


YALE
MEDICAL LIBRARY



HISTORICAL
LIBRARY



DBL HCC

Vorlesungen
über
Kinderkrankheiten.

Ein Handbuch
für
Aerzte und Studirende

von

Dr. Eduard Hensch,

Geh. Medicinalrath, Professor an der Universität und Director der Klinik und Poliklinik
für Kinderkrankheiten im Königl. Charité-Krankenhaus zu Berlin.

Zweite vermehrte Auflage.

Berlin 1883.

Verlag von August Hirschwald.

N.W. 68. Unter den Linden.

Das Recht der Uebersetzung wird vorbehalten.

Vorrede zur ersten Auflage.

Das vorliegende Buch enthält fast ausschliesslich die persönlichen Erfahrungen, welche ich während einer siebenundreizigjährigen Praxis und einer fast unausgesetzten poliklinischen Thätigkeit im Gebiete der Kinderkrankheiten zu sammeln Gelegenheit hatte. Die im Jahre 1872 mir übertragene Leitung der Kinderklinik in der Königl. Charité setzte mich in den Stand, nicht nur die bereits sehr grosse Zahl meiner Beobachtungen in allen Perioden des Kindesalters auf eine ungewöhnliche Höhe zu bringen, sondern denselben auch die sichere anatomische Grundlage zu geben, welche die poliklinische und Privatpraxis für sich allein niemals gewähren kann. Nur auf ein so massenhaftes, genau beobachtetes, und alle Schichten der grossstädtischen Bevölkerung umfassendes Material gestützt, konnte ich es wagen, für diese fast gänzlich aus eigener Erfahrung hervorgegangene Arbeit den Titel „Handbuch für Aerzte und Studierende“ in Anspruch zu nehmen.

Dass die Beobachtungen des einzelnen Arztes trotzdem lückenhaft bleiben, dass ihm, je älter und erfahrener er wird, immer noch neue, den früher erlebten theilweise widersprechende Thatfachen entgegentreten, ist selbstverständlich, und schon aus diesem Grunde wird man nicht erwarten dürfen, in diesem Buche alles Krankhafte beschrieben oder auch nur erwähnt zu finden, was bei Kindern überhaupt vorkommen kann. Ausserdem halte ich es nicht für angemessen, ein Werk über Kinderkrankheiten mit ermüdenden Wiederholungen von Dingen zu belasten, welche in allen Büchern über allgemeine und specielle Pathologie und Chirurgie ausführlich abgehandelt werden, und deren Kenntniss ich schon bei meinen klinischen Zuhörern, noch weit mehr aber bei meinen Lesern voraussetzen darf. Nur diejenigen Krankheiten des Kindesalters, welche sich durch eine überwiegende Frequenz oder durch Eigenthümlichkeiten ihrer Erscheinung vor den gleichen Affectionen der Erwachsenen auszeichnen, sollen den Gegenstand dieser Arbeit bilden, und desshalb

blieb auch die Variola, welche heutzutage bei Kindern fast eine Seltenheit geworden ist, ausgeschlossen. Mein Schweigen über die Vaccination aber kann ich nur dadurch entschuldigen, dass ich den unzähligen Abhandlungen über dieselbe aus eigener Erfahrung nichts Wesentliches hätte hinzufügen können.

Ueber die Wahl der Vorlesungsform brauche ich heut, wo dieselbe längst Mode geworden, kein Wort zu verlieren. Ohne ihre Mängel zu verkennen, halte ich doch die Vortheile dieser Form, die Zwanglosigkeit und angenehmere Lectüre, für überwiegend. Dazu kommt noch der Umstand, dass sie die Einschaltung casuistischer Mittheilungen, welche hier die Stelle von Illustrationen vertreten, bedeutend erleichtert. Gerade mit dieser zahlreichen Casuistik, welche ich dem Leser biete, hoffe ich ihm einen Dienst zu leisten, und bitte daher, dieselbe nicht zu überschlagen. Ich war stets bemüht, die „Fälle“ möglichst kurz zu fassen, die Hauptpunkte, um die es sich handelt, hervorzuheben, und die unerträgliche Breite und Langweiligkeit „exacter“ Krankengeschichten zu vermeiden.

Dass ich nicht bloss den klinischen Schilderungen, sondern auch den therapeutischen Empfehlungen nur meine eigene Erfahrung zu Grunde legte, wird gewiss jeder Arzt billigen, welcher das in den meisten Compendien beliebte kritiklose und verwirrende Nebeneinanderstellen vieler Mittel und Methoden zu seinem Schaden kennen gelernt hat. Die dem Buche beigegebenen Receptformeln, auf welche im Text durch die Bezeichnung F. 1, 2 u. s. w. hingewiesen wird, halte ich für kein Verbrechen gegen die Wissenschaft. Aeltere Aerzte können sie entbehren; jüngeren, auf deren Wünsche ich besonders Rücksicht nahm, werden sie eine willkommene Handhabe für den Anfang ihrer Kinderpraxis bieten.

Berlin, im Januar 1881.

Der Verfasser.

Vorrede zur zweiten Auflage.

Ein Jahr nach der Publication der ersten sehr starken Auflage dieses Buches fand die Verlagsbuchhandlung sich in der Lage, mich zur Bearbeitung einer zweiten aufzufordern. Dieser kaum erwartete Erfolg gab mir die erfreuliche Gewissheit, keine aufzuhebende Arbeit unternehmen zu haben. Auch waren mir von nah und fern so viele Beweise von Befriedigung und Anerkennung zugegangen, dass ich, selbst wenn der äussere Erfolg minder glänzend gewesen wäre, mich nicht veranlasst gefühlt hätte, von dem Grundplaze des Werkes in irgend einer Weise abzugeben. Durch die Heranziehung vieler experimenteller, anatomischer und chemischer Dinge kann man freilich einer klinischen Arbeit leicht das bestechende Gepräge moderater Wissenschaftlichkeit geben. Ich verzichte aber auch in dieser neuen Auflage auf diese Art der Darstellung, welche überall ihre Hypothesen und Erklärungen bereit hält, und besonders auf den Anfänger mehr verwirrend als klärend wirkt. Das Gährungsstudium, in welchem sich ein Theil unserer Hülfswissenschaften jetzt befindet, erfordert dringend die strengste Sichtung und Kritik, wenigstens für Zwecke, um welche es sich hier handelt. Mir lag es vor allem daran, dem Leser gegenüber in vollem Sinne des Wortes wahr zu sein, strenge Selbstkritik, besonders auch in therapeutischen Dingen, zu üben, weil gerade hier soviel gesündigt wird, und aus der Fülle selbstbeobachteter Thatsachen eine sichere Grundlage für weitere Studien zu construire. Der Beifall meiner Collegen beweist, dass dieser Weg der richtige war, und ich darf deshalb hoffen, dass auch diese neue, durch vielfache Zusätze vermehrte Auflage die gleiche freundliche Aufnahme bei denen, für welche sie bestimmt ist, finden wird.

Berlin, im April 1883.

Der Verfasser.

Druckfehler,

Auf S. 74, Zeile 2, ist statt „doppelt“ „nicht so viel Fett“ zu lesen.

Inhalts-Verzeichniss.

Einführung und Untersuchungsmethoden

Seite
1

Erster Abschnitt.

Krankheiten der Neugeborenen.

Ikterus neonatorum	20
Tremor u. Tetanus neonatorum	25
Cephalämatem.	31
Hämatom des Sternumsternons	36
Anschwellung der Brustdrüsen	37
Erysipelas neonatorum.	39
Sklerema neonatorum	46
Pomphigus neonatorum	52
Aphthen des Gaumens	57
Melena neonatorum.	59

Zweiter Abschnitt.

Krankheiten des Säuglingsalters.

I. Die atrophischen Zustände der Kinder	63
II. Das Scur	77
III. Das hereditäre Syphilis	84
Das Syphilis des späteren Kindesalters	108
IV. Die dyspeptischen Zustände der Säuglinge	112
V. Die Strym der Säuglinge	127
VI. Der Reizpharyngitis	150
VII. Die Dentition und ihre Erscheinungen	158

Dritter Abschnitt.

Krankheiten des Nervensystems.

I. Die Convulsionen der Kinder	145
Epilepsie	157
II. Das Stimmungsleiden	161

III. Die idiopathischen Contracturen	165
Tremor	172
IV. Der Nickerampf, Spasmus nictans	173
V. Der Veitstanz, Chorea minor	177
Chorea electra	180
VI. Die hysterischen Affektionen der Kinder	193
Chorea magna	199
VII. Das mütterliche Aufstrecken, Paros miensum	211
VIII. Ophthalmische Lähmungen	213
Paralyse des N. facialis	213
Plexus brachialis	217
IX. Die spande Kinderlähmung	219
Andere Krankheiten des Rückenmarks	230
X. Das Pseudokrupptrophie der Muskeln	232
XI. Die hämorrhagische Lähmung	234
XII. Die Tuberculose des Gehirns	239
XIII. Geschwülste des Gehirns	249
XIV. Die atrophische Geschwülstlähmung	252
XV. Der chronische Wasserkopf, Hydrocephalus chronicus	256
XVI. Hyperämie des Gehirns, Thrombose der Sinus	265
XVII. Die infektiöse Meningitis	272
XVIII. Die eitrige Meningitis	288
XIX. Neuragische Zustände	298
Migräne	298

Vierter Abschnitt.

Krankheiten der Respirationorgane.

I. Die Entzündung der Nasenschleimhaut, Rhinitis	301
II. Der Pseudokrupp	304
III. Die Atelctase der Lunge	306
IV. Die entzündlichen Affektionen des Kehlkopfs und der Luftröhre	310
V. Die Bronchitis und die katarrhalische oder Bronchopneumonie	325
VI. Die „fibrinöse“ Pneumonie	344
VII. Die chronische Pneumonie	358
VIII. Die Pleuritis	362
IX. Die Tuberkulose der Lunge	374
X. Der Lungenbrand	385
XI. Der Keuchhusten	399

Fünfter Abschnitt.

Krankheiten der Circulationsorgane.

I. Die angeborenen Herzfehler	400
II. Die erworbenen Affektionen des Herzens	411

Sechster Abschnitt.

Seit.

Krankheiten der Verdauungsorgane.

I. Die entzündlichen Affektionen der Mundschleimhaut	423
II. Der Mandelwund, Tonsill.	426
III. Die entzündlichen Affektionen des Pharynx.	433
Hypertrophie des Mandels.	435
IV. Die entzündliche Parotitis	443
V. Die Krankheiten der Speiseröhre	447
VI. Die Krankheiten des Magens	456
Dyspepsia gastrica	447
Magenalgie	452
VII. Der Brechdurchfall	455
VIII. Die katarrhalische Darmerkrankung	461
IX. Die Ruhr	470
X. Die Stuhlverengung	475
Die Darmverengung	475
XI. Die Mastdarmdivertikeln	485
XII. Der Mastdarmentzündung	488
XIII. Die Katarrhe des Darmkanals	491
XIV. Die acute und chronische Peritonitis	503
XV. Die Tuberkulose der Unterleibsorgane	509
XVI. Die Krankheiten der Leber	521
XVII. Die Krankheiten der Milz	531
XVIII. Die Geschwülste der Bauchhöhle	536

Siebenter Abschnitt.

Krankheiten der uropoetischen Organe.

I. Die entzündlichen Affektionen der Nieren	549
II. Störungen der Harnexcretion	551
III. Krankheiten der äußeren Genitalien	559

Achter Abschnitt.

Die Infektionskrankheiten.

I. Das Scharlachfieber	568
II. Die Masern	629
III. Die Windpocken	649
IV. Die Diphtherie	655
V. Der Typhus abdominalis	691
Fekris intermittens	721

Neunter Abschnitt.

Constitutionelle Krankheiten.

I. Der Rheumatismus	723
II. Die Anämie	732

III. Die Purpura	734
IV. Die Strophulosen	743
V. Die Karbunkel	756

Zehnter Abschnitt.

Die Krankheiten der Haut.

I. Erythem und Interitide	777
II. Lichen-Scrophulas und Psoriasis	789
III. Ekzema und Impetigo	783
IV. Ekthyma	793
V. Abscess des subcutanen Gewebes	792
Rosythermia	794
Regener	798

Einleitung und Untersuchungsmethode.

M. H.! Die Kinderheilkunde wird in der Regel als eine Specialität betrachtet. Ich halte infess diese Auffassung deshalb für nicht zutreffend, weil fast alle Krankheiten der Kinder mit sehr wenigen Ausnahmen auch bei Erwachsenen vorkommen. Wenn trotzdem ein Specialstudium aus diesen Krankheiten gemacht, besondere Kliniken für dieselben eingerichtet worden und eine reiche pädiatrische Literatur vorhanden ist, so liegt der Grund dafür vorzugsweise darin, dass

1) ein grosser Theil der betreffenden Krankheiten bei Kindern ungemein häufiger und in prägnanterer Weise, als im späteren Alter beobachtet wird (die acuten Exantheme, der Keuchhusten, die Dyspepsien, die Meningitis tuberculosa u. s. w.), und

2) die ärztliche Untersuchung eines kranken Kindes eine Gewandtheit erfordert, welche man trotz aller Geschicklichkeit in der Untersuchung Erwachsener nur durch fleissige Uebung an Kindern erwerben kann.

Dazu kommt nun noch der wichtige Umstand, dass insbesondere der jugendliche Arzt, dessen Thätigkeit sich fast immer zunächst in den unteren kinderreichen Volksschichten bewegt, gleich beim Eintritt in die Praxis vorwiegend kranke Kinder zu behandeln hat. Dieser Umstand, der früher nicht so gewürdigt wurde, wie er es verdient, kommt jetzt mehr und mehr zum Bewusstsein der Betheiligten. Wenigstens glaube ich dies aus der stets wachsenden Zahl meiner klinischen Zuhörer, unter denen nicht wenige junge Aerzte sich befinden, schliessen zu dürfen. Um so auffälliger erscheint es, dass nur die Facultäten sich hartnäckig dieser Einsicht verschliessen, und hinter den längst durchbrochenen Wällen veralteter Satzungen gelingen der Pädiatrik das Recht eines eignen Lehrstuhls bestreiten.

Ich kann aber von vornherein nicht verschweigen, dass auch das eifrigste Studium der Kinderkrankheiten und die reichste Erfahrung Ihnen

nicht schmerzliche Täuschungen in Bezug auf therapeutische Erfolge nicht ersparen wird. Leider sind die Lebensbedingungen des frühen Kindesalters der Art, dass auch die rationellste und aufopferndste Behandlung seiner Krankheiten Seitens des Arztes in erschreckend vielen Fällen wirkungslos bleibt. Von jeher hat die überaus grosse Mortalität dieser Lebensperiode die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Welt und die allgemeine Theilnahme auf sich gelenkt, ohne dass es bisher gelungen wäre, dieser furchtbaren Thatsache auf erfolgreiche Weise entgegenzutreten. Die Statistik giebt uns unwiderlegbare Beweise dafür in die Hand, dass die Sterblichkeit der Kinder in den ersten Lebensmonaten am stärksten ist, während des ganzen ersten Jahres noch immer diejenige der späteren Jahre um mehr als das Doppelte übertrifft, erst nach dem zweiten Jahre allmählig abnimmt, und etwa nach dem fünften Jahre die gewöhnlichen Verhältnisse erreicht. Von 1000 Geborenen stirbt etwa der 5. Theil im ersten Lebensjahre, während die allgemeine Mortalität der Bevölkerung sich etwa wie 25:1000 verhält.

Aus diesem kann ich Ihnen das Verhältniss durch folgende Zusammenstellung veranschaulichen. Auf meiner Abtheilung in der Clinik wurden in den Jahren 1874–1880/1881 Kinder aufgenommen, von denen 4159 unter und 2801 über zwei Jahre alt waren. Von der ersten Reihe starben 2570, d. h. etwa 62–70 pCt., von der zweiten Reihe nur 506, d. h. etwa 19 pCt. Ganz besonders wird das erste Semester des Lebens betroffen, denn von 2335 Kindern, welche den 6. Monat noch nicht überschritten hatten, starben 2010, d. h. etwa 80 pCt. Ueberraschender war diesen furchtbaren Ergebnissen sind die aus weit grösseren Zahlen entnommenen, wohnman allerdings den Aufenthalt im Krankenhaus und den ständigen Zustand der Heilnahl der aufgenommenen kleinen Kinder als besonders ungünstig wirkende Factoren für meine Berechnungen in Anschlag bringen muss.

Diese enorme Mortalität der beiden ersten Lebensjahre, zumal der ersten sechs Monate, erklärt sich aus zwei Reihen von Ursachen, von denen die erste in der unangemessenen Entwicklung des Kindes, die zweite in äusserlichen Verhältnissen zu suchen ist. Sie wissen, dass mit der Geburt die Entwicklung des kindlichen Körpers keineswegs abgeschlossen ist, dass vielmehr noch derselben, ganz abgesehen vom Wachsthum, noch sehr wichtige Veränderungen in diesem Organismus sich vollziehen. Ich erinnere Sie nur an die Schliessung gewisser fetaler Kanäle des Kreislaufs, die Secidung der grauen und weissen Gehirnsabstanz, die Entwicklung des Darmdrüsenystems, den Durchbruch der Zähne, das Wachsthum der Knochen, Procten, welche an sich schon geeignet sind, pathologische Veränderungen in den betreffenden Organen hervorzurufen. Während nun die Kinder der bevorzugten Klasse unter der sorglichen Pflege liebender Eltern und bei angemessener Ernährung

diese bedrohlichen Entwicklungsergänge leichter überstehen, sehen wir unter der Ungunst der äusseren Lebensverhältnisse in den armen Volksschichten zahlreiche verderbliche Einflüsse sich geltend machen, welche die normale Entwicklung in pathologische Bahnen lenken. Die verdorbene Luft ruzer, überfüllter Wohnräume, die mehr oder minder mangelbehaftete, dem kindlichen Magen widerstrebende Ernährungsweise, der Einfluss der Kälte, des Hungers, die mangelnde Pflege der Mutter, die nur allen oft durch die einer gewissenlosen Fremden ersetzt werden soll — alle diese Momente wirken zusammen, den normalen Entwicklungsgang aufzuhalten und jene jammervollen Krankheitsbilder zu schaffen, die uns in den Sprechstunden der Armenärzte, in den Polikliniken, in den Kinderstationen der Krankenhäuser entgegentreten. Viele dieser unglücklichen Geschöpfe tragen von einer kranken Mutter her den Keim des Todes von vornherein in sich und fallen schon in den ersten Tagen nach der Geburt als Opfer der angeborenen Lebensschwäche; viele andere gehen an erworben Syphilis zu Grunde; die meisten werden atrophisch, durch anhaltende Diarrhoe heruntergebracht, oder durch wiederholte Bronchialkatarrhe mit secundären Anschwellungen der Bronchialdrüsen, welche schliesslich zu käsigen Degenerationen und allgemeiner Tuberculose führen, verimirt. Ein grosser Theil dieser Kinder ist unheilbar geboren, und nicht wenige Mütter überlassen, wie ich aus eigener reicher Erfahrung versichern kann, das ihnen kostig gewordene Kind dem Krankenhause, nicht um es geheilt wiederzusehen, sondern in der heiler nur zu sehr gerechtfertigten Hoffnung, auf immer von ihm befreit zu werden. Von den in meine Abtheilung aufgenommenen Kindern dieser Art starb ein grosser Theil noch am Tage der Aufnahme. Diesen socialen Missständen gegenüber blieben unsere ärztlichen Bemühungen nur allzu häufig nachthlos, in dem Erfahren sinkt überhaupt schon von vornherein der Muth, etwas zu unternehmen. Das aufgelöste und kaum lösbare Problem, die eigentlich causale Infection, bleibt hier die Hebung der bezeichneten Missstände, gegen welche die Medicin als solche ohnmächtig ist. —

Wir beschäftigen uns zunächst mit der ärztlichen Untersuchung, welche, wenigstens während der ersten Lebensjahre, wesentlich von derjenigen der erwachsenen Patienten abweicht. Erschwerend wirkt schon der Mangel der Sprache oder die Unfähigkeit der Kinder, dem Arzte eine genügende Auskunft zu geben. In der Privatpraxis können die Mütter dafür eintreten, während man im Krankenhause meistens ohne alle Beihilfe der Angehörigen und ohne anamnestiche Data auf eine rein objective Untersuchung, wie beim kranken Thier, beschränkt ist. Die Schwierigkeit steigert sich noch durch die Angstlichkeit und das Widerstreben der

Kinder dem fremden Arzte gegenüber. Während Sie bei der Untersuchung Erwachsener am besten thun, unbekümmert um die Zwischenreden des Kranken regelmässig ein Organsystem nach dem andern zu exploriren, und mit der Anamnese abzuschliessen, werden Sie dies Princip im Kindesalter nicht selten preisgeben müssen, weil die Widersetzlichkeit des kleinen Patienten Sie nöthigen kann, jeden günstigen Augenblick zur Besichtigung oder Auscultation von Theilen zu benutzen, die eben nur während eines ruhigen Intervalls gut zu untersuchen sind, z. B. die Rachenorgane oder das Herz. Auf diese Weise bekommt das Krankenexamen leicht etwas Springendes, Unregelmässiges, welches zumal dem Ueingeübten die schliessliche Uebersicht der erhaltenen Resultate erschweren kann. Andererseits aber wird die Zusammenfassung des Krankheitsbildes zur Diagnose erleichtert durch die bei Kindern natürlich weit kürzere und einfachere Anamnese. Ueber das Benehmen des Untersuchers dem Kinde gegenüber lassen sich keine bestimmte Regeln aufstellen. Mag es auch richtig sein, dass manche Aerzte Kindern sympathischer sind, als andere, so wird auch der von ihrer Zuneigung am meisten Getragene oft genug in den Fall kommen, durch ihr Schreien und Toben während der Untersuchung erheblich gestört zu werden. Man überwindet diesen Widerstand je nach dem Charakter und der jetzmaligen Stimmung der Kinder mit Güte oder mit Gewalt, im Anfange der Praxis meistens mit grosser verwirrender Schwierigkeit, die sich aber mit der fortschreitenden Uebung immer mehr verliert und schliesslich kaum noch störend erscheint. Viele Kinder lassen sich durch Erregung der Aufmerksamkeit, Vorhalten einer Uhr, eines Spielzeugs, einer brennenden Kerze, eines Stethoskops, mit welchem sie spielen, während der Untersuchung leidlich beruhigen, und für besonders wichtige Fälle haben wir in der Chloroformirung ein Mittel, jeden Widerstand brechen und in aller Ruhe untersuchen zu können, so namentlich in Fällen, wo es sich um die Exploration der Bauchhöhle, der Harnblase, des Mastdarms oder schwerhafter Gelenkaffectionen handelt.

Kleine Kinder in den ersten Lebensjahren werden am besten in der Weise untersucht, dass sie auf dem Schoosse der Mutter oder Wärterin, das Gesicht dem Fenster zugewendet, dem Arzte gegenüber sitzen. Wenn es irgend angeht, lasse ich auch fiebernde Kinder aus dem Bette nehmen und in die bezeichnete Stellung bringen, welche durch die Mithätigkeit der Pflegerin, die das Kind stützt und festhält, und durch die volle Beleuchtung wesentliche Hilfe gewährt. Nicht selten widerstrebt aber das Kind den Händen, die es halten wollen, bewegt und windet sich hin und her und bereitet dadurch gerade der Percussion und Auscultation

die grössten Schwierigkeiten. Man hat daher versucht, mit einem Stethoskop, dessen Röhr durch einen Gummischlauch gebildet wird, diesen Bewegungen zu folgen, und dies gelingt allerdings weit leichter, als mit einem soliden Instrument; ich habe indess nach vielen Versuchen mit jenen Stethoskopen dieselben ganz aufgegeben, weil sie oft störende Nebengeräusche erzeugten, und empfehle Ihnen daher nur unser gewöhnliches Stethoskop, dessen unteres Ende Sie indess während der Untersuchung immer zwischen den Fingern haben müssen, einmal um sicher zu sein, dass es sich überall im Contact mit der Brustwand befindet, dann aber auch, um nicht mit dem Kopfe einen zu gewaltsamen Druck auf den Thorax auszuüben, welcher sofort Schreien hervorruft. Ein Gummirand, um diesen Druck zu mildern, ist für das untere Ende zu empfehlen, muss aber öfter erneuert werden, weil er im abgebrauchten Zustande knarrende Nebengeräusche hervorbringt. Bei sehr unruhigen Kindern kann man nur mit dem unbewaffneten Ohr auscultiren, welches auch stärkeren Bewegungen der Patienten mit Leichtigkeit folgen kann, wenn zur der Untersucher, den Thorax des Kindes umfassend, seinen Kopf anhaltend im Contact mit demselben erhält. Viele Aerzte glauben, mit der Untersuchung der Rückenfläche ihre Pflicht erfüllt zu haben; ich treide Sie aber dringend auf, in keinem Falle die Vorder- und Seitenfläche zu vernachlässigen. Gar nicht selten fand ich die Zeithen einer Pneumonie unterhalb der Clavicula, während hinten alles normal war, und der zungenförmige Fortsatz der linken Lunge, welcher sich über das Pericardium legt, liess mich öfters pneumonische Geräusche hören, die an anderen Stellen des Thorax noch gar nicht oder weit undeutlicher wahrgenommen wurden. Die Vorderfläche mögen Sie in sitzender oder liegender Stellung, letzteres besonders bei sehr jungen Kindern, untersuchen; die Rückenfläche aber nur im Sitzen oder in der Seitenlage, niemals in der Bauchlage. Durch die Compression des Abdomens müssen in diesem Falle die Baucheingeweide und das Zwerchfell aufwärts gedrängt und der Thoraxraum beschränkt werden, was bei einer bereits vorhandenen Erkrankung der Athmungsorgane nicht nur die Dyspnoe steigert, vielmehr schon einen plötzlichen Tod während der Untersuchung zur Folge hatte.

Die Percussion erregt bei vielen Kindern weit mehr Unbehagen, als die Auscultation, und das durch die erstere hervorgerufene Geschrei beeinträchtigt in hohem Grade die Klarheit ihrer Resultate. Ausserdem hat jede schiefe Körperhaltung, jede Muskelaction bei den Bewegungen des Thorax eine leichte Veränderung des Schalles zur Folge, und Sie begreifen daher, mit wie grosser Sorgfalt man bei unruhigen Kindern in

der Beurtheilung der Schallhöfungen zu Werke gehen muss. Unendlich ist glaube ich bei der ersten Untersuchung eine Verschiedenheit des Schalles an den beiden Thoraxhälfen zu finden, während die wiederholte Percussion, wenn der Thorax ganz ruhig und gerade gestellt wurde, mich über die Täuschung aufklärte. In zweifelhaften Fällen Meistens die Auscultation als die beste Controlle. Versäumen Sie übrigens nie, die Percussion sowohl während des Ein- wie während des Ausathmens vorzunehmen, zumal bei schreienden Kindern, weil hier die percutirten Theile während des Schreiens mehr oder weniger luftleer sind und demgemäss einen matten und leeren Schall geben, der während der Inspiration verschwindet. Ganz besonders ist dies, wie Vogel mit Recht bemerkt, am unteren Theil der hinteren Rückenfläche der Fall, wo die durch Schreien und Pressen aufwärts gedrückte Leber den Schall dämpfen und Täuschungen veranlassen kann. Bei dieser Untersuchung wird unsere Geduld oft stark in Anspruch genommen, indem es recht schwer werden kann, die stillen das Geschrei unterbrechenden Inspirationen rasch zur Percussion zu benutzen. Dabei haben kleine Kinder noch die Gewohnheit, besonders während der Auscultation den Athem so lange als möglich anzuhalten, und mit Ungeduld, ja mit Aerger wartet der Arzt auf einen solchen Athemzug. Der Auscultation schadet das Geschrei bei weitem weniger als der Percussion; im Gegentheil finde ich während der das Schreien unterbrechenden tiefen Inspirationen die in den Lungen stattfindenden Geräusche viel deutlicher hörbar, als im ruhigen Zustande. Ich gebe mir daher auch nie besondere Mühe, ein schreiesendes Kind vor dem Auscultiren zu beruhigen, und empfehle nur der Umgebung absolutes Stillschweigen.

In Betreff der Percussion rathe ich Ihnen noch zu möglichst heftigen Anschlagen des Plessimeters. Die Resonanzverhältnisse des kindlichen Thorax sind besonders wegen der Elasticität seiner Wandungen so günstige, dass jede starke Percussion durch Erregung von Mitschwingungen entfernterer Partien einen soenen vollen Schall auch über Theilen ergeben kann, die nicht mehr lufthaltig sind und demgemäss bei leinem Klopfen einen matten und leeren Schall geben. Ich benutze zur Percussion der Kinder ein kleines Plessimeter von Elfenbein und einen gewöhnlichen Hammer; nur bei grosser Magerkeit (eingesunkenen Inter-costalräumen) und beim Percutiren der Supraclaviculargegend muss das Plessimeter mit dem untergelegten Finger der linken Hand vertauscht werden *).

*) Jede Arbeit, welche vollständige und genaue Forschungen über die Diffe-

Um die Frequenz der Respiration zu beurtheilen, müssen Sie das Kind in einem möglichst ruhigen Zustande untersuchen, am besten, wo es angeht, während des Schlafes. Jede Aufregung, Geschrei u. s. w. trübt die Resultate. Indem Sie Ihre Hand behutsam auf den Thorax oder das Abdomen des Kindes legen und mit der anderen Hand die Secundenuhr halten, sind Sie im Stande, die Zahl der respiratorischen Hehungen und Senkungen auf dem Zifferblatte abzulesen. Im wachen Zustande wird auch bei nicht schlafenden Kindern diese Untersuchung häufig durch das oben erwähnte Aushalten des Athems gestört, wobei dann Pausen der Respiration mit rasch auf einander folgenden kurzen Athemzügen abwechseln. Aus diesem Grunde ist es auch durchaus nicht leicht, die normale Zahl der Athembewegungen für ein bestimmtes Lebensalter anzugeben. Im Allgemeinen steht fest, dass dieselbe bei Kindern bis zum 7. oder 8. Lebensjahre grösser ist, als bei Erwachsenen, und zwar um so grösser, je jünger die Kinder sind, entsprechend der Frequenz des Pulses. Die Herzaction des Kindes ist an und für sich schon rascher, durch jeden psychischen Eindruck im hohen Grade erregbar, und besonders die Furcht vor dem ihm mehr oder weniger fremden Arzte steigert die Zahl der Pulse oft in einem Grade, dass die Zählung für die Diagnose absolut werthlos wird. Das beste Beispiel für diesen Einfluss geben uns Kinder, die an Icterus leiden. Die bei Erwachsenen so charakteristische Verlangsamung des Pulses in dieser Krankheit habe ich im kindlichen Alter bis etwa zum 7. Jahre nie beobachtet und kann den Grund dafür nur in der erwähnten Erregbarkeit des Herzervensystems suchen, welche den heftigsten Einfluss der Gallensäuren vollständig compensirt. Eine richtige Zählung des Pulses kann daher, zumal bei kleinen Kindern, ebenfalls nur im Schlafe vorgenommen werden und gelingt auch oft, sobald man sich nur recht still verhält und die Spitze des Zeigefingers sanft auf die Radialarterie legt. Man hat dabei nur den Umstand zu beachten, dass der Puls auch bei vollkommen gesunden Kindern während des Schlafes zuweilen etwas unregelmässig ist, was durchaus nichts Besorgnissgebendes hat. Durch

rasen der physikalischen Untersuchung bei Kindern gelingt, ist gewiss viel Dank zu sagen, und in diesem Sinne verdient die Schrift von Sahli (*Die topographische Percussion im Kindesalter*, Bern 1882) besonders hervorgehoben zu werden. Dennoch scheinen mir die praktischen Resultate derselben der angewandten Arbeit nicht entsprechend zu sein, namentlich in Betreff der Percussion des Thorax. Ich glaube vielmehr, dass hier die Controlirung der Percussionsresultate durch die Auscultation für die Diagnose bei weitem werthvoller ist, als alle aufgestellten Regeln. Sie nur so oft durch zufällige Nebenumstände Ausnahmen scheitern dürfen.

Zählungen im wachen Zustande lassen sich, abgesehen von einzelnen Ausnahmefällen und von schon älteren Kindern, nie zuverlässige Resultate erhalten, und daraus erklärt es sich auch, dass die von den verschiedenen Autoren erhaltenen Zahlen so erheblich von einander abweichen.

Im Durchschnitt glaube ich für die ersten Lebensmonate eine Frequenz von 120–140, für das zweite Jahr von 100–120 als die normale betrachten zu müssen, worauf dann eine allmähliche Abnahme erfolgt. Bei Kindern von 3–6 Jahren überschreitet die Pulszahl immer noch 90, und erst nach der zweiten Dentition nähert sie sich mehr und mehr den Verhältnissen der Erwachsenen. In entsprechender Weise gestaltet sich nun die Frequenz der Respiration, wobei man immer das Verhältniss derselben zum Pulse, wie etwa $1:3\frac{1}{2}$ bis 4, im Auge zu behalten hat. Ich wiederhole indess, dass man gerade im Kindesalter aus den schon angegebenen Gründen mit solchen Durchschnittsberechnungen für die Praxis wenig oder gar nichts gewinnt. Nur unter ganz bestimmten Umständen bekommt hier die Zahl der Pulse eine diagnostische oder prognostische Bedeutung, so die Verlangsamung derselben im Beginne, die colossale Beschleunigung am Schlusse der tuberculösen Meningitis, und die enorme Frequenz im Scharlachfieber. Im Allgemeinen erschien mir immer der Rhythmus und die Qualität des Pulses von weit grösserer Bedeutung für den Arzt. Die Ungleichheit und Unregelmässigkeit der Schläge in der ersten Periode der Meningitis tuberculosa, das Kleinwerden und allmähliche Schwinden der Pulsweite in schweren Krankheiten, einmal infectiöser Natur — das sind Momente von einschneidender Bedeutung, auf welche ich im Laufe dieser Vorlesungen wiederholt zurückkommen werde. Dasselbe gilt von dem Verhältnisse des Pulses zur Respiration, welches im Normalzustande $3'$, bis $4:1$ ist. Wird dies dauernd gestört, kommen z. B. 40 bis 60 Athembögen auf 120–140 Pulse, so dürfen Sie fast mit Sicherheit eine Erkrankung der respiratorischen Organe annehmen; nur ausnahmsweise kann, wie wir später sehen werden, ein nervöser Einfluss hier in Betracht kommen. Die Sicherheit der Diagnose wächst, wenn die Athembögen nicht bloss rascher und oberflächlicher, sondern gleichzeitig mühsamer erscheinen, wenn gewisse Hülfsmuskeln in Thätigkeit treten und die Expiration stöhnend wird. Nur selten werden Sie unter diesen Umständen bei der physikalischen Untersuchung die Befunde einer Bronchitis, Pneumonie oder Pleuritis vermissen.

Fast noch grössere Schwierigkeiten, als die der Lungen, bietet in den ersten Kinderjahren die Untersuchung des Herzens. Die rasche

Aufeinanderfolge seiner Schläge und das häufig begleitende anhaltende Geschrei machen es nicht selten unmöglich, gleich bei der ersten Untersuchung ein sicheres Urtheil über die Reiztheit der Töne und über die percussorischen Verhältnisse abzugeben. Am bedenklichsten aber bleibt immer die laryngoskopische Untersuchung. Während bei sehr jungen Kindern von derselben kaum die Rede sein kann, findet der Arzt auch bei älteren, wenn nicht immer, doch in der Regel einen nur schwer zu überwindenden Widerstand. Und gelingt es auch, den Kehlkopfspiegel richtig einzuführen und in der erforderlichen Lage festzuhalten, — wird die Fläche desselben durch das beim Schreien, Husten oder Würgen aus den Raubentheilen aufwärts geschleuderte Secret bald in einer Weise getrübt, dass kein deutliches Bild zu gewinnen ist. Wenn ich auch nicht in Abrede stellen will, dass die Exploration bei vielen Kindern unter günstigen Verhältnissen gelingt, so muss ich doch dabei beharren, dass sie in einer weit grösseren Zahl von Fällen keine oder nur sehr unsichere Resultate ergibt. Noch weit unzuverlässiger sind die Schlüsse, welche ältere Autoren aus dem Charakter des Geschreies ziehen wollten. Nur der Heiserkeit desselben oder seiner Ersetzung durch schmerzliches Winseln kann ich eine praktische Bedeutung zuerkennen. Dass Neugeborene beim Schreien niemals Thränen vergiessen, wird Ihnen bekannt sein; es muss also die Secretion der Thränenrüsen um diese Zeit noch ebenso mangelhaft sein, wie diejenige der Speicheldrüsen, wovon später die Rede sein wird.

Die Untersuchung der Mund- und der Rachenhöhle bietet bei einiger Übung nur selten Schwierigkeiten dar, und ich wundere mich daher oft über das Ungeschick, mit welchem manche Aerzte dabei verfahren. Öffnet das Kind, wenn man es dazu auffordert, nicht von selbst den Mund, so thut man am besten, mit dem Zeigefinger die kindliche Unterlippe über den unteren Kieferrand zu schieben und gegen denselben anzudrücken, wobei auch die Gefahr des Beissens für den Arzt vermieden wird. Denn jeder Versuch dazu würde dem Kinde, dessen Lippe sich zwischen dem drückenden Finger und den Zähnen befindet, sehr schmerzhaft werden. Der Widerstand, welchen die eigensinnig geschlossenen Kiefer dieser Manipulation entgegensetzen, wird bei einiger Beharrlichkeit meistens rasch überwunden, zumal wenn man durch Zusammendrücken der Nasenlöcher das Kind nöthigt, durch den Mund Athem zu holen. Sobald man nun mit dem Finger über die untere Zahnreihe hinaus ist, öffnet das Kind gewöhnlich den Mund hinreichend, um die Mund- und Rachenhöhle gut übersehen zu können. Im entgegengesetzten Falle kann man dies durch Benutzung eines Zungenspatels leicht erreichen.

Vor allem sorge man dabei für gute Beobachtung der Nasenathmung, entweder durch helles Tageslicht, oder wo dieses nicht zu haben ist, durch eine kleine Kerze, deren Flamme man vor einem mit derselben Hand gefassten silbernen Löffel festhält. Mit dieser einfachen, vom Reflexspiegel ersetzenden und überall schnell zu beschaffenden Vorrichtung erzielt man eine treffliche Beobachtung, deren ich mich sehr häufig bediene. Immerhin aber werden Sie es bisweilen mit Kindern zu thun bekommen, welche allen unseren Versuchen, den Mund zu öffnen, eines unüberwindlichen Widerstand entgegensetzen, so dass man schließlich ganz davon absteht oder durch geduldsames Auseinanderschrauben der Kiefer zum Ziele zu gelangen suchen muss.

Um nun die erhaltenen Untersuchungsergebnisse für die Diagnose verwertbar zu machen, müssen Sie die Kenntnisse derjenigen Momente sich aneignen, durch welche sich gewisse Befunde im kindlichen Alter, und zwar im gesunden Zustande, von den gleichen bei Erwachsenen unterscheiden, damit Sie nicht, was sonst leicht geschehen könnte, in die Lage kommen, normale Verhältnisse als pathologische anzusprechen. Zunächst mache ich Sie auf die Differenzen aufmerksam, welche der Charakter des normalen Athmungsgeräusches in den verschiedenen Lebensaltern darstellt. In den ersten Wochen und Monaten nach der Geburt ist das Geräusch noch ziemlich schwach, weil die kurze oberflächliche Respiration nicht anreicht, die Luft kräftig durch die Bronchien hineinzuheben, und aus demselben Grunde giebt auch die Pericostion in diesem Alter am ganzen Thorax einen minder sornen Schall. Aber schon von der Mitte des ersten Jahres an beginnt das Athmungsgeräusch jene Eigenschaften anzunehmen, die man auch unter gewissen Umständen bei Erwachsenen findet und mit dem Namen des puerilen Athmungsgeräusches zu bezeichnen pflegt. Dasselbe hat einen auffallend scharfen, fast blasenden Charakter, die Inspiration ist fast allein hörbar, die Expiration im collig ruhigen Zustande wenig oder gar nicht, während sie bei Aufregungen deutlich hörbar wird¹⁾. Das scharfe puerile Athmen steigert sich noch in den Fällen, wo der Thorax durch eine rachitische Deformation auf anormale Weise verengt wird, und es wäre daher denkbar, dass auch bei gesunden Kindern die relative Enge des Brustraumes durch

¹⁾ Dabei will ich noch erwähnen, dass vorübergehend bei ganz gesunden Kindern allein durch Aengstlichkeit oder jense Rhythmus entstehen kann, welcher für die respiratorischen Krankheiten der Kinder bezeichnend ist, nämlich das Ueberwiegen einer verlängerten abklingenden Expiration über der ganz kurzen, wie ein Nachhall darauf folgenden Inspiration.

leichte Compression der inspiratorisch sich ausdehnenden Lunge jenen rauhen blasenden Charakter begründet¹⁾.

Die krankhaften Geräusche, welche von den Lungen oder der Pleura ausgehen, sind im Allgemeinen von denen der Erwachsenen nicht verschieden. Nur lautet man mittels und besonders feuchtblaige Rasselgeräusche weit häufiger, nicht selten mit der Eigenthümlichkeit, dass sie beim Exspiriren vorherrschen, während die Inspiration fast rein erscheinen kann. Der Typus der Respiration ist bei jungen Kindern bis zum dritten Jahre überwiegend der abdominale. Zwerchfell und Bauchmuskeln arbeiten auffallend stark, wodurch schon im gesunden Zustande durch leichte Einziehung des Epigastrums und der unteren Rippen eine Andeutung jenes pathologischen Befundes entsteht, den wir bei wichtigen respiratorischen Erkrankungen in weit stärkerem Maasse entwickelt finden. Unregelmässigkeit des Athems im wachen Zustande, selbst kleine Pausen dürfen nicht beunruhigen; beides kommt bei kleinen Kindern nicht selten vor. Mit dem relativ engen Thorax contrastirt der voluminöse Unterleib, der von besorgten Müttern so oft als krankhaft angesehen, in der That aber nur durch die relative Enge des Thorax und durch eine Tendenz zur Gasbildung im Darmkanal bedingt wird.

Unter den Befunden, welche die Untersuchung des Kopfes ergibt, verdient zunächst ein auscultatorisches Phänomen erwähnt zu werden. Bei ruhigen Kindern mit noch offener grosser Fontanelle, d. h. also im Durchschnitt während der beiden ersten Lebensjahre, vernimmt man durch das auf die grosse Fontanelle applicirte Ohr oder Stethoskop, wenn auch nicht constant, doch sehr häufig ein mit der Herzsystole isochrones, mehr oder weniger lautes blasendes Geräusch. Da auch das Athengeräusch in Folge der Vibration des durch die Rachenhöhle streichenden Luftstroms, sowie jeder durch Sitzen, Kauen und Schlucken hervor-

¹⁾ Siemoch, aber keineswegs sicher ist die von Sabatier (Étude sur l'auscultation du poulmon chez les enfants. Paris 1863) gegebene Erklärung. Nach den mühsamen Messungen dieses Autors soll nämlich beim erwachsenen Menschen und Singebner die Capacität des Bronchialbaums von Centrum nach der Peripherie hin im Allgemeinen zunehmen, bei Kindern hingegen abnehmen, d. h. das Lautes der von einem Bronchus abströmenden beiden Aeste soll zusammengekommen hier enger als das des primären Bronchus sein, während das Umgekehrte bei Erwachsenen der Fall sei. Durch diesen Umstand soll bei diesen die Strömungsgeschwindigkeit der Luft in den Bronchien nach der Peripherie hin sich verringern, bei Kindern aber zunehmen und das Athengeräusch desselben dadurch trüber erscheinen, wenn auch die grössere Schärfe der zwischen zwei abströmenden Bronchialästen aufragenden Knorpelsperre, welche die Vibration der vorbeistreichenden Luftsäule veranlasst, das Ueberschüssige beiträgt.

gebrachte Laut auf der Fontanelle wahrgenommen wird, so muss man, zumal bei sehr schnell athmenden Kindern, während des Auscultirens die Hand am Pulse haben, um sich vor Irrthümern zu bewahren. Bei grösserer Übung ist man indess bald im Stande, auch ohne diese Vorsichtsmaassregel das systolische Blasen ohne Mühe neben dem Athmungsgeräusche zu hören und beide von einander zu unterscheiden. Nur sehr selten hörte ich das Blasen auch auf der schon geschlossenen Fontanelle und an anderen Stellen des Schädels, wie denn auch Andere dasselbe an den hinteren und seitlichen Fontanellen, und bei geschlossenem Schädel in der Richtung der Art. meningea media, ja sogar auf den Processus spinosi der Nackenwirbel wahrnahmen. Während die ersten Entdecker dieses Geräusches, die Amerikaner Fisher (1833) und Whitney (1843) demselben stets eine pathologische Bedeutung merkannten, und ich selbst *) nach meinen Untersuchungen geneigt war, dasselbe in Zusammenhang mit der Rachitis zu bringen, leiteten Henning und Wirthgen das physiologische Vorkommen des Geräusches von der 22. oder 23. Lebenswoche an bis zum knöchernen Schlusse der Fontanellen. Ich stimme nach dem Resultat meiner seit jener Zeit fortgesetzten Untersuchungen nunmehr mit der Ansicht dieser Autoren überein und glaube, dass das Geräusch nur deshalb so überwiegend häufig bei Rachitischen gehört wird, weil bei densen Kindern eben die Fontanellen und Nähte weit länger offen bleiben, als es sonst der Fall ist. Welche Ursachen dem systolischen Schädelgeräusche zu Grunde liegen, ist bis hent unentschieden. Die Ansicht von Jurawcz, dass dasselbe in Folge einer relativen Enge des Sinus carotici in der Carotis entstehe, fand einen Widersacher in Epstein, welcher dasselbe zu einem in den Carotiden am Halse stattfindenden Geräusch in Beziehung zu bringen geneigt ist. Jedenfalls halte ich das sogenannte „Hirnbblasen“ in klinischer Beziehung für interestesslos und für die Diagnose nicht verwertbar.

Viel wichtiger sind für uns die Verhältnisse der Fontanellen und Suturen des Schädels. Beim neugeborenen Kinde finden Sie die letzteren durch eine knorpelige, etwas vorragende Leiste geschlossen, sämtliche Fontanellen aber noch häufig, so dass der Finger im Stande ist, die Pulsationen des Gehirns auf der vorderen Fontanelle zu fühlen, und zwar am deutlichsten dann, wenn das Gehirn ungewöhnlich blutreich wird und durch einen stärkeren Druck die häufige Fontanelle über das Niveau der umgebenden Knochenränder emporhebt. Diese pralle, elastische, pulsirende Beschaffenheit der vorderen Fontanelle ist daher für die Praxis

*) Beiträge zur Kinderheilk. Berlin 1861. p. 170.

ein werthvolles Zeichen stattfindender Gehirnhyperämie, sowie andererseits das Einsinken der Fontanelle unter dem Niveau der Umgebung aus einem anämischen verflärten Zustand des Gehirns verkündet, wie er häufig bei atrophischen Kindern oder am Schluss erschöpfender Krankheiten (Dürre, Brechdurchfall) vorkommt. Während nun die beiden seitlichen und hinteren Fontanellen schon in den ersten Monaten nach der Geburt durch Ossification sich schliessen, bleibt die vordere grosse Fontanelle nicht nur noch offen, sondern nimmt sogar während der ersten sechs Monate noch an Umfang zu, und wird erst in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres durch Verschieben der sie umschliessenden Knochenränder allmählig kleiner, bis sie etwa gegen den 15. Lebensmonat sich vollständig schliesst. Zu dieser Zeit müssen Sie also bei gesunden Kindern den Schädel allseitig geschlossen finden. Indess sind diejenigen Fälle nicht ganz selten, in welchen die Fontanelle noch bis tief in's zweite Jahr hinein eine mit der Fingerspitze zu bedeckende häutige Stelle zeigt, die man dann nicht ohne Weiteres als eine krankhafte Erscheinung ansehen darf. Alle sonstigen Abweichungen aber, insbesondere ein grösseres und noch länger sich hinziehendes Offenbleiben der grossen oder kleinen Fontanellen, ein Auseinanderklaffen der Suturen, eine ungewöhnliche Eindrückbarkeit der Knochenränder müssen als pathologische aufgefasst werden und sollen später bei der Betrachtung der Rachitis berücksichtigt werden. Dasselbe gilt von einigen Anomalien der Kopfform, die mit gewissen Krankheiten (Rachitis, Hydrocephalus) in Zusammenhang stehen, während die individuellen Verschiedenheiten der Schädelform, welche nicht durch Krankheiten, sondern nur durch Anomalie des Knochenwachsthums bedingt sind (Asymmetrie, Schiefstellung der Medianlinie, Dolichocephalus u. s. w.), das klinische Interesse nur dann in Anspruch nehmen dürften, wenn sich gleichzeitig Symptome eines Cerebralleidens (Hemiplegie, Contracturen, Zurückbleiben der Intelligenz) nachweisen lassen. Als eine Hauptdifferenz von Erwachsenen müssen Sie immer die Thatsache festhalten, dass bei Kindern in den beiden ersten Lebensjahren der Umfang des Schädeldgewebes denjenigen des Gesichts ganz unverhältnissmässig überwiegt, so dass das Verhältniss etwa wie 6:1 (bei Neugeborenen sogar 8:1), bei Erwachsenen wie 2 $\frac{1}{2}$:1 angegeben wird. Man hat dies wohl zu beachten, um die Angstlichkeit vieler Mütter, welche ihre Kinder für hydrocephalisch halten, beruhigen zu können, ganz besonders in Fällen, wo das erwähnte Misverhältniss durch rachitische Verdickung der Schädelknochen noch erheblich gesteigert wird. Unter diesen Umständen können manche Kinder erst ungewöhnlich

spät ihren Kopf ohne Unterstützung aufrecht zu halten, was im ganz gesunden Zustande oft schon im 3. bis 5. Lebensmonate möglich ist. Gerade in dieser Beziehung giebt es aber zahlreiche Ausnahmen, welche hauptsächlich durch die grössere oder geringere Kraft der Musculatur, zumal der Nackenmuskeln, bedingt werden. Man darf desshalb, auch wenn ein Kind den Kopf nach dem 3. oder 6. Monat nicht aufrecht halten kann, sondern immer noch einer Unterstützung bedarf, nicht gleich eine angeborene cerebrale Erkrankung annehmen, wenn nicht etwa andere Zeichen, besonders Mangel der intellectuellen Entwicklung, starrer Blick, Nystagmus der Augäpfel, ungeschicktes Greifen mit den Händen oder völlige Apathie eine solche Annahme rechtfertigen.

Bei der Untersuchung der Mundhöhle wird Harn bei neugeborenen Kindern sofort die dunkelrothe Farbe der Schleimhaut auffallen, welche erst nach einigen Wochen langsam schwindet, und als eine normale Erscheinung zu betrachten ist. Mit dieser Hyperämie verbindet sich ein gewisser Grad von Trockenheit, weil die Secretion des Mundspeichels noch nicht in der Weise stattfindet, wie bei älteren Kindern und Erwachsenen. Die in neuerer Zeit angestellten Untersuchungen (Ritter, Korowin, Schiffer und Zweifel) ergaben ziemlich übereinstimmend, dass Mundspeichel zwar von der Geburt an vorhanden ist, aber nur in so geringer Menge, dass seine zuckerbildende Kraft wenig oder gar nicht in Betracht kommt. Erst gegen das Ende des 2. Monats nimmt die Speichelsecretion merklich zu; auch Zweifel beginnt sie in den Submaxillärdrüsen und im Pankreas überhaupt erst um diese Zeit, während die Parotis schon bei Neugeborenen ptyalinhaltig ist. Diese mangelhafte Speichelsecretion ist auch die Ursache, dass die Mundschleimhaut der Säuglinge in den ersten Monaten, wenn sie nicht sehr sorgfältig gewaschen wird, bei der Untersuchung mit Lakmuspapier fast immer etwas sauer, und selbst nach dem Auswaschen noch neutral, nur selten alkalisch gefunden wird. Wir werden später sehen, wie wichtig diese Umstände für die Ernährungsweise der Kinder werden können.

Bei sehr vielen Neugeborenen sieht man in der Raphe des harten Gaumens hirsekom- bis stecknadelkopfgroße, weissgelbliche, über der Schleimhaut nur wenig prominirende Knötchen, entweder vereinzelt oder mehrere hintereinander, die mittelst von einem schmalen rötlichen Saum umgeben sind. Diese hirseweissen etwas länglichen Knötchen finden sich in den ersten 4—6 Wochen des Lebens sehr häufig und haben durchaus keine pathologische Bedeutung. Während Bohn dieselben als verstopfte Schleimfollikel, ähnlich den Milien der äusseren Haut, Gayon

und Thierry als Epidermoideysten und Meidenhauer¹⁾ als solide, vom Epithel in die Schleimhaut hineingewachsene Zapfen und als sich entwickelnde Drüsenbläsche betrachteten, scheint in neuester Zeit Epstein²⁾ mit seiner Auffassung das Richtige getroffen zu haben. Die Untersuchungen dieses Autors ergaben nämlich, dass man es hier mit epithelgefüllten Spalträumen, welche auch der Vereinigung der beiden Gartnerhöhlen zurückzuführen, zu thun hat.

In Betreff der Zunge haben Sie zu beachten, dass dieselbe bei Säuglingen meistens mit einem dünnen weisslichen Belag versehen ist, zumal nach dem Saugen (Milchsaugen), und dass sie bei vielen älteren Kindern ein eigenthümliches „laackkartonartiges“ Aussehen darbietet, d. h. der Zungenrücken zeigt vielfach gewundene oder mehr geradlinige weissgelbliche, meistens etwas gewölbte Figuren. Diese Beschaffenheit der Zunge, deren anatomische Bedingung noch nicht klar, vielleicht in einer ungleichmässigen Ablösung des Epithels zu suchen ist, kommt sehr oft bei völlig gesunden Kindern vor, hat daher durchaus keinen diagnostischen Werth, und namentlich mit der hereditären Syphilis nichts zu schaffen.

Fast ganz mit dem erwachsenen Alter übereinstimmende Resultate ergiebt die Untersuchung des Herzens, welche uns daher nicht länger beschäftigen soll. Für die Praxis reicht es hin, zu wissen, dass bei jüngeren Kindern, mehr in der zweiten Kindheit als in den beiden ersten Jahren, die Bewegungen des normalen Herzens oft in zwei bis drei Interkostalräumen undulirend sichtbar sind und die Rippen stärker gehoben werden als im späteren Alter. Auch kann man den Spitzenstoss häufig etwas nach aussen von der Mammarlinie fühlen, ohne dass eine Vergrösserung des Organs vorliegt. Rachitische Abflachung der seitlichen Thoraxwand begünstigt in hohem Grade diese Erscheinungen.

Ich reihe diesen Erörterungen noch einige Worte über die Untersuchung der Temperatur, des Urins und der Faeces an. Ueber den Werth der Thermometrie im Kindesalter brauche ich wohl kein Wort zu verlieren; in einem Alter, wo alles noch weit mehr auf objective Untersuchung ankommt, als späterhin, ist diese Methode nicht hoch genug anzuschlagen. Leider ist infoss nur die Hospital- und Privatpraxis zu ihrer vollständigen Verwerthung geeignet, während in der Poliklinik und in den Sprechstunden der Armenärzte eine vertrauenswürdige

¹⁾ Archiv f. Gynäkol. Bd. VII. Heft 2.

²⁾ Ueber die Epithelperlen in der Mundhöhle u. s. w. Zeitschr. für Heilkunde, 1. Bd. Prag 1880.

Messung wegen der Häufung der Kranken und des nicht genügenden Personals kaum durchführbar ist. Unter diesen Umständen muss man sich, abgesehen von besonders wichtigen Fällen, mit der Abschätzung der Temperatur durch die aufgelegte Hand begnügen und in Betreff des weiteren Fieberverlaufes auf die Angaben der Mütter verlassen, die wenigstens die Zeit der Exacerbationen meistens ganz richtig angeben. Die Messung mit dem Thermometer nehme ich durchweg in der Achselhöhle vor. Wenn auch die Untersuchung hier mindestens 10–12 Minuten fortgesetzt werden muss und daher doppelt so lange dauert, als im Mastdarm, so bedenke man wohl, dass selbst bei aller Vorsicht durch eine plötzliche Bewegung ein Abbrechen des Thermometers im Rectum möglich ist, wie ich dies selbst gesehen habe. Wer sich über diese Möglichkeit hinwegsetzt, wird allerdings bei der Messung im Rectum viel Zeit ersparen. Uebrigens sind die Temperaturverhältnisse bei Kindern und Erwachsenen die gleichen; nur besteht während der ersten 3–4 Lebensmonate eine entschiedene Tendenz zur Abkühlung. Die Wärmeproduction scheint in diesem Alter mit geringerer Energie vor sich zu gehen, denn in sehr vielen Fällen von ungelauter Ernährung, erschöpfenden Säureverlusten oder insuffizienter Leberthätigkeit sehen wir die Temperatur allmählig ungewöhnlich tief, selbst bis auf 39° C. und noch tiefer heruntergehen. Diese Eigenthümlichkeit geht sich auch darin kund, dass sonst hochfieberige Krankheiten, z. B. Pyämien, in dem bezeichneten Alter mit normaler oder gar subnormaler Temperatur verlaufen können, wovon ich mich im Säuglingssaal meiner Klinik oft überzeugt habe. Deshalb braucht man aber noch keine eigene Krankheit unter dem Namen „Algor progressivus“ aufzustellen, wie es Herveux gethan hat, da diese enorme Abkühlung eben bei den verschiedensten Zuständen auftreten kann, welche nur den schliesslichen Ausgang der Erschöpfung mit einander gemein haben.

Sehr schwierig ist bei Neugeborenen und Säuglingen die Untersuchung des Urins, weil derselbe immer in die Windeln entleert wird, und die Abschätzung seiner Menge und Farbe aus der Betrachtung der letzteren sehr unsicher ist. Man kommt aber mitunter schon in diesem Alter Fälle vor, in denen es durchaus nothwendig ist, den Urin auf Eiweiss oder selbst auf Zucker zu untersuchen, und man muss zu diesem Zweck den Urin entweder in besonderen Apparaten, bei kleinen Mädchen in gut gereinigten, vor den Genitalien applicirten Schüsseln, bei Knaben in Condois oder Gummiblasen, die um den Penis befestigt werden, auffangen, oder durch die Einführung eines elastischen Katheters in die Blase zu gewinnen suchen, was wir in der Klinik vorzogen. Der Prak-

tiker begnügt sich in der Regel mit der Abschätzung der Urinmenge des Neugeborenen aus den Windeln. Die Nässe desselben giebt ihm einen Massstab für die Menge der aufgenommenen Nahrung, und aus der verminderten Menge des Secrets schließt er meistens mit Recht auf eine ungenügende Nahrungsaufnahme oder eine mangelhafte Resorption der aufgenommenen Nahrung. Erst in der neuesten Zeit wurde der Urin der Neugeborenen einer sorgfältigen Untersuchung von Parrot und Robin¹⁾, Dohrn²⁾, Martin und Ruge³⁾, Cruse⁴⁾, Camerer⁵⁾ u. A. unterworfen. Die von diesen Autoren erhaltenen Resultate sind aber nicht durchweg übereinstimmend. Für den Arzt ist besonders die Thatsache interessant, dass Martin und Ruge während der ersten 10 Tage nach der Geburt im Urin zuweilen eine geringe Menge von Albumen fanden, entweder nur vorübergehend oder auch während mehrerer Tage, und geneigt sind, diesen Befund mit der Ausstossung der in den Harnkanälchen vorkommenden karnsauren Infante, von denen später die Rede sein wird, in Verbindung zu bringen. Cruse's Untersuchungen ergaben ähnliche Resultate, während Parrot und Robin Albumurie bei gesunden Neugeborenen nie, Dohrn nur selten gefunden haben wollen. Bei Kindern, die über 10 Tage alt waren, fand Cruse⁴⁾ niemals Albumen, wohl aber eine grössere Menge Mucin im Harn, welches zu Durchungen Anlass geben kann.

Auch die Faeces können bei Neugeborenen und Säuglingen immer nur mit Urin vermischt in den Windeln untersucht werden. Im normalen Zustande sind dieselben fast geruchlos, haben etwa die Farbe und Consistenz von Rohriera und erfolgen 2–4mal täglich. Abweichungen von dieser Regel, besonders eine seltener oder etwas längere Entleerung, sind noch nicht als krankhafte zu betrachten, so lange die Consistenz nicht flüssiger, der Geruch nicht sauer oder faulig wird. Bei manchen Kindern ist die Färbung der Faeces auch im Normalzustande nicht eigelb, sondern mehr in's Bräunliche spielend. Lässt man die Windeln längere Zeit liegen, so wird die gelbe Farbe dadurch, dass der Sauerstoff der Luft den braunen Gallenfarbstoff in Biliverdin umwandelt, sehr oft grünlich, und man muss daher, um ein sicheres Urtheil zu gewinnen, die

¹⁾ *Comptes rendus*, Bd. 52, No. 1.

²⁾ *Monatsschr. f. Gek.* Bd. 29.

³⁾ Ueber das Verhalten von Harn und Nieren der Neugeborenen, Stuttgart 1873.

⁴⁾ *Jahrb. f. Kinderkrankheiten*, 1877, XI, p. 395.

⁵⁾ *Ibid.* 1880, XV, p. 361.

⁶⁾ *Jahrb. f. Kinderkrankheiten*, 1878, XIII, p. 71.

Faeces immer möglichst frisch untersuchen. Im Umkreise der letzteren sieht man meistens einen durch den Urin verunreinigten nassen farblosen Hof in den Windeln. Ich mache Sie indess hier schon darauf aufmerksam, dass es Diarrhöen giebt, bei denen zuerst ziemlich normal aussehende Faeces entleert werden, auf welche aber eine mehr oder weniger copiose Ausgussung seröser Flüssigkeit aus dem Mastdarme folgt. Die durch letztere entstehende Durchnässung der Windeln kann nun zu Irrthümern verleiten, indem man sie für urämis und die Faeces für normale hält. Ich würde dies nicht erwähnen, wenn mir ein solcher Fall nicht erst vor Kurzem bei einem 4 Monate alten Kinde vorgekommen wäre, welches bei einem zunehmenden Collaps das erwähnte Aussehn der Windeln, in der Mitte ziemlich gut verformte gelbe Faeces und rings um dieselben einen blassen, scheinbar urämis Hof darbot. Durch eigene Beobachtung überzeugte ich mich, dass jedesmal nach der Entleerung der festeren Faecalmassen eine grössere Menge dünner trüber Flüssigkeit mit Heftigkeit aus dem Anus hervorspritzte, dass also in der That eine Diarrhoe stattfand, welche den Kräfteverfall erklärte.

Schliesslich komme ich noch auf die Schmerzensäusserungen kleiner Kinder, welche fast nur in Schreien bestehen. Dies Schreien von demjenigen zu unterscheiden, welches der Ausdruck des Hungers oder irgend eines unerfülllichen Unbehagens ist, bildet keine leichte Aufgabe, und zwar nicht bloss für den Anfänger. Ich halte es für ganz unzweifelhaft, Sie hier mit einer Schilderung der verschiedenen Modificationen des Geschreis aufzuhalten, wie es viele Autoren gethan haben. Für die Praxis kommt dabei fast gar nichts heraus. Ob ein Kind kräftig schreit oder nur winselt, das hört natürlich ein Jeder und kann auch danach die dem Kinde zu Gebote stehenden Kräfte beurtheilen; ebenso ob die Stimme klar ist oder durch Affectionen der Larynxschleimhaut einen keiseren Klang angenommen hat. Starkes andauerndes Schreien, welches keinen Hustenfall erregt, ist bei Affectionen der Athmungsorgane immer ein günstiges Zeichen, weil es einen verhältnissmässig geringen Reizungszustand der respiratorischen Schleimhaut anzeigt. Anfälle von heftigem Schreien mit starken Bewegungen der unteren Extremitäten, besonders Anzielen derselben gegen den Unterleib, deuten bei Säuglingen meistens auf Colikschmerzen. Aber trotz dieser und mancher anderen Erfahrungssätze bleibt es, wie schon gesagt wurde, oft recht schwierig zu beurtheilen, ob das Geschrei des Kindes in der That irgend ein Leiden bedeutet oder einen andern Grund hat, zumal da die Gegenwart des Arztes allein schon hinreicht, viele Kinder lebhaft zu beunruhigen und zum anhaltenden Schreien zu bewegen. In so zweifelhaften Fällen, wo

ein Druck nicht bloss auf den scheinbar leidenden Theil, sondern auf jede andere Körperstelle das Geschrei hervorrufen oder verstärken, kann man nur dann zum Ziel gelangen, wenn es gelingt, das Kind völlig zu beruhigen und dann die Untersuchung von neuem zu beginnen. Kann man dabei die Aufmerksamkeit des Kindes gleichzeitig durch Spielzeug, durch eine vorgehaltenen Uhr oder durch die Wendung des Auges gegen das helle Tageslicht (am Fenster) vom Orte der Untersuchung ablenken, so gelingt es oft, aber nicht immer, den wirklich gegen Druck empfindlichen Theil herauszufinden.

Für die Beurtheilung des Zustandes von Neugeborenen und Säuglingen empfehle ich Ihnen noch, die Haltung der Hände während des Schlafes zu beobachten. Gesunde Kinder dieses Alters schlafen bekanntlich mit derartig flektirten Armen, dass die Hände ganz nach oben gerichtet und in der Höhe des Halses oder Unterkiefers gehalten werden. Diese Stellung, vielleicht eine Erinnerung an das Uterinleben, verändert sich im Fall einer ernstlichen Krankheit und kann somit als ein beruhigendes Moment betrachtet werden. Bei dieser Gelegenheit bemerke ich, dass gesunde Kinder im Schlafe zwar meistens die Augen fest geschlossen haben, dass aber doch bei nicht wenigen ein geringes Klaffen der Lidspalte beobachtet wird. Man muss sich im einzelnen Falle nach diesem Umstande erkundigen, der, wie wir später sehen werden, viel häufiger eine pathologische Bedeutung hat.

Erster Abschnitt.

Krankheiten der Neugeborenen.

Das Säuglingsalter erstreckt sich von der Geburt his gegen den 9. Monat, wo die Entwicklung der Zähne das Ende desselben bezeichnet. Mit Recht trennt man von dieser Periode den Beginn derselben, d. h. etwa die ersten 4—6 Lebenswochen ab, während welcher man das Kind als ein „Neugeborenes“ zu bezeichnen pflegt, denn dieser ersten Periode gehören in der That eine Reihe krankhafter Zustände an, welche später entweder gar nicht oder doch weit seltener und in veränderter Form vorkommen, Zustände, welche zum Theil mit den Vorgängen der Geburt und mit der plötzlichen Versetzung des Kindes aus dem mütterlichen Schoosse in das Luftleben zusammenhängen.

Alle Neugeborenen bieten in den ersten Tagen nach der Geburt eine durch Hyperämie bedingte, mehr oder minder intensive rothe Farbe der

gesamten Haut dar. Bei vielen Kindern geht diese Farbe, allmählig erblässernd, etwa nach einer Woche in die normale Hautfarbe über; bei vielen anderen aber erfolgt dieser Uebergang durch einen Zwischenzustand, indem die rothe Farbe zunächst einer mehr oder weniger gesättigten gelben Hautfärbung Platz macht, welche man mit dem Namen des

Icterus neonatorum

(Gelbsucht der Neugeborenen) bezeichnet. Sie bemerken diese gelbe Farbe meistens schon am zweiten oder dritten Tage nach der Geburt, aber fast niemals gleichmäßig verbreitet, sondern an einzelnen Theilen, besonders an der Stirn, um den Mund herum, am Rumpfe stärker entwickelt als an den Extremitäten. Je mehr die oben erwähnte Rötze erblasst, um so deutlicher und allgemeiner tritt die gelbe Färbung hervor, die meistens einen Stich in's Orangefarbige hat und nicht sehr intensiv zu sein pflegt. Dieselbe pflegt mehrere Tage zu bestehen, dann allmählig abzunehmen und im Verlaufe von 8–14 Tagen der normalen Hautfarbe Platz zu machen.

Wenn Sie sich bei der Untersuchung solcher Kinder der Symptome erinnern, welche Ikterus des späteren Lebensalters darbietet, so werden Sie sehr auffallende Unterschiede finden. Die Windeln zeigen eine Durchmässung mit blasserem Urin, die Faeces sind gelb oder bräunlich, wie im Normalzustande; die Sklera des Auges aber, welche wegen des energischen Zukneifens der Augenlider oft nur schwer zu sehen ist, zeigt fast in allen Fällen eine deutliche gelbe Färbung, und auch die durch Fingerdruck auf das rothe Zahnfleisch momentan erzeugte blasser Druckstelle zeigt, wenn auch mitunter nur schwach, den gelben Schimmer, den wir beim Ikterus älterer Personen zu sehen gewohnt sind. In manchen Fällen indess, wo der Ikterus überhaupt nur schwach entwickelt ist, fehlt auch die gelbliche Färbung der Sklera. Dazu kommt, dass außer der gelben Hautfärbung überhaupt keine krankhaften Erscheinungen bestehen, vielmehr alle Functionen gut von Statten gehen, und binnen 8–14 Tagen Alles vorüber ist, natürlich abgesehen von denjenigen Fällen, in welchen Complicationen mit anderen Krankheiten bestehen. Diese Unschädlichkeit des *icterus neonatorum* und seine ungemeine Frequenz war die Ursache, dass man denselben gar nicht als eine Krankheit, sondern mehr als einen physiologischen Zustand betrachten wollte.

Vor Allem handelt es sich darum zu bestimmen, wodurch denn die gelbe Farbe der Haut bedingt wird, ob man es hier in der That mit einem in der Leber gebildeten Gallenpigmente zu thun hat. Ueber diese Frage sind die Ansichten bis jetzt immer noch getheilt. Die ursprüng-

lich von französischen Autoren vertretene Ansicht, es handle sich hier gar nicht um eine wirklich biliose Färbung, sondern nur um eine aus der rothen Farbe der Neugeborenen hervorgehende gelbliche Pigmentirung, dürfte heut kaum noch einen ernstlichen Vertheidiger finden. Denn nicht die Haut allein ist im Icterus neonatorum gelb gefärbt, sondern auch ein grosser Theil der inneren Organe. Ich selbst habe mich bei Sectionen wiederholt von dieser Thatsache überzeugt, und Orth⁷⁾ beschreibt einen Fall, wo sogar das Gehirn, welches sonst beim Icterus überhaupt wenig oder gar nicht gefärbt zu sein pflegt, intensiv gelb erschien. Es kann also keinem Zweifel unterliegen, dass die Färbung der Gewebe durch ein Pigment bedingt ist, welches mit dem der Galle wesentlich übereinstimmt. Die Untersuchungen von Orth geben dieser Anschauung eine neue Stütze. Die schon früher gemachten Beobachtungen von krystallinischem Pigment im Blute und in verschiedenen Organen Neugeborener wurden von ihm, wenigstens nach dem Tode, bestätigt, und zwar in der Weise, dass ein solches Pigment nur bei bestehendem allgemeinen oder schon im Verschwinden begriffenen Icterus vorkomme⁸⁾. Das Pigment, welches in Form von rothen rhombischen Täfelchen oder Säulchen oder von büschelförmig vereinigten Nadeln sehr reichlich im Blute, in den Nieren, der Leber und vielen anderen Organen vorkommt, ergab die mikrochemischen Charaktere des Bilirubins, und Orth steht daher nicht an, die Krystalle als Bilirubin zu betrachten, welches sich nach dem Tode aus dem vorher im Blutplasma gelösten Gallenfarbstoffe bildet. Freilich bleibt dabei die Frage ungelöst, auf welche Weise dieser Gallenfarbstoff in's Blut gelangt ist, und gerade in dieser Frage stehen sich die Meinungen noch streitend gegenüber. Während die Einen den Icterus als einen hämatogenen durch Bildung von gelbem Pigment im Blute selbst entstehen lassen, nehmen Andere einen hepatogenen Ursprung, analog dem gewöhnlichen Stauungsicterus, an. Wenn ich nun auch selbst wiederholt gesehen habe, dass man bei der Section mancher Fälle kleine Schleimgänge aus dem Ductus choleloechus herauspressen kann, so sprachen doch während des Lebens der gallige Darminhalt und der normal gefärbte Urin dafür, dass dieselben nicht ausreichend waren, um eine beträchtliche Gallenretention und Resorption in der Leber zu bedingen. Andererseits aber findet man vielfach den Ductus

⁷⁾ Virchow's Archiv, Bd. 68, Ueber das Vorkommen von Bilirubinkrystallen bei neugeborenen Kindern.

⁸⁾ Unter 37 Fällen fand Orth das Pigment 32mal bei Icternis, und auch in den übrigen 5 Fällen liess sich das frühere Vorhandensein der Gelbsucht nicht absolut in Abrede stellen.

chloëisches und hepaticus frei von hemmenden Schlingtröpfen, und aus diesem Grunde hat die hämatogene Auffassung des Icterus neonatorum sich immer mehr Anhänger erworben. Nur fehlt auch hier der sichere Nachweis der Ursache, welche eine so bedeutende Abscheidung von gelbem Pigment im Blute bedingt. Jedenfalls ist dann ein sehr reichlicher Untergang rother Körperchen im Blute und ein entsprechendes Freiwerden von Blutfarbstoff erforderlich, aus welchem dann Bilirubin und Hämatoidin hervorgehen. Wir wissen, dass das Blut der Neugeborenen überhaupt schon relativ reicher an rothen Blutkörperchen, als das älterer Individuen ist (Thomas, Demme), und Hayem, Hölzel u. A. haben auch das Zugrundegehen massenhafter durch den Nabelschnurzufluss in den Kindeskörper gelangter Blutkörperchen durch Zählung nachgewiesen. Bestätigen sich nun die Untersuchungen von Parak¹⁾ u. A., so würde sich daraus der Einfluss einer langsamen, erst nach dem Aufhören der Pulsation erfolgenden Unterbindung des Nabelstranges auf das Zustandekommen des Icterus ergeben. Bei dieser Methode soll nämlich noch eine grössere Blutmenge aus der Placenta in den Kreislauf des Neugeborenen gelangen, als bei der raschen Unterbindung, und demgemäss auch ein massenhafter Zerfall rother Körperchen und eine reichlichere Bildung von Bilirubin und Hämatoidin im Blute stattfinden, deren Ausscheidung, besonders bei schwächlichen Kindern, in unzureichender Weise vor sich geht. Auf diese Weise sollen sich dann die Pigmente in den Organen anhäufen und gelbe Färbungen erzeugen.

Gegen diese Ansicht, die gewiss manches Bestechende hat, lässt sich aber zunächst der von Cohnheim²⁾ erhobene Einwand geltend machen, dass beim Icterus neonatorum niemals Hämoglobin im Harn und in den Nieren vorkäme, was doch bei dem massenhaften und raschen Untergang der Blutkörperchen der Fall sein müsste. Auch die neueste Arbeit von Cruse³⁾ erschütterte diese Theorie. Derselbe fand schon die Farbe des sorgfältig aufgefangenen Urins gelber als im Normalzustande, und constatirte ferner, dass die zuerst von Virchow, später von Robin und Parrët, Violet u. A. beschriebenen gelben Körperchen (Masses jaunes), welche constant im Urin icterischer Neugeborener entweder in Epithelzellen eingebettet, oder frei umherschwimmend, oder von hyalinen Cylindern umschlossen gefunden werden, durch die mikrosc-

¹⁾ Parak, *Considérations sur l'ictère du nouveau-né*. Paris 1878. — Schüßling, *Bef. kün. Wochenschr.* 1879. Nr. 28. — Violet, *Virchow's Archiv*, Bd. 80, p. 353.

²⁾ Vorlesungen über allgemeine Pathologie. Bd. 2, p. 296.

³⁾ *Archiv f. Kinderheilkunde*. Bd. 1. 1880. p. 354.

nische Reaction sich als wirkliches Gallenpigment ausweisen. Auch gelang es ihm in allen Fällen von intensiverem Icterus gelöstes Gallenpigment im Urin durch Schütteln mit Chloroform nachzuweisen, was früheren Untersuchern nicht gelungen war. Auf diese Befunde gestützt betrachtet er den Icterus neonatorum als einen hepatogenen, bedingt durch Hyperämie der Leber und starke Epithelabstossung in den feineren Gallengängen, deren obstruierender Einfluss indess nicht stark genug sei, um die Galle gänzlich vom Darm abzuschliessen. Den anatomischen Nachweis für die Richtigkeit dieser Annahme ist er bis jetzt freilich schuldig geblieben.⁹⁾

Begünstigt wird die Entwicklung des Icterus durch Schwäche der Neugeborenen, durch ungünstige Verhältnisse bei und nach der Geburt, Einwirkung der Kälte, Atelaktase des Lungengewebes, mangelhafte Respiration, schlechte Luft, woraus sich das besonders häufige Vorkommen des Icterus in Gebäuhäusern und Färdelanstalten, und bei Kindern von geringem Gewicht erklärt. Von einer Behandlung ist kaum die Rede, da die Affection von selbst heilt. Gute Pflege und Sorge für Stuhlfgang, wenn derselbe mangelt, reichen aus.

In einer nicht kleinen Zahl von Fällen aber complicirt sich der Icterus mit anderen weit erheblicheren krankhaften Zuständen, welche an sich schon geeignet sind, einen tödlichen Ausgang herbeizuführen. Viele dieser Kinder sind in höchstem Grade emaci, mager und lebensschwach zur Welt gekommen, zeigen starke Säureentwicklung im Munde und am Gaumen, und leiden von vorn herein an Erbrechen und Diarrhoe. Auch unter diesen Umständen konnte ich eine gelbe Farbe, also Gallengehalt des Erbrochenen wiederholt constatiren. Die ungünstigste Complication ist jedenfalls die mit Sclerema neonatorum, glücklicher Weise eine ziemlich seltene. Bemerkenswerth erschien mir ein im Juli 1875 in der Privatpraxis beobachteter Fall wegen der Dunkelheit der Aetiology und des unerwartet günstigen Ausganges:

Ein 14 Tage altes Kind litt seit etwa 10 Tagen an Gelbsucht, die in den letzten Tagen plötzlich erheblich zugenommen hatte. Der Stuhlging war dunkel gefärbt, schwärzlich braun, schaumig und spärlich; die Urinfarben in den Windeln gelblich gerändert. Dabei starke Säureentwicklung bis in den Pharynx hinein, frühe

⁹⁾ Auch B. Schultze plaidirt für die hepatogene Natur unseres Icterus, und nimmt nach der Theorie von Frerichs eine verminderte Gallenresorption in Folge der nach der Geburt stattfindenden Fällungsabnahme der Lebergefässe an, weil der Zufuss durch die Nabelvene plötzlich aufhöre, ausserdem aber der Druck in der Aorta abdominalis durch Wegfall des Zirkulums von Ductus Botalli beträchtlich ansteige. (Virchow's Archiv. Bd. 81. Hft 1.)

Farbe der Schließhülle, ausnehmender Verfall trotz einer vorzüglichen Nahrung und mäßlichen Trinken. Auffallend waren sehr zahlreiche, auf der grünlich gelben Haut des Nackens, Rückens und der Extremitäten zerstreute milchweisse rötliche Pusteln, die auf Fingerdruck nicht schwanden, bis und da etwas prominenter, und später unter leichtem Desquamation verschwanden. Unter dem Gelbsucht eines Chloascedes mit Salzsäure. Anzeichnungen des Mundes mit einer Lösung von Chloralkali und arsenigsaurem Bismut genügt das Kind wider Erwarten und ist während zu einem kräftigen Knaben herangewachsen.

Einen zweiten Fall dieser Art, d. h. also von Verbindung des Icterus mit dem beschriebenen Exanthem konnte ich bis jetzt nicht beobachten. Ob es sich hier um kleine Hämorrhagien oder um grössere Anhäufungen von Bilirubinkrystallen in der Haut handelte, wage ich nicht zu entscheiden, glaube aber bestimmt, dass hier kein Fall des gewöhnlichen Icterus neonatorum vorlag. Von dem letzteren zu unterscheiden ist auch diejenige Gelbsucht, welche in sehr seltenen Fällen bei Neugeborenen in Folge einer Obliteration oder eines angeborenen Mangels der ausführenden Gallengänge vorkommt und in jeder Beziehung dem Retentionsicterus älterer Individuen an die Seite zu stellen ist. Während meiner ganzen Praxis sind mir höchstens drei Fälle dieser Art begegnet, von denen nur der folgende zur Section gelangte:

Ein 4 Monate altes Kind, im Sommer 1850 in der Universitätsklinik vorgestellt, seit der Geburt an Gelbsucht mit völlig trockenen, fast mikroskopischen Darmausscheidungen und dunkelgelblichgrünen Urin. Man konnte den linken Leberlappen im Epigastrium deutlich fühlen. Trotz aller angewandten Mittel blieb die Gelbsucht nicht nur bestehen, sondern die Hautfarbe wurde immer grünlcher und das Kind ging 3 Wochen nach seiner ersten Vorstellung, abgemagert, in Grabs. Bei der Section fanden wir die Leber mindestens um den doppelten Theil kleiner, als sie sonst in diesem Alter zu sein pflegt; beide Lappen gleich gross, der links abgeplattet, bis ans linke Hypochondrium reichend, mäßig consistent und durch und durch von olivengrüner Farbe. Die Gallenblase war nur rudimentär vorhanden, von den Gallengängen aber keine Spur wahrnehmbar, auch die Mündung des Ductus cholecysticus im Duodenum nicht zu erkennen.

Sie finden in diesem Falle also nicht nur während des Lebens, sondern auch nach dem Tode alle Erscheinungen des durch Gallenstauung innerhalb der Leber erzeugten Icterus, besonders auch die bekannte Volumsverminderung der anfangs geschwellenen Leber, welche durch eine regressive Metamorphose und Zerfall der Leberzellen herbeigeführt wird. In solchen Fällen ist natürlich von jeder Behandlung abzusehen. —

Im Gegensatz zu der Gutartigkeit des Icterus, den wir kaum als eine Krankheit betrachten können, bietet die erste Zeit nach der Geburt

eine der mächtigsten und heftigsten Affektionen dar, welche wir überhaupt kennen, den

Trismus s. Tetanus neonatorum.

Sind auch die Erscheinungen dieser Krankheit im Wesentlichen denen des Starrkrampfes der Erwachsenen gleich, so werden sie doch durch das zarte Alter mehr oder weniger modificirt. Am häufigsten beginnt dieselbe zwischen dem 5. und 9. Tage nach der Geburt, doch sei ich ein paar Mal erst am 20. Tage die ersten Symptome auftreten. Die früheste Erscheinung, welche der Umgebung des Kindes auffällt, ist in der Regel die Schwingenken oder Unmöglichkeit des Saugens; jeder Versuch, die Brustwarze oder die Saugflasche in den Mund zu nehmen, ruft eine starre Contraction der Kaumuskeln und des Musc. orbicularis ans hervor, wodurch das Saugen unmöglich wird. Auch die übrigen Gesichtsmuskeln nehmen an der Contractur Theil, und das Antlitz wird dann in hohem Grade entstellt. Anfangs treten diese Erscheinungen nur anfallsweise und zwar bei jedem Saugversuche auf, während es noch gelingen kann, dem Kinde mittelst eines Theelöffels Milch einzuführen, aber schon nach wenigen Stunden pflegen sich die Symptome rapide zu steigern. Die erwähnten Anfälle erfolgen nun auch spontan, ohne deutliche Veranlassung, wobei sich die Stirn in Querfalten legt, die Augenbrauen sich runzeln, die Lider fest schliessen, die Lippen rüsselförmig ausspitzen und mit radiären Falten umgeben. Bald nehmen auch die Schlundmuskeln Theil, das Schlucken eingeflossener Milch wird durch Contractur derselben verhindert, häufig unter Hinzutreten von Erstickenerscheinungen mit cyanotischem Gesicht und Stillstand der Athembewegungen, welche in den Intervallen der Anfälle blasser und schwächer zu sein pflegen. Versucht man den Finger in den Mund einzuführen, so stößt man auf die in Folge starrer Contractur der Masseteren und Temporalismuskeln fest aufeinander gepressten Kiefer, und der Versuch, diesen Widerstand der Kiefer zu überwinden, hat regelmäßig den Eintritt oder die Steigerung der geschilderten krampfhaften Erscheinungen zur Folge. Nur in den wenigsten Fällen aber finden Sie diese auf die bereits erwähnten Muskelpartien beschränkt; meistens gesellen sich Rigidität der Nacken- und Rückenmuskeln hinzu, mit Rückwärtsbeugung des Kopfes und völliger Steifigkeit der Wirbelsäule, die sich besonders dann zeigt, wenn Sie das Kind mit einer Hand an die Mitte des Körpers fassen und in horizontaler Schwebe halten. Auch die Muskeln der oberen und unteren Extremitäten nehmen oft mehr oder weniger Antheil. Arme und Beine sind extendirt, die Muskeln dersel-

ten wie die des Baumes hart und unnachgiebig, eine gewaltsame Flexion kaum möglich. Alle diese spastischen Symptome zeigen zwar Intermissionen oder wenigstens Remissionen, werden aber, je weiter die Krankheit vorrückt, immer persistenter, und häufig, aber keineswegs constant, durch Betastung, Ernährungsversuche, Klystiere erheblich gesteigert oder hervorgerufen. Auch kurze convulsivische Erschütterungen, welche gleich elektrischen Strömen Rumpf und Glieder durchzucken, werden hier und da beobachtet.

Unter diesen Umständen wird die Ernährung durch die Brust oder Saugflasche eine Unmöglichkeit; nur in einem Falle sah ich das Kind noch auf der Höhe der Krankheit an der Flasche saugen, natürlich nicht in ausreichender Weise.

Im Verein mit den geschilderten, unzweifelhaft sehr schmerzhaften Contractionen der Muskeln muss das Daaiederliegen der Ernährung einen rasch zunehmenden Verfall herbeiführen. Die Temperatur, deren Untersuchung sehr wichtig ist, bleibt entweder normal oder zeigt nur mässige Erhebungen auf 38,5—39°, und in vielen Fällen wird dieser Grad im ganzen Verlauf der Krankheit wenig oder gar nicht überschritten. Zuweilen aber steigt die Temperatur ziemlich schnell und erreicht schliesslich 40, 41 und darüber, ähnlich wie in manchen Fällen von Tetanus der Erwachsenen. Im Allgemeinen zeigt die Krankheit einen stetig progressiven Charakter, doch kommt es mitunter spontan oder in Folge angewandeter Mittel zu einer scheinbaren, trügerischen Besserung der Symptome, auf welche meistens schon nach kurzer Zeit eine neue Steigerung der Contractionen zu folgen pflegt. Schliesslich verfällt das Kind in Betäubung, der jugende Puls wird unzufühlbar und der Tod erfolgt entweder an Erschöpfung oder durch Asphyxie in Folge tetanischer Contractur der inspiratorischen Muskeln, nach einer je nach der Intensität des Verlaufs wechselnden Dauer der Krankheit von 24 oder 36 Stunden bis zu 9 Tagen.

Der weitaus grösste Theil der vom Trismus befallenen Neugeborenen geht zu Grunde; Sie haben daher von Anfang an eine schlechte Prognose zu stellen. Völlige Genesung ist indess keineswegs ausgeschlossen und mir selbst sind ein paar solcher Fälle vorgekommen. Wie bei Erwachsenen scheinen auch hier die mit hoher Temperatur einhergehenden Fälle von vorn herein eine ungünstige Prognose zu geben, wenn auch bei niedrigem Thermometerstande (37,1—37,8 während des ganzen Verlaufs) der letale Ausgang häufig genug ist. Bei günstigerem Ausgange erfolgt die Besserung immer ganz allmählig, nie mit einem Schlage; die Starre der Muskeln, die spastischen Steigerungen ver-

schwinden langsam, und in zwei von mir selbst beobachteten Fällen konnte ich noch nach drei Wochen eine Rigidität der Extremitätenmuskeln, welche der Extension einen gleichsam federnden Widerstand entgegensetzte, wahrnehmen. Beide Fälle gehörten indes auch während ihrer Akme nicht zu den schlimmsten, die Temperatur überschreitet die Norm nur um einige Zehntel, und dem einen dieser Kinder, welches in der Poliklinik behandelt wurde, konnte schon nach den ersten zwei Tagen mit einem durch die Kieferspalte gezwungenen Theelöffel etwas Milch eingeflüßt werden.

Wie bei Erwachsenen ergibt auch beim Neugeborenen die anatomische Untersuchung keine charakteristischen Resultate. Die alte Annahme von Blutextravasaten im Wirbelkanal ist längst widerlegt, und von denselben wirklich gefunden worden, wissen sie wohl nur als Folgen der durch die gehemmte Respiration gesetzten venösen Störungen, nicht als Ursache der Krankheit betrachtet werden. Aus demselben Grunde werden Sie auch kleine Hämorrhagien zwischen den Meningen des Gehirns und auf anderen serösen Membranen nicht selten antreffen. Die Centralorgane selbst erscheinen, abgesehen von einer mehr oder minder starken venösen Hyperämie und deren Folgen (Ödeme, miliäre Blutungen) normal. So sind wir denn auch beim Neugeborenen darauf angewiesen, den Trismus und Tetanus als eine Neurose aufzufassen, womit leider so gut wie nichts gesagt ist. Dass es sich beim Tetanus um eine erhöhte Reflexthätigkeit des Rückenmarkes handelt, ist unabweifelt, wenn auch die Erregung und Steigerung der spastischen Erscheinungen durch jede Reizung sensibler Nerven (Pulsfühlen, Betastung u. s. w.) nicht in allen Fällen gleich ausgesprochen ist. Auch beim Trismus neonatorum ist diese Erscheinung bald nicht, bald weniger entwickelt, und wird um so begreiflicher, als in diesem Alter noch schon im zumeist Zustande der Refleximpuls ein überwiegender ist. Bestätigen sich die an neugeborenen Thieren angestellten Experimente von Soltau, so würden in der ersten Zeit des Lebens überhaupt alle Bewegungen ohne den Einfluss des Willens nur auf reflectorischem Wege zu Stande kommen, und alle die Reflexaction hemmenden Centra im Gehirn und Rückenmark noch fehlen. Daraus würde sich dann die enorme Häufigkeit reflectirter Krämpfe bei diesen Kindern im Vergleich mit dem späteren Lebensalter erklären, nicht aber die Ursache, welche dieser ungehinderten Reflexaction die eigenthümliche und bedrohliche Form des Trismus aufprägt. Auch stimmt mit der Frequenz dieser Form nicht recht die Ansicht von Soltau, dass die Reizbarkeit der peripheren Nerven gerade in den ersten Wochen des Lebens geringer sein soll, als bei Erwachsenen, denn

dass von diesen Nerven aus der Anstoss zum Tetanus ausgeht, wird wohl Niemand leugnen wollen. Wie bei Erwachsenen, ist auch beim Neugeborenen der Tetanus das Product verschiedener Einflüsse, die entweder auf ein einzelnes Nervengebiet oder auf eine Summe sensibler Fasern reizend einwirken und bei der vorhandenen Predisposition durch schnelle Uebertragung auf das Rückenmark die Krankheit zu Stande bringen. Als solche nenne ich:

1) Verletzungen (T. traumaticus), die in diesem Alter weitaus am häufigsten den Nabel betreffen, Abfallen der Nabelschnur, Omphalitis, selten andere Traumen z. B. die rituelle Beschneidung. In zwei Fällen, die mir selbst vorkamen, war schon am Morgen nach der Geburt der Nabelschnurstamm gewaltsam abgerissen worden und es fand sich eine um entzündeten Hofe umgebene Nabelwunde vor. Ich füge aber hinzu, dass ich nur auf wirkliche Traumen hier Werth lege, nicht auf die vor Jahren von Schöller geltend gemachte „Entzündung der Nabelarterien“, die nichts anderes ist, als eine theilweise zu Detritus zerfallene Thrombose derselben, und mit dem Trismus durchaus nichts zu thun hat.⁷⁾

2) Einwirkung thermischer Reize auf die Haut des Neugeborenen, einerseits zu frühzeitiges Austragen in die kalte Luft (z. B. behufs der Taufe), andererseits zu heisse Bäder. Dahin gehören die Fälle, welche hier und da durch Hebammen, welche des Temperatursinns ermangelten und dem Neugeborenen Bäder ohne Zuhilfenahme des Thermometers liesserten, veranlasst wurden. Dies ereignete sich z. B. in Elbing, wo in der Praxis der beschäftigten Hebammen der Trismus Jahre lang endemisch war und hunderte von Neugeborenen daran starben. Schliesslich ergab sich, dass die Hebamme ein Badewasser von 35° von einem 28gradigen nicht unterscheiden konnte, und erst die Anwendung des Badethermometers machte dieser „Epidemie“ von Trismus ein Ende.⁸⁾ Dass noch viele andere Reize unentdeckt bleiben und die Krankheit dann scheinbar ohne Ursachen auftreten kann, ist leicht begreiflich. Vielleicht muss auch die Entstehung derselben durch verdorbene Luft (Thranluft in Island, Gethirhaus in Dublin, aus welchem der Trismus durch gute Ventilationsvorrichtungen vertrieben worden sein soll), ebenso wie das epidemische Auftreten auf einigen westindischen Inseln, durch eine der genannten Ursachen erklärt werden. Das Vorkommen von Albinen im Urin Neugeborener wurde oben (p. 17.) berührt; und ich füge hinzu,

⁷⁾ Achselöcher behandelte Bornmeister in seiner Dissertation: „Ein Beitrag zur Aetiologie des Tetanus und Trismus neonatorum.“ Berlin 1881.

⁸⁾ Bokh, Jahrb. f. Kinderheilk. 1876. IX. p. 307.

dass auch die Sectionen neugeborener Kinder nicht ganz selten die Erscheinungen der parenchymatösen Nephritis ergeben haben. Wenn nun auch in einem Falle (Jagerslev²⁾ Erscheinungen, die mit dem Trismus neonatorum durchaus übereinstimmten, beobachtet wurden und der aufgestaute Urin sehr viel Eiweiss und zahlreiche theils hyaline, theils körnig und mit fettigem Epithel besetzte Cylinder enthielt, so fand sich doch bei der Section mehr das Bild der Stauungsniere mit capillären Blutungen, als das der parenchymatösen Nephritis, was bei den venösen Stauungen, die beim Trismus in allen Organen vorkommen können, leicht begreiflich ist. Vorläufig können wir also noch nicht behaupten, dass auch urämische Vorgänge unter der Form des Trismus in diesem Alter auftreten.

Die Ansicht, dass der Trismus neonatorum, ähnlich wie etwa die Epilepsie, eine nur in ihrer Erscheinung einseitliche Krampfform sei, welche durch eine Reihe verschiedener Reize erzeugt werden kann, ist nicht ohne Begründung. Diese Ursachen in jedem einzelnen Falle aufzufinden, dürfte freilich schwer werden, und nur unter günstigen Verhältnissen, z. B. bei Verletzungen, Nabelwunden, thermischen Reizen, gelingen. Aber auch dann wird die Therapie immer mit den grössten Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Wissen wir ja doch, dass dieselbe Krankheit, wenn sie das weit resistenterere spätere Lebensalter befällt, mag sie nun traumatischen, rheumatischen oder toxischen Ursprungs sein, zu den gefährvollsten gehört, die wir kennen. Das einzige Mittel, unter dessen Gebrauch ich zwei Fälle von Trismus neonatorum genesen sah, ist das Chloralhydrat, welches ich zu 0.06 stündlich verordnete. Kann das Mittel nicht geschluckt werden, so wende man es im Klysm 0.1 stündlich an. In anderen Fällen blieb dasselbe ebenso erfolglos, wie die Einathmungen von Chloroform, welche höchstens ein momentanes Aufheben der Kiefersperre bewirkten. Von Opium (Tinct. thebala. gtt. 1, 2stündlich) beobachtete ich nur vorübergehenden Erfolg, so lange die durch dasselbe bedingte Narkose anhält. Mit dem Aufheben derselben begann auch der Tetanus von neuem. Ebenso wenig Wirkung sah ich vom Extr. Calabar, welches ich ein paar Mal zu 0.005 3—4mal täglich hypodermatisch anwendete (0.05 auf 10.0 Wasser, eine Spritze voll zu injiciren), während Andere (Monti) gerade von diesem Mittel Gutes gesehen haben wollen. Bei den äusserst ungünstigen Erfolgen jeder Therapie in dieser Krankheit muss um so mehr Werth auf eine sorgfältige Prophylaxis gelegt werden, d. h. auf die möglichst vollständige

²⁾ Oesterr. Jahrb. f. Pädiairk, VIII. p. 173.

Abhaltung aller Verletzungen und aller auf das Hautnervensystem reizend wirkenden Einflüsse (kalte Luft, zu heisse Bäder). —

Abgesehen vom Trismus kommen noch convulsivische Zufälle, partielle und allgemeine, bei Neugeborenen vor, welche mit den eklamp-tischen Erscheinungen älterer Kinder durchaus übereinstimmen. Ich erwähne dies nur aus dem Grunde, weil man, gestützt auf gewisse Befunde Virchow's, hier und da geneigt ist, die letzteren für jene Cerebralsymptome verantwortlich zu machen. Unter dem Namen „Encephalitis und Myelitis interstitialis“ beschrieb nämlich Virchow¹⁾ einen krankhaften Zustand des Gehirns und Rückenmarks, den er bei todgeborenen oder bald nach der Geburt unter dem Einflusse infectiöser Krankheiten, der Syphilis, aber auch ohne deutliche Ursache gestorbenen Kindern beobachtete. Es handelt sich dabei wesentlich um eine Wucherung und fettige Infiltration der Neurogliazellen, die mitunter schon makroskopisch in Form kleiner gelber oder hortensiafarbiger weicher Flecken erkennbar ist. Diese von Hayem und Parrot bestätigten, aber nicht direct als entzündliche gedeuteten Befunde wurden indess von Jastrowitz²⁾ in einer auf 65 Fällen basirten Arbeit dahin gedeutet, dass die Neurogliazellen, besonders in gewissen Partien des Mittelhirns und in den Hintersträngen der Medulla in jedem Foetus eine physiologische Verfettung zeigen, die bis zum 7. Monate des Intrauterinallebens ihr Maximum erreicht, sich dann vermindert und bald nach der Geburt verschwindet. Als krankhaft betrachtet Jastrowitz die Verfettung nur dann, wenn sie über die normale Zeit hinaus dauert, oder andere Gehirnteile als die weisse Substanz des Centrums ergreift, z. B. die grossen Hirnganglien, die graue Substanz der Windungen, die Kerne der Gehirn- und Rückenmarksnerven. Ueber die ätiologischen Verhältnisse dieser unvollständigen Fettersorption blieben wir im Dunkeln. Bis jetzt haben diese Befunde nur ein anatomisches Interesse, da eine Beziehung derselben zu bestimmten klinischen Symptomen bei Neugeborenen noch nicht constatirt wurde, und auch die im 2.—5. Monate vorkommende und als Folge einer solchen „Encephalitis“ beschriebene Keratitis ulcerosa³⁾ keineswegs als solche sichergestellt ist.

Dasselbe gilt von gewissen makroskopischen Veränderungen, welche man in der Schädelhöhle Neugeborener zuweilen findet, Oedem und Hyperämie der Pia, kleine Eklhymosen derselben. Vergleicht man die

¹⁾ Archiv 1867, Bd. 38, p. 129, 1868, Bd. 44, p. 472.

²⁾ Arch. f. Psych. u. Nerv. 1872, II, u. III.

³⁾ Graefe und Hirschberg, Arch. f. Ophth., XII, 5, 220 und Berl. klin. Wochenschr. 1868, p. 324.

Fälle, in denen solche Befunde bei der Section notirt werden, klinisch mit einander, so findet man durchaus keine charakteristischen Symptome, oft aber ein allgemeines Krankheitsbild, welches man als das der „angeborenen Lebensschwäche“ bezeichnen kann. Mehr oder minder hochgradige Atrophie, graugelbliches Hautcolorit, äusserst Schwäche und Apathie, klägliches Wimmern statt des normalen Geschreis, oberflächliche schnelle Respiration, cyanotischer Anflug der extremen Körperteile, Sinken der Temperatur — das sind die Symptome, welche diese unglücklichen Geschöpfe bald nach der Geburt darzubieten pflegen, unter denen auch die Meisten schon in den ersten Tagen oder Wochen ihres Lebens erliegen, wenn sie nicht durch einen Zufall in besonders günstige Lebensverhältnisse gelangen. Das Los der Meisten ist leider, in schlechter Pflege oder in ein Kinderkrankenhaus zu kommen, wo ihnen das Nöthigste, Frauenmilch und reine Luft, mangelt. Meine Abtheilung in der Charité hat das ganze Jahr hindurch eine Anzahl solcher Kinder aufzuweisen, welche fast sämtlich allen Bemühungen zum Trotz im Collaps durch progressiv zunehmende Herzschwäche mit oder ohne hinzutretende Convulsionen zu Grunde gehen. Die unter solchen Verhältnissen nicht selten gefundenen Oedeme, Hyperämien und kleinen Blutextravasate der Pia sind aber meiner Ansicht nach nur durch die venöse Stauung in Folge der Herzschwäche und fast immer vorhandenen Lungenateldiasen, keineswegs als active Prozesse und demgemäss als Ursachen terminaler convulsiver Erscheinungen zu betrachten, worauf ich bei der Besprechung des sogenannten „Hydrocephaloids“ älterer Kinder zurückkommen werde.

Cephalhämatom.

Ihre Häute wird nicht selten von besorgten Müttern wegen einer Geschwulst am Kopfe des Neugeborenen in Anspruch genommen werden, die unter dem Namen des Cephalhämatoms (Kopfb Blutgeschwulst) bekannt ist und auf einem Bluterguss zwischen dem Knochen und dem Pericranium beruht. Derselbe scheint durch den Druck, welchen der Schädel des Foetus beim Durchtritt durch den Beckenausgang erleidet, zu entstehen. In vielen Fällen wirkt dieser Druck nur auf die Kopfhaut und das subcutane und subaponeurotische Bindegewebe, und es kommt dann nur zu einem serös-blutigen Erguss in dasselbe mit Bildung einer mässigen trügigen Geschwulst, das aus der Gehirnhülle ihnen bekannte Caput succedaneum. Wirkt der Druck aber tiefer oder länger ein, so wird das Pericranium selbst betroffen und die Blutung erfolgt nun zwischen diesem und dem betreffenden Schädelknochen. In der Regel sind dies die

Scheitelbeine, besonders das rechte, welche bei der gewöhnlichen Lage des Kindes am häufigsten dem Drucke während der Geburt ausgesetzt sind. Das aus den zerrissenen Gefäßen sich entleerende Blut löst nun allmähig das Pericranium vom Knochen ab und bildet eine fluctuirende Geschwulst auf demselben, welche nicht sofort ihr Maximum erreicht, sondern, da die Blutung noch langsam fortdauert, allmähig sich vergrößert und gewöhnlich erst am dritten Tage stationär wird. Nicht selten nimmt dann der Tumor das ganze Scheitelbein ein, erstreckt sich aber nicht über dasselbe hinaus, weil die Nähte der Schädelknochen, an welchen das Pericranium besonders fest haftet, der weiteren Ausbreitung eine Grenze setzen. Ein doppelseitiges Cephalhämatom ist mir selbst bisher noch nicht begegnet, doch fehlt es nicht an Beispielen in der Literatur.

Bei der Untersuchung finden Sie eine mehr oder minder pralle, deutlich fluctuirende Geschwulst, meistens auf dem rechten, seltener auf dem linken Scheitelbein oder gar auf anderen Schädelknochen, die bedeckende Haut normal gefärbt, seltener bläulich durchscheinend oder selbst hämorrhagisch infiltrirt. Bei starker Füllung gelangt es Ihnen nicht, den unterliegenden Knochen durchzufühlen, wohl aber fühlen Sie schon in den ersten Tagen rings um den Tumor einen harten, etwas vorspringenden Rand, welcher, zumal bei geringem Umfange der Geschwulst, als der Rand einer im Schädelknochen befindlichen Lücke tauschen kann. Das Cephalhämatom scheint dem Neugeborenen kaum ein Unbehagen zu verursachen. Nur wenn man dasselbe drückt, ängst das Kind so zu schreien, was sich aus der Empfindlichkeit der stark gespannten Weichtheile leicht erklären lässt. Uebrigens bleibt das Wohlbefinden ungestört, und die Resorption des ergossenen Blutes geht in der Regel rasch vor sich, wozu wohl besonders der Umstand beiträgt, dass in diesen Geschwülsten das Blut sehr lange, bis über 4 Wochen, sich wenigstens theilweise flüssig erhalten kann. Schon nach einer Woche ist die Geschwulst erheblich verkleinert, der Knochen deutlich durchzufühlen, und je nach dem Umfange des Tumors vergehen 2 bis 4 Wochen bis zur völligen Resorption. Während dieser Heilungsperiode können Sie den erwähnten harten Ring um den Tumor immer noch wahrnehmen, nur wird derselbe mit der Verkleinerung des letzteren gleichzeitig enger, und in vielen Fällen, wo der Resorptionsprocess längere Zeit in Anspruch nimmt, fühlen sie beim Druck auf die mehr und mehr dem unterliegenden Knochen sich wieder nähernden und anliegenden Weichtheile ein Knittern, als ob Sie auf Pergament drückten, bis schließlich die Resorption beendet ist und das Pericranium dem Knochen

wieder fest anliegt. Die Ursache jenes harten Ringes im Umkreise der Blutgeschwulst ist die von der inneren Fläche des abgehobenen Periosts nach dorsal vor sich gehende Knochenbildung, welche zunächst da am reichlichsten ist, wo Periost und Knötchen noch aneinander grenzen, d. h. also am Rande des Tumors. Im weiteren Verlaufe werden auch auf der inneren Fläche des abgehobenen Periosts Knochenplättchen gebildet, welche dem Untersucher das erwähnte knitternde Gefühl geben und eine Art Schale um den Rest des Blutergusses darstellen.¹⁾

Cephalhämatome von ganz gleicher Art wie bei Neugeborenen können auch im späteren Alter durch traumatische Einflüsse zu Stande kommen. Ich beobachtete solche bei Kindern von 2, 4 und 8 Jahren in Folge eines heftigen Anfalls gegen einen Laternenpfahl, eines Falls auf den Hinterkopf, hier und da auch ohne deutliche Ursache. Die Geschwulst sass auf dem Scheitel- oder Hinterhauptbein und zwar bedeckte sie letzteres in seinem ganzen Umfange. Auch hier wurde noch eine allmähliche Vergrößerung des Tumors beobachtet, ja bei einem 8jährigen Knaben entstand eine Woche nach dem Fall, als das Cephalhämatom schon vollständig entwickelt war, noch eine unerträgliche, mit starker Schwellung eintretende Blutung im subcutanen Bindegewebe der Stirn und Augendale. Eine Woche später war von dieser nur noch eine grünlichgelbe Pigmentirung übrig, während das colossale Cephalhämatom auf dem Os occipitis nach einem 14tägigen Bestande bis auf eine kaum markstückgrosse, flache, von einem harten Knötchenwall umgebene Stelle resorbirt war.

Die Behandlung sollte nach meiner Erfahrung eine rein expectative sein. In früherer Zeit habe ich oft genug Incisionen gemacht, das Blut entleert und dann sofort einen Druckverband durch Heftpflasterstreifen applicirt. Es ging auch dabei meistens gut, doch konnte ich nicht immer die Eiterung verhindern, und wiederholt kamen mir Fälle vor, die von anderen Aerzten mit Einschnitten behandelt waren und klaffende eiternde Wunden mitbrachten. Mag man auch diese Gefahr jetzt durch den antiseptischen Verband erheblich vermindert werden, so sehe ich doch keinen Grund, eine Geschwulst zu öffnen, die ich nach einigen Wochen immer auf dem Wege der Resorption vollständig verschwinden sah. Ich rathe Ihnen daher nur dann zur Incision, wenn der Tumor spontan in Eiterung übergeht und aufzubrechen droht, ein Ausgang, der indess sehr selten und von mir selbst noch nie beobachtet worden ist. Unter allen Umständen wird man aber gut thun, den Tu-

¹⁾ Virchow, Grundlehren, I. p. 100.

nur durch eine weiche Bedeckung (Watte) gegen äussere Insulte möglichst zu schützen.

Nur der gänzlich Unerfahrene könnte ein Cephalämatom mit der angeborenen Encephalocoele, dem Vorfall des Gehirns oder wenigstens seiner durch Flüssigkeit ausgefüllten Hülle (Meningocoele) durch eine angeborene Lücke der Schädelknochen verwechseln, indem die scheinbar oder wirklich fluctuierende Beschaffenheit einer solchen Geschwulst und der rings um dieselbe fühlbare harte Rand der Knochenlücke diese Täuschung möglich macht. Der Unterschied liegt aber schon darin, dass der Hirnbruch in der Regel an einer Stelle vorkommt, welche vom Cephalämatom des Neugeborenen meistens verschont wird, nämlich am Hinterhauptbein, weit seltener an der Glabella oder am Scheitelbein. Auch das Volumen der Encephalocoele ist in der Regel ein kleineres und die angelegte Hand kann in einer Reihe von Fällen eine deutliche von Gehirnhalt herrührende Pulsation wahrnehmen, was beim Cephalämatom nie stattfindet. Ich will Sie mit einer detaillirten Schilderung dieser Affectiön, welche Sie in allen chirurgischen und anatomisch-pathologischen Handbüchern finden, nicht länger aufhalten, und Ihnen nur einen Fall von einer ungewöhnlich voluminösen Meningo-Encephalocoele mittheilen, welcher sowohl in klinischer, wie anatomischer Beziehung zu den sehr charakteristischen gehört:

164 B., 8 Tage alt, am 23. Dec. 1875 auf meine Abtheilung gebracht. Von dem früher geborenen Kinde derselben Mutter soll eine im 8. Monat der Schwangerschaft mit „offenem Hinterhauptknochen“ zur Welt gekommen sein. Schädelhals dick, Gesicht fleischartig, Kopfumfang sehr klein (der gerade 11 $\frac{1}{2}$ „, der schräge 14 Cms.). Von der Mitte des Os occip. geht eine mit harem Stiel aufstrebende Geschwulst aus, welche den Kopfumfang um mehr als das Doppelte übertrifft, ihre Stütze kissenartig hin- und herschwankt und überall, ausser am Stiel, deutlich fluctuirt. Rings um den Stiel fühlt man deutlich einen Knochenwall. Die Haut des Tumors ist nur an ihrem dem Hinterhaupte zunächst liegenden Theile kramartig behaart und erscheint, je näher man dem Scheitel der Geschwulst kommt, immer kahler, atrophischer, in einzelnen Stellen zu einer fast durchscheinenden glasigen Lamelle verdünnt, vielfach von erweiterten Venen durchzogen und von Hämorrhagien durchsetzt. Pulsations- und Respirationsbewegungen am Tumor nicht wahrnehmbar; auch ist derselbe nicht durchsichtig, wenn er gegen das Licht gehalten wird. Der Versuch, die Flüssigkeit aus der Geschwulst in den Schädelraum zurückzudrängen, gelingt nicht; es tritt dabei wieder eine Volumsabnahme des Tumors, noch ein Pulsirenden der klapprigen Suturen und Fontanelles ein.

Aus diesem Umstande schloss ich, dass die Communication des Cysteninhalts mit dem Schädelraum durch einen aus Gehirnhäutsubstanz bestehenden Pfropf verlegt sein müsse, dass also hier nicht nur eine Meningocoele, sondern eine Meningo-Encephalocoele anzunehmen war. Die bedeutende Abflachung des Schädelrückens unterstützte diese Meinung, insofern sie einen Defect des Schädelhalses anzeigte.

Das Kind war sonst durchaus wohlgebildet und nahm wenig die Flasche; alle Functionen normal. Eine sofort am abhängigen Theile des Tumors vorgenommene Punction mit einem feinen Troicart entleerte etwa 200 Ccm. einer gelblichen Flüssigkeit, welche reichlich Eiweiß und röthl. Halkörperchen enthielt. Die Geschwulst wurde darauf schlaffer, doch war insbesondere kleiner.

Während der beiden folgenden Wochen nahm der Umfang derselben allmählig wieder zu und es zeigten sich häufige Contracturen an beiden oberen und unteren Extremitäten, deren Streckung nicht immer leicht war. Auch wurden häufig kurze Zuckungen in den Muskeln der Augen und Extremitäten beobachtet, welche sowohl spontan, wie beim Druck auf den Tumor eintraten. Puls 150—190. Das Kind nahm bald nicht mehr die Flasche und collabirte sichtlich, wobei die Temperatur auf 36.9 bis 36.5 herabsank. Um die Untersuchung zu erleichtern, entleerte ich am 5. Jan. durch die Punctio wiederum 400 Ccm. blutiger Flüssigkeit und konnte nun, nachdem die Geschwulst völlig collabirt war, sehr deutlich eine compacte teigige Masse durchfühlen, welche aus einer Lücke des Os occipitis in die Cyste hineinragte. Unter zunehmendem Collapse und wiederholten Zuckungen erfolgte am 6. Januar Abends der Tod, nachdem Mittags bei 45.7 Temp. das Chylo-Stero'sche Respirationophänomen in equivocaler Weise aufgetreten war.

Bei der Section zeigte sich die stark zusammengefallene Cyste, bestehend aus der äusseren reflektirten Haut und der dicht derselben anliegenden Haltrinde, zum Theil häutenartigen Dura mater. In dem Sacke lag Gehirnmasse, deren hyperämische Pia an vielen Stellen mit der Cystenwand verwachsen ist. Dasselbe ist viel röthliche trübe Flüssigkeit im Sacke enthalten. Die Schuppe des Hinterhauptbeins zeigt eine bohnenförmige, $2\frac{1}{2}$ Ctm. breite und $2\frac{1}{2}$ Ctm. lange Lücke. Im Schädel selbst findet sich eine durchaus normal aussehende Gehirnmasse. Cerebellum und Medulla obli. liegen an der richtigen Stelle, die Pia ist hier mit einigen Eiterfoklen bedeckt. Bei genauer Untersuchung ergibt sich, dass der grösste Theil der Hinterlappen des Gehirns durch die Knochenlücke ausgetreten war und in dem Sacke lagerte. Die in denselben sich hinwärtstreckenden Hinterhörner der Seitenventrikel sind sauren erweitert, mit seröser Flüssigkeit gefüllt und dehnen die an ihrer Oberfläche äusserst hyperämischen Hinterlappen kugelförmig aus. Beide Seitenventrikel, soweit sie innerhalb der Schädelhöhle liegen, enthalten puriforme Flüssigkeiten. Im Uebrigen sind das Gehirn sowohl wie alle übrigen Organe vollkommen normal entwickelt.

Bemerkenswerth ist, dass eine so riesige Meningo-Encephalocoele, welche an Grösse den Kindeskopf selbst weit übertraf, doch die Geburt nicht erheblich störte. Durch die enorme Quetschung aber, welche der Tumor während des Geburtsacts erfuhr, waren unzweifelhaft die Hämorrhagien in der bedeckenden Haut und Dura mater zu Stande gekommen, welche auch die im Sacke enthaltene Flüssigkeit blutig färbten. Die Meningitis (Eiter in den Ventrikeln und auf der Pia) war wohl die Folge der zweimaligen Punction und verrieth sich während des Lebens nur durch die Contracturen und beschränkten Zuckungen, während die Temperatur in Folge des Collapses normal und schliesslich subnormal war, eine

Erscheinung, die auch bei anderen eitrigen Krankheiten während der ersten Lebensmonate häufig beobachtet wird (p. 16).

Hämatom des Sternomastoideus.

Der Geburtsact, der, wie wir oben sahen, durch den Druck auf den Schädel des Kindes das Cephalhämatom erzeugt, kann noch eine andere Anomalie zu Stande bringen, welche nicht den Kopf, sondern den Hals betrifft. Es werden Ihnen nicht ganz selten Kinder in den ersten Lebenswochen vorgeführt werden, welche an dem einen oder anderen Seitentheile des Halses, sehr selten doppelseitig, entsprechend dem vorderen Abschnitte des Musculus sternocleidomastoideus, eine harte, rundliche oder strangförmig höckerige Geschwulst darbieten. Das Volumen derselben ist verschieden, etwa taubengross, oft aber auch viel grösser und in die Länge gezogen, so dass ich mitunter einen grossen Theil des vorderen Muskelraumes hart und knötig fand, von wo dann strangförmige Ausläufer in die benachbarte Muskelpartie sich hineinsogen. Zuweilen kommen auch zwei bis drei von einander isolirte Harten im Muskelraume vor. Im Allgemeinen ist die obere Hälfte des Muskels weit häufiger befallen, als die untere. Nur in einem Falle fand ich beinahe die ganze vordere Hälfte desselben von oben bis unten von einer wahrhaft cartilaginösen Härte. Der rechte Sternocleidomastoideus wird unverhältnissmässig oft befallen, denn ich zähle unter 23 in meinen Journalen verzeichneten Fällen 18 rechts- und nur 5 linksseitige.

Das jüngste Kind, welches ich mit einer solchen Affection zu sehen bekam, war 3 Wochen, die meisten waren schon 4 bis 6 Wochen alt; nur drei standen im Alter von 3, 5 und 12 Monaten. Beschwerden machte diese Affection niemals, die meistens ganz zufällig beim Waschen des Kindes entdeckt worden war. Seltener wurde die Mutter zuerst darauf aufmerksam gemacht, dass der Kopf des Kindes beim Liegen nicht gerade gehalten wurde, sondern immer eine Neigung nach der einen Seite, am häufigsten also nach rechts zeigte. Diese Haltung war aber keineswegs immer vorhanden, und schien mir um so seltener zu sein, je jünger das betreffende Kind war.

Die Natur dieser Geschwulst des Musculus sternocleidomastoideus wird uns klar, wenn wir hören, dass fast alle damit behafteten Kinder eine anomale Geburtslage hatten, welche entweder den Act verlängerte oder die Kunsthilfe erforderte. Unter 23 von mir beobachteten Fällen waren 16, in welchen eine Steissgeburt stattgefunden und die Entbindung gewaltsam zu Ende geführt worden war. Von den 7 übrigen Fällen waren 5 in der normalen Lage geboren, aber in allen wurde

ausdrücklich betont, dass, weil die Schultern des Kindes sich nicht entwickeln wollten, die Geburt ungewöhnlich lange gedauert und eine starke Tractio erfordert habe. Es unterliegt daher wohl keinem Zweifel, dass die Ursache in einer Zerrung und partiellen Zerreissung des Muskels während der Geburt zu suchen ist, und dass es sich um einen Bluterguss im Muskelgewebe (Hämatom) und eine denselben abkapselnde und zu einer bindegewebigen Schwiele führende Myositis handelt. Die Anwendung der Gewalt führte unter solchen Umständen mitunter noch zu anderen Ereignissen: so in einem meiner Fälle gleichzeitig zu einer Fractur des Oberarms, in einem anderen zu einer lähmungsartigen Schwäche der rechten unteren Extremität, deren oberer Theil (Nates) gleich nach der Geburt eine starke Sugillation gezeigt hatte.

Die Geschwulst nimmt, so weit meine Beobachtung reicht, immer einen günstigen Verlauf, indem sie sich allmählig verkleinert und schliesslich eine mehr oder minder grosse harte Schwiele im Muskel zurück lässt, welche dessen Functionen wenig oder gar nicht beeinträchtigt. Eiterung habe ich selbst niemals gesehen; dass aber eine ernstliche Functionsstörung daraus hervorgehen könnte, lässt sich nicht bestreiten, und ich habe alle Ursache dieses Ursprung in einem Falle von Caput obstipum bei einem 6jährigen Mädchen anzunehmen, welches auf die ersten Wochen des Lebens zurückgeführt wurde. Leider kamen mir fast alle meine Hämatomfälle später aus dem Gesicht, und nur wenige sah ich bei einer anderen Gelegenheit wieder, so z. B. ein 8 Wochen altes Kind, bei dem ich die am 31. März 1873 zuerst untersuchte Geschwulst am 25. October, wenn auch erheblich verkleinert, noch deutlich fühlen konnte. Die Naturheilung durch Schwielenbildung macht übrigens jede Behandlung überflüssig. Wollen Sie Jodkalisalbe auf den Tumor einreiben lassen, so thun Sie damit höchstens der bestregten Mutter einen Gefallen und sichern sich die weitere Beobachtung, zumal in der Armenpraxis; einen Nutzen wird sich wohl Niemand davon versprechen. —

Bei sehr vielen Neugeborenen beobachten Sie in den ersten Lebenswochen eine

Anschwellung der Brustdrüsen.

welche in mehrfacher Hinsicht interessant ist. An der Stelle der einen oder auch beider Mammæ finden Sie eine kugelige oder stumpf konische, ziemlich harte Geschwulst, etwa vom Umfange eines Taubenris oder einer kleinen Wallnuss und von normaler Hautfarbe. Druck auf dieselbe scheint empfindlich, da er das Kind in der Regel zum Schreien bringt. Fassen Sie nun die Basis der Geschwulst zwischen zwei Finger und

drücken den Tumor, der auf seiner Spitze ein seichtes trichterförmiges Grübchen zeigt, von beiden Seiten her mässig zusammen, so sehen Sie aus dem letzteren einen opalisirenden weisslichen Tropfen herausquellen, welcher unter dem Mikroskop Fettkügelchen und grössere aus diesen bestehende Conglomerate aufweist.

Um die Bildung dieser Tumoren zu verstehen, muss man sich daran erinnern, dass bei allen Neugeborenen, und zwar sowohl bei Knaben wie bei Mädchen, etwa am 4. Tage nach der Geburt eine milchartige Secretion der Brustdrüsen beginnt, welche bis zum 9. Tage, gewöhnlich von einer leichten Schwellung der Mamma begleitet, sich steigert und dann allmählig sich verliert, so dass ungefähr am 20. Tage nach der Geburt nichts mehr davon wahrzunehmen ist. Natalis Guillot¹⁾ konnte bei einem Kinde etwa 1 Ccm. weisslicher Flüssigkeit durch Druck auf die Brustdrüsen gewinnen, welche unter dem Mikroskop alle Charaktere der ersten Frauenmilch, des Colostrum, darbot. Nach den Untersuchungen von Sinéty²⁾ findet man auf Durchschnitten der Brustdrüsen Neugeborener zunächst der Oberfläche Milchkanäle, die mit Epithelmassen gefüllt sind. Dieselben erweitern sich gegen die Tiefe hin, theilen sich und bilden Höhlen, welche eine colostrumähnliche Flüssigkeit enthalten. Dieser Process soll schon während des Fotallebens beginnen, zwischen dem 4. und 10. Tage nach der Geburt vermöge einer stärkeren Entwicklung der erwähnten Milchgänge und Höhlen seine Akme erreichen, durch Ausdrücken der Brustdrüsen sich steigern und in einzelnen Fällen 6–8 Wochen lang dauern können. Epstein³⁾ bringt diesen Process in Zusammenhang mit der lebhaften Zellenproduction und Desquamation der Epithelien, welche während des Fotallebens auch in anderen als Einstülpungen der Haut zu betrachtenden Theilen, besonders in den Talgdrüsen stattfindet und in der Form des Hautmegma, der Schorrtübe, der Milien zu Tage tritt. Nach Guillot soll übrigens diese Milchsecretion nur bei kräftigen, gesunden Kindern, nicht aber bei schwächlich geborenen und kranken beobachtet werden.

Wie nun beim Weibe die secretirende Mamma der Sitz krankhafter Vorgänge werden kann, so auch beim Neugeborenen. Man leucht dazu nicht mit Bäckhut einen Paraperalzustand des letzteren annehmen, von dem sonst absolut nichts zu bemerken ist; der rein locale Process kann sich vielmehr zu einer entzündlichen Höhe steigern, welche zunächst

¹⁾ Arch. de méd. 1851.

²⁾ Gaz. méd. 1875. No. 17.

³⁾ Centralblatt f. Kinderheilk. II. No. 4. p. 53.

eine stärkere Anschwellung der Drüsen, dann aber auch Abscessbildung in denselben hervorrufen. Nunmehr röthet sich die kleine Geschwulst, wird sehr empfindlich, fluctuirt und ergiebt spontan oder beim Einschnitt reichlichen Eiter. Da ich diesen Ausgang ein paar Mal durch zu starke und wiederholte Compression des Tumors zu Stande kommen sah, so hute ich mich seitdem vor jeder Misshandlung desselben, lasse ihn vielmehr einfach mit ölgetränkter Watte bedecken. Erfolgt trotzdem Röthung und Eiterbildung, so mögen Sie den Aufbruch des Abscesses durch warme Kataplasmen und Incision befördern. Guillet beobachtete 3 Todesfälle durch Complicationen, und Bouchut¹⁾ in einem Falle eine beträchtliche Unterminirung des Pectoralmuskels, welche mit dem Tode endete. Mir selbst ist ein schlimmer Ausgang bisher nur einmal vorgekommen (Eitersonkung und Gangrän der Haut über dem Pectoralis bei einem elenden atrophischen Kinde); wohl aber fand ich bei einem Kinde auch am Ende der dritten, bei einem anderen am Schluss der vierten Lebenswoche beide Mammæ stark geschwollen, knotig und, wie die Compression ergab, milchhaltig.

Erysipelas neonatorum.

Man ist jetzt vielfach geneigt, der Rose der Neugeborenen jedwede Selbstständigkeit abzusprechen und dieselbe immer als eine Begleiterscheinung desjenigen Zustandes zu betrachten, welcher unter dem Namen der „puerperalen Infection“ Neugeborener beschrieben wird. Mir selbst stehen über diesen Zustand, der aus nahe liegenden Gründen ganz besonders in Entbindungsanstalten und Findelhäusern vorkommt, keine ausreichenden Erfahrungen zu Gebote; so viel aber glaube ich doch aus den letzteren schließen zu dürfen, dass das Erysipelas neonatorum keineswegs immer als ein Symptom der Puerperalinfection zu betrachten ist, dass vielmehr hier ganz ähnliche Verhältnisse wie im späteren Alter vorliegen. Wie bei Erwachsenen die Rose bald als ein Symptom wichtiger Allgemeinerkrankungen, der Pyämie, Septicämie, des Typhus u. s. w. auftritt, bald als eine zunächst locale, von einer Verletzung ausgehende Krankheit, deren parasitäre Natur durch die neuesten Versuche (Fehleisen) an Wahrscheinlichkeit erheblich gewonnen hat, so glaube ich auch beim Erysipelas neonatorum zwei Formen unterscheiden zu müssen. Die erste und schlimmste ist zweifellos an jene bereits erwähnte puerperale Infection der Neugeborenen gebunden, deren Erscheinungen in ihrer mannigfachen Form sich hier mit denen des Erysipelas verbinden, schneller

¹⁾ Traité prat. des maladies des nouveau-nés III. 4. édit. 1867. p. 718.

Verfall, sehr hohe Temperatur (bis 41°), Icterus, Erbrechen und Durchfall, Entzündungen verschiedener seröser Membranen (Pleura, Peritonium, Gelenke), Convulsionen, Sopor. Diese Form der Rose ist es, welche nicht bloss bei den Kindern solcher Frauen vorkommt, die an einem sporadisch aufgetretenen Puerperalfieber leiden oder bereits an demselben zu Grunde gegangen sind, wovon ich mehrere Beispiele erlebt habe, sondern die auch in grösserer Verbreitung die Neugeborenen in solchen Zeiten und in solchen Gebäranstalten ergreift, in denen Epidemien von Puerperalfieber unter den Wöchnerinnen herrschen. Die zweite Form aber hat, wie ich glaube, mit der puerperalen Infektion nichts zu schaffen, wenigstens lässt sich ein Zusammenhang mit einer mütterlichen Erkrankung dieser Art nicht nachweisen. Irgendwo am Körper besteht eine Verletzung, welche der Ausgangspunkt der Rose wird; ein wahres Erysipelas traumaticum mit der bekannten Tendenz zum Wandern entwickelt sich von hier aus, wobei wir dahingestellt sein lassen wollen, welche Einflüsse bei dieser Entwicklung in Betracht kommen.

Doch kann man wohl annehmen, dass, wie zu manchen Zeiten, besonders in Krankenhäusern, die verschiedensten Wunden leicht zum Erysipelas Anlass geben, während dies zu anderen Zeiten nur selten oder gar nicht geschieht, so auch die am Körper des Neugeborenen befindlichen Traumen unter der Einwirkung einer verdorbenen Luft, der Unreinlichkeit und infectiöser Einflüsse, die aber in diesen Fällen sicherlich nicht puerperaler Natur sind, eine besondere Neigung zeigen, der Ausgangspunkt eines Erysipelas zu werden. Aus diesem Grunde begegnet man dem letzteren auch in seiner zweiten Form weit seltener in der Privatpraxis unter günstigen Familienverhältnissen, als unter den Armen. Aber auch bei der besten Pflege und den günstigsten Lebensbedingungen kann das Erysipelas neonatorum sich entwickeln. Als Beispiel will ich nur den Fall eines jüdischen Knaben aus sehr wohlhabender Familie anführen, bei welchem sich die Rose nach der Beschreibung vom Penis aus entwickelte, allmählig über den ganzen Körper wanderte, nach 14 Tagen einen umschriebenen Brand am Scrotum, dann einen colossalen Abscess am Rücken zur Folge hatte und schliesslich unter allgemeinem Collaps, Icterus und peritonischen Symptomen zum Tode führte. Von einer Puerperalinfektion konnte in diesem Falle keine Rede sein.

Auch die traumatische Form des Erysipelas neonatorum kann schon in den ersten Tagen nach der Geburt beginnen. Mitunter geschieht dies indes viel später. So sah ich bei dem Kinde einer noch nicht ganz 16jährigen Mutter, welches auf den Boden gefallen war, die Rose erst

am 15. Tage nach der Geburt auftreten. Sehr häufig zieht eine am Nabel bestehende Wundfläche den ersten Anlass zur Entwicklung desselben, fast ebenso oft aber bilden die Genitalien den Ausgangspunkt, seltener der Anus. In diesen Fällen handelt es sich, abgesehen von der rituellen Beschneidung, weniger um wirkliche Wunden, als um jene rothen Excoriationen, die sich in dieser Gegend auf intertriginösen Hautpartien durch den Contact des Urins und der Faeces bei mangelhafter Reinlichkeit bilden. Auch von anderen Partien der Hautoberfläche aus kann die Entwicklung des Erysipelas stattfinden, sobald wunde Stellen an denselben vorhanden sind, doch geschieht dies ungleich seltener. Am häufigsten werden Sie daher die Rose zuerst am Nabel oder noch tiefer in der Schamgegend, an der Wurzel des Penis, als eine die Haut überziehende mehr oder minder lebhaft Röthe und ziemlich resistente Schwellung wahrnehmen, welche mit scharf abgesetzten, etwas über dem Niveau der angrenzenden normalen Haut prominenten Rändern abschliesst und sich heiß anfühlt. Druck, welcher die Röthe momentan vermindert, aber nicht ganz verschwinden lässt, ist dem Kinde offenbar schmerzhaft. Eine Beschränkung des Processes auf die ursprünglich ergriffene Hautpartie ist selten; fast immer schieben sich die wallartig prominirenden Ränder nach verschiedenen Richtungen hin allmählig weiter vor, mitunter gleichzeitig nach allen Seiten, häufiger nach der einen mehr als nach der andern, in welchem Falle die Wanderung des Erysipelas eine ganz ungleichmässige werden kann. So geschieht es z. B. häufig, dass die Ausbreitung nach unten die vorwiegende ist, dass die Oberschenkel, dann die Unterschenkel bis zu den Füssen von der Rose überzogen werden, während das Niveau des Nabels nach oben hin zunächst nicht überschritten wird. Aber auch in diesen Fällen sehen wir nicht selten die Wanderung nach oben plötzlich vom Anus her beginnen und das Erysipelas über die Nates und den Rücken hin die obere Körperhälfte gewinnen. Auf diesem Wege kann dasselbe überall stillstehen und der Process sein Ende erreichen; oft aber durchwandert die Rose die gesamte Hautoberfläche, selbst das Gesicht und die Kopfhaut. Überall, wo dieselbe auftritt, ist die Haut hell- oder dunkelroth, oft glänzend, ödematös geschwollen und derb, selbst von breittartiger Härte, so dass der Fingendruck kaum eine seichte Grube bilden kann. An den oberen und unteren Extremitäten wird die harte Infiltration der Haut besweilen so stark, dass es mir in einzelnen Fällen kaum möglich war, dieselben in den Gelenken zu bewegen. Im Allgemeinen aber pflegt die Röthe und Spannung der Haut an dem später heilenden Theilen nicht mehr den hohen Grad wie an den Ausgangsstellen darzubieten,

wobei auch der wallartig aufgeworfene Rand sich allmählig immer weniger markirt. An manchen Stellen können dabei Bläschen oder mit gelblichem Serum gefüllte grössere Blasen, wie beim Erysipelas halbsam älterer Individuen, aufschliessen. Die ödematöse Anschwellung der Haut und des unterliegenden Gewebes zeigt sich an den schlafferen Hautpartien am stärksten, so dass Penis, Scrotum, Vulva, Augenlider, Hände und Füsse nicht nur geröthet, sondern erheblich tumescirt erscheinen. Linien, die mit dem Fingernagel oder einem stumpfen Gegenstande auf der rothen Haut gezogen werden, bleiben als weisse Streifen lange sichtbar; in einem von mir beobachteten Falle war dies über eine Viertelstunde lang der Fall. Wie bei jeder Wanderröthe sehen wir nun auch hier während des allmählichen Fortschreitens der Röthe die früher befallenen Hautpartien erblässen, und daher kommt es, dass bisweilen Brust und Hals, selbst den Unterschenkeln noch blühend roth erscheinen, während die dazwischen liegenden Theile ihre normale Farbe wieder angenommen haben, was indess nicht ausschliesst, dass letztere noch einmal, gleichsam rückläufig vom Erysipelas ergriffen werden. So sah ich bei einem 5 Wochen alten Kinde, welches seit 3 Wochen an einem den ganzen Körper fast bis zum Nacken überziehenden Erysipelas litt, dasselbe plötzlich noch einmal das Scrotum befallen. Im Stadium der Abnahme, wenn die Wanderung aufgehört hat, findet man daher nicht selten ungleichmässig vertheilte, nicht mehr continuirliche, sondern vielfach isolirte inselförmige Röthungen, theils auf der Brust, theils auf dem Rücken oder den Extremitäten, zwischen welchen die Haut normal gefärbt, aber meistens mehr oder weniger ödematös und mit desquamirten Epidermisfetzen bedeckt erscheint. Nach völliger Erblässung bleibt bisweilen ein über die ganze Haut vertheiltes Oedem zurück, und in Fällen, welche dem Arzte erst in diesem Stadium zugeführt werden, können Zweifel über die Natur dieses Oedems entstehen, welche nur durch die Geschichte der Krankheit und durch die gleichzeitig vorhandenen Spuren einer Desquamation der Epidermis gelöst werden.

Während des geschilderten Krankheitsverlaufs besteht in allen Fällen ein remittirendes Fieber, wobei die Abendtemperatur auf 39–41° steigt, die Morgentemperatur etwa 1° weniger beträgt. Der Puls ist äusserst schnell (bis 170 und mehr) und klein, der Athem entsprechend beschleunigt und oberflächlich. Viele Kinder verweigern schon frühzeitig die Nahrung, besonders die Brust, während sie mittelst des Theelöffels noch Milch zu sich nehmen. Andere sah ich an der Brust fast so gut wie im gesunden Zustande trinken. Mit dem Stillstände des Erysipelas geht das Fieber meistens schnell zurück und das Kind erhebt sich mehr

oder minder rasch. Im entgegengesetzten Fall aber, wenn die Rose über die Hautoberfläche weiter und weiter fortsetzt, treten leicht unter andauerndem Fieber Complicationen mit krankhaften Zuständen innerer Theile hinzu, welche dem Leben ein Ziel setzen, besonders mit ephemerer Diarrhoe, Pneumonie und Peritonitis. Letztere beschloß sich auch in zwei nicht puerperalen Fällen, mit sehr bedeutender Ausdehnung, Spannung und Empfindlichkeit des Unterleibs und mit häufigem Erbrechen. Wahrscheinlich setzt sich der entzündliche Process von der Bauchhaut aus durch den in solchen Fällen meistens runden und geschwollenen Nabel direct auf das Peritonäum fort. Aber auch abgesehen von diesen Complicationen kann das hohe Fieber die Kräfte des schwachen Neugeborenen so erschöpfen, dass ein lethaler Ausgang unter den Symptomen des Collapses eintritt. Dennoch sollte man nie den Muth verlieren, da selbst in Fällen ausgedehnter Wanderung der Rose die Kinder nach wochenlangem Leiden noch mit dem Leben davorkommen und gänzlich genesen können, während andere nach glücklicher Uebersiehung des Erysipelas noch einer aus demselben hervorgehenden Abscedirung und Nekrose der Hautdecken zum Opfer fallen. Ich habe diese Ausgänge wiederholt am Scrotum beobachtet, dann aber auch an den Malleolen, am Rücken (bei einem Kinde war fast der dritte Theil desselben der Sitz einer colossalen Eiteransammlung), am Arm und am äusseren Ohr. Kleinere Nekrosen dieser Art können durch Abstossung heilen.

Bei einem 3 Wochen alten Kinde hatte sich vor 12 Tagen vom Nabel aus ein Erysipel über den grössten Theil der Haut nach oben und unten ausgebreitet. Als Roselraum bemerkt bestand auf der linken Seite des Scrotum ein Abscess, nach dessen Aufbruch ein mit Feinen abgestorbenen Eudergewebe tief eindringender Substanzreich von Umfang eines Zerstärkstückes zurückblieb. Penis und untere Extremitäten waren ebenfalls und auf der linken Wange bestand noch eine ausgeprägte rote Infiltration. Unter dem Gebrauche warmer Cataplasmen giess sich binnen 4 Tagen das leuchtende Gewebe des Scrotum los, während das Erysipel, von welchem bis auf die erwählte Wangenpartie an den oberen Körpertheilen nichts mehr zu bemerken war, plötzlich die linke obere Extremität vom Ellenbogen bis zu den Fingern von neuem überzog und am Ellenbogen einen unheilbaren Abscess zur Folge hatte, den ich eine Woche später öffnete. Schliesslich erfolgte völlige Genesung.

Auch in diesem Falle zeigte sich die schon oben erwähnte Thatsache, dass nach der scheinbar vollendeten Wanderung über Krankheit einzelner Partien der Haut, hier die des linken Vorderarms, plötzlich von neuem befallen werden können, ohne dass sich eine Continuität mit einem noch bestehenden Herde oder eine Verletzung an dem neu ergriffenen Theile nachweisen lässt.

Die Therapie ist in dieser gefährlichsten Krankheit so gut wie ohnmächtig. Im Beginn derselben, wo sich die Rose meistens auf die Nabel- oder Schamgegend beschränkt, kann man den Versuch machen, durch grosse in Bleiwasser getauchte Fomente den entzündlichen Process zu mildern. Innerliche Mittel sind, abgesehen von leichten Purgantien, wenn der Stuhlgang mangelt, gänzlich nutzlos. Begnügt man die Rose ihre Wanderung, so ist, ebensowenig wie im späteren Lebensalter, irgend ein Mittel im Stande, diese Ausbreitung Schranken zu ziehen. Es bleibt nichts weiter übrig, als die Anwendung tonisirender Mittel, des Weins und eines Chinadecocts, von welchem ich indess auch keinen wesentlichen Erfolg gesehen habe. Alles kommt darauf an, ob das Erysipel stillsteht oder seine Wanderung fortsetzt, in welchem Falle ich zu keinem Mittel Vertrauen hege. Injectionen von Carbonsäure (1—2:100) in das benachbarte gesunde Gewebe leisteten mir nichts und scheinen mir wegen der Gefahr der Intoxication bei so kleinen Kindern bedenklich. Die Complicationen müssen ihrer Natur nach behandelt werden, führen aber in diesem zarten Alter bei weit verbreiteter Rose fast immer den Tod herbei. Abscesse lässt man kataplasmiern, öffne sie, sobald deutliche Fluctuation vorhanden ist, und lege einen antiseptischen Verband auf.

Um nicht noch einmal auf diesen Gegenstand zurückzukommen, erlaube ich mir, einige Worte über das Erysipelas des Säuglings- und späteren Kindesalters anzuknüpfen. Auch hier findet man bei genauer Untersuchung fast immer eine wunde Stelle, welche man als das Eingangsthor des Infectionsstoffes und als Ausgangspunkt des Erysipelas betrachten kann. Als solche fand ich am häufigsten die Vaccination, Ekzeme der Kopfhaut, Excoriationen an den Genitalien oder am Anus, wie sie häufig in Folge des an diesen Stellen vorkommenden Erythema intertrigo vorkommen, endlich bei älteren Kindern, zumal skrophulösen, chronische Rhinitis mit Excoriationen der Nasenschleimhaut. Nichts ist häufiger, als ein habituelles, d. h. jedes Jahr ein oder selbst ein paar Mal eintretendes Erysipel unter den letzterwähnten Umständen, wobei sich aus den wunden und borkigen Nasenlöchern die Rose nach beiden Seiten hin wie mit rothen Schmetterlingsflügeln über die Wangen auszubreiten, dieselben aber nicht zu überschreiten pflegt. Nicht immer gelingt es aber trotz sorgfältiger Nachforschung, eine wunde Stelle am Ausgangspunkte aufzufinden.

So sah ich bei einem 15 Monate alten Kinde von der rechten grossen Schamlippe aus, an welcher nicht die geringste Haarverletzung bestand, ein Erysipel sich entwickeln, welches unter heftigem Fieber 10 Tage lang mit einem wallartigen Kinde über die rechte untere Extremität wanderte und in massigen Flecken sprang-

weise, d. h. mit fast bleibenden Intervallen, bis zum inneren Knöchel herabsteig, während auch auf der Haut des Bauches bis und da rothe Inseln bemerkbar wurden. Der Versuch, durch aufgestrichenes Collodium eine Grenze zu ziehen, misslang vollständig; vielmehr dauerte die Wanderung etwa 22 Tage, worauf Heilung eintrat. Bei einem anderen, 5 Monate alten Kinde schob das Erysipelas aus der Vagina heraus sich zu entwickeln, welche in diesem frühen Alter schon der Sitz eines Flusses albus war; die Wanderung umschloß sich nach unten und oben über den ganzen Körper und endete unter Eintritt von Diarrhoe und Pneumonie tödtlich. Den Ausgang von einer an der rechten Seite des Halses befindlichen Incisionswunde beobachtete ich bei einem 5 Monate alten Säugling. Von der Wunde aus schob sich das Erysipelas mit wallartig aufgeworfenem Rande unter Fieber (39–40°) über das rechte Ohr, die Wange und beide Augenlider, dann über Stirn und Kopfhaut bis in den Nacken, wo es nach einer Woche aufhörte. Compressen von verdünntem Bleiwasser, später ein Eisbeutel auf den Kopf, innlich Chinin (0.03 täglich) bildeten die Behandlung.

Geht das Erysipelas von einem Ekzema capitis aus, so bildet es nicht selten im Beginn unter den Haaren und Borsten der Kopfhaut verborgen, und verräth sich nur durch das begleitende Fieber, dessen Grund erst erkannt wird, wenn die Rose die Haargrenze überschreitet und auf der Stirn, im Nacken oder in der Umgebung der Ohren sichtbar wird. In solchen Fällen kommt es bisweilen zu Nachschüben oder vielmehr zu Wanderungen nach verschiedenen Seiten des Ekzemas, z. B. aufwärts über den Stirnrand und später noch einmal gegen die Schläfe hin, wobei jede Ausstrahlung durch einen neuen Fiebersturm eingeleitet wird.

Knabe von 4 Jahren, mit Ekzema capitis, besonders linksseits, im September 1823 in meine Klinik aufgenommen. In der Nacht vom 26. zum 27. Septbr. Fieber, Unruhe, Kopfschmerz. Am 27. Fortdauer dieser Symptome ohne deutliche locale Ursache. Temp. 39.7, Abends 39.9. Am folgenden Tage Rötze und Schwellung der linken Kopfschuppe, die Haargrenze überschreitend und bis an die Schläfengegend sich ausdehnend, Anorexie, dick belegte Zunge, Dyschamie, Temp. Abends 40.6. In den nächsten Tagen nimmt das Erysipelas allmählig an Intensität ab, die Rötze wird mehr fleckig, die Empfindlichkeit geringer, das Fieber sinkt und am 1. Oct. ist die Temp. 37.5, und von Erysipelas nur noch eine multiple Bläschenbildung am Stirnrande sichtbar. Da beginnt am Abend des 11. Oct. das Fieber von neuem, erreicht am folgenden Tage Morgens und Abends 40.5 und wiederum erscheint ein Erysipelas vom Nasen ausgehend, und am 3. Oct. die Haargrenze überschreitend. Unter Anwendung eines Eisbeutels auf die rothe Partie hebt die Nasenstationen, verlässt sich am nächsten Tage und der Knabe ist am 14. bereits ohne Fieber, so dass wir schon nach wenigen Tagen die Behandlung des Kopfekzems in Angriff nehmen konnten.

Unter den Wunden sah ich wiederholt die behufs der Tracheotomie bei Diphtherie gemachten und selbst diphtheritisch belegten Incisionen der Ausgangspunkt eines Erysipelas nigrans werden, welches bisweilen bis auf den Thorax, ja bis auf das Epigastrium hin fortkroch. Bei einem

Säugling nahm dasselbe von den kleinen mit einer Insectennadel gemachten Einstichen ins Scrotum seinen Ausgang, welche ich wegen einer Hydrocele gemacht hatte. Scrotum und Schamgegend bis zum Nabel hinauf wurden gefröck, hart und geschwollen, es erfolgte eine theilweise nekrotische Abstossung des Scrotums und das Kind ging im Collaps zu Grunde. In vielen Fällen entwickelt sich das Erysipel in Folge der Vaccination, selten schon in den ersten Tagen (Früherysipel), gewöhnlich erst am Ende der ersten und in der zweiten Woche oder noch später. In der Regel wird nur der eine Arm befallen und man hat dann eine Wanderung der Rose über den Körper im Allgemeinen weniger zu besorgen als da, wo beide Arme erysipelatös werden. Oft ist es nicht möglich zu entscheiden, ob man es mit der gewöhnlichen, nur das Maass überschreitenden Areola der Impfpocken oder mit einem sich auf den Oberarm beschränkenden Erysipel zu thun hat. Zu manchen Zeiten, besonders aber in gewissen Localitäten (Friedelhäusern) kann das Impferysipel in epidemischer Vertheilung auftreten, wobei es gleichgültig ist, ob animalische oder humanisirte Lymph benutzt wurde. Die Behandlung aller dieser Erysipelformen stimmt mit der (p. 44) erwähnten durchaus überein.

Sklerema neonatorum.

Das Charakteristische dieser gefährlichen Krankheit, deren Vorkommen sich grösstentheils auf die Entbindungsanstalten und Findelhäuser beschränkt und auch hier immer noch zu den Seltenheiten zählt, liegt in der Härte und Starrheit, welche die Hautdecken des Neugeborenen dem Fingerdruck an einem grossen Theile des Körpers darbieten. In den höchsten Graden fühlt man eine pralle Härte, als ob der Körper gefroren wäre, aber nicht ganz gleichmässig an allen Stellen. Eine mehr oder minder bedeutende Abnahme der Temperatur geht damit Hand in Hand. Die davon befallenen Kinder sind lebensschwach, zu früh geboren, atrophisch und gehen sämmtlich zu Grunde.

Dies sind die kurzen und sehr allgemein gehaltenen Züge eines Leidens, über welches bis auf die neueste Zeit eine Verwirrung der Ansichten herrschte, wie kaum über eine andere Krankheit. Die Seltenheit der Affection und die unklare Schilderung desselben bei den meisten Fachschriftstellern bewirkten, dass auch unter den ausübenden Aerzten nicht nur die Anschauungen über das Wesen der Krankheit auseinandergehen, sondern Viele überhaupt gar keine bestimmte Vorstellung davon haben, was sie sich unter dem Namen des Sklerems zu denken haben.

Das Verdienst, in diese Verwirrung Klarheit gebracht zu haben, gebührt, wie ich glaube, vorzugsweise einem unserm französischen Autor, Parrot, welcher in seiner ärztlichen Stellung an der Pariser Findelanstalt reiche Gelegenheit hatte, die Krankheiten der Neugeborenen zu studiren. In seinem Werke über die „Atrophie“ ¹⁾ weist er nach, dass zwei von einander ganz verschiedene krankhafte Zustände, die wirkliche Verhärtung und das Oedem der Neugeborenen, fast durchweg mit einander verwechselt und zu einem verworrenen Bilde vereinigt worden sind. Er erklärt diese Verwirrung daraus, dass die eigentliche „Zellgewebsverhärtung“ (Sklerem) zuerst von Underwood beschrieben, und dieser Name bald darauf im Jahre 1781 von Andry auf das im Pariser Findelhause häufig beobachtete Oedem der Neugeborenen übertragen wurde.

1) Die eigentliche Verhärtung (Sklerema) kommt nach Parrot ausschliesslich bei stark atrophischen (oder wie er sich ausdrückt „atrophischen“) Neugeborenen vor, besonders dann, wenn die Atrophie alsbald nach der Geburt Kinder von einer mittleren Körperfülle befällt. Während die Haut bei Atrophischen sonst weite Falten um die Glieder bildet, wird sie hier stark gespannt, glatt, verliert ihre Weichheit und lässt sich schliesslich nicht mehr von den unterliegenden Theilen abheben, mit denen sie anscheinend fest verbunden ist. Diese Veränderung der Hautdecken pflegt von den unteren Extremitäten auszugehen und sich über die Leutalgegend und den Rücken nach oben zu verbreiten, kann aber schliesslich den ganzen Körper, selbst das Gesicht befallen. Spannung und Härte der Haut nehmen täglich zu und geben derselben bald die Beschaffenheit eines dicken Leders. Alle weichen Theile erscheinen dann starr wie Holz oder Stein, der Fingerring hinterlässt keine Grube, die Farbe der Haut ist dabei meistens schmutzig gelb, an den extremen Theilen leicht cyanotisch. Unter diesen Umständen werden die Glieder immobil, liegen anhaltend gestreckt, und nur die schwachen Bewegungen des Thorax, vielleicht noch der Gesichtsmuskeln unterscheiden den Zustand von einer Leichenstarre. Hebt man ein solches Kind durch Umgreifen des Nackens in die Höhe, so kann man es wie einen starren Körper horizontal in der Luft schwebend erhalten, ganz ähnlich wie beim Trismus neonatorum, mit welchem das Sklerem besonders in den Fällen verwechselt werden kann, wo durch die Theilnahme der Lippen und Wangen der Mund geschlossen und das Saugen verhindert wird. Auch wo das letztere nicht der Fall ist, wird man,

¹⁾ Clinique des nouveau-nés, Paris 1871. p. 116.

wenn auch nicht an Trismus, doch an tetanische Contractionen der gesamten Masticulatur denken können. Ich erinnere mich besonders zweier Kinder dieser Art, welche wochenlang im starren Zustande und im höchsten Grade abgezehrt auf meiner Klinik lagen, dabei noch im Stande waren, etwas zu saugen oder aus dem Löffel Milch zu sich zu nehmen, und schliesslich unter stetem Sinken der Temperatur bis auf 30,0, ja in dem einen Falle bis auf 28,5°C. starben. Bei der Section wurden Gehirn und Rückenmark, auf die wir unsere Untersuchung speciell richteten, absolut normal gefunden, während die Hautdecken die Erscheinungen des Skleremus darboten. In einigen anderen Fällen fand ich dasselbe nicht so allgemein verbreitet, sondern auf die Gegend der Waden, der Adductoren des Oberschenkels, der Nates, der Wangen oder auch der Vorder- und Oberarme beschränkt, wobei nicht nur die aufgelegte Hand, sondern auch der in die Mundhöhle eingeführte Finger die Abnahme der Temperatur sofort constatirte. Fast alle von mir beobachteten Fälle waren dabei mehr oder weniger icterisch.

Die von Parrot gefundenen Sectionsresultate sind folgende: starke Atrophie und Verdichtung der Haut und des Rete Malpighi, dessen Zellen kaum sichtbar sind und eine compacte Masse mit undeutlichen Contouren bilden. Im Unterhautfettgewebe sind die Bindegewebestränge zahlreicher und dicker, das Fett ist beträchtlich geschrumpft, die Fettzellen selbst sind verkleinert und lassen ihren Kern deutlich erkennen; ein grosser Theil der Fettzellen ist, wie bei jeder Atrophie, ihres Fettinhaltes fast oder gänzlich beraubt und zu eiförmigen Zellen geschrumpft, welche eine grosse Ähnlichkeit mit den Epidermiszellen des Rete Malpighi haben. Die Blutgefässe, besonders die der Hautpapillen, sind dergestalt verengert, dass man ihr Lumen nicht unterscheiden kann.

Es handelt sich also nach Parrot um eine Vertrocknung der Haut, mit Verdichtung ihrer Schichten und Atrophie des Fettzellgewebes, und ganz ähnliche Resultate ergab die anatomische Untersuchung der Haut in einzelnen in meiner Klinik beobachteten Fällen.

2) Ein gänzlich verschiedenes Bild bietet die zweite Form, welche das Oedem der Neugeborenen darstellt. Während beim Sklerem die atrophische starre Haut fest an den unterliegenden Theilen haftet, findet beim Oedem gerade das Gegentheil statt, indem sie durch eine ödematöse Infiltration des subcutanen Bindegewebes abgehoben und ausgedehnt wird. Wir finden hier also alle klinischen Erscheinungen des Oedems, wie sie in jedem Lebensalter vorkommen, vor allem eine Anschwellung der betroffenen Theile, welche je nach der Ausbreitung des Oedems entweder nur einen Theil der Körperoberfläche, oder die Gesamtheit

derselben betrifft. Am häufigsten verbreitet sich die Schwellung von den Unterschenkeln aus über die untere Körperhälfte, den Penis, das Scrotum oder die äusseren Schamlippen, wobei die Waden zuweilen früher als die Füsse befallen werden. Nicht selten nehmen auch der Rumpf, die oberen Extremitäten und die Wangen Theil, oder die Anschwellung tritt nur partiell auf den Hand- oder Fussrücken auf. Alle vom Oedem befallenen Theile sind geschwollen und fühlen sich, je nach dem Grade der Infiltration und der dadurch bewirkten Spannung der Haut, teigig oder hart an. Bei hohen Graden können also die betreffenden Theile sehr hart erscheinen und dem Fingerdrucke wenig oder gar nicht nachgeben, gerade wie bei hochgradigen Oedemen des späteren Lebensalters. Die Haut ist dann gewöhnlich glänzend, während sie bei geringeren Graden des Oedems matt und meistens rötlich oder gelblich, zuweilen auch hier und da bläulich marmorirt erscheint. Bei sehr starker Spannung der Haut kann auch hier eine gewisse Starre der Glieder und der Gesichtszüge mit Erschwerung der Beweglichkeit eintreten, die aber ebenso wenig wie die Resistenz der Haut jemals den Grad tetanischer Starre und holartiger Härte, wie beim Sklerem, erreicht. Die Körpertemperatur pflegt aber auch beim Oedem mehr oder weniger zu sinken, ja bei ungünstigem Ausgange auf 30°C . oder noch weiter herabzugesinken. Bei der Section findet man eine Infiltration des subcutanen Bindegewebes mit seröser gelblicher Flüssigkeit, während das Fett zu einer gelbstichlichen oder bräunlichen körnigen Masse verdichtet erscheint, und so ist denn auch das anatomische Bild grundverschieden vom Sklerem, wo beim Einscheiden der Hautdecken nicht ein Tropfen Flüssigkeit ausfließt und das Fettgewebe bis auf wenige Rudimente verkommen ist.

Trotz aller dieser Verschiedenheiten bestehen doch zwischen den beiden Formen gewisse Aehnlichkeiten, welche aber nicht die Hautaffection, sondern die begleitenden Erscheinungen betreffen. Gemeinam ist nämlich beiden der mehr und mehr zunehmende Schwächezustand, die Kleinheit und Unfühlbarkeit des Pulses, das Schwinden des zweiten Herztones, ganz besonders das Sinken der Temperatur, von welchem schon oben die Rede war. Ich selbst habe $28,5^{\circ}$ in der Achselhöhle, Andere schliesslich nur 22° gemessen. Aeusserer Wärme bewirkt unter diesen Umständen entweder keine oder nur eine ganz vorübergehende Erwärmung. Die Stimme wird schwach und winselnd, der Athem langsam, unterbrochen, oder auch häufig, oberflächlich und stöhnend in Folge einer complicirenden Pneumonie, welche unter diesen Umständen die gesunkene Temperatur in der Regel nicht mehr in die Höhe zu treiben vermag. Die Kinder liegen meistens in einem völlig apathischen, somnolenten Zustande, und

manche zeigen schliesslich partielle oder allgemeine Zuckungen. Viele leiden nach an mehr oder minder bedeutenden Durchfällen, welche den Schwächezustand erheblich fördern. Je nach dem Vorliegen dieser oder jener Erscheinungen wird man auch in der Leiche verschiedene Complicationen antreffen, vor allem Bronchitis, Pneumonie, mehr oder weniger ausgebreitete Lungenatektase, Pleuritis, Enteritis in verschiedenen Graden, Hyperämie und kleine Hämorrhagien der Hirnhäute und anderer Theile. In einem meiner Fälle wurde eine Gastritis haemorrhagica gefunden. Dass noch ausserdem eine Anzahl anderer Complicationen, z. B. Icterus, Krankheiten des Nabels, jaunisch-purpurne Zustände u. a. stattfinden können, begreift sich leicht, wenn man das Lebensalter der kleinen Patienten bedenkt.

Müssen wir nun die erste, vor 100 Jahren von Deamian und Underwood beschriebene und namentlich durch Parrot wieder in ihre Rechte eingetragene Form, das eigentliche Sklerem, als eine (in Folge allgemeinen hochgradiger Atrophie eintretende?) Vertrocknenheit der Haut und des Fettgewebes betrachten, so kann die Pathogenese des Oedema neonatorum eine ebenso verschiedene sein, wie diejenige des Oedems der späteren Lebensalter. In einem Theil der Fälle ist, wie oben (S. 42) erwähnt wurde, ein vorausgegangenes Erysipelas neonatorum die Ursache des Oedems, und nur auf diese Fälle passen die von einigen Autoren geschilderten dunklen Rötungen der Genitalgegend oder anderer Hautpartien, die hier und da gefundenen eitrigen Infiltrationen des Bindegewebes und die partiellen Nekrosen. In einem anderen Theil der Fälle ist das Oedem als das Product einer hochgradigen Herzschwäche, einer foetalen Myocarditis¹⁾ oder einer ausgebreiteten Lungenatektase zu betrachten, in deren Folge eine Stauung im Körpervenensystem und seröse Transsudation zu Stande kommt. Mitunter liegt auch ein nephritischer Process dem Oedem zu Grunde, wofür schon Klässner²⁾ Beispiele anführt. Ich selbst beobachtete folgenden Fall:

Kind von 4 Wochen, aufgezogen am 21. März 1874. Intensiv in allen Hauttheilen, starkes gelbes Oedem des Gesichts und aller Extremitäten. Puls 130, Temp. 36.5. Der nehmam erhaltene Urin ist trübe, albuminös und aussert sparsam. Am 27. starke Dyspnoe, Cyanose. Puls 144—160, Temp. 38.4. Respirationsorgane anscheinend intact. Tod am 29. Die Section ergab Nephritis parenchymatosa, Hydrops der Pleura, des Pericardium und Peritoneum; kleine Hämorrhagien auf dem serösen Überzuge des Herzens, Verdünnung des linken Vorhofsappens.

¹⁾ Dahin gehört z. B. der von Deamian (19. Jahresbericht S. 75) als „Sklerem“ beschriebene Fall.

²⁾ Archiv f. physiol. Heilk. XI, 3, 1852.

Sie sehen, dass dem Sklerem und Oedem der Neugeborenen wenigstens ein pathogenetisches Moment gemeinsam zukommt, eine hochgradige Schwäche, mag sie nun eine angeborene oder durch gleich nach der Geburt einwirkende Ursachen erworbene sein. Von der herabgesetzten Energie des Herzmuskels, der bisweilen fötig entartet gefunden wurde, dem gestörten Blutumlaufe, der schwachen Respiration, der Atelectase des Lungengewebes und der Störung des natürlichen Stoffwechsels ruht auch das enorme Sinken der Temperatur her, welches vielleicht jene eigenthümliche, dem kranken Hammetalg ähnliche Veränderung des subcutanen Fettgewebes herbeiführt, die man bei nicht sehr abgedehnten Kindern nützlich antrifft. Es scheint mir keineswegs notwendig, deshalb, wie Einige wollen, eine eigene Art der Krankheit als „Verkantung des Fettgewebes“ aufzustellen.

Aus der oben erörterten Pathogenese ergibt sich von selbst, dass Sie das Sklerem, so gut wie das Oedem, vorzugsweise bei Kindern beobachten werden, welche zu früh geboren worden sind, oder welche von vornherein den ungünstigsten Lebensbedingungen, der Kälte, schlechter Luft und elender Nahrung ausgesetzt sind. Daher sind besonders die unehelichen Findelkinder, zumal während der kalten Jahreszeit, diesen Zuständen unterworfen, während die Privatpraxis und selbst die poliklinische weit seltener die Gelegenheit zur Beobachtung derselben bietet. Alle anderen aufgeführten Ursachen sind hypothetisch. Bei der Gemeinsamkeit der atologischen Verhältnisse, die einerseits das Sklerem, andererseits ebenso gut das Stauungsodem hervorzubringen können, begreift es sich dann auch, dass Fälle vorkommen können, in welchen beide Formen gleichzeitig oder wenigstens successiv in einem und demselben Individuum auftreten, eine Thatsache, welche die bei den meisten Autoren herrschende Verwirrung noch gesteigert hat. Parrot beschreibt ein interessantes Beispiel dieser Art. Das zuerst nur ein partielles Oedem darbietende neugeborene Kind wird unter dem Einflusse der Atrophie durch Resorption des Oedems immer magerer, und während noch am Oberkörper idematische Schwellung sichtbar ist, beginnt an den unteren Extremitäten und am Rücken schon das eigentliche Sklerem.

Nach Allen, was ich Ihnen über das letztere gesagt, werden Sie wohl die Unheilbarkeit desselben erkennen können. Die Kinder gehen im äussersten Collaps zu Grunde, nicht immer schnell, da ich selbst zwei solcher Individuen 2—3 Wochen lang auf meiner Klinik beobachten konnte. Etwas günstiger gestaltet sich die Prognose des Oedems, wenn eben die Ursache desselben eine noch hebbare ist. So stellt sich das Oedem auch Erysipels im Ganzen als das günstigste dar, obwohl auch

hier Todesfälle nicht selten sind. Durchweg schlimmer gestaltet sich die Prognose aller passiven Oedeme, welche als der Ausdruck hochgradiger Herzschwäche, einer Lungenatelektase oder Nephritis betrachtet werden müssen. In allen diesen Fällen gehören Heilungen zu den Ausnahmen und die Behandlung kann sich nur auf diätetische und hygienische Maassregeln beschränken. Dass für eine gute Amme Sorge zu tragen ist und das Kind, wenn es nicht mehr saugen kann, mit der abgezogenen Ammen- oder guter Kuhmilch ernährt werden muss, ist eine Hauptbedingung, welcher sich die Sorge für künstliche Erwärmung des erkaltenden Körpers anschliesst, Frottirungen des Körpers mit erwärmtem Flaëssl, Wärinflaschen, warme aromatische Bäder (Kamillen, Calmas). Im Moskauer Findelhaus bedient man sich zu solchen Zwecken metallischer Wiegen mit doppelten Wänden, die mit warmem Wasser gefüllt werden.¹⁾ Innerlich mag man versuchen, die immer mehr sinkende Energie des Herzens durch kleine Gaben von Wein (10–15 Tropfen Tokayerwein stündlich) zu erhalten, wird aber von allen diesen Maassregeln kaum einen Erfolg erwarten dürfen. —

Die Verwirrung, welche in den Anschauungen über die „Verhärtung und das Oedem des Zellgewebes“ bis auf die neueste Zeit sich geltend machte, wurde noch erheblich durch Bouchut gesteigert, welcher eine bei Erwachsenen und älteren Kindern zuweilen beobachtete Krankheit, die Sklerodermie, mit dem Sklerem der Neugeborenen in Beziehung brachte. Die Sklerodermie hat indess mit unserem Sklerem nichts gemein, und ist in ihrem Gesammthilde und Verlauf so verschieden von demselben, dass man nicht begreift, wie der Irrthum Bouchut's auch noch Nachfolger haben konnte. Ich muss Sie in Betreff dieser Krankheit auf die Werke über Dermatologie verweisen. Auch bei Kindern ist sie wiederholt, und theilweise sogar mit glücklichem Ausgange beobachtet worden.²⁾

Eine dritte Hautaffection des Neugeborenen der

Pomphigus neonatorum

betrifft in Bezug auf Zahl, Form, Sitz und Füllung der Blasen sehr mannigfache Abweichungen dar, doch halte ich es vom ärztlichen Standpunkte für ausreichend, zwei Hauptformen zu unterscheiden, den einfachen (acuten) und den kachektischen Pomphigus.

¹⁾ Glensdowsky, Oester. Jahrb. f. Päd. 1873. I. 7.

²⁾ Grass, Oester. Zeitschr. f. Päd. 1876. II. p. 189. — Jahrb. f. kinderl. Heilkunde. XI. 1877. p. 318. — Ibid. XIII. 1878. p. 36. — Silbermann, Jahrb. f. Kinderheilk. 1880. Bd. XI.

Die erste Form, den *Pomphigus simplex* s. *acutus* will ich Ihnen zunächst durch einige Beispiele aus meiner Praxis veranschaulichen.

Das Kind eines Arztes, gesund geboren, im März 1873 von mir beobachtet, bekam von 9 Lebenstage an einen Pomphigusausschlag, der sich successiv, doch ohne bestimmte Ordnung am Hals, im Nacken, am Rumpf und an den Extremitäten entwickelte. Nur die Hände und Füße blieben verschont. Die Blasen erreichten die Größe eines Zwemmarkstückes, waren aber theilweise nur erhoben, im höchstengrade, halbkugelig, nämlich jezt mit gelblichem Serum gefüllt, und standen an einigen Stellen tiefer, an anderen durch größere Intervalle getrennt. Ihre Gesamtzahl betrug wohl 30 bis 40. Die darwischen liegende Haut zeigte eine lebhaft Rothé. Im Laufe der nächsten Tage trübte sich der Inhalt, doch nicht in allen Blasen. Die Bildung derselben dauerte im Ganzen 12 Tage, während welcher das Kind, abgesehen von einem mäßigen Trachsaltern, sich vollkommen wohl behielt. Alle Functionen waren normal und die Temperatur der Haut, die übrigens nicht gemessen wurde, schien kaum erhöht zu sein. Nachdem schon viele Blasen theils gelblich, theils zu dünnen Urstein eingetrocknet waren, hörte am 12. Tage die Neubildung derselben auf, die rothe Haut erhellte und nach einer Woche waren von dem ganzen Leiden nur rüthe überhäutete, von einem wünschlichen Epithelmünge umgebene Flecken übrig. Das Kind blieb seitdem von jedem Rückfalle verschont.

Ein 14 Tage altes Kind, zu welchem ich am 8. Januar 1874 gerufen wurde, normal geboren, dessen Vater vor 12 Jahren einen Schanker gehabt hatte, sondern aber durchaus gesund geblieben war, bekam am 9. Tage nach der Geburt hämorrhagische völlige Wohlthätigkeit plötzlich Pomphigus. Unter leichter Wärmehaltung brachen successiv am ganzen Körper Blasen hervor, welche von der Größe eines halben Markstückes bis zu der eines Thales und darüber varirten, halbkugelig, durchsichtig gelblich, und bald mehr, bald weniger jezt gefüllt waren. Auch das Gesicht blieb nicht verschont, und besonders auf der Stirn entstanden die beschriebenen Blasen zu ganz kolossalen Erhebungen des Epithels. Die Haut des Körpers erschien stark geröthet. Fummalen und Blausäuren blieben auch hier verschont, nur in der linken Palma bildete sich eine Blase. Dabei ungestörtes Wohlthätigkeit, Menschlichkeit frei; Sengen ungehindert. Die Blasenbildung, die in successiven Schüben erfolgte, dauerte etwa 10 Tage, und die Abheilung erfolgte wie im ersten Falle, so dass nach mehreren Tagen diese trockene, von einem Epithelmünge umgebene Schärfe die Stellen der Blasen bezeichnete, nach deren Abheilung die Haut nach längere Zeit geröthet blieb. Syphilische Erhebungen sind bei diesem Kinde in der Folge nie beobachtet worden.

Bei einem Zwischstüchlichen Kinde, beobachtet in der Poliklinik im Juli 1873, erreichten die zahlreichen Blasen nur die Größe eines halben Markstückes (eich Hellen bedeutend kleiner), waren absonderlich, und auf der gerötheten Haut schienen sie und da auch kleinere Bläschen auf. Auch hier völlige Kapazität und Heilung binnen 14 Tagen.

Bei einem 14-tägigen Kinde, in der Poliklinik vorgestellt am 18. März 1873, war ebenfalls der ganze Körper mit zahlreichen Pomphigusblassen bedeckt, die zum Theil einen trüben eitrigen Inhalt zeigten. Ganz besonders grosse Blasen hatten sich auf der behaarten Kaput entwickelt. Inguinaldrüsen etwas angeschwollen, sonst völlige Kapazität. Heilung.

Ich glaube, diese Beispiele werden genügen, um Ihnen das Bild und

den Verlauf der Krankheit bei Neugeborenen klar zu machen, da es hier nicht meine Aufgabe sein kann, mich auf eine Beschreibung und Deutung des Pemphigus im Allgemeinen einzulassen. Sie finden hier eine rapide Entwicklung des Ausschlags bei ganz gesunden Kindern in der zweiten Lebenswoche, einen guten Verlauf und schnelle Heilung. Mehr wie einmal liessen mich die grosse Zahl der Blasen und die Rötze der Haut, zumal in so zartem Alter, fürchten, dass es hier zu ähnlichen Complicationen kommen könnte, wie bei ausgebreiteten Verbrennungen der Haut — aber meine Befürchtungen waren nicht gerechtfertigt. Alle diese Kinder genasen. Ja abgesehen von einer heftigen Ursache und einem starken Jucken im Stadium der Abheilung, welches man deutlich an den Bewegungen der Kinder erkannte, boten dieselben gar keine krankhaften Erscheinungen dar. Der glückliche Ausgang ist jedoch keineswegs constant. Zufällige Complicationen mit eitrigen Zuständen innerer Organe, plötzlicher Collapsus, wie bei starken Verbrennungen, oder auf die Krankheit folgende Furunculosis sind wiederholt als Todesursache beobachtet worden. Als wichtige Thatsache hebe ich hervor, dass in dieser Form die Fusssohlen und Handteller immer entweder ganz frei bleiben oder doch nur in äusserst geringem Maasse befallen werden.

Kennt man nun die Ursache dieser Krankheit? Bevor ich auf diese Frage antworte, erinnere ich Sie daran, dass es sich an dieser Stelle ausschliesslich um den Pemphigus der Neugeborenen handelt. Zunächst bemerke ich, dass die Krankheit in Entbindungsanstalten bisweilen in endemischer Form beobachtet wird. Dahin gehört z. B. die von Ahlfeld⁷⁾ in Leipzig beobachtete Endemie, welche binnen zwei Monaten 25 Kinder von ganz verschiedener Körperconstitution, die fast alle von gesunden Müttern geboren waren, zwischen dem 2. und 14. Tage nach der Geburt befiel. Auch hier blieben Handteller und Fusssohlen immer verschont, während die Finger bisweilen stark afficirt wurden. Ahlfeld spricht sich für die contagiose oder wenigstens miasmatische Natur der Krankheit aus, ohne indess stricte Beweise beibringen zu können. Koch⁸⁾ nimmt eine Uebertragung des Contagiums durch die Hebamme an, weil er im Zeitraum von drei Monaten 8 Fälle des Pemphigus beobachtete, welche sämmtlich aus der Praxis einer und derselben Hebamme stammten, und ergänzt diese Beobachtungen durch einen späteren Bericht⁹⁾, in welchem wiederum 23 Fälle von Pemphigus

⁷⁾ Arch. f. Gynäkol. V. Bd. I. p. 130.

⁸⁾ Jahrb. f. Kinderheilk. 1878. p. 413.

⁹⁾ Ibid. 1875. p. 425.

aus der Praxis derselben Holmann angeführt worden, während unter 200 Neugeborenen, die von anderen Hebammen gepflegt wurden, kein einziger Fall vorkam. Ähnliche Erfahrungen machte Palmer⁷⁾. Beide Autoren beobachteten auch den Uebergang des Ausschlags auf Erwachsene, und Koch führt an, dass es ihm gelungen sei „sehr vielen negativen Resultate“ einmal durch Ueberimpfung des Blaseninhaltes auf seinen Arm noch etwa 60 Stunden eine Blase zu produciren. Auch Vidal⁸⁾ berichtet einige gelungene Impfversuche. Die von Mildenbauer⁹⁾ beschriebene Epidemie in Leipzig und Umgegend (dieselbe, welche Ahtfeld beobachtete) erlosch nach strenger Isolation der Erkrankten. Ueber die Art des angenommenen Contagiums weiß indess Niemand etwas zu sagen; insbesondere konnten Pilze oder Sporen im Blaseninhalt bisher nicht nachgewiesen werden.

Die epidemische oder mindestens endemische Ausbreitung des Pemphigus neonatorum, wie sie von den genannten Autoren und schon früher von Hervieux, Abegg, Olshausen, Klemm⁴⁾ u. A. beschrieben wurde, ist mir in meinem Wirkungskreise noch nicht begegnet. Ich hatte es immer nur mit sporadischen Fällen zu thun und kann versichern, dass in keinem derselben eine Uebertragung der Krankheit von dem Kinde auf das Wartepersonal oder die Umgebung stattgefunden hat. Diese Beobachtung haben schon auch viele andere gemacht, und man hat daher außer der infectiösen noch andere Ursachen zu ergründen versucht. So bringt Bohn⁵⁾ die meistens in der zweiten Hälfte der ersten Lebenswoche entstehende Krankheit mit der Exfoliation der Epidermis, welche um den dritten Tag zu beginnen pflegt und durchschnittlich mit dem Schluss der ersten Woche beendet ist, in Beziehung. Er glaubt, dass während dieser Zeit jede Reizung der Haut, z. B. schon durch Kleidungsstücke, besonders aber durch Bäder, im Stande sei, die physiologische Action in eine pathologische in Form von Blasenbildung umzuwandeln und warnt mit Recht vor der Abschätzung der Baletemperatur mittelst der Hand ohne Zuhilfenahme des Thermometers. Bohn beruft sich auf einen Fall von Pemphigus, der auf diese Weise durch Bäder von 31°, welche eine des Temperatursinns beraubte Hebamme auf 28° laxirt hatte, entstanden war und nach der Einführung kühlerer Bäder

7) Würtemb. med. Correspond. 40. 1889.

8) Gaz. med. 29. 1876.

9) Arch. f. Gynäkol. VI. 1874. p. 369.

4) Gend. Jahrb. f. Ped. 1872. II. Abth. p. 205.

5) Jahrb. f. Kinderheilk. 1876. IX. p. 304.

schnell aufhörte. In ähnlicher Weise spricht sich Dohrn¹⁾ aus und schreibt der Haut der Neugeborenen die Eigenschaft zu, auf mechanische, chemische oder thermische Reize mit der Eruption von Blasen zu antworten. Der nur sehr vereinzelt beobachtete Uebergang auf die Umgebung und die kleine Zahl scheinbar gelungener Impfversuche verbieten in der That ihre contagiose Bedeutung, wenn man bedenkt, das auch das Secret einfacher Ekzeme nicht ganz selten durch den Contact die Krankheit auf die Mütter und Pflegerinnen der an derselben leidenden Kinder überträgt.

Bei dieser Sachlage dürfen wir zur Zeit wohl noch unser Urtheil über die infectiöse Natur des *Pemphigus ventosus neonatorum* in suspension halten.

Die Behandlung desselben ist äusserst einfach. Ich beschränke mich auf laue Bäder (26—27°) mit Zusatz von Kleie oder Leim und halte den hier und da empfohlenen Zusatz von Sublimat für überflüssig.

Der *Pemphigus cachecticus* unterscheidet sich von dem einfachen *ventosus* vorzugsweise dadurch, dass er mit Vorliebe die dünnen Hautstellen, Hals, Achsel- und Leistenregionen, dann aber besonders die Fusssohlen und Handflächen befällt, welche, wie wir oben sahen, von jenem fast immer verschont bleiben. Die auf einer lividen Macula sich erhebenden Blasen sind meistens nur halb gefüllt, schlaff und überstiegen selten den Umfang einer Erbse oder einer Haselnuss. Dabei erscheint ihr Inhalt minder klar, oft purulent oder etwas blutig gefärbt. Im Allgemeinen pflegt auch die Zahl der Blasen eine geringere zu sein. Neugeborene bringen bisweilen die Spuren dieses *Pemphigus*, der sie schon während des Fötallebens befallen, in Gestalt geplatzter Blasen oder daraus hervorgegangener oberflächlicher Ulcerationen mit auf die Welt, was dann sofort zur Annahme einer hereditären Syphilis Anlass giebt.

In der That wird diese Pemphigusform vielfach nach dem Vorgange von P. Dubois als ein Ausdruck von Lues, und zwar als der frühzeitigste, betrachtet, und ich selbst besitze unzweifelhafte Fälle, welche diesen Zusammenhang beweisen.

Bei einem Kinde von 6 Monaten z. B. hatte die Blasenbildung gleich nach der Geburt begonnen und in den letzten Monaten dergestalt zugenommen, dass namentlich an vielen Stellen des Körpers, auch im Gesicht und am Hinterkopfe theils diese Blasen, theils Ecoriations und Schürfe sichtbar waren.

Die schmutzige Hautfarbe, die chronische Rhinitis, schliesslich treue Karyodermie am den Axen gaben den Beweis, dass es sich hier um Syphilis handelte.

¹⁾ Arch. f. Dermat. IX. 2.

Ein 6 Tage altes Mädchen, aufgenommen am 15. April 1879, sehr atrophisch, zeigte Pemphigusbläschen am ganzen Körper, besonders reichlich in den Fesseln und Handflächen, auch unter den Nägeln. Dabei Rhinitis, Schorfbildung an den Nasenlöchern und Lippen, Adhäsion- und Inguinalblissen geschwollen. Section. Osteochondritis syphilitica intracranialis, mehrfache kleine Abscesse in der Tyma.

Mädchen von 14 Tagen, schlecht genährt (18. Dec. 1881). Vorne und hinten mit frischen trüben Blasen und vielen Excoriationen, die von einem Epithelmangel angedeutet waren (replante Blasen) bedeckt; einzeln auch auf dem Hand- und Fußrücken, an den Fingern und Zehen. Dabei Rhinitis, Infiltrate der Aftergegend.

Deshalb möchte ich diese Pemphigusform, welche sich auch durch einen unbegrenzten chronischen Verlauf von der ersten unterscheidet, keineswegs durchweg für ein Anzeichen von Lues gelten lassen, stimme (vielmehr mit Caillaud¹⁾) darin überein, dass die Bildung von Blasen, wie sie dieser zweiten Form eigenthümlich sind, nur der Ausdruck einer tief wurzelnden Cachexie ist, welche man bei den Kindern der Armen, zumal atrophischen, so häufig beobachtet. Insofern nun syphilitische Neugeborene, wenn nicht immer, doch sehr häufig die Zeichen dieser Cachexia pauperum und der Atrophie darbieten, können sie auch solche Blasen produciren; nur darf man diese nicht gleich als einen Pemphigus „syphiliticus“ bezeichnen und durch eine specifische Behandlung heilen wollen, die oft eher schaden als nützen wird. Vielmehr ist eine allgemeine tonisirende Behandlung, vor allem gute Ernährung durch Frauenmilch, Tokayerwein, gute Luft indicirt. Nur bei anderen sicheren Anzeichen von Syphilis möge man Sublimatlösung (1,0 auf ein Bad) damit verbinden.

Aphthen des Gaumens.

In einer früheren Vorlesung (S. 14) machte ich Sie auf milienartige Knötchen der Gaumenschleimhaut aufmerksam, welche bei sehr vielen Neugeborenen in den ersten 4–6 Wochen des Lebens angetroffen werden. Sehr häufig finden Sie auch noch, wenn Sie die Rachenhöhle nach der nicht immer leichten Niederdrückung der Zunge untersuchen, auf jeder Seite des Gaumengewölbes, gerade im Niveau der Apophysis pterygoidea und unmittelbar hinter dem Arcus alveolaris des Oberkiefers, wo der Knochen durch die dünne Schleimhaut durchschimmert, eine runde oder mehr ovale weissgelbliche, von einem rothen Saum umgebene Scheibe, meist ganz symmetrisch auf beiden Seiten, zuweilen auf einer Seite etwas grösser als auf der anderen, hier und da auch von semiovalförmiger Gestalt, die offenbar durch Coalescenz zweier Plaques entstanden ist. Der

¹⁾ Traité prat. des maladies de la peau chez les enfants. Paris 1859.

größte Durchmesser derselben erreicht nur selten einen Centimeter. Man findet diese „Plaques“, welche bei Berührung mit dem Spatel leicht bluten, sehr oft bei ganz gesunden Kindern. Allmählig verlieren sie ihre graugelbliche Farbe, werden roth und verschwinden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Nur bei atrophischen und kachektischen Kindern sah ich sie bisweilen an Umfang und Tiefe zunehmen und in wirkliche Ulcerationen übergehen, die selbst bis auf den Knochen dringen können. In solchen Fällen sieht man auch oft gleichzeitig die Mund- und Gaumenschleimhaut mit Soor bedeckt, und die Kinder gehen in Folge ihres Allgemeinleidens oder eintretender Complicationen zu Grunde.

Diese symmetrischen „Plaques“ oder „Aplthien“ waren zwar schon früher, besonders von französischen Kinderärzten erwähnt worden, dann aber in Vergessenheit gerathen, welcher sie erst Beduax¹⁾ wieder entzies. Vor allem halten Sie fest, dass dieselben mit der Syphilis absolut nichts zu thun haben; ich würde dies gar nicht erwähnen, wenn nur nicht immer noch Fälle vorkämen, in denen Aerzte, welche diese Dinge nicht kennen, eine solche Diagnose gestellt hatten. Vielmehr war ich immer der Ansicht, die jetzt auch von Anderen getheilt wird, dass diese „Aplthien“ nur durch einen mechanischen Act, nämlich durch den Druck und die Reibung, welche die Zunge beim Saugen, sei es nun aus der Warze oder aus der Milchflasche, auf die an jenen Stellen sehr dünne Schleimhaut ausübt, zu Stande kommen. Nach Parrot²⁾ handelt es sich hier zunächst um eine Lockerung des Epitheliums und eine Kernwucherung in der Schleimhaut mit Anschwellung desselben, weiterhin um eine Abstossung des ersteren und Bildung einer seichten Erosion. Es ist daher nicht richtig, wenn man diese Aplthien aus einer Ulceration der früher erwähnten milienartigen Knötchen am Gaumen hervorgehen lässt, welche fast immer nur in der Raphe und ihrer nächsten Umgebung sitzen, während die Aplthien gerade die Seitentheile des Gaumens einnehmen. Allerdings kommen auch in der Raphe bisweilen oberflächliche oder tiefer dringende Ulcerationen vor, deren Entstehung aus jenen Knötchen als möglich gedacht werden kann. Aber diese in der Raphe auftretenden Geschwüre sind überhaupt viel seltener, und mit wenigen Ausnahmen, die abgesehen von ihrer ungleichen Form ganz wie unsere Aplthien aussahen, fand ich dieselben nur bei sehr atrophischen Kindern, bei denen am Gaumengewölbe überhaupt scharf abgeschaltene rindliche, weißgelbe oder graue Ulcera vorkommen, welche hin und da

1) Des Knöch. d. Neugeb. u. Säuglings. Wien. 1850. I. p. 105.

2) l. c. p. 267.

den unterliegenden Knochen blosslegen. Die Ansicht von Parrot, dass alle ausserhalb der Raffe vorkommenden Ulcerationen syphilitischer Natur seien, kann ich nicht theilen. Ich sah z. B. bei einem 6 Wochen alten Kinde, welches im höchsten Grade der Atrophie zu Grunde ging, ohne ein einziges Zeichen von Laes darzubieten, das ganze Gaumengewölbe mit solchen Ulcerationen besetzt, während gleichzeitig im Munde und am Gaumen reichliche Neubildung stattfand. Die ursprünglich gelbe und grauweiss aussehenden Geschwüre wurden schliesslich braun gefärbt und bei einzelnem traf die Sonde den entblässen Knochen.

Die Gaumengapthen erfordern als eine sehr häufige „decubitale“ Erscheinung nur dann eine Behandlung, wenn sie sich unter dem Einflusse schlechter Ernährung vergrössern und vertiefen. In diesem Falle pflege ich dieselben mit einer Auflösung von Zinn sulphuricum (1:10) oder Argent. nit. (1:15) zu befeuchten. Jenseits der ersten 3 Monate habe ich die Aphthen nicht mehr beobachtet, doch führt Parrot (l. c. p. 97) den Fall eines 2¹/₂ jährigen, von den Masern befallenen Kindes an, welches neben anderen Erosionen und Aphthen in der Mundhöhle auch zwei wohl charakterisirte Plaques am Gaumen darbot.

Nur ausnahmsweise sah ich durch eine ungewöhnliche Ausdehnung der Aphthen ein Krankheitsbild entstehen, welches zur Verwechslung mit Diphtheritis Anlass gab. Dies geschah z. B. bei einem 3 Wochen alten mässig atrophischen Kinde, bei welchem ursprünglich zwei Plaques an den Seiten des Gaumens bestanden und sich allmählig dergestalt ausgebreitet hatten, dass sie schliesslich mit einander confluirten und der ganze hintere Theil des Gaumengewölbes von einer zusammenhängenden gelblich grauen Schicht überzogen war, welche mit einer scharfen Linie oberhalb der Uvula abschnitt. Diese selbst und die Mandeln waren indess vollkommen normal, und dieser Unstand, wie die geschilderte Entwicklung, war für mich vollkommen hinreichend, die von dem behandelnden Arzte gestellte Diagnose „Diphtheritis“ zu entkräften. In der That verschwand die ganze Affection innerhalb 10 Tagen, ohne einen Substanzverlust zu hinterlassen.

Ich schliesse die Betrachtung der Krankheiten, welche Neugeborene ausschliesslich oder vorzugsweise befallen, mit einigen Bemerkungen über die

Melaena neonatorum.

nur im Allgemeinen seltene Affection, welche ich selbst nur in einzelnen Fällen zu beobachten Gelegenheit hatte. Dieselbe charakterisirt sich durch Blutungen aus dem Magen und Darmkanal, welche in der Regel

zwischen dem ersten und sechsten Tage nach der Geburt, sollten später eintreten und leicht einen tödtlichen Ausgang nehmen. Mitunter findet nur wiederholtes Erbrechen dunkelen Blutes statt, worauf trotz anfänglicher starker Erschöpfung die Kinder sich allmählig wieder erheben. In anderen Fällen aber kehrt das Blatbrechen häufiger wieder und es treten auch schwärzliche Blutentleerungen aus dem After hinzu, welche die Wundeln durchtränken. Zuweilen fehlt auch das Blatbrechen gänzlich und es kommt nur zu rasch hintereinander folgenden blätigen Stühlen, die Anfangs noch Meconium oder Koth enthalten, späterhin aber aus reinem flüssigen und coagulirten Blute bestehen. Andere krankhafte Erscheinungen können vollständig fehlen, und die Untersuchung des Unterleibs ergibt nichts Abnormes. In den meisten Fällen tritt schon binnen 24—48 Stunden in Folge der wiederholten massenhaften Blutungen tödtliche Blässe, Kühle der Haut, Schwinden des Pulses und der Tod ein; nur der kleinere Theil der Fälle erhebt sich wieder, nachdem die Blutung aufgehört hat. Die Mortalität schwankt bei den verschiedenen Autoren zwischen 35 und 50 pCt.

Die Ansichten über die Entstehungsweise dieses gefährlichen Krankheitszustandes sind je nach dem pathologisch-anatomischen Befunden, welche demselben zu Grunde lagen, sehr verschieden. Billard erklärte die Blutungen aus der Hyperämie der Alimentschleimhaut, welche schon im normalen Zustande während der ersten Lebenstage besteht und durch eine zufällige Störung der venösen Circulation, z. B. durch einen asphyktischen Zustand des Neugeborenen, Atelektase der Lunge, angeborene Fehler des Herzens, Anschwellung der Leber und Milz gesteigert werden kann. Von Anderen (Kiwisch) wurde eine zu frühzeitige Unterbindung des Nabelstranges beschuldigt, während in der neuesten Zeit die Aufmerksamkeit sich auf kleine rundliche Ulcerationen der Magen- und Darmschleimhaut lenkte, welche schon von den französischen Autoren Denis, Billard, Rilliet und Barthex, Barrier u. A. gekannt, später bei uns von Vogel, Hecker, Buhl u. A. beschrieben waren. Diesen Geschwüren, deren anatomische Schilderung am vollständigsten bei Parrot⁷⁾ zu finden ist, will man nun eine Beziehung zur Melæna neonatorum zuschreiben. Aber auch über die Bildungsweise dieser Ulcerationen gehen die Meinungen auseinander. Während Einige denselben einen entzündlichen Ursprung zuschreiben, lassen Andere (Buhl) sie aus einer Verschwärung der Follikel oder (Rehn) aus einer Fekulent-

⁷⁾ l. c. p. 247.

artung der kleinen Arterien hervorgehen. Landau¹⁾ endlich, gestützt auf einen Fall von Duodenalgeschwür mit Thrombose der Nabelvene, glaubt an einen embolischen Ursprung der Geschwüre und lässt sie durch Thromben, welche aus dem Ductus Botalli oder aus der Nabelvene in die kleinen Arterien der Magenschleimhaut hingetrieben werden und Nekrose der betreffenden Partie herbeiführen, zu Stande kommen. Dabei soll die Anätzung der außer Circulation gesetzten Schleimhautpartie durch den sauren Magensaft eine fördernde Rolle spielen. Asphyxie und unvollkommene Entwicklung der ersten Respiration sollen insofern von Bedeutung sein, als sie eine Stagnation der Blutsäule in der Nabelvene und Thrombenbildung in derselben begünstigen. Dass man endlich auch die Ulcerationen ganz modern als parasitäre, durch Mikrobakterien hervorgerufene betrachtet hat (Rehn²⁾), ist fast selbstverständlich.

Sie sehen, wie verschieden die Ansichten über die Pathogenese der Meliaria sich gestalten, und schon daraus müssten Sie den Schluss ziehen, dass diese Affectio nur eine Krankheitserscheinung, d. h. das Symptom verschiedener anatomischer Vorgänge sein könnte, ganz ebenso wie im späteren Lebensalter. Vor allem steht fest, dass sich bei Neugeborenen Ulcerationen der Magenschleimhaut ziemlich oft finden, während die Meliaria im Ganzen sehr selten zur Beobachtung kommt, dass ferner gerade in Fällen, wo multiple Geschwüre bei der Section gefunden wurden, weder Blutstühlen noch blutige Stühle während des Lebens bestanden hatten. Es ist dies um so mehr zu beachten, als der Inhalt des Magens, wie ich selbst in solchen Fällen gesehen, etwas blutig schwärzlich erscheinen, und auch die kleinen Schleimhautgeschwüre mit einer schwärzlich gefärbten Schleimlage bedeckt sein können, ohne dass im Leben jemals blutige Auslassungen stattgefunden haben. Will man also auch für einzelne Fälle von Meliaria Geschwüre im Magen oder Darmkanal gelten lassen (mir selbst ist ein solcher Fall bekannt, in welchem zwei Geschwüre im Duodenum gefunden wurden³⁾), so gilt dies doch keineswegs für die Majorität. Kling⁴⁾ fand in 6 tödlich verlaufenen Fällen nur 2 mal Magen- und Duodenalgeschwüre, in allen übrigen konnten nur venöse und capilläre Blutungen angenommen werden. Landau's

¹⁾ Ueber Meliaria der Neugeborenen u. s. w. Breslau 1874.

²⁾ Centralzeit. f. Kinderkrankh. 1878. p. 227.

³⁾ Voit (Deutsche med. Wochenschr. 1881. No. 30). Derselbe betrifft freilich ein schon 7 Wochen altes Kind, welches nur kleine Mengen kaffeeartiger Flüssigkeit ausgeschied, aber nie wirkliches Blutstühlen oder blutigen Stuhlgang gehabt hatte.

⁴⁾ Ueber Meliaria neonatorum. Inaug.-Diss. München 1875.

Verlust wird dadurch nicht geschmälert. Sein Fall von Duodenalgeschwür und die Erfahrung, dass Darmblutungen durch Erhöhe der Arteria mesenterica bei Erwachsenen zu Stande kommen können¹⁾, enthält in der That eine Aufforderung, auch in allen Fällen von Meläna der Neugeborenen die Magen- und Darmarterien nach dieser Richtung hin zu untersuchen. Andererseits wird man auch ohne Ulcerationen Hämorrhagien für möglich halten müssen, wenn in Folge gehemmter Respiration der venöse Druck stark erhöht wird, was Landau selbst zugibt und Epstein's Versuche beweisen, der bei Thieren durch Athmungspension Blutextravasate in der Magenschleimhaut erzeugte²⁾. Dass endlich auch Fälle von Darmblutungen mit einer hämorrhagischen Diathese, insbesondere mit der „Puerperal-Infection“ zusammenhängen können, sei hier nur erwähnt, weil die Blutung dann nur ein Glied in der grossen Kette anderer localer und allgemeiner Krankheitserscheinungen bildet. Sehr interessant sind die beiden von Rilliet³⁾ mitgetheilten Fälle capärer Darmblutung bei Zwillingen, welche fast gleichzeitig befallen und bis auf den äussersten Grad erschöpft wurden. Hier könnte man ebenfalls zur Analose einer gemeinsamen hämorrhagischen Diathese geneigt sein, wenn die Krankheit nicht schliesslich doch einen glücklichen Ausgang genommen hätte und beide Kinder später von Blutungen ganz verschont geblieben wären.

Diese Fälle, denen sich andere [Rahn-Escher, Silbermann⁴⁾] anschliessen, zeigen auch, dass nicht bloss leichte, in denen nur ein paar Mal Blutstrecken stattfand, sondern auch sehr schwere, in denen schon die Symptome des Verfalls, allgemeine Kälte, Schwinden des Pulses, Aufwärtswellen der Augäpfel eingetreten waren, noch einer Heilung fähig sind. Man darf deshalb unter keinen Umständen die Hände in den Schooss legen, muss vielmehr auch unter den amüchrend ungünstigsten Umständen immer noch versuchen, die erschöpfenden Blutungen zu hemmen. Kalte Fomentationen des Unterleibs oder das Auflegen eines Eisentels auf denselben, während gleichzeitig Arme und Beine mit erwärmtem Flanell umwickelt werden, sind am meisten zu empfehlen. Als Nahrung eignet sich, wenn die Kinder nicht die Brust nehmen können, in Eis gekühlte Milch, welche theelöffelweise eingeflossen wird. Bei

¹⁾ Klob (*Zeitschr. f. Ges. d. Wiener Aerzte*, 1829) beobachtete auch bei einem 8 Tage alten Kinde eine Thrombose der Art. mesenterica mit Diarrhöen in der Magenschleimhaut.

²⁾ Arch. C. experim. Pathol. Bd. II.

³⁾ Gaz. med. No. 33. 1848.

⁴⁾ Jahrb. C. Kinderheilk. 1877. Bd. XI. p. 378.

starkem Bluthrechen ist diese Ernährungsweise dem Sugen an der Brust überhaupt vorzuziehen, weil bei diesem der Magen leicht überfüllt und Anlass zum Erbrechen gegeben wird. Unter den Arzneimitteln ist der Liqueur ferri sesquichlorati, grt. 1 pro dos 2mündlich in einem Theelöffel Hafer Schleim zu empfehlen, demnächst das Ergotin 0,03—0,05 pro dos innerlich oder subcutan injicirt. Klystire sind nicht ratsam, weil sie nicht bis in die höheren Dartheile hinaufgelangen, vielmehr leicht Stuhlirrang und neue Blutungen erzeugen, wie es z. B. in dem ersten Falle von Rilliet gesah. Prophylaktisch ward Landaus vor zu früher Unterbindung des Nabelstranges, die immer erst dann vorzunehmen sei, wenn die Respiration vollständig hergestellt ist und die Kinder kräftig geschrien haben.

Schlusslich sei noch bemerkt, dass Neugeborene bisweilen etwas Blut nach oben oder unten entleeren, welches entweder aus wunden Brustwarzen oder bei einer an Munde und Rachen vorgenommenen Operation verschluckt worden ist. Auch aus der Nase und den angrenzenden Theilen kann dieses Blut stammen. Seine Menge ist aber immer nur gering und eine Verwechslung mit der wirklichen Melana kaum möglich.

Zweiter Abschnitt.

Krankheiten des Säuglingsalters.

1. Die atrophischen Zustände der Kinder.

In keiner andern Lebensperiode spielt die Art der Ernährung eine so bedeutende Rolle, wie in derjenigen, welche die Zeit von der Geburt bis zur Vervollendung des ersten Lebensjahres umfasst. Neuere Untersuchungen (Baginsky¹⁾) ergaben, dass die Drüsenzahl in der ganzen Darmwand von der Fötalperiode an bis zu den späteren Altersstufen immer zunimmt und in demselben Masse auch der Ausbau des Drüsen Systems gefördert wird, während das Lymphgefäßsystem des Darms stetig an Mächtigkeit abnimmt. Deshalb sind junge Kinder weniger im Stande, Substanzen zu assimiliren, deren Verarbeitung erhebliche chemische Leistungen (von Seiten des Drüsen Systems) erfordert, können aber um so leichter die Milch, welche an sich schon leicht re-

¹⁾ Untersuchungen über den Darmtrakt des menschlichen Kindes. Virchow's Arch. Bd. 89. 1882.

verdaulich ist, verdauen. Deshalb weist die Natur das neugeborene Kind auf die Brust der Mutter an. Sie wissen aber, dass eine Reihe von Hindernissen sich der Erfüllung dieser nothwendigen Lebensbedingung entgegenstellen können. Krankheiten der Mutter, ähnliche Verhältnisse, welche dieselbe zwingen, ausserhalb des Hauses zu arbeiten, unentwickelter Zustand der Brustwarzen gehören zu den häufigsten und entschuldbarsten Hindernissen, während eine andere Reihe von Müttern, welche meistens den höheren Klassen der Gesellschaft angehören, die vermeintliche Pflicht gegen diese mit ihrer natürlichen Bestimmung nicht vereinigen kann und die letztere verabsäumt. Unter diesen Verhältnissen ist nun wenigstens der Ersatz der Mutter durch eine gemietzte Amme leicht zu beschaffen; anders verhält sich die Sache in den armen Volksschichten, wo an das Halten einer Amme der Kosten wegen nie zu denken ist und statt der natürlichen eine künstliche Ernährung eingeleitet werden muss. Ich stelle nun keineswegs in Abrede, dass diese, wenn sie nur sorgfältig und zweckmässig geleitet wird, in sehr vielen Fällen ganz befriedigende Resultate giebt, und jeder Tag bringt uns Beispiele von Kindern, die unter diesen Verhältnissen sich kräftig entwickelt haben. Um aber dies Resultat zu erreichen, muss die Sorge und Gewissenhaftigkeit der Mütter oder Pflegerinnen eine weit grössere sein, als bei der natürlichen Ernährung; nicht nur das Material der Nahrung, sondern auch die gehörige Zerteilung spielt hier eine Rolle, und beides ist in der Armenpraxis nicht in der Weise zu erreichen, wie es für das Gedeihen des Kindes notwendig wäre. Sorge für die Existenz, uneheliche Geburt, Leichtsinn und Unverstand, thörichter Aberglauben — alle diese Momente treten hier störend dazwischen, und so erklärt es sich, dass Sie unter den Säuglingen der ärmern Volksklassen das enorme Ueberwiegen von Ernährungsstörungen und in deren Folge jene colossale Mortalität beobachten, von welcher schon in der Einleitung (S. 2) die Rede war. Doch nicht die mangelhafte und unzweckmässige Ernährung allein ist hier anzuklagen; in zweiter Reihe, obwohl immer noch sehr einflussreich, steht die verdorrene Luft, welche diese Kinder in den dicht bevölkerten und mit Emanationen aller Art gefüllten Wohnräumen einathmen, die Unmöglichkeit, dieselben regelmässig an die frische Luft zu bringen, der Mangel an Reinlichkeit und die Vernachlässigung der ersten Stadien von Krankheiten, welche die Kinder treffen. Ein Theil dieser Ursachen wirkt auch in den Kinderhospitälern, besonders in den Findelanstalten, wo man daher reiche Gelegenheit hat, die verschiedenen Folgen solcher Missstände zu beobachten. Wir fassen dieselben unter dem Namen der Atrophie zusammen, da ich keinen Grund sehe, diese alte Bezeichnung

mit der von Parrot neu eingeführten „Athrepsie“ zu vertauschen. Das Bild dieses Krankheitszustandes, welches zu jeder Zeit des Säuglingsalters, auch schon bei Neugeborenen, in seiner schrecklichsten Gestalt zur Erscheinung kommen kann, wechselt natürlich je nach dem Stadium, in welchem man dasselbe zu sehen bekommt. Das erste Zeichen ist das Stehenbleiben der Entwicklung, was allerdings immer nur durch genaue, allwöchentlich wiederholte Wägungen der Kinder constatirt werden kann.¹⁾ Bald aber wird auch ohne dies Verfahren der Rückschritt offenbar, das Fettgewebe schwindet mehr und mehr, die Haut im Gesicht und am ganzen Körper wird schlaff, fältig, gelblich gefärbt und zeigt nicht selten eine kleinförmige Desquamation der Epidermis. In diesem Stadium können die Functionen der Organe, insbesondere die des Verdauungskanales, noch ganz oder nahezu intact sein, und eine zweckmäßige Ernährung und Pflege ist noch im Stande, den drohenden Verfall aufzuhalten und zum Guten zu wenden. In der Majorität der Fälle aber ist die Möglichkeit einer solchen Wendung durch die ärmlichen Verhältnisse ausgeschlossen. Functionsstörungen der Verdauungsorgane, besonders Erbrechen und Diarrhoe, gesellen sich hinzu und es kommt schliesslich zur Entwicklung jenes höchsten Grades, der jede Hoffnung ausschliesst und, wenn man die Kinder in Masse beisammen sieht, wie z. B. in meiner klinischen Abtheilung, dem Arzte nur eine traurige Resignation übrig lässt.

Aus den zurückgeschlagenen Töchtern, mit welchen die Mutter ihr Kind verhält, schaut ein gelblich bleiches, nach unten spitz zulaufendes Antlitz mit markanten Knochenvorsprüngen und zahlreichen Längs- und Querfalten, besonders um Nase und Mund herum und auf der Stirn, die sich bei jeder Bewegung der Gesichtsmuskeln noch tiefer ausprägen. Die Augen sind weit geöffnet, starr blickend, oder mit matterm Ausdruck halb geschlossen, das Bild völliger Indolenz, welche von Zeit zu Zeit durch ein schmerzliches Verziehen der gerunzelten Züge, durch schwaches Gähnen oder heiseres Winseln unterbrochen wird. Die Bewegungen sind langsam oder fehlen ganz. Und doch ist das Antlitz nur das Vorspiel zu den Schrecken, welche die Untersuchung des entblößten Körpers darbietet und die mit Rücksicht auf die hässlichen Verhältnisse, denen sie entstammen, einen wahrhaft tragischen Eindruck hervorbringen können.

¹⁾ Das Durchschnittsgewicht des Neugeborenen beträgt etwa 3200/3; die tägliche Zunahme im 1. Monat etwa 25–35,0 (abgesehen von den ersten 3–4 Lebenstagen, in welchen das Gewicht kollektiv um 200,0 abnimmt). Bis zum Ende des ersten Monats hat sich das Gewicht etwa um $\frac{1}{2}$ gesteigert, im 6. Monat verdoppelt, im 12. Monat verdreifacht. Die Entweichung, die Zahnung, noch mehr krankhafte Zustände bedingen einen Stillstand der Gewichtszunahme.

Die welke erdfähle Haut hängt lappenartig an und über den Knochen, welche, zumal die Schulterblätter, Wirbel, Rippen, Darmbeine, die Umrisse des Skeletts deutlich markiren. Am Halse und Unterleibe bildet die Haut grosse Falten, welche in Folge des Verlastes der Contractilität, wie in der asiatischen Cholera, ihre Form längere Zeit behalten, als ob sie aus Teig geknetet wären. Das Fettgewebe scheint gänzlich geschwunden zu sein und die Muskeln, z. B. die Gastrocnemii und Adductoren des Oberschenkels, fühlen sich wie dünne welke Stränge an. Nicht selten ist die Haut an den Genitalien, am After, an den Perien erythematös geröthet, und an verschiedenen Stellen, selbst auf dem behaarten Kopfe, der Sitz grösserer oder kleinerer Abscesse und furunculöser Bildungen. Die Schleimhaut des Mundes und Gaumens zeigt häufig einen mehr oder weniger ausgedehnten Soorbelag.

In allen Fällen von Atrophie, welche sich bei Säuglingen oder künstlich aufgestellten Kindern entwickelt, haben Sie daran zu denken, dass die mangelhafte Ernährung der Gewebe aus verschiedenen Ursachen hervorgehen kann, und eine vollständige Abhandlung über die kindliche Atrophie müsste daher einen nicht kleinen Theil der Pädiatrik in ihren Bereich ziehen. Selbst dann, wenn alle Umstände für eine einfache, d. h. eine durch fehlerhafte und ungenügende Nahrung entstandene Atrophie sprechen, hat man sich doch immer zu fragen, ob nicht auch andere Ursachen gleichzeitig wirksam sein können, und zu diesen zähle ich in erster Reihe die Tuberkulose. Da ich später noch Gelegenheit haben werde, auf diese verwüstende Krankheit näher einzugehen, so bemerke ich hier nur, dass gerade in den ersten Lebensjahren die Tuberkulose durch die gleichzeitige Erkrankung vieler zur Blüthenzeit in innigster Beziehung stehenden Organe, der Lungen, der lymphatischen Drüsen, der Milz u. s. w. Erscheinungen hervorbringt, welche von der gleichen Krankheit späterer Lebensalter wesentlich abweichen, indem die localen Organsymptome gegen die allgemeine Beeinträchtigung der Nutrition zurücktreten. Nur der sichere Nachweis einer hereditären Anlage des Kindes zur Tuberkulose und die physikalischen Erscheinungen einer Verdichtung des Lungengewebes können hier maassgebend für die Diagnose sein, da Rasselgeräusche verschiedener Art in Folge begleitender Katarre auch bei jeder einfachen Atrophie hörbar sein können, und eine vorhandene Diarrhoe ebensogut von einem chronischen Darmkatarth und seinen Folgen, wie von einer Darmtuberkulose abhängen kann. Wenn auch im Allgemeinen die einfache Atrophie im Säuglingsalter häufiger vorkommt, als die tuberkulöse, so kann doch im speciellen Falle oft nur eine wiederholte Beobachtung und der Ver-

lauf des Leidens die Diagnose feststellen, und Rilliet und Barthez¹⁾ haben gewiss Recht mit ihrem Ausspruche: „*ni les symptômes généraux, ni les symptômes locaux ne peuvent offrir la lumière suffisante; le traitement seul est la pierre de touche du diagnostic.*“

Dem eben entworfenen Gesamtbilde der Atrophie habe ich noch eine Reihe einzelner ergänzender Züge hinzuzufügen. Sehr oft zeigen sich von Anfang an Störungen der Verdauung, entweder häufiges Erbrechen sofort oder einige Zeit nach der Nahrungsaufnahme, oder krankhafte Veränderungen der Faeces, die häufiger entleert werden, als im normalen Zustande, dünnflüssiger sind, und statt ihrer eigentlichen gelben Beschaffenheit gelbe oder grünliche Klümpchen und Streifen zeigen. Dabei nimmt die Harnsecretion gerichtlich ab, so dass die Wundeln des Kindes oft ganz trocken, oder wenigstens bedeutend weniger von Urin durchnässt erscheinen, als dies bei einem gesunden Kinde der Fall sein soll, eine Erscheinung, welche grösstentheils von dem verminderten Appetit des Kindes abhängt. Dasselbe nimmt weniger Nahrung zu sich, sträubt sich gegen das Einführen der Saugflasche, oder trinkt zwar von Darsel getrieben häufiger als sonst, aber immer nur wenig, so dass die Menge der genossenen Milch im Ganzen hinter der normalen erheblich zurückbleibt. Dabei zeigt das Kind eine vorwiesende Stimmung, schreit viel und schläft weniger als sonst. Mit dem Fortschritte der Krankheit nehmen alle diese Symptome an Intensität zu. Die anfangs nur wenig veränderten Stühle werden mehr und mehr dünnflüssig, schmutzig grün, flockig und sehr übelriechend. Nur selten wird das Gegentheil, normaler oder sogar verminderter Stuhlgang, beobachtet. Der Appetit geht ganz verloren und selbst die Kraft, an der Flasche oder an der Brustwarze zu saugen, fehlt dem Kinde, dem man nur noch mittelst eines Löffels geringe Mengen von Milch einfließen kann. Die Menge des Urins wird demgemäss immer sparsamer, seine Farbe dunkler, und die Untersuchungen von Parrot ergaben, zumal bei atrophischen Neugeborenen, nicht selten einen Alumen- oder geringen Zuckergehalt desselben²⁾. Die Respirationsorgane zeigen, wenn nicht Complicationen vorhanden sind, keine physikalische Abnormität; nur wird die Athmung sehr oberflächlich und schwach, wie die Herzaction, welche im letzten Stadium nur noch 60, ja noch weniger Pulsationen in der Minute leistet. Die Temperatur des

¹⁾ L. c. II. p. 377.

²⁾ Andere von Parrot nachgewiesene Veränderungen des Urins in Bezug auf das Gehalt an Harnstoff, Sedimenten, Fett u. s. w. haben für die Stofwechselkrankheiten grössere Bedeutung als für die Atrophie.

Körpers kann schliesslich bis auf 35,0 und darunter sinken und der in die Mundhöhle des Kindes eingeführte Finger fühlt eine unheimliche Kühle. In Folge der Herzschwäche zeigt die bis dahin schmutzig-geröthete Haut an ihren extremen Theilen (Lippen, Finger, Zehen, Nägel) eine leichte Cyanase. Unter diesen Umständen sehen wir auch die grosse Fontanelle am Schädel sich unter das Niveau der umgebenden Knochen vertiefen, wodurch eine 2–3 Mm. tiefe Einsenkung entsteht und durch das Auseinanderrücken der Schädelknochen der Umfang der Fontanelle sich mehr oder weniger vermindern kann. Das Uebereinanderschieben der Knochenränder ist von der Volumverminderung des Gehirns und der daraus folgenden Spannungsabnahme der Schädelkapsel abzuleiten. Die nur halb geschlossenen Augenlider, welche schliesslich kaum noch eine Nickbewegung zeigen, vervollständigen das Bild des lethalen Collapses, welcher oft fast unbemerkt eintritt, weil in den letzten Tagen der Zustand des Kindes schon ein todtenähnlicher sein kann, mit unfühlbarem Pulse, kühler Haut, seltenen und äusserst schwachen Athembewegungen. Bei Neugeborenen kann während der letzten Periode noch jener Zustand von Rigidität des Körpers sich einstellen, den ich Ihnen oben (S. 47) als eigentliches Sklerem beschrieben habe.

Ueber die Dauer der Atrophie lassen sich keine bestimmten Angaben machen, weil sich dieselbe nach den Verhältnissen, dem ursprünglichen Kräftezustande des Kindes, den Mitteln der Ernährung, welche zu Gebote stehen, und besonders nach den eintretenden Complicationen richtet. So sehen wir Neugeborene oft schon in den ersten Wochen oder Monaten des Lebens unter den beschriebenen Symptomen zu Grunde gehen, während ältere Kinder ihr elendes Dasein viele Monate lang fristen können und erst einer Steigerung der Darrrhe oder einer kintrennalen acuten Lungenaffection erliegen. Die Bronchopneumonie ist unter diesen Verhältnissen eine der häufigsten Todesursachen und kann hier, wie überhaupt, durch zufällige Erkältungen oder durch Verschlucken, zumal bei anhaltender Rückenlage veranlasst werden. Ich mache Sie besonders darauf aufmerksam, dass gerade bei hochgradiger Atrophie und Schwäche eine unvorsichtige Ernährung, zumal aber die schlechte Gewohnheit, solche Kinder mit der Saugflasche im Munde unbeaufsichtigt liegen zu lassen, die Aspiration von Milch in die Luftwege und dadurch eine Bronchitis und Pneumonie zur Folge haben kann, wenn nicht der Tod rapide durch Asphyxie tritt. Dasselbe kann geschehen, wenn die Kinder in der Rückenlage, besonders während des Schlafes, Mageninhalt in die Mundhöhle regurgitiren. Mir selbst sind leider solche Fälle in der Klinik, wo es beim besten Willen nicht möglich ist, jedes einzelne Kind

anhaltend zu berücksichtigen, ein paar Mal begegnet, und Parrot (l. c. p. 67) führt einige ähnliche Beobachtungen von asphyktischen Todesfällen an, nach welchen Chymus in den Lungen, und durch die chemische Einwirkung desselben Malacie des Lungensparenchyms und des angrenzenden Diaphragma gefunden wurde.

Die Sectionen der an reiner Atrophie gestorbenen Kinder ergaben constant nur eine fast vollständige Aufzehrung des unter der Haut und in der Umgebung innerer Organe vorhandenen Fettes, eine Verdünnung und Blässe der Muskeln, auch des Herzmuskels, und meistens eine hochgradige Anämie aller Theile¹⁾. Vielfache Atelektasen des Lungengewebes in Folge der geschwächten Inspirationskraft finden sich häufig vor. Unter den Complicationen sind Bronchopneumonien, Katarhe und folliculäre Entzündungen des Darmkanals die gewöhnlichsten. Als Folgen der im letzten Stadium der Krankheit hochgradigen Schwäche des Herzmuskels findet man bisweilen Stausungen im Venensystem und Thrombose desselben, besonders der Sinus der Dura mater und der Nierenvenen. Solche Thromben können schon während des Lebens krankhafte Erscheinungen veranlassen, auf welche ich an einer anderen Stelle zurückkommen werde.

Die Beurtheilung der Gefahr, in welcher sich atrophische Kinder befinden, hängt wesentlich von dem Grade der Krankheit und von der Möglichkeit, das kranke Kind in bessere Lebensbedingungen zu versetzen, ab. Ist die Atrophie noch nicht zu weit fortgeschritten, keine erhebliche Complication vorhanden, jeder Verdacht einer Tuberkulose auszuschliessen, und haben Sie die Mittel in Händen, dem vernachlässigten Kinde gute Nahrung und Pflege zu gewähren, so mögen Sie immerhin noch eine günstige Prognose stellen. Es ist erstaunlich, wie schnell in solchen Fällen die Körperfülle und die Kräfte zunehmen und das hinsiehende, grossenheft aussehende Kind sich in einen vollen blühenden Säugling verwandeln kann. Dagegen dürfen Sie sich in der Armenpraxis kaum Hoffnung machen, durch Ihre Anstrengungen und noch so sorgsame Ueberwachung derselben Erfolge zu erreichen, und zwar um so weniger, je jünger die Kinder sind. Aus diesem Grunde sind die Neugeborenen am meisten gefährdet; sie liefern die meisten Todesfälle, und die feinere pathologische Anatomie der Krankheit beruht vorzugsweise auf den Sec-

¹⁾ Nach den Untersuchungen von Oelmüller (über die Abnahme der einzelnen Organe bei an Atrophie gestorbenen Kindern, inaug.-Diss. München 1882) kommt der Fettoestock hauptsächlich auf Kosten des Unterhautfettgewebes, der Eiweissreichheit auf Kosten der Musculatur (incl. Herz), während das Gehirn ganz verschont bleibt, auch Herz und Leber sich ziemlich in statu quo erhalten.

Wunderthaten aus den ersten Wochen und Monaten des Lebens. So sehr man nun auch das Verdienst anerkennen muss, welches sich Parrot um diese Dinge erworben hat, liegt doch in seinen Arbeiten meiner Ansicht nach keine Berechtigung, eine neue Krankheitspecies unter dem Namen „Athrepsie“ der Neugeborenen zu beschreiben. Derselbe ist eben, wie ich schon oben bemerkte, nichts weiter, als unsere „Atrophie“, und der rapide Verlauf hängt nur von dem zarten Alter und den elenden Verhältnissen ab, in denen Parrot's Patienten sich befanden. Daraus erklärt sich die Einseitigkeit seiner Auffassung, welche eine Reihe von pathologischen Erscheinungen, die entweder mit der Atrophie gar nichts zu thun haben, wie der Trismus, oder die auch bei nicht atrophischen Kindern vorkommen, wie der Scur, unter den Symptomen der „Athrepsie“ aufzählt.

Indem ich mich nun zur Behandlung der Atrophie wende, erkenne ich nicht die Schwierigkeiten, welche sich der vollständigen Bewältigung dieser Aufgabe entgegenstellen. Wollte ich derselben in ihrem ganzen Umfange gerecht werden, so würde dies bei weitem die mir gestellten Grenzen überschreiten. In der That müsste ich Ihnen die ganze Behandlung und Pflege des gesunden Kindes von der Geburt an bis zu seiner Entziehung auseinandersetzen, weil alle Fehler, welche in diesem Zeitraum in Bezug auf Ernährung, Beilichkeit, Bekleidung u. s. w. begangen werden, sich zunächst in dem Ernährungszustande des kleinen Wesens reflectiren werden. Ich würde ferner in das sociale Gebiet und in das der öffentlichen Gesundheitspflege eindringen müssen, weil nur von umfassenden, das Wohl der armen Volksschichten im Allgemeinen fördernden Massregeln des Staates und der Gemeinde die Beseitigung oder wenigstens die Linderung von Missständen erwartet werden kann, unter deren Einflüssen die von uns geschilderte Atrophie vorzugsweise sich ausbildet, die Verbesserungen der Wohnräume, die Schaffung von Luft und Licht für die derselben so dringend bedürftige erste Lebenszeit, die Möglichkeit für die Mütter, ihre Kinder selbst zu nähren und zu pflegen, und sie nicht fremden Händen anvertrauen zu müssen, welche für kärglichen Lohn entweder Vernachlässigung der übernommenen Pflicht oder gar noch schlimmere Dienstleistungen bieten, die, wenn man ihre Abscheulichkeit beweisen könnte, der Schärfe des Strafgesetzes unterliegen würden. Die humanen Bestrebungen unserer Zeit, die vielfache Theilnahme, welche das Loos der unglücklichen kleinen Geschöpfe gefunden, haben allerdings das Institut der „Engelmannheimen“, welches ich eben berührte, mehr und mehr verdrängt. Findelhäuser, Krippen, Kinderschutzvereine sind an vielen Orten, zum Theil mit Munificenz, errichtet

worden und ihre gegenwärtige Wirksamkeit ist nicht genug anzuschlagen. Aber das alles ist doch bei weitem nicht im Stande, dem Pauperismus und seinen Folgezuständen im Grossen beizukommen, und so bleibt die Lösung unserer scheinbar beschränkten Aufgabe, d. h. die Behandlung der kindlichen Atrophie, eng verbunden mit der Lösung des grossen sozialen Problems. Sie werden sich in der Praxis bald überzeugen, dass diese Behandlung unter den geschifteten Verhältnissen nur geringe Erfolge aufzuweisen hat, dass alle Ihre Anordnungen an der Unmöglichkeit der Ausführung oder am bösen Willen der Umgebung scheitern, und dass Sie sich daran gewöhnen müssen, alljährlich eine grosse Anzahl solcher Kinder verkümmern und ins Grab sinken zu sehen, ohne die Sache ändern zu können. Am traurigsten stellt sich das Ergebniss in den Anstalten heraus, in welchen eine grössere Zahl atrophischer Kinder gleichzeitig untergebracht ist, in den Krankenhäusern und Kinderasyle aller Art; nur Findelhäuser, welche dem Zerstreuungssystem huldigen, d. h. den grössten Theil ihrer Insassen aufs Land in Pflege geben, können bessere Resultate erzielen.

Bei dieser Sachlage muss ich mich hier auf die Erörterung desjenigen Moments beschränken, welches allerdings das hauptsächlichste ist und am ehesten noch von rein ärztlichen Standpunkte aus in Angriff genommen werden kann, nämlich die Ernährung. Ueber die natürliche Ernährung durch die Mutter- oder Ammenbrust habe ich nur wenig zu sagen. Da ich Ihnen hier keine Vorträge über Diätetik der Kinder, sondern über die Krankheiten derselben halte, so kann ich auf die Physiologie der Ernährung, auf die Beschaffenheit der Muttermilk, die Wahl der Ammen u. s. w. nicht näher eingehen. Alle diese Dinge kommen für mich nur in ihrer Beziehung zu pathologischen Zuständen in Betracht, und da muss ich Ihnen denn zunächst bemerken, dass auch bei der natürlichen Ernährungsweise die Kinder atrophisch werden können, wenn die gewonnene Milch während dyspeptischer Störungen, d. h. Erbrechen oder Durchfall erzeugt, wodurch natürlich die Resorption der für eine normale Ernährung notwendigen Chylusmenge eine Einbusse erleiden muss. Andererseits kommen auch bisweilen Fälle vor, wo die Milch einer Amme gerade dem Kinde, welches sie säugen soll, nicht zusagt, dasselbe vielmehr anhaltend an Verdauungsstörungen leidet oder auch, ohne dass diese einen erheblichen Grad erreichen, in seiner Entwicklung nicht vorwärts kommt. Dasselbe Amme säugt dann nach ihrer Entlassung ein anderes Kind mit dem allerbesten Erfolge, so dass man nicht eine etwa vorhandene anomale Beschaffenheit der Milch, vielmehr eine eigenenthümliche Idiosynkrasie des ersten Kindes an-

nehmen muss, welches, seitdem es eine andere Amme erhalten, ebenfalls prächtig gedeiht. Auch beim Selbststillen der Mutter kommen mitunter wunderliche Dinge vor; so beobachtet man bisweilen, dass eine Mutter, welche bereits ein oder mehrere Kinder mit bestem Erfolg gesäugt hat, ein später geborenes Kind von der Brust absetzen muss, weil ihre Milch gerade diesem nicht bekommt, ohne dass man irgend eine Ursache dafür auffinden kann. Bemerkenswerth ist noch, dass Säuglinge im Allgemeinen es gut vertragen, wenn ihnen neben der Muttermilch ein oder zweimal in 24 Stunden, z. B. in der Nacht, gute verklärte Kuhmilch aus der Säugflasche gereicht wird, ein Verfahren, welches ich übrigens nur beim Selbststillen der Mutter, nicht aber einer Amme gegenüber für gerechtfertigt halte. Auch der Eintritt der Menstruation bei der Säugenden wirkt in den meisten Fällen nicht störend ein, muss aber immer vorsichtig machen. Treten nun bei einem Säuglinge Verdauungsstörungen, Erbrechen oder Diarrhoe ein, und zwar nicht bloss in vorübergehender Weise, sondern immer wiederkehrend, zeigt die Zunahme des Körpergewichts einen Stillstand oder nimmt dasselbe gar ab, so darf man nicht zögern, einen Wechsel der Säugenden vorzunehmen. Um aber die Gewichtsabnahme frühzeitig zu erkennen, muss man allwöchentlich wenigstens einmal eine sorgfältige Wägung des Kindes vornehmen, deren Resultate allerdings mit grosser Vorsicht in Bezug auf einflussreiche Nebenumstände (wie Kleidungsstücke, Füllung des Magens oder Darmkanals, der Blase) zu beurtheilen sind. Diese Wägungen sind im Allgemeinen aber nur in Ausfällen oder in der Privatpraxis anwendbar; in dem weitaus grössten Theil der Fälle von Atrophie, welcher gerade in die poliklinische oder Armenpraxis fällt, müssen Sie ohne dieselbe mit Ihren eigenen sinnlichen Wahrnehmungen auskommen.

Die Erscheinungen am Kinde selbst, Dyspepsie und beginnende Atrophie sind für mich weit bedeutungsreicher, als alle Methoden, durch welche man die gute oder schlechte Beschaffenheit der Mutter- oder Ammenmilch zu beurtheilen versucht hat. Das Mikroskop giebt allerdings Aufschluss über die Zahl, Form und Grösse der Milchkügelchen, und es ist gewiss sehr erwünscht, wenn man diese in recht vollkommener Bildung und Menge vorfindet. Aber die Resultate dieser Untersuchungen, mögen sie von noch so geübten Beobachtern herrühren, stimmen in Bezug auf den Einfluss, welchen diese oder jene mikroskopische Abweichung auf das Verhalten des Kindes ausübt, keineswegs mit einander überein. Noch weit schwieriger gestaltet sich die chemische Untersuchung der Milch, welche nur die wenigsten praktischen Aerzte in ausreichender Weise selbstständig vorzunehmen im Stande sein dürften. Ich rathe Ihnen da-

her, wie allem das Verhalten des Kindes zum Maassstab für die Beurtheilung der Milch zu machen, gerade wie Sie bei der Wahl einer Amme sich am besten durch die Beschaffenheit ihres eigenen Kindes leiten lassen. Ich halte dies für den einzig richtigen praktischen Weg. Sie können allerdings auf diesem Wege dahin kommen, ein und dasselbe Kind von drei oder noch mehr Ammen säugen zu lassen, dürfen sich aber durch alle diese Schwierigkeiten und durch die sich wiederholende Unbequemlichkeit einer Ammeninspection nicht abschrecken lassen. Schliesslich wird doch der Erfolg und das Bewusstsein der Pflichterfüllung Ihre Bemühungen krönen. Erwähnt sei noch, dass auch die ungenügende Menge der Ammenmilch weniger durch Betastung und Ausspritzung der Mamme sich erkennen lässt, als durch die Trockenheit der Windeln und das anhaltende Schreien des Säuglings nach dem Saugen, während derselbe nach gehöriger Sättigung in ruhigen Schlaf verfallen soll.

Ungleich schwieriger aber ist die Lage in der grossen Majorität der Fälle, wo aus den wiederholt angegebenen Gründen die natürliche Ernährung überhaupt nicht möglich und der Säugling, welcher an beginnender Atrophie leidet, auf die Saugflasche angewiesen ist. Es ist unglücklich, mit welchen Surrogaten die Kinder der Armen gefüttert werden, aber die tägliche Erfahrung in meiner Poliklinik liefert immer neue Beweise für die Dummheit und Rohheit der betreffenden Personen. Ein dünner Haferschleim allein oder mit etwas Milch vermischt und Abkochungen von Mehlen aller Art bilden die elende Nahrung vieler Säuglinge von ihren ersten Lebenstagen an. Und selbst diese wird ihnen nicht einmal regelmässig und nach dem Bedürfnisse des Hungers gereicht, weil eben die Mütter oder Pflegerinnen keine Zeit oder Lust haben, sich diesen Pflichten zu unterziehen. An einer früheren Stelle (S. 14) habe ich Sie bereits auf die Geringfügigkeit der Speichelsecretion in den ersten Lebensmonaten hingewiesen, und Sie werden begreifen, dass während dieser Zeit, also etwa bis zur 10. Woche, absolut keine Nahrung gereicht werden darf, welche aus Amylaceen besteht, weil alle diese Stoffe eine zur Umwandlung in Zucker genügende Menge von Speichel erfordern. Kann man sich also darüber wundern, dass bei einer solchen Diät von Anfang an der Grund zu Dyspepsien gelegt, der Magen und Darm mit unverdauten Massen überbürdet wird, Gasauftreibung des Abdomens und Diarrhoe entsteht? ganz abgesehen von dem geringen Nährwerthe, welcher jenen Substanzen im Vergleich zu der Frauenmilch zukommt. Wo die letztere nicht zu beschaffen ist, haben Sie als einzig passendes Surrogat die Kuhmilch für die ersten drei Lebens-

menste zu empfehlen. Freilich stimmt dieselbe nicht vollkommen mit der Frauenmilch überein, da sie viel mehr Käsestoff, doppelt so viel Fett und weniger Zucker als diese enthält, der noch dazu mehr zur sauren Gährung neigen und die Milch daher leichter sauer werden lassen soll, als die Frauenmilch. Ein schwerwiegender Unterschied liegt auch in der Thatsache, dass das Kasein der Kuhmilch sich bei der Gerinnung abweichend verhält, indem dieselbe derbe, schwerer lösliche zusammenhängende Coagula bildet, während die Frauenmilch in losen kleinen Flecken gerinnt, dass aber selbst das feinflockigste Kuhkasein immer noch schwerer verdaulich bleibt, wie das der Frauenmilch (Biedert). Sie sehen, wie wichtig dieser Unterschied für den kindlichen Magen sein muss. Die Gerinnungen der Frauenmilch im Magen werden durch das Pepsin und die Salzsäure des Magensaftes viel leichter angegriffen und gelöst werden, als die der Kuhmilch, und die Püces der mit letzterer ernährten Kinder werden daher immer mehr unverdaulichen Käsestoff und wegen des grösseren Fettgehaltes der Milch auch mehr Fett enthalten, als die der Brustkinder. Diesem Uebelstande können wir nicht nach Wunsch abhelfen, auch nicht durch die vielfach empfohlenen Zusätze von Gersten- oder Haferschleim, Gummi arabicum, Lactin ¹⁾ u. s. w., während wir die anderen minder erheblichen Verschiedenheiten durch eine passende Verdünnung der Milch allenfalls compensiren können. Im Allgemeinen nehmen Sie während der ersten drei Monate das Verhältniss von 1 Th. Milch zu 3 Th. Wasser, im zweiten Vierteljahr 1 : 2, im dritten halb und halb. Von 9. Monat an können Sie 2 : 1 oder ganz unverdünnte Milch geben, die, sowie das Wasser, stets abgekocht sein muss, um die darin enthaltenen Gährungskeime möglichst zu vernichten. Dass die angegebenen Verhältnisse der Verdünnung durch die Beschaffenheit der Milch, die leider oft viel zu wünschen übrig lässt, modificirt werden können, versteht sich von selbst. In der Beschaffung einer unverfälschten frischen Kuhmilch liegt vor allem das Heil der atrophischen Kinder der Armen, und diesem Punkte sollten die Gemeinden, denen zu dem Gedeihen der heranwachsenden Generation gelegen ist, mehr Aufmerksamkeit zuwenden, als es bis jetzt gescheht²⁾. Damit lässt sich weit mehr ausrichten, als mit allen in neuester Zeit empfohlenen Methoden, die Milch zu conserviren, so verdienstvoll sie auch sein

¹⁾ Der Zusatz von Lactin soll nach den Versuchen von Hyntzkeak (Arch. f. Kinderheilk. 1882. III. 421) sogar nachtheilig sein.

²⁾ Vergl. Cayrin, über die Production von Kinder- und Kuhmilch in städtischen Milchkanzleien. Deutsche Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspflege. XI. 1879. — Kornmann, Jahrb. f. Kinderheilk. N. F. XIV. p. 238 und XV. p. 300. —

mügen (Becker, Scherff, Biedert u. A.). Man bedenke wohl, dass bei der ganzen künstlichen Ernährung hauptsächlich die armen Volksklassen in Betracht kommen, welche auch die geringste Vertheuerung nicht vertragen können, und dass von allen Surrogaten der Frauenmilch die frische Kuhmilch immer noch das billigste bleibt¹⁾.

Nicht nur für die ersten Monate, sondern für das ganze Säuglingsalter bildet die Kuhmilch das beste Surrogat für die natürliche Ernährung. Andere Substanzen statt derselben zu reichen, halte ich nur dann für zulässig, wenn entweder eine gute Milch auf keine Weise beschafft werden kann, oder wenn dieselbe den Kindern nicht bekommt, d. h. wenn ihr Genuss anhaltend Erbrechen oder Diarrhoe erzeugt. Im Allgemeinen kommt dies nicht gerne häufig vor, und man kann, worauf ich später noch zurückkommen werde, diesem Uebelstande nach meiner Erfahrung nicht selten dadurch abhelfen, dass man die Milch, nachdem sie abgekeicht ist, kalt werden und in diesem Zustande trinken lässt. Dennoch bleibt immer eine Reihe von Fällen übrig, in welchen auch die kalte Milch, wahrscheinlich wegen der Unverdaulichkeit der festen zusammenhängenden Gerinnsel, nicht vertragen wird, und wir sind dann in Ermangelung einer Amme auf andere Surrogate angewiesen. Die in neuerer Zeit viel empfohlene condensirte Schweizermilch ist anscheinend das nächstliegende und beste. Bringt man etwas davon unter das Mikroskop, so sieht man das Gesichtsfeld völlig von Milchsäurekrystallen bedeckt, die aber wie durch einen Zauberschlag verschwinden, sobald man etwas Wasser an das Objectglas bringt. Man sieht dann nur noch massenhafte wohlerhaltene Milchkügelchen. Obwohl ich aus in manchen Fällen die condensirte Milch mit Vortheil Monate lang anwenden liess, kann ich doch dieser Nährmethode nicht das Wort reden, weil der enorme Zusatz von Rohrzucker, welcher zur Conservirung der Milch nöthig ist (39—43%), sehr häufig saure Gährung und Diarrhoe erzeugt. Geschieht dies nicht, so mag man die Milch dreissig anwenden, denn dass auch dann noch Rachitis die Folge sein soll, wie Manche behaupten, ist keineswegs bewiesen. Man nimmt für die ersten drei Monate 1 Th. condensirte Milch auf 22 Th. Wasser, vom 3.—8. Monat 1:18 und später 1:12. Statt des Wassers wird auch Hafer- oder Gerstenschleim zur Verdünnung empfohlen.²⁾

Reber's über „neuer Beiträge zur Ernährungsfrage der Kinder“ im Arch. f. Kinderheilk. Stuttgart 1881. II. 170. — Biedert, Kinderernährung im Säuglingsalter. Stuttgart 1880.

¹⁾ Hoffmann, Jahrb. f. Kinderheilk. XVI. 1880. p. 143.

²⁾ Veegh, Deutscher, 19. Bericht über d. Jenner'sche Kinderhospital. 1882. p. 34.

Unter den vielfachen künstlichen Surrogaten, welche unsere Zeit producirt, hat sich das in Vevey verfertigte Nestlé'sche Mehl einen besondern Ruf erworben und erfreut sich der grössten Verbreitung. Dasselbe besteht aus Weizenmehl, Eigelb, condensirter Milch und Zucker in dem Verhältniss, dass auf 1000 Theile 20 Theile stickstoffhaltiger Substanzen und 7 Theile Salze kommen. Gewöhnlich lässt man 1 Eosl. Mehl mit 9—10 Eosl. Wasser abkochen und die Flüssigkeit aus der Saugflasche trinken. Ich muss Sie indess darauf hinweisen, dass das Nestlé'sche Mehl unter Umständen verderben und dann sehr nachtheilig werden kann. Unter andern sah ich bei einem Kinde, welches keine Rahmlich vertrug, und bei dem ich der zunehmenden Atrophie wegen im Sommer 1878 consultirt wurde, trotz des schon wochenlang gegebenen Nestlé'schen Mehls und trotz aller verschiedensten Mittel eine hartnäckige Diarrhoe, welche die Atrophie natürlich steigerte, fortbestehen. Ich entdeckte nun, dass das in einer Blechbüchse enthaltene Mehl nicht, wie es sein soll, nach Zuckerk, sondern abscheulich nach altem Käse roch, liess sofort eine andere frische Büchse holen und sah nun die aus dieser bereitete Nahrung sehr gut vertragen werden. Nach meiner Erfahrung kann ich das Nestlé'sche Mehl von der 10. bis 12. Lebenswoche an, aber nicht früher, als ein geeignetes Nahrungsmittel empfehlen, bis aber keineswegs für diese Substanz ausschliesslich eingenommen. Ich glaube vielmehr nach den von mir angestellten Versuchen anderen ähnlichen Kindermehlen, wie dem von Gërber, Giffey, Liebig, Frerichs, den Präparaten der Fabrik von Cham, der Usines de Vevey et de Montreux einen gleichen Werth zusprechen zu dürfen. Das Laurative des Geschäfts macht es übrigens wahrscheinlich, dass die Welt noch mit noch mehreren Präparaten dieser Art beglückt werden wird, welche sich in dem Bestreben, der Zusammensetzung der Frauenmilch so nahe als möglich zu kommen, gegenseitig den Rang ablaufen.

Unter den sonst noch gerühmten Surrogaten der Muttermilch nenne ich hier nur noch die Liebig'sche Suppe und das von Biedert¹⁾ empfohlene Rahngemenge. Von der ersteren, die einst so gepriesen wurde, ist man fast ganz zurückgekommen, weil schon die Bereitung derselben viel zu unständlich ist, um in der Armenpraxis, welche ja bei der künstlichen Auffütterung vorzugsweise in Betracht kommt, eine allgemeine Anwendung zu finden. Dasselbe gilt auch von dem Biedert'schen Rahngemenge, welches ich trotzdem in meiner Klinik bei einer Reihe atrophischer Kinder beharrlich anwenden liess, ohne mich indess

¹⁾ Virchow's Arch. Bd. 60. Bd. 3 u. 4.

davon überzeugen zu können, dass es mehr leistete, als die Ernährung mit Kuhmilch oder Nestlé'schem Mehl. Ueber das von Biedert angegebene „künstliche“ Balanagemenge, welches wenigstens den Gebrauch sehr erleichtert, fehlen nur ausreichende eigene Erfahrungen, und ich kann nur hinzufügen, dass es von Monti¹⁾ u. A. gerühmt wird; doch wird auch hier der Preis für die Verhältnisse, in welchen es vorzugsweise gebraucht wird, hinderlich sein.

Ein vortreffliches Unterstützungsmittel für die Ernährung atrophischer Säuglinge ist der Wein, besonders der echte unverfälschte Tokayerwein. Ob andere Weissarten, wie Xeres und Malaga, die auch vielfach gegeben werden, als gleichwerthig zu betrachten sind, lasse ich dahingestellt. Ich ziehe immer den altwährten Ungarwein, von dem mein unvergesslicher Lehrer Romborg zu sagen pflegte, dass er nicht bloss ein „*l'ac senile*“, sondern auch ein „*l'ac juvenile*“ sei, allen anderen Sorten vor. In den ersten Lebensmonaten gebe man 20 bis 25 Tropfen dreimal täglich, rein oder in einem Theelöffel Wasser; später kann man die Dosis bis auf ein paar Theelöffel und mehr pro die steigern. Gleichzeitig lasse man der Reinlichkeit wegen täglich ein laues Wasserbad von 27–28° R. nehmen, dem man bei zunehmender Schwäche aromatische Aufgüsse (am besten ein paar Hände voll Chamillen und Calmus mit kesselm Wasser infundirt) zusetzen mag. Gut gelüftete Krankenzimmer, strenge Reinlichkeit, pünktliche Sorgfalt in der Pflege — alles das sind und bleiben leider zu oft *par desideria*, welche nur in der Minderzahl der Fälle zu erreichen sind.

Von Arzneimitteln haben Sie bei der Atrophie nichts zu erwarten. Nur bei deutlich erkennbaren Complicationen mit Affectionen der Respirationsorgane oder des Darmkanals besteht eine Indication zur Anwendung derselben, wobei indess bemerkt werden muss, dass leichtere dyspeptische Erscheinungen (Erbrechen, unregelmäßige überreichende schlecht verdaute Stühle) sich auch ohne Anwendung von Arzneimitteln in Folge zweckmässiger Ernährung bessern können.

II. Der Saor.

Je jünger die Kinder sind, um so häufiger treffen Sie diese auch unter dem Namen „Schwämmchen“ bekannte Affection der Mund- und Rachenhöhle, am häufigsten daher bei Neugeborenen und in den ersten Monaten des Lebens. Aber auch die zweite Hälfte des ersten Jahres wird oft davon betroffen, ja unter gewissen Umständen werden Sie dem

¹⁾ Archiv f. Kinderheilk. Bd. II.

Soor noch viel später, selbst bei Erwachsenen begreuzt. Das Bild der Krankheit wechselt je nach den Graden und den Verhältnissen, unter denen es sich Ihnen darstellt.

Erster Grad. Auf der Schleimhaut der Lippen, der Zunge und der Wangen, besonders in den Falten zwischen Lippen und Zahnfleisch, und zwischen Wangen und Alveolarrand finden Sie vereinzelte weisse, leicht prominirende Punkte und Fleckchen, welche zwar mit einem Spatel leicht abstreifbar sind, aber, wenn man einige Gewalt dabei anwendet, einen Blutstropfen hinterlassen. Die Schleimhaut ist dabei sonst nicht verändert und kein anderes Leiden vorhanden. Diese Form des Soors kommt sehr häufig bei vollkommen gesunden Kindern vor, wenn die nöthwendige Reinhaltung des Mundes vernachlässigt wird. Reste von gezossener Milch in den genannten Falten der Schleimhaut liegen bleiben und sich hier zerstören. Mitunter ist es auf den ersten Blick nicht leicht zu bestimmen, ob man wirklichen Soor oder nur Milchreste vor sich hat, da beides fast gleich aussieht; der Unterschied zeigt sich aber, wenn man mit dem Spatel über die Fleckchen hinstreicht, wodurch die locker aufliegenden Milchreste sogleich entfernt werden, während der Soor eine stärkere Adhärenz an der Schleimhaut kundgibt.

Zweiter Grad. Die ganze Mundschleimhaut bis in den Pharynx hinein ist dunkelroth, purpurfarbig und auffallend trocken. Auf derselben sieht man überall, besonders aber auf der Zunge, den Wangen, den Lippen und am harten Gaumen sehr zahlreiche weisse Punkte und Fleckchen von rundlicher oder unregelmässiger Gestalt, welche hier und da, namentlich in den erwähnten Falten und auf der Zunge, zu grösseren Plaques coälesciren. Die Mundhöhle scheint dabei empfindlich zu sein, da die Kinder oft das Gesicht schmerzhaft beim Säugen verziehen oder letzteres gänzlich verweigern. Bei noch stärkerer Entwicklung findet man die Zunge, die Wangen und den harten Gaumen von einer weissen, membranartigen Decke überzogen, während an den Lippen, am Zahnfleisch und weiter hinten am Gaumensegel und auf den Mandeln Soorflecken in grosser Zahl sichtbar sind. Diese hohen Grade kommen nur bei atrophischem oder durch schwere Erkrankungen (Diarrhoe, Cholerae) erschöpften Kindern vor, und daraus erklärt sich auch der Umstand, dass die anfangs dunkelrothe Schleimhaut in Folge der zunehmenden Anämie allmählig erblasst. In den letzten Stadien solcher Kinder fand ich den Soor oft auf einer ganz blassen, ins Livide spielenden Schleimhaut haften, wobei er minder deutlich hervortritt, als früher, so lange die Schleimhaut noch stark bluthaltig war. Dazu kommt, dass er unter diesen Umständen seine milchweisse Farbe mehr und mehr ver-

liert und oft schmutzig grau oder gelblich erscheint; letzteres besonders in Folge galliger Färbung durch erbrochene Massen. Man muss dann schon genauer hinschauen, um die Krankheit in ihrer ganzen Ausdehnung zu erkennen. Je länger dieselbe bestanden, um so fester haftet der Soor an der Schleimhaut. Unter den zahlreichen Fällen dieser Art gedenke ich namentlich eines 4 Monate alten stark collabirten Kindes mit Syphilis hereditaria und Pneumonie des rechten Unterlappens, bei welchem die ganz blasser Mundschleimhaut bis in den Pharynx hinein mit perlgrauen Soorbecken überzogen war, die so fest wurzelten, dass sie nur gewaltsam und unter Blutung mit einer Pinzette ablösen waren. Neugeborene dieser Art bieten oft gleichzeitig die oben (S. 58) erwähnten Ulcerationen am harten Gaumen dar. — Bringt man ein Stückchen Soor gut zerzupft unter das Mikroskop, so sieht man als Hauptbestandtheil desselben eine Menge von Pilzfäden und Sporen. Mit dieser Entdeckung des Schweden Berg im Jahre 1842 belegen alle früheren Deutungen der Krankheit als einer euteinlich-exsalfativen. Wir können dieselbe heut nur als eine parasitäre betrachten. Die Pilzfäden erscheinen als lange, gerade oder nach verschiedenen Richtungen gebogene, durchsichtige, scharf contourierte, etwa 50—60 Mm. lange und 3—4 Mm. breite Cylinder, welche aus mehreren zueinander gefügten Gliedern bestehen. Die rothen Fäden zeigen fast alle einen oder mehrere gleich beschaffene Aeste, welche von denjenigen Stellen des Stammfadens ausgehen, an welchen die Aneinanderfügung der Glieder durch Scheidewände markirt ist. Das Innere der Fäden enthält gewöhnlich einige moleculäre Körnchen, auch wohl einzelne ovale Körperchen, wahrscheinlich sich entwickelnde Sporen. Um den Ursprung des Fadens herum sieht man fast immer Haufen rundlicher oder ovaler Sporen, aus denen die ersteren hervorgehen. Der gebräuchliche Name „*Oidium albicans*“ ist nach den Untersuchungen von Grassi¹⁾ nicht gerechtfertigt; der Pilz soll vielmehr identisch mit dem *Mykodermia vini* sein, welches zu den allerverbreitetsten Schimmeln gehört, woraus sich auch das häufige Vorkommen des Soors erkläre. Ausser den Pilzelementen zeigt das Mikroskop noch zahlreiche Epithelialzellen, mehr oder weniger Fettkügelchen und rothe Blutkörperchen, die beim Abziehen des Soors von der Schleimhaut mit hereingerathen sind.

Dies ist alles, was der Soor Ihnen klinisch darbietet. Alle Symptome, die man ihm sonst zuschrieb, besonders die heftigen Diarrhöen, das Erbrechen, der Verfall, von dem zumal die früheren französischen Autoren sprechen, gehören nicht dem Soor, sondern der Grundkrankheit

¹⁾ Zur Diagnostik des Soors u. s. w., Deutsche Zeitschr. f. prakt. Med. 1877, No. 20.

zu, in deren Gefolge derselbe auftritt, und ich habe daher nur noch einige anatomisch-pathologische Zusätze zu machen. Der Soor beschränkt sich nämlich keineswegs auf die Schleimhautpartien, welche unserer klinischen Untersuchung zugänglich sind, sondern kommt, wie die Sectionen zeigen, auch noch weiter abwärts nicht selten vor, zumal in den tieferen Partien des Pharynx und häufig im Oesophagus, namentlich in den beiden unteren Dritttheilen desselben, wo er entweder in ähnlicher Weise, wie in der Mundhöhle auftritt, oder einen mehr oder minder vollständigen, durch die vorspringenden Falten der Schleimhaut ein rindenförmiges Aussehen darbietenden Cylinder bildet. In der Regel ist der Soor der Speiseröhre nicht rein weiss, sondern perlgrau oder gelblichgrau und schneidet dicht oberhalb der Cardia mit einer scharfen Linie ab. Auf der Schleimhaut des Magens fand ich ihn nur in einem Falle und zwar in Form sehr verzeelter, etwas prominirender Plaques, bekenne aber offen, dass eine sorgfältige Untersuchung des Magens, wie sie hier nothwendig ist, nicht immer stattfand, und eine grosse Zahl unserer atrophischen Kinder mit Soor im Munde überhaupt nicht zur Section kam. Ich bemerke dies deshalb, weil Parrot²⁾ den Soor des Magens durchaus nicht selten beobachtet hat. Um ihn zu erkennen, muss man zunächst die dicke Schleimschicht, welche den Soor bedeckt, durch einen Wasserstrahl entfernen, worauf dasselbe in Form kleiner isolirter oder beisammenstehender Wärrchen, die theilweise nur durch die Länge erkennbar sind, zum Vorschein kommt. Die grösseren Häufchen zeigen öfters eine centrale Delle und bekommen dadurch, wie durch ihre nicht selten gelbe Farbe entschiedene Ähnlichkeit mit einer Fatusborke. Am häufigsten findet man den Soor auf der hinteren Magenwand längs der kleinen Curvatur und in der Nähe der Cardia. Die Adhärenz an der Schleimhaut ist hier so beständig, dass es schwer hält, den Soor durch Ueberspielen von Wasser oder durch Abkratzen zu entfernen. Ueber den Magen hinaus kommt der Soor nur sehr selten vor. Die ohne Hülfe des Mikroskops angestellten Beobachtungen von Valleix und Senx sind nicht entscheidend, wohl aber die von Robin und Parrot, von denen der erstere den Soor im Duodenum, der letztere zweimal im Coecum nachwies. Für diesen Theil, wie für den Magen, scheint die Acidität der Contents, als ein die Vegetation des Soorpilzes förderndes Moment in Betracht zu kommen. Jedenfalls muss in allen diesen Fällen ein Hinabgelangen der Soorkeime oder Fäden vom Pharynx oder Oesophagus her angenommen werden. Bemerkenswerth ist, dass der Soor,

2) l. c. p. 225.

auch wenn er im Pharynx noch so stark entwickelt ist, sich doch nie in die hintere Partie der Nasenhöhle hinein erstreckt, ebensowenig in Fäden, wo Gaumenspalten vorhanden sind, wo also eine directe Communication zwischen Mund- und Nasenhöhle besteht; wohl aber ändert man ihn bisweilen auf der Schleimhaut der Glottis in Form kleiner Häufchen oder Streifen. Da dies die einzige Stelle der respiratorischen Schleimhaut ist, welche von Soor befallen wird, so wird man wohl Berg und Löhr darz. beipflichten müssen, dass nicht das Flammers, sondern nur das Pflasterepithelium den geeigneten Boden für die Entwicklung der Pilze abgibt. In den Lungen fand man den Soor nur in vereinzelten Fällen, wahrscheinlich durch Aspiration von Sporen aus dem Pharynx her entwickelt (Parrot, Birch-Hirschfeld).

Untersucht man die Beziehungen des Scorpilazs zu der unterliegenden Schleimhaut genauer, so ergibt sich, dass ein Theil der Pilze oberflächlich zwischen den Epithelzellen liegt, ein anderer Theil tiefer in das Gewebe dringt, so dass man deutlich die Fäden perpendiculär in die Schleimhaut eintreten sieht (Wagner¹⁾, Parrot). Diese Thatsache erklärt auch den mitunter sehr bedeutsamen Widerstand, welchem man beim Versuch, Soorflecken abzulösen, begegnet. Dass die Pilze auch in die Blutgefässe hineinwachsen und die Sporen von da aus embolisch in andere Theile des Gefäßsystems übertragen werden können, scheint aus vereinzelten Beobachtungen von Zenker und Ribbert²⁾, in welchen dieselben im Gehirn gefunden wurden, hervorzugehen.

Auf einer vollkommen gesunden Mundschleimhaut scheint die Soor-entwicklung nicht vorzukommen, oder wenigstens nie zu einer erheblichen Ausdehnung zu gelangen. Selbst in den Fällen unseres ersten Grades muss wohl eine partielle Reizung der Mucosa durch Reste von Milch, die sich zersetzen und der Entwicklung der Keime einen günstigen Boden bereiten, angenommen werden. Deutlicher sieht man dies in den weit häufigeren Fällen des zweiten Grades. Hier geht immer eine auffallende Trockenheit und dunkle Färbung der Mundschleimhaut voraus, die Zunge wird durch Vorspringen der Papillen rauh, und an diesen Stellen beginnt zunächst die Pilzbildung, welche durch den Mangel an Alkalien der Mucosa gefördert wird. Auf diese Beziehung machte ich So schon früher aufmerksam; die außerordentliche Geringsfügigkeit der Speicherscretion in den ersten Monaten muss die Soorbildung im Munde und die Trockenheit der Schleimhaut in hohem Grade begünstigen. Vor allem

¹⁾ Jahrb. f. Kinderheilk. 1898. I, p. 58.

²⁾ Berliner klin. Wochenschr. 1879. p. 618.

aber wirkt die Atrophie und Schwäche des Kindes als ein die Keimung der Sporen beförderndes Moment, und ich kann Ihnen zum Beweise dieser Thatsache die von Delafond ¹⁾ angestellten Thierversuche anführen. Demselben gelang es nie, den Soor auf die Mundschleimhaut eines gesunden wohlgenährten Schafes mit reichlicher Speichelsecretion, durch Impfung zu übertragen, während dies sofort geschah, wenn er das Thier vorher durch Hunger schwächte, oder wenn er ein bereits krankes Thier mit saurem Speichel zu dem Impfversuche wählte. Auch die klinische Beobachtung, dass ganz ähnliche Sooreruptionen, wie bei den atrophischen oder durch Krankheiten aller Art erschöpften Säuglingen, auch im späteren Lebensalter im letzten Stadium der Phthisis und in schweren Fällen von Typhus nicht selten vorkommen, stimmt damit überein. Unter anderen fand ich bei einem 18jährigen an einem schweren Abdominaltyphus gestorbenen Mädchen nicht bloss den Pharynx, sondern auch den Oesophagus bis zur Karina mit einem Soorüberzuge bekleidet, welcher durch seine schmutzig graue Farbe bei der Schwierigkeit, den Pharynx genau zu untersuchen, während der letzten Lebenstage als „Diphtheritis“ imponirt hatte. So mag überhaupt mancher Fall von „diphtheritischer Complication“ des Typhus, der nicht zur Section kommt, auf einer Täuschung durch Soor des Pharynx beruhen, und zwar um so mehr, als der Soor hier und da auch bei Kindern die Mundschleimhaut verschonen und nur den Gaumen und Pharynx befallen kann.

Die Sporen gelangen wohl vorzugsweise mit den Nahrungsmitteln (Milch und andern Flüssigkeiten) oder mit der eingeathmeten Luft auf die Mundschleimhaut, aber auch eine directe Uebertragung durch die Flasche, wenn deren Saugpfropfen nicht täglich wiederholt auf das Sorgfältigste gereinigt wird, ist möglich und kann bei einem und demselben Kinde immer wieder neue Sooreruptionen herbeiführen. Achten Sie daher wohl darauf, dass namentlich die Gummipfropfen der Saugflaschen recht fleissig abgerascht, in Wasser gelegt und auch auf ihrer Innenseite mit einer kleinen Bürste täglich gereinigt werden. Ob der Soor aus dem Munde des Kindes auf die Brustwarze der säugenden Mutter oder Amme übergehen kann, ist eine Frage, über welche die Ansichten der Beobachter keineswegs übereinstimmen. Wenn auch Senn ²⁾ unter mehr als 1000 Fällen von Soor nicht ein einziges Mal den Uebergang desselben auf die Brustwarze der Amme beobachtet haben will, so sprechen sich doch andere, besonders Hignot ³⁾, auf einzelne Beobachtungen gestützt, für

¹⁾ Gaz. hebdomad. 1858. p. 300.

²⁾ Recherches sur les maladies des enfants nouveau-nés. Paris 1855. p. 29.

³⁾ Traité de quelques maladies pendant le premier âge. Paris 1858. p. 223.

eine solche Möglichkeit aus, und Delafond fand bei den oben erwähnten Impfversuchen an Schafen, dass das Oidium durch ein soorkrankes Schaf auf die Warze des Mutterschafes übertragen werden könne. Man muss daher unter allen Umständen die Säugende auf die Möglichkeit einer solchen Uebertragung aufmerksam machen und ihr die grösste Reinlichkeit, besonders häufiges Waschen der Warze mit alkalischen Flüssigkeiten zur Pflicht machen.

In allen Fällen, wo man diagnostische Zweifel über das Vorhandensein von Soor hegt, und dies sind nur äusserst seltene, entscheidet allein das Mikroskop durch den Befund der charakteristischen Piliöden und Sporen. Dass Reste von Milchgerinnungen auf der Schleimhaut durch die Möglichkeit, sie einfach abzuwischen, sich leicht vom Soor unterscheiden lassen, erwähnte ich bereits. Es giebt aber noch einen Zustand, der von Unkundigen mitunter als Soor gedeutet wird, nämlich eine membranartige Epithelialablossung auf der Schleimhaut der Zunge und besonders des Zahnfleisches in der Form dünner grauerisser Auflagerungen. Das Mikroskop weist hier sofort den Irrthum nach, indem es nur Epithelzellen und eine amorphe körnige Masse, aber keine Piliomente erkennen lässt. In einzelnen Fällen sieht man diese Epithelialzellen ausschliesslich unter der Zunge, wo sie einen zusammengerollten milchweissen queren Strang bilden.

Ich fand dies bei zwei Säuglingen, von denen der eine Hündel und voll, der andere atrophisch war, vielfache Absonder der Haut und einen Decubitus am Ellenbogen darbot. Zahne waren bei beiden Kindern noch nicht vorhanden, die Mundschleimhaut aber war durchweg geröthet und hätte leicht bei Berührung die weissliche Auflagerung unter der Zunge liess sich ziemlich leicht abheben; nur am Freigewebe haftete sie etwas fester und hinterliess hier einen Blutspritzer. Unter dem Mikroskop wurde ich nur Fettkügelchen (wohl Milchreste), Epithelzellen und eine amorphe Endmasse, aber keine Spur von Soorparasiten erkennen, und ich denke mir, dass die in Folge der Schleimhauthypertrophie reichliche Epithelialabsonderung durch das wiederholte Blübergleiten der unteren Zungenfläche über den Alveolarrand beim Saugen jene zusammengerollte Strangform angenommen hätte. —

Dass die locale Behandlung des Soor nur in den Fällen unseres ersten Grades Erfolg verspricht, leuchtet ein. Hier genügt meistens schon eine mechanische Abreibung. Die Wärterin mass mittelst des mit feiner Leinwand umwickelten und in frisches Wasser getauchten Fingers die auf der Schleimhaut sichtbaren Soorflecken dreist abreiben, auch wenn dabei eine kleine Blutung erfolgen sollte. Sobald neue Eruptionen sichtbar werden, wiederhole man das Verfahren, und reinige nach jedem Sagen die Mundhöhle recht sorgfältig auf dieselbe Weise. Man wird dann sehr bald der Affectio Herr werden. Ganz anders liegt die Sache

in Fällen des zweiten Grades, bei atrophischen und erschöpften Kindern. Auch hier wird es Ihnen zwar rasch gelingen, durch die oben erwähnte mechanische Reinigung den Soor zu entfernen, und zwar noch besser, wenn Sie behufs der Alkalisierung der sauren Mundreaction der mit Linzen unentwickelten Frager nicht in reines Wasser, sondern in eine alkalische Lösung tauchen (z. B. Kali chloricum, Borax oder Natrium benzoicum 5:100 Wasser, eine Messerspitze Kochsalz in einem Glase Wasser gelöst). Aber das Allgemeinleiden, welches die Soorentwicklung begünstigt, bleibt hier immer die Hauptsache, und deshalb werden Sie auch in diesen Fällen immer neue Recidive des Soors vor sich gehen sehen. Unter diesen Umständen wandte ich wiederholt eine Bestreichung der gesamten Mundschleimhaut mit einer Lösung von Argentum nitricum (1 oder 2 Th. in 100 Wasser) mit Vortheil an, nachdem zunächst eine Abreibung derselben stattgefunden hatte.

III. Die hereditäre Syphilis.

In demselben Zeitabschnitte, zu welchem wir den Beginn der atrophischen Zustände und die Entwicklung des Soor am häufigsten zu beobachten pflegen, haben wir auch die reichlichste Gelegenheit, uns mit den Erscheinungen der hereditären Syphilis bekannt zu machen. Da die letzteren sehr mannichfaltig sind, so scheint es mir am zweckmässigsten, Ihnen zunächst das Bild der Krankheit so zu schildern, wie es sich Ihnen am häufigsten in der Praxis darbieten wird, die Varietäten aber und die seltener vorkommenden Zustände erst in zweiter Reihe zu erörtern.

Gewöhnlich stehen die Ihnen zugeführten Kinder im 2. oder 3. Monate des Lebens und sind, je nachdem sie von der Mutter gesäugt oder aufgezogen werden, besser oder schlechter ernährt. Ein hoher Grad von Atrophie gehört keineswegs zu den Attributen der infantilen Lues, denn eine Menge von Kindern, die mir vorkamen, besonders Brustkinder, erfreute sich einer normalen Körperfülle und einer gesunden Hautfarbe, während die künstlich genährten allerdings meistens eine Neigung zur Atrophie zeigten. Hohe Grade dieser letzteren verdanken aber nicht der Syphilis allein, sondern den mit dieser gleichzeitig einwirkenden Factoren: Hunger, Elend aller Art, ihres Ursprung.

Eins der frühzeitigsten Symptome ist in vielen Fällen ein Schnüffeln beim Athemholen, welches durch Anschwellung der Nasenschleimhaut in Ären der Inspiration entzogenen Theilen bedingt und von den Müttern in der Regel als Stockschnupfen bezeichnet wird. Weiterhin zeigt sich meistens eine Verstopfung der Nasenlöcher durch gelbliche oder braunliche Borken, und ein serös-schleimiger, zuweilen mit etwas Blut ge-

nischer Ausfluss (*Koryza syphilitica*), wobei die Nase ausserlich etwas anschwellen kann. Diese in ihren Graden sehr verschiedene Koryza halte ich für eins der constantesten Symptome der Krankheit, welches entweder den übrigen Erscheinungen vorausgeht, oder dieselben fast immer begleitet und nur ausnahmsweise ganz fehlt. Bald gesellen sich dazu hellrothe, meistens ins Bräunliche spielende runde Flecken von der Grösse eines Fing- oder Zehnpfeningstücks, welche anfangs noch vereinzelt auftreten und besonders die Gegend der Augenbrauen, des Kins, die Nasolabialfalten, die Umgebung des Anus und die Flächen der Hände und Füsse zu ihrem Sitze wählen (*Rosacea syphilitica*). Viele dieser Flecken zeigen eine kleinflüchtige Abschällung der Epidermis oder bedecken sich auch wohl mit grösseren Fetzen derselben; andere, und in manchen Fällen mehrere alle, bieten von der Seite gesehen eine glänzende, fast lackirte Fläche. Die am Kinn und auf den Hinterbacken sitzenden Flecken werden durch die wiederholte Reizung der Mundsecrete, des Urins und der Faeces allmählig macerirt und nach Abstossung der Epidermis in rothe nassende Excoriationen verwandelt, deren spezifische Bedeutung nicht ohne Weiteres erkennbar ist, vielmehr durch ein in ihrer Umgebung stattfindendes Erythem (*Intertrigo*) verunkelt werden kann. Innerhien aber sind die Localitäten, an denen sich diese Excoriationen zeigen, die dabei auch unterseht bestehenden Flecken und die Koryza ausreichend, um den Verdacht der Syphilis und die Einleitung einer spezifischen Cur zu rechtfertigen.

Geschieht dies nicht, so macht der weitere Fortschritt der Krankheit bald jeden Zweifel schwinden. Die Flecken verbreiten sich namentlich über einen grossen Theil des Körpers, besonders über die Stirn, die ganze den Mund umgebende Hautpartie und die Extremitäten, und fliessen an vielen Stellen zu grösseren, düsterrothen, gelbbraunlichen, mehr oder weniger desquamirenden, hier und da auch mit dünnen, durch Vertrocknung nassender Excoriationen entstandenen Schorfen bedeckten Platschen zusammen. Handflächen und Fusssohlen sind meistens diffus geröthet, mit Fetzen abgestossener Epidermis bedeckt, und besonders die Fersen zeigen oft eine glänzende Rötze und Spannung. Dazu gesellen sich Excoriationen der Mundwinkel, die mit einer weisslichen Auflagerung bedeckt sind, Risse und Spalten der Lippenschleimhaut (*Rhagaden*), welche beim Saugen und Schreien leicht bluten, und im Verein mit den die Augenbrauen bedeckenden Schorfen und der Koryza ein Gesamtbild darstellen, welches selbst von Mindergeübten kaum mehr zu verkennen ist und auch ohne Geständniss der Eltern die Diagnose der Syphilis gestattet. In vielen Fällen wird das charakteristische Bild noch

durch das Ausfallen der Haare, besonders der Augenbrauen und selbst der Wimpern, gesteigert. Trousseau's Beobachtung eines der Laes infantilis eigenthümlichen bräunlichen Hautcolorats kann ich nur für eine Reihe von Fällen, welche atrophische Kinder betrafen, bestätigen, während ich bei vielen anderen gut genährten Kindern einen ebenso weissen Teint wie im gesunden Zustande beobachtete.

Sie dürfen nun nicht erwarten, dass alle Züge dieses Krankheitsbildes durchweg so prägnant entwickelt sind, wie ich es Ihnen eben schilderte. Häufig ist nur ein Theil desselben vorhanden, während andere fehlen oder nur schwach angedeutet sind. So sah ich z. B. die Genitalia und die Analgegend bisweilen ganz frei von Exanthen, während die oberen Körpertheile und das Gesicht exquisit befallen waren. Auch die Abweichungen von diesem Grundbilde der Krankheit sind durchaus nicht selten. So beobachtete ich statt der Roseola wiederholt dunkelrothe runde Papeln auf den Fusssohlen, den unteren Extremitäten und um den Anus herum, oder stellenweise, besonders auf den Nates, dunkelrothe, infiltrirte, mit dünnen weisslichen Schuppen bedeckte, zuweilen squirte Flecken (*Psoriasis gyrata*); hier und da, aber immer nur bei Kindern in den ersten Lebenswochen, die Ueberreste von Pemphigus (S. 56) in Form rother, von einem trockenen Epidermistringe umzogener Flecken oder Excoriationen, zuweilen auch noch frische, meistens schlaffe, mit trübem eiterigen Inhalt gefüllte Blasen an den Fusssohlen und Handtellern. In manchen Fällen, zumal bei sehr jungen Kindern, fand ich neben den Zeichen der Laes fast die ganze Haut diffus geröthet und mit grossen Lamellen gelblicher, mit Sebum vermischter Epidermis bedeckt. Am seltensten beobachtete ich bläschenartige und nässende (ekzematische) Ausschlagsformen als Ausdruck der Laes; auch schien es mir, als wären dieselben meistens durch Misshandlung der papulösen und fleckigen Exantheme, besonders durch Kratzen oder den Contact reissender Se- und Excrete zu Stande gekommen. Bei einem 6 Wochen alten Kinde erwies sich ein neben reichlicher Roseola an vielen Körpertheilen entwickeltes feinbläsiges Ekzem nur als das Product sehr reichlicher Schreisse, hatte also mit der Syphilis selbsts nichts zu schaffen. Häufiger sah ich aus den oben beschriebenen Excoriationen in der Umgebung des Anus, am Scrotum, aber auch an anderen Hautstellen, z. B. in den Augenbrauen, um den Nabel herum, tiefer dringende, mit Schiefen bedeckte Geschwüre sich entwickeln, sowie auch die oft gleichseitig vorhandene Intertrigo der Inguinalgegenden eine Tendenz zur Bildung weisslichgrauer, von einem infiltrirten rothen Saum umgebener Ulcerationen zeigte. Dagegen konnte ich mich von der Richtigkeit der Ansicht

Caillaud's¹⁾, dass nur das Condyloma latum (die Schleimpapel) zur Annahme der Lues congenita berechtige, nicht überzeugen, kann vielmehr versichern, dass in einer ansehnlichen Zahl von Fällen trotz der genauesten Untersuchung nirgends eine solche Hautaffection von uns gefunden wurde. Keinesfalls hätte ich die Schleimpapel für eins der frühesten Symptome der Krankheit, denn, abgesehen von einzelnen Ausnahmefällen, beobachtete ich die kondylomatösen Bildungen immer erst in einem späteren Stadium, bei Kindern, die bereits einige Monate alt waren oder an einem Recidiv der Syphilis litten. Unter diesen Verhältnissen kamen die Schleimpapeln allerdings häufig genug vor, besonders an den Mundwinkeln, auf der Zunge, in der Kinagrube, in den Inguinal-falten, rings um den Anus, auf dem Scrotum und der Vulva, mitunter auch auf der inneren obersten Partie der Oberschenkel, am seltensten an den Nasenflügeln und den äusseren Augenwinkeln, also meistens an Stellen wo Hautfalten aneinander liegen, Druck und Secrete reizend einwirken. Ihr Aussehen war dasselbe, wie bei Erwachsenen, und ihre Tendenz zur Maceration durch Secrete (Mundflüssigkeit, Urin, Faeces, Schweiß) sehr ausgesprochen, wobei dann nach Abstossung der Epidermis die Kondylome allmählig in eine weissgraue rissige Ulceration zerfielen. In einzelnen Fällen bildeten die Kondylome zusammenhängende Massen, welche namentlich den grossen Schamlippen ein knotiges, fast an Elephantiasis crurialis ähnliches Aussehen gaben. Auch Onychie mit Verdickung und krallenförmiger Deformität der Nägel, welche endlich durch Eiterung des Nagelbettes abgestossen wurden, kam wiederholt zur Beobachtung.

Neben allen diesen verschiedenartigen Affectionen der äusseren Haut können nun auch die Schleimhäute krankhafte Erscheinungen darbieten. Abgesehen von der fast constanten Koryza beobachtete ich Conjunctivitis mit eitrigen Secret, (niemals aber Iritis, die überhaupt zu den seltensten Erscheinungen der Lues hereditaria zu gehören scheint), Fluor albus, hier und da auch Rötze und Anschwellung der Urethralmündung mit Schmerzen beim Urinlassen. Auf dem Zungenrücken kommen, wie schon erwähnt, kondylomatöse oder besser gesagt gumöse, harte, dunkler gefärbte Einsprengungen vor, besonders im hinteren Theile, und auch die Mandeln sind bisweilen der Sitz flacher, aus Kondylomen hervorgegangener Ulcerationen. Ich kann indess diese Mund- und Nasenaffectionen nicht als häufig betrachten, da in der grossen Mehrzahl meiner Fälle die betreffenden Theile durchaus nichts Krankhaftes darboten, und ich warne Sie hier nochmals davor, die wiederholt (S. 57) erwähnten Gau-

¹⁾ Traité prat. des maladies de la peau chez les enfants, Paris 1859.

unengeschwüre der Neugeborenen als etwas Syphilitisches zu betrachten. Meistens verbindet sich mit der Hautsyphilis der Kinder eine Veränderung der Stimme, eine mehr oder minder starke Heiserkeit, die sich ausnahmsweise bis zur völligen Aphonie steigern kann. In dem folgenden Falle bildete der Verlust der Stimme sogar fast das einzige nachweisbare Symptom der Lues:

Carl C., 4 Monate alt, am 14. März 1882 in meiner Poliklinik vorgestellt, litt seit 2 Monaten an Heiserkeit, in der letzten Zeit an vollständiger Aphonie. Das Kind schreie, aber man höre kaum etwas davon. Keine Husten, normaler Athem. Im Pharynx und an der Epiglottis nichts Abnormes. Speculumsuntersuchung des Kehlkopfs (Waldfenburger verarbeitete Anamnese) ohne Resultat. Das Kind war gesund, wohlgenährt und hübsch, zeigte aber an den Armen bräunliche Narben. Weitere Nachforschung ergab, dass dasselbe im Alter von 2 Monaten an starker Coryza und einem massigen abschließenden Ausflussgegriffen hatte, welcher durch Calomel beseitigt werden war. Diagnose: Syphilitischer Affect (Ulceri condyloides?) der Stimmlippen. Ich verordnete Syreos. solub. Hörsen 0.007, 2mal täglich. Schon am 28., also nach 9 Tagen, war die Stimme freier, bis zum 18. April völlig normal. Nachtr. mit Syr. ferri iodati. Bis zum December kein Recidiv.

Ueber die Art der Kehlkopfaffection in diesem Falle wage ich kein Urtheil. Fälle von Perichondritis des Kehlkopfs oder von Carcinom des Schildknorpels, wie Sie hier und da beschrieben werden, kenne ich aus eigener Erfahrung nicht. Ebenso wenig kam mir die in neuerer Zeit mehrfach erwähnte Darmosyphilis Neugeborenen zu Gesicht, welche schon 1871 von Herz¹⁾, später von Jürgens²⁾ beschrieben wurde. Es handelte sich dabei um gumöse, zum Theil ringförmig das Duodallumen umfassende und verengende, meist den Peyer'schen Plaques entsprechende Indurationen der Muskel- und Schleimhaut, theilweise auch um condyloide Wucherungen und Ulceration der letzteren. Eine klinische Bedeutung scheint diesem Befunde vorläufig nicht zuzukommen, da ein bezüglicher Fall von Schwimmer³⁾ (Heilung einer Darrrhoe unter specifischer Cur) nicht als beweiskräftig gelten kann.

Kleine, erbsen- bis haselnuss höhnengrosse bewegliche Anschwellungen der Lymphdrüsen lassen sich bei genauer Untersuchung häufig, wenn auch nicht constant nachweisen, bisweilen nur vereinzelt hinter den Ohren, am unteren Ende des Oberarms, oder mehr conglomerirt in den Cervical-, Axillär- und Inguinalsträngen. Diese Drüsenknoten gehörten immer zu den hartnäckigsten Erscheinungen und bestanden auch

¹⁾ Archiv f. Dermat. u. Syphilis. 1871. p. 1.

²⁾ Jahrb. f. Kinderheilk. 1881. VIII. p. 126.

³⁾ Archiv f. Dermat. u. Syphilis. 1878. No. 2.

nach der Heilung der Krankheit oft noch weiter fort, wobei es allerdings zweifelhaft blieb, ob dieselben nicht eine zufällige, von anderen Ursachen abhängige Complication bildeiten. Keinesfalls aber kann ich mit Bedacht übereinstimmen, welcher die Lymphdrüsenanschwellungen für ausserordentlich selten hält und persönlich nur einmal beobachtet haben will.

Syphilitische Affectionen des Knochensystems wurden in früherer Zeit für sehr selten gehalten. Man beschrieb vereinzelte Fälle von Zerstörung der Nasenknochen (des Vomer und der Muscheln), von Peritostosen am Oberschenkel und anderen Röhrenknochen, schien aber keine Ahnung davon zu haben, dass diese Affectionen im ersten Kindesalter eben so oft, ja in grösser Beziehung noch häufiger vorkommen, wie bei Erwachsenen. Ein Fall dieser Art wurde von mir schon im Jahre 1861 beobachtet und beschrieben ¹⁾.

Anna K., 2 Monate alt, atrophisch obwohl von der Mutter geliebt, am 4. April in meine Poliklinik vorgestellt, weil sie seit 14 Tagen die Arme nicht mehr bewegte. Beide oberen Extremitäten lagen schlaff und losse, auch wenn das Kind die Peize und den Brustkorb nach verschiedenen Richtungen bewegte. Nicht einmal in den Fingern war eine kleine Bewegung wahrnehmbar. Der linke Arm bei, wenn man ihn aufstieß und wieder hüllte, wie der einer Leiche ohne alle Resistenz benutzt, während sich im rechten unter gleichem Einflusse noch ein schwacher Rest von Widerstand zeigte. Sensibilität und Temperatur beider Arme normal. Die beiden Condylen und das ganze untere Dritttheil des linken Humerus stark angeschwollen und an der inneren Seite desselben eine erbsengrosse bewegliche Drüse nachweisbar. Cervical-, Axillar- und Inguinaldrüsen zum Theil vergrößert und hart; die Fusschen, besonders die Ferseu roth, glänzend, leicht Inguantinal. Nase verstopft. Athem schniefend, bestand aus geringer bläulicher stiniger Ausathem. Die Mutter gestand, während ihrer Schwangerschaft wiederholt am Halse und an einem Brustwarzenlage gelitten zu haben und bei einer bedauernde Abgabe der Thier- Merc. sublim. 0.015 2 mal täglich, Einsprachen von Ung. kal. Jodali in die angeschwollenen Partien. Schon nach 8 Tagen, am 11., war die Aushebung des Knötchens verschwunden, der Schlafes geringer, die Arme in nicht geringem Grade beweglich. Unter dem Fortgebrauch der Jodali mit Kamilleninfusion und Tolayerwein erfolgte rasche Besserung, am 16. war die Beweglichkeit der Arme wieder ganz normal, der Schlafes verschwunden, und es wurde von der Mutter mit dem Syrup. ferr. Jodali (3 mal tägl. 5 ztl.) vermischt. Am 21. Mai und ich stündliche badeische Erweichungen geübt, die Atrophie aber noch fortwährend. Weiterer Verlauf unbekannt.

Ganz ähnlich verhielten sich die folgenden von mir beobachteten Fälle.

Kind von 8 Wochen, am 14. Februar 1873 in der Poliklinik vorgestellt, mit bläulicher Hautfarbe, ziemlich gut mit der Flasche ernährt. Seit 3 Wochen Coryza,

¹⁾ Beiträge zur Kinderheilk. Berlin 1861, p. 192.

Blasen an den Lippen und Onychia an allen Fingern und Zehen. Stenotische Nadel stark ver dickt, ödem und in ihrem Behälter bereits eingeklemmt, die strahlen Phalangen mit Epitheliumabschüben bedeckt. Starke Inquamation der Fasciolen, weniger der Handflächen. Der linke Arm seit einer Woche schlief hängend, wird nicht mehr bewegt. Das untere Dritttheil des Humerus stark geschwollen, empfindlich. Der rechte Halm etwas dicker und fester als der linke. Alle Functionen normal. Ther.: Calmel 0.01 2mal täglich. Am 26. die Beweglichkeit des Arms kehrt zurück, die Anschwellung um die Hälfte vermindert. Blasen und Koryza beseitigt. Die Nadel fast alle abgestossen; unter denselben wachsen die neuen Nadel heraus. Fortsetzung der Cur.

Kind von 8 Monaten, am 30. Mai 1876 mit einem Decir der Syphilis in die Poliklinik gebracht. Papulosa und hohles Eosinem am Kinn und der Oberlippe, starkes Schüttelfrö, Koryza. Anschwellung der unteren Epiphyse des rechten Humerus mit erschwelter Beweglichkeit desselben und Schmerz beim Druck. Der linke Arm normal. Mercurielle Behandlung. Weiterer Verlauf unbekannt.

Während in diesen Fällen nur das untere Ende des Humerus der Sitz der syphilitischen Periostitis und Osteitis war, zeigen die folgenden, dass auch andere Röhrenknochen von derselben Affection befallen werden können.

Kind von 10 Wochen, vorgestellt am 18. Novbr. 1877, mit Koryza, heftiger Verstopfung der Nasenlöcher und glänzend rothen, nach gedehntem Papeln um den Arm und auf des Hals. Empfindliche Anschwellung der oberen Epiphyse des Radius und der Ulna linksseitig, sowie der mittleren Phalanx des linken Mittelfingers, der 1. und 2. Phalanx des rechten Mittelfingers. Mercurielle Behandlung. 27. Dec. Mit Ausnahme der Epiphyseanschwellung ist fast alles geheilt. Fingerphalangen beiderseits normal. Fortsetzung der Cur.

Kind von 3 Monaten, am 7. Jan. 1875 in die Poliklinik gebracht. Gut genährt und blühend. Infortige mit Erosionen am Arms und Gesichtern. Koryza fast seit der Geburt mit steterm Ausfluss und Beizen an den Nasenlöchern. Seit 4 Wochen Anschwellung der oberen Epiphyse des rechtsseitigen Vorderarmknochen, empfindlich beim Druck, Gelenk frei. Bechter Arm schlief hängend, wird nur sehr wenig bewegt. Alle anderen Knochen abschüssend normal. Mercurielle Cur. Ende Jan. bedeutende Besserung. Weiterer Verlauf unbekannt.

Kind von 12 Wochen, am 18. Juni 1879 vorgestellt. Koryza, Anschwellung beider unteren Epiphysen des Radius und der Ulna, am stärksten linksseitig. Beide Arme unbeweglich. Eosinela an ganzen Körper, Blasen der Vola warms und Abschuppung der Fasciolen. Verlauf unbekannt.

Kind von 5 Monaten, am 28. Novbr. 1875 vorgestellt. Von der Mutter gen. genährt. Anschwellung der Epiphysen an allen Extremitäten. Völlige Unbeweglichkeit der Arme, Schaffheit der Beine. Keine anderen jammenden Symptome. Mercurielle Cur. Schon nach 6 Tagen Beweglichkeit der Arme gelezert, bald auch Anschwellung der Epiphysen. Aus der Cur vergeblich.

Sie sehen, dass nicht bloss die verschiedenen Röhrenknochen an ihren Epiphysen deutliche Anschwellungen darbieten können, sondern

auch die Phalangen der Finger, welche letztere dann vollkommen das Bild der Osteomyelitis scrophulosa (Pachyarthrocace) zeigen, d. h. eine harte, anfangs nur areolar gefüchter und verschleißbarer Haut bedeckte Anschwellung, die im Laufe der Zeit sich rüthet, mit kleinen fistelartigen Oeffnungen aufricht und nach jahrelanger Eiterung schliesslich mit einer trichterförmigen Narbe heilt. Ich habe ausser im Fall IV diese Form noch ein paar Mal, besonders bei Recidiven der hereditären Lues im ersten und zweiten Lebensjahre beobachtet, aber immer nur an den Fingern, noch nie an den Zehen. Auch andere Autoren, besonders Taylor¹⁾ und Lewin²⁾, haben sich zu neuester Zeit mit dieser „Dactylitis“ beschäftigt, die inmerhin als eine verhältnissmässig seltene betrachtet werden muss. Dennoch dürfen Sie in allen Fällen von Pachyarthrocace, welche Ihnen künftig vorkommen werden, nicht vergessen, dass diese Affection nicht bloss eine scrophulöse ist, sondern auch eine hereditär-syphilitische sein kann. Andererseits muss ich aber davor warnen, die Epiphysenschwellungen, besonders an den unteren Enden des Radius und der Ulna, selbst wenn andere verdächtige Symptome vorhanden sind, aus gleich für syphilitische zu erklären, zumal bei älteren Kindern, die das erste Halbjahr bereits überschritten haben, weil hier schon Rachitis zu Grunde liegen kann. In diesen Fällen bleiben die Schwellungen der Epiphysen durch die Mercurialeur unberührt, während die eigentlich syphilitischen Symptome verschwinden:

Kind von 7 Monaten, vorgestellt am 29. Jan. 1876, gut genährt, Haut koryza mit der Geburt. 8 Wochen nach derselben fleckiges Exanthem, Jacob Bäder³⁾ geheilt, aber immer wiederkehrend. Jein spärliche Rosola im Gesicht, auf den Kopfe, an den Händen und Füssen. Zahlreiche Knochentumoren auf der inneren Fläche des rechten Oberschenkels, am Arm, am Scrotum und auf dem Nates. Seit einigen Wochen starke Schwellung der inneren Epiphysen der Vorderarmknochen beiderseits. Schädelnahten noch klapfend, mit sehr weichen Kanten, Epiphysenschwellung an der Grenze der knöchernen und knorpeligen Theile der Rippen. Mercurielle Behandlung. Am 17. Februar Alles geheilt bis auf die Schwellungen der Epiphysen, welche unverändert sind.

Suchen Sie also in solchen Fällen immer sorgfältig zu ergründen, ob nicht eine Combination von Rachitis und Syphilis stattfindet, was freilich nur vom 6. Lebensmonate an stattzufinden pflegt. In den ersten Monaten können Sie die Schwellungen der Epiphysen unter den genannten Umständen eher als syphilitische ansehen und behandeln. Einen Unterschied in der Form der Anschwellung (Taylor charakterisirt die syphi-

¹⁾ Syphilitic lesions of the osseous system. New York 1875.

²⁾ Charité-Annalen. Jahrg. IV.

litische durch einen „plötzlichen, streilen“ Beginn) kann ich nicht als stichhaltig betrachten; wohl aber die von mir wiederholt beobachtete Thatsache, dass die Epiphyseanschwellung bei der Luxa auch einseitig auftritt, was bei der Rachitis nie der Fall ist.

In den meisten der oben mitgetheilten Fälle wird Ihnen eine erschwerete Beweglichkeit oder gänzliche Immobilität der oberen Extremitäten aufgefallen sein, welche auch bewirkt, dass die aufgehobenen und wieder abgelassenen Arme wie todte schwere Körper niederfielen. Der erste Autor, welcher diese Erscheinung gellührend würdigte, war meines Wissens Bednár¹⁾, unter dessen 98 tabellarisch zusammengestellten Fällen von Syphilis hereditaria die Parese der Arme 16mal, die der Beine 1 mal, die aller Extremitäten 2 mal vortritt ist. Seine Beschreibung stimmt mit den in meinen Fällen wahrgenommenen Symptomen völlig überein. Bednár scheint geneigt, obwohl er es nirgends geradezu ausspricht, diese Parese als eine myopathische Affectio aufzufassen und lediglich von einem schlaffen Zustande der Muskulatur her zu leiten. Meiner Ansicht nach handelt es sich aber um eine Pseudoparalyse, die von den Muskeln und Nerven ganz unabhängig, und lediglich als eine Immobilität der Glieder in Folge der schmerzhaften Knochenaffection zu betrachten ist. Die Kinder bewegen die betreffenden Glieder nicht, weil sie dabei Schmerz empfinden, und der Beweis für die Richtigkeit dieser Ansicht liegt darin, dass in allen meinen Fällen mit der Abnahme der Knochenanschwellung auch die Beweglichkeit der Extremität sofort wiederkehrte. Freilich könnte man dagegen geltend machen, dass Bednár in keinem seiner Fälle von Parese eine Knochenanschwellung erwähnt, dass ferner in meinem ersten Fall auch der von Anschwellung freie Arm partisch war. Ja ich kann selbst ein paar Fälle anführen, wo die Parese ohne jede nachweisbare Knochenaffection bestand:

Kind von 6 Wochen, mit gelütheter, etwas desquamirter Eoside auf den Armen und Beinen, im Gesicht und am Rumpfe, dunkelrothen glänzenden desquamirten Fesseln und Handflächen, Korya und Corjantörchen. Beide Arme gegen vollkommen schlaff da, nur die Finger zeigen einige leise Bewegungen. Nirgends eine Knochenanschwellung. Die in der Universitätsklinik am 30. Juli 1890 begonnene Mercuriakur hatte schon bis zum 16. ein Schwinden des Ausschlags und eine bessere Beweglichkeit der oberen Extremitäten erzielt.

Kind von 8 Monaten, am 15. Januar 1879 in meine Poliklinik eingeliefert. Die Mutter hat bereits 4mal abgeort. Arme und Beine fast von Geburt an unbeweglich und schlaff liegend, Korya mit Schüffeln und Ausfluss, eisteile Kosterlaefen im Gesicht und um den Anus. Keine Anschwellungen der Knochen. Mercuriakur. Am 4. Febr. Korya und Flecken gelöst, Arme werden gut bewegt,

¹⁾ Krankheiten der Neugeborenen u. s. w. Wien 1853. IV, p. 227.

Beim Absterben, lassen sich aber in den Kieferknochen wegen eines Widerstandes der Plexuren nicht vollkommen stecken. Fortsetzung der Cur.

Kind von 6 Wochen, am 24. Juli 1879 vorgestellt, Koryza, Erysipelen roth, glänzend, desquamirend, Bascula an den After. Epiphyten nicht geschwollen. Seit 8 Tagen Anus schließt, (incontinent) jede passive Bewegung mit Geschrei hervor. Verlauf unbekannt.

Die Deutung dieser Paresen ohne nachweisbare Knochenaffection ist uns jetzt durch die anatomisch-pathologischen Untersuchungen von Wegner¹⁾ näher gerückt. Bei syphilitischen Neugeborenen und jungen Kindern findet man nämlich constant an den Röhrenknochen, und zwar an der Uebergangsstelle der Diaphyse in den Knorpel der Epiphyse einen krankhaften Process, welcher auf einer excessiven Wucherung der Knorpelzellen und einer retardirten Ossification der schon vercalciften Substanz beruht. Gefässneubildung im Knochen soll dabei gänzlich oder nur sehr unvollkommen stattfinden, und in Folge der mangelhaften Ernährung sollen die Zellen durch Schrumpfung und Fettmetamorphose langsam untergehen. Auf Durchschnitten giebt sich dieser Process durch eine an der Grenze des Epiphysenknorpels verlaufende schmale gelbliche oder orangefarbige, etwas zackige Linie kund, welche nach Wegner durch die abgestorbene Substanz gebildet wird, welche die Dia- und Epiphyse trennt und durch eine „entzündlich-suppurative Complication“ zur völligen Ablösung der Epiphyse führen kann. Der ganze Vorgang tritt immer multipel auf, besonders häufig am unteren Ende des Femur, an den Unterschenkel- und Vorderarmknochen und an den Rippen, mitunter aber an allen Röhrenknochen. Diese Beobachtungen wurden von Waldeyer und Kühn²⁾ bestätigt, nur betrachten sie, wie auch Taylor, den Vorgang nicht als eine durch Gefässmangel bedingte Nekrose, sondern als einen gummiösen, durch massenhafte Zellneubildung bedingten Process, welcher durch Compression der Gefässe das Absterben des intermediären Gewebes und damit die Trennung der Ep- und Diaphyse zur Folge habe. Mag nun diese oder jene Deutung die richtige sein³⁾, so bleibt uns immer die klinisch wichtige Thatsache, dass es sich an der Epiphysengrenze constant um einen krankhaften Vorgang handelt, der zwar nur in dem kleinsten Theil der Fälle während des Lebens erkennbare Symptome hervorruft (Anschwellung,

¹⁾ Virchow's Archiv. Bd. 50 p. 395.

²⁾ Ibid. Bd. 53.

³⁾ Nach Haak und Viraguth (Virchow's Archiv. 84. Bd. 2. Hft.) soll es sich hauptsächlich um einen entzündlichen Vorgang im Knorpel handeln, wodurch dieser spaltförmig verkleinert wird.

Schmerz, Immobilität), dessen Einfluss auf die Bewegungen der betreffenden Extremitäten aber auch da nicht unterschätzt werden darf, wo andere Symptome fehlen. Eine während des Lebens schon nachweisbare Ablösung der Epiphyse kommt nur ausnahmsweise vor, und zeigt sich dann durch abnorme Beweglichkeit an der Grenze der Epiphyse und eine ungewöhnliche „Schlottrigkeit“ der Hand (Köhner und Waldeyer). Ich selbst konnte nur in einem Falle Crepitation an der betreffenden Stelle nachweisen. Uebrigens kommt die geschilderte Veränderung an den Epiphysengrenzen nicht immer gleichmäßig vor. Bei einem zweimonatlichen Kinde, dessen Vorderarmepiphyse schon während des Lebens deutlich geschwollen waren, fand ich sie gut entwickelt nur an diesen, an den anderen Knochen nur angedeutet, bei einem Kinde von 20 Tagen an allen untersuchten Knochen nur schwach sichtbar¹⁾. Vielleicht hatte hier die seit 20 Tagen mit entschiedenem Erfolge gebrauchte Mercuroleum (alle Ausschläge waren bereits geheilt) auch schon auf die Knochen günstig eingewirkt. Einen Uebergang des krankhaften Processes von den Epiphysen der Knochen auf die anliegenden Gelenke konnte ich nie mit Sicherheit beobachten. Bei einem 6 Monate alten Kinde bestand zwar eine eitrige Entzündung im linken Ellenbogengelenke mit theilweiser Ankylose und Fistelgängen, dieselbe leistete indess der specifischen Behandlung Widerstand. Dagegen wollen andere Autoren (Güterbock²⁾, Schüller³⁾, Parrot, O. Heubner⁴⁾) eitrige Gelenkentzündungen oder periarthritische Abscesse im Gefolge der hereditären Lues beobachtet haben. Die Berechtigung, diese Affectionen als wirklich syphilitische zu betrachten, vermag ich aber doch nicht anzuerkennen, da es sich auch um ein zufälliges Nebeneinandervorkommen handeln kann. Bouchut und Parrot⁵⁾ fanden auch die Epiphysen der Hüftknochen oft ungewöhnlich dicht und hart, und häufig mit periositischen Auflagerungen besetzt, Wegner in seltenen Fällen eine gummiöse Periostitis auf der inneren Seite der Schädelknochen oder kleine gummiöse Knötchen des Pericraniums. Nicht ganz sicher erscheint mir der folgende Fall von Knochenleiden, welcher das Sternum betraf:

Im October 1878 wurde ein gesund und blühend aussehendes Kind von 9 Wochen in die Poliklinik gebracht. Alle Zeichen von Syphilis fehlten. In der Gegend des

¹⁾ Nach Köhner und Waldeyer sind selbst in den Fällen, wo makroskopische Alterationen der Epiphysen fehlen, dieselben durch das Mikroskop sicher zu erkennen.

²⁾ Langenbeck's Archiv, Bd. XXIII, Heft 2.

³⁾ Ibid. Bd. XVIII, Heft 2.

⁴⁾ Virchow's Archiv, 84, Bd. 1881.

⁵⁾ Archiv f. Kinderheilk., 2. Bd. III.

Processus corioformis sterni bestand eine markstückgrosse gerundete Wundfläche, in deren Mitte eine fadenförmige Oeffnung, aus welcher bei der Expiration selbst Eiter einige Luftblasen hervordrang, welche offenbar nur von innen in den Canal eingeöfnet waren. Die Sonde traf auf den rechten erstkürtesten Knochen (Sternum). Nach Aussage der Mutter hatte sich eine Woche nach der Geburt ein Abscess gebildet, welcher geöffnet worden war. Erst am 21. Februar 1879 sah ich das Kind wieder. Nach Ausräumung eines Knochenstückes war die Fistel vollständig geheilt, es bestanden nunmehr aber Kurven, Klagen über die Lippen und Mundwinkel, Eosinofaecien und Emissionen aus den After und an den Genitalien.

Ob in diesem Falle die Nekrose des Brustbeins in der That als eine syphilitische Erscheinung zu betrachten war, wage ich nicht zu entscheiden, weil ich bisher noch nie beobachtet habe, dass ein spezifisches Knochenleiden bald nach der Geburt auftrat und allen andern Symptomen der Krankheit Monate lang vorausging, und die Heilung der Knochenaffektion auch ohne spezifische Behandlung erfolgt war. —

Die infantile Syphilis beschränkt aber ihre Einwirkung nicht auf die Haut, die Schleimhäute und das Knochen-system. Vielmehr können, wie bei Erwachsenen, auch noch andere Organe ergriffen werden, unter denen die Hoden und die Leber als diejenigen zu bezeichnen sind, deren Theilnahme an der Krankheit nicht bloss anatomisch, sondern auch klinisch nachgewiesen werden kann. Die Erkrankung der Hoden war bis auf die neueste Zeit so gut wie unbekannt. Hennig und Taylor erwähnen ihrer nur schenker, und erst Després¹⁾ beschrieb genauer 3 Fälle bei Kindern von 7 Monaten bis zu 3 Jahren, deren einer von Carnil secirt wurde und eine Hypertrophie der Tunica vaginalis, der Albuginea nebst interstitieller Orchitis und Epididymitis ergab. Mir selbst sind seit dem Jahre 1874, also in einer verhältnissmässig kurzen Zeit, mindestens 10 Fälle vorgekommen, welche ich zum Theil schon früher²⁾ mittheilte. Versäumen Sie daher nicht, in jedem Falle von infantiler Lues die Hoden genau zu untersuchen. Der Hoden erscheint dabei mehr oder weniger vergrössert, hart und derb, auch wohl etwas uneben oder höckerig. Das Volumen wechselte von Haselnuss- bis Kastanussgrösse. Beide Hoden fand ich 4mal, ebenso oft den linken allein, 2mal den rechten allein befallen. Das jüngste Kind war 3 Monate, das älteste, von einem Recidiv der Lues befallene, 2½ Jahr alt. Zur Section kam nur ein Fall:

Kind von 2½ Jahren, Ende September 1876 mit breiten Condylomen am After und Perianth syphilitisch in die Klinik gebracht. Beide Hoden beiderseits

¹⁾ Bullet. de la soc. chir. 1875.

²⁾ Deutsche Zeitschr. f. prakt. Med. 1877. No. 11.

vergrössert und knetig. Schmelzwur (täglich 1,0 Ung. nigr.) Nach der 30. Entzerrung sind alle krankhaften Erscheinungen verschwunden, nur die Hoden vergrößert. Tod am 25. December an Erschöpfung. Section: Beide Hoden sehr gross und stark. Das Mikroskop ergab eine ausgesprochene interstitielle Bindegewebshyperplasie im Hoden, am stärksten im Corpus Hyalini. Ganssafa nirgends nachweisbar.

Es handelt sich also in diesem, wie in dem einen Falle von Després und in den späteren Beobachtungen von Huxinck¹⁾, um eine interstitielle Orchitis, vom Theil auch Epididymitis, die, wenn sie bis zur fibrösen Neubildung fortgeschritten ist, wohl jeder Cur widerstehen wird. Nur in einem früheren Stadium dürfen Sie noch eine Rückbildung, wenn auch nicht immer eine vollständige, erwarten, wovon ich mich in 4 Fällen entschieden überzeugt habe. In ganz ähnlicher Weise wie die Hoden kann nun auch die Leber von einer interstitiellen Entzündung befallen werden, welche in einem Theil der Fälle erst bei der Section erkannt wird:

Mädchen von 7 Tagen, natürlich in der Charte geboren. Vater syphilitisch. Die Untersuchung des Kindes ergab Rötze und Parison der Handflächen und Fersenrücken, der Ober- und Unterschenkel und der Nates, hochgradige Atrophie, keine Anschwellung der Leber. Tod an Erschöpfung am 25. November 1875. Section: Interstitielle Hepatitis, Leber etwas vergrößert, sehr dunkel, glatt. Arterien nicht sichtbar. Panniculus überall von weißlichen, aus Bindegewebe bestehenden Streifen durchzogen. Corticalsubstanz der Nieren äusserst dünn. Magenfundus vacant und innen hämorrhagisch, die Schleimhaut diffus mit einer weisslichroth zusammenhängenden Schicht blutigen Schleims überzogen. An verschiedenen Rippenknöcheln die gelbe Epiphysearose; am rechten Humerus periostische Auflagerungen. Als Diaphyse einem hart.

Während in diesem Falle die interstitielle Hepatitis erst auf dem Sectionstisch erkennbar war, und nach der blutigen Catarrh des Magenfundus, möglicher Weise eine Folge der Stauung in der Pfortaler, symptomlos blieb, macht sich in anderen Fällen eine Anschwellung der Leber bemerkbar, welche die Diagnose gestattet:

Felix L., 2 Monate alt, bekam im Alter von 6 Wochen einen sich allmählig über den ganzen Körper verbreitenden maculösen Ausschlag. Stellenweise schienen erbsengrösse, mit trübem Inhalt gefüllte Blasen auf, am Scrotum und in der Umgebung des Anus bildete sich lateritige, seit etwa 4 Wochen auch Krusten und Erosionen. Am 15. März 1864 constatirte ich neben allen gewöhnlichen Symptomen der hereditären Lues eine beherrschende Anschwellung der Leber. Derselbe reichte bis zum Nabel des Kindes herab, wo ihr oberer Rand leicht durchzufühlen und bei jeder Inspiration durch die atrophischen Bauchdecken hindurch sichtbar war. Oberfläche glatt, nicht empfindlich. Die Leberumfang ging nach links unmittelbar

¹⁾ Berne mém. de G. 2. 1878.

in die der Milz über. Die Mercuriellbehandlung blieb erfolglos, die Atrophie nahm zu, und schon am 25. erfolgte der Tod. Bei der Section fand sich eine ausserordentlich vergrösserte, mit vielen weisslichgelben, mehr oder minder unregelmässigen Herden und Streifen durchsetzte Leber, welche bei der von Prof. Klebs vorgenommenen mikroskopischen Untersuchung der Einscheidungen der interstitiellen Hepatitis darbot. Milz und Nieren makroskopisch normal.

Kind von 9 Wochen (7. Febr. 1881). Seit der Geburt mässiger Icterus mit Färbung der Sklera und der Schleimhäute. Faeces und Urin gallig. Leber prominent, glatt. Keine Zeichen von Lues, zunehmende Atrophie. Behandlung mit Calomel ohne Wirkung. Tod am 28. Febr. im Collaps. Section: Leber sehr gross, dick, atrophisch, leib. Anteil durch weisse Bindegewebsstränge, deren Massenhaltigkeit besonders mikroskopisch nachweisbar ist, von einander getrennt. (Hepatitis interstitialis.) Magen- und Duodenaleinhalt stellenweise blutig saffrandirt. An allen Rippenepiphysen die charakteristische syphilitische Zone. Sonst nirgends Zeichen von Lues. — Bald darauf kam mir ein fast identischer Fall vor, der noch desshalb bemerkenswerth ist, weil dieselbe Mutter schon drei Kinder an dieser mit Icterus verbundenen Leberaffection verloren hatte.

Bei einigen Kindern in den ersten Monaten des Lebens beobachtete ich ebenfalls neben den Exanthemen, Kandyloemen und der Koryza eine mehr oder minder bedeutende palpable Anschwellung der Leber, welche in Folge der mercuriellen Behandlung ebenso zurückging, wie die früheren Stadien der Oculitis syphilitica. Immerhin aber gehören diejenigen Fälle, wo die Erkrankung der Leber klinisch nachweisbar ist, meiner Erfahrung nach zu den Seltenheiten, und selbst die Sectionen liessen dieselbe in sehr vielen Fällen wenigstens makroskopisch vermissen. Nach wem mehr gilt dies von der Milz, den Nieren und dem Pankreas, Organen, welche ebenfalls hier und da als Sitz interstitieller Bindegewebswucherung bezeichnet worden sind. Dieselben bieten uns ebenso wenig ein klinisches Interesse dar, wie die gummiösen Knollen, welche besonders in der Thymusdrüse und in den Lungen gefunden werden. Einen deutlich palpablen Milztumor konnte ich nur einmal bei einem 6 Wochen alten sehr atrophischen Kinde mit Lues hereditaria constation. Thymusabszesse, auf welche P. Dubois besonderen Werth legte, fand ich nur einmal in Form kaum erbsengrosser multipler Eiterherde, und zwar bei Kindern, die schon in der ersten Lebenswoche zu Grunde gingen und gleichzeitig vielfache Pemphigushäuten, besonders in den Hand- und Fussflächen darboten.

Die Theilnahme der Nervencentra, besonders des Gehirns und seiner Gefässe an der Syphilis, welche in unserer Zeit vielfaches Interesse erregt hat, scheint nach meinen Erfahrungen bei Erwachsenen weit häufiger vorzukommen als bei Kindern.¹⁾ In vereinzelten Fällen beob-

¹⁾ Chiriac (Wiener med. Wochenschr. 17 u. 18. 1881) beschreibt einen Fall

achtete ich Contracturen, welche durch eine spezifische Cur gebessert oder geheilt wurden. Der erste Fall dieser Art¹⁾ betraf einen 14 Monate alten Knaben, der am 24. November 1867 in meine Poliklinik gebracht wurde.

Die Untersuchung ergab eine Contractur des rechten Arms im Ellenbogengelenk, der nachstehenden Finger und beider unteren Extremitäten in den Kniegelenken. Stehen, Sitzen, Greifen mit der rechten Hand unmöglich. *Biceps brachii* und die Flexoren der Unterarmeskel straff gespannt, jeder Versuch, die Theile zu strecken, erzeugt heftiges Geschrei. Gleichmäßig beiderseits Papeln um den Ansatz und auf dem Scrotum, Excoriation der Nasenflügel und Mundwinkel, Koryza, Anschwellung der Ovarien und Adhäsionen. Die Anamnese ergab, dass das Kind Monate lang an einer starken Koryza, an einem „Blasenauschlag“ und Geschwüren, und im Alter von 3 Wochen mehrere Tage an spätstehendem Krämpfen gelitten hatte, worauf die Contracturen sich allmählig entwickelt haben sollten. Nachdem das Kind einen Monat lang Mercur genommen hatte, konnte es am 23. Dec. die rechte Hand öffnen, auch die Knie etwas beugen. Bis zum 3. Febr. 1868 allmähliche Besserung. Am 27. Uebergang zum Jodkali. Am 30. März lag das Kind zu stehen und den rechten Arm zu gebrauchen. Weiterer Verlauf unbekannt.

Der Einfluss der antisypilitischen Behandlung ist hier unverkennbar. Dennoch fragt es sich, ob die Contracturen in der That als eine centrale Affection, welche dann mit den früher überstandenen Krämpfen in Verbindung zu bringen wäre, oder als eine vom Nervensystem ganz unabhängige myopathische, durch eine interstitielle Myositis bedingte Affection, wie sie auch bei syphilitischen Erwachsenen hin und wieder vorkommt, betrachtet werden sollen. Dass die letztere auch bei der hereditären Syphilis vorkommen kann, scheint mir durch folgenden Fall bewiesen zu werden:

Bei einem 4 Monate alten syphilitischen Kinde (October 1874 in die Poliklinik gebracht) bestand eine starke Contractur und Härte der an der hinteren Partie beider Oberarmeskel liegenden Flexoren des Unterarmes, wodurch die Beuge vollständig in halber Biegung gehalten wurden. Streckung der Unterarmeskel im Knie war nur theilweise möglich. Der notwendige Gebrauch des Querschnitts bewirkte vollständige Heilung, trotz der Hämoptysen, schliesslich auch der Contracturen.

Eigentlich cerebrale Symptome konnte ich bei der Syphilis infantilis nicht beobachten, insbesondere niemals wirkliche Lähmungen einzelner oder mehrerer Extremitäten, oder convulsivische Anfälle. Um so bemerkenswerther erschien mir der folgende Fall:

Bei einem 2jährigen Kinde (am 6. Sept. 1877 in die Kinderklinik aufgenommen) bestand neben Pseudotubercle ein ungewöhnliches psychisches Wesen, ein

von Endarteritis luetica der Hirngefäße bei einem 15 Monate alten hereditär syphilitischen Kinde.

¹⁾ Beiträge zur Kinderheilk. N. F. Berlin 1868. p. 421.

Verlust von Abhängigkeit und Stumpfsinn, aber ohne irgend eine Mollitasierung. Nach dem an Diphtherie erfolgten Tode ergab die Section unter der Pia und an verschiedenen Stellen der Gehirnrinde, auch im kleinen Gehirn mehrere käsige kirschgrosse Tumoren, die in die Peripherie ganz durchströmten, im Centrum klein verhielten, theils verkalbt waren. Ein ähnlicher Herd fand sich im obern Theil der linken Niere. Da in keinem Theile Tuberkel verkalben, aber auf beiden Seiten periaortale Auflagerungen gefunden wurden, liegt es nahe, die Gehirntumoren als syphilitische Gummata zu betrachten, wofür sie auch nach der mikroskopischen Untersuchung im pathologischen Institut der Charité erklärt wurden.

Ueber andere Fälle dieser Art verfüge ich nicht, doch findet man in der Literatur vereinzelte Mittheilungen über ähnliche Befunde, z. B. von Barlow⁵⁾ (gummatöse Erkrankung der Gehirnnervenwurzeln und bösartige Veräuterungen der Arteria basilaris und anderer Hirnarterien bei einem 15 Monate alten Kinde), die indess allein auf der mikroskopischen Untersuchung basirt sind. Bedenkt man nun, dass die Diagnose zwischen Gummata und Tuberkel durch das Mikroskop nicht mit Sicherheit gestellt werden kann, dass also die begleitenden Erscheinungen, der Verlauf und schließlich der Erfolg der Behandlung eines in diagnostischer Beziehung viel höheren Werth haben, so wird man in der Beurtheilung solcher Fälle sehr skeptisch sein müssen. Auch in anderen Gebieten des Gefäßsystems Neugeborener fand man Veränderungen, die an die „luetischen Erkrankungen“ der Hirngefäße erinnern; so schädelt Schütz⁶⁾ die kleinen Arterien der Nieren und der Haut als stark verengt, ihre Wandungen durch Hypertrophie der Muskelelast und Adventitia bedeutend verdickt, und leitet davon die vielfachen kleinen Ekchymosen her, welche sich bei diesem Kinde (einer Frühgeburt) auf der Haut, im Unterhautzellgewebe, in den Muskeln, den Nieren und in anderen Theilen vorfinden. Vorläufig bedarf es wohl noch weiterer Beobachtungen auch dieser Richtung hin, um die Frage zu entscheiden, ob solche Gefäßveränderungen, wie sie hier als syphilitische geschildert werden, in der That nur durch die Syphilis bedingt sind. Bestätigt sich dies, so würde die von Behrend versuchte Aufstellung einer „hämorrhagischen“ Form der Syphilis neonatorum, deren Berechtigung ich noch nicht anerkennen kann, eine wesentliche Stütze erhalten. —

Der Verlauf und Ausgang der hereditären Syphilis wird nach allen Erfahrungen weniger durch die Art der Symptome, als durch den Ernährungszustand der Erkrankten bestimmt. Syphilitische Säuglinge, welche sich einer natürlichen Ernährung durch die Mutter oder eine

⁵⁾ Lancet 1877, I, p. 645.

⁶⁾ Prager med. Wochenschr. 1875, No. 43, 46.

Amme zu erfreuen haben, gedeihen bei einer spezifischen Cur meistens gut und leisten die besten Aussichten auf eine vollständige Wiederherstellung dar. Dagegen hatte ich alle künstlich ernährten Kinder, besonders diejenigen, welche von Geburt an schwach und atrophisch sind, für sehr gefährdet, die letzteren sogar fast immer für verloren. Während ich in der Privatpraxis und selbst in der Poliklinik von einer sehr grossen Zahl syphilitischer Kinder nur einzelne durch zufällige Complicationen verloren habe, sah ich in der Kinderabtheilung der Charité fast alle Fälle, und dies waren ausnahmslos hochgradig atrophische, zu Grunde gehen. Der Tod erfolgt nicht selten ganz plötzlich, was schon von Trousseau hervorgehoben wurde, meiner Ansicht nach aber durchaus nichts besonderes ist, da plötzliche Todesfälle bei atrophischen Kindern überhaupt ziemlich oft vorkommen. Unter günstigen Verhältnissen nimmt die Krankheit oft überraschend schnell eine glückliche Wendung. Man ist erstaunt, Ausschläge, Kondylome, Kautschumschwellungen unter dem Einflusse des Quecksilbers schon nach 5—6 Tagen sich vermindern und nach wenigen Wochen gänzlich schwinden zu sehen. Aber ich warne Sie hier vor der Ueberschätzung Ihrer Erfolge. Recidive gehören bei der Syphilis infantilis zu den häufigen Erscheinungen, und gerade in Polikliniken, wo die Kinder schon nach dem ersten Schwinden der Symptome so oft der weiteren Beobachtung entzogen werden, hat man Gelegenheit, sich von dieser Thatsache zu überzeugen:

Kind von 6 Wochen, am 7. Januar 1874 mit tiefen Symptomen der Syphilis vorgestellt. Heilung Ende Februar durch Mercur. Wieder vorgestellt am 20. April mit einem seit 3 Tagen bestehenden Recidiv. Heilung am 26. Recidiv am 18. Juni.

Knabe von 2 Jahren, geboren von einer syphilitischen Mutter, deren sämtliche Kinder inficirt waren. Lues infantilis im zweiten Lebensmonat. Einige Wochen später in der Poliklinik an Erosionen der Mundwinkel und der Zunge behandelt. Am 15. Mai 1874 Recidiv; seit 8 Wochen Kondylome am Anus und auf dem Zungenrücken, die hinten dunkelroth hart inficirt, vorn mit grauweisser Schicht bedeckt erscheint. Erste Juni Heilung durch Mercur. Am 14. November Recidiv der Kondylome am After. Am 9. Januar 1875 abermals Recidiv, welches eine neue Behandlung erfordert.

Mädchen von 5 Jahren, mit breiten Kondyloren am Anus und Anschwellung der Inguinaldrüsen. Erster Ausbruch der Lues im Alter von 5 Wochen, zweiter zu $1\frac{1}{2}$ Jahren, dritter am Ende des 5. Lebensjahres.

Man sollte daher die Behandlung auch nach dem Verschwinden aller Symptome nicht sofort abbrechen, sondern immer noch wenigstens einige Wochen fortführen, obwohl auch dann die Gefahr eines Recidivs nicht beseitigt ist. In den meisten Fällen gelingt es aber doch, die Krankheit innerhalb des ersten oder wenigstens des zweiten Jahres vollständig zu heilen, und ich verfüge über eine genügende Zahl von Beobachtungen

aus der Privatpraxis, um behaupten zu dürfen, dass die Sache damit für immer abgethan war. Dennoch müssen Sie immer auf das Wiederaufkommen der Krankheit auch noch in den späteren Kinderjahren gefasst sein, und es können unter diesen Umständen Zweifel darüber entstehen, ob man es mit einem Recidiv der hereditären Lues, oder mit einer directen Ansteckung, oder mit der sogenannten „Syphilis tarda“ zu thun hat, worauf ich an einer späteren Stelle zurückkommen werde. Aber selbst in den Fällen, wo schon von vornherein die Krankheit durch eine ausdauernde Behandlung gründlich geheilt wurde, bleibt doch nicht selten eine Störung im Organismus zurück, welche denselben zur Entwicklung der Rachitis disponirt. Ich sah diese Krankheit nach der Heilung der Syphilis hereditaria wiederholt bei Kindern auftreten, welche sich in den günstigsten Lebensverhältnissen befanden und mit der grössten Sorgfalt gepflegt wurden, muss aber schon hier gegen die unlogische Ansicht Parrot's Front machen, welcher die Rachitis durchweg als eine Folge der Syphilis betrachtet. —

So leicht nun in den meisten Fällen die Diagnose der infantilen Syphilis ist, ebenso schwer ist es oft, den Ursprung derselben mit Sicherheit nachzuweisen. Mit äusserst seltenen Ausnahmen müssen alle Fälle, welche sich bereits innerhalb der ersten beiden Lebensmonate entwickeln, als hereditäre betrachtet werden. Ich führte bereits an, dass die erbte Lues bisweilen schon in den ersten Lebenstagen in der Form des Pemphigus zur Erscheinung kommt, und einzelne der oben mitgetheilten Fälle beweisen, dass schon in den beiden ersten Wochen auch andere syphilitische Hautaffectionen mit Korym auftreten können. Weit häufiger aber lassen die Kinder in den ersten 4 bis 6 Wochen gar keine auffallenden Erscheinungen dar, und erst nach Ablauf dieser Zeit machen sich Symptome bemerkbar. Jenseits des zweiten oder gar des dritten Monats ist die erste Entwicklung selten¹⁾, und bei noch späteren Terminen bleibt es immer zweifelhaft, ob nicht ein Recidiv oder eine directe Uebertragung der Krankheit vorliegt. Die letztere lässt sich freilich nicht leicht feststellen, und besonders unter solchen Umständen, welche Geständnisse von Seiten der Eltern erschwern oder verhindern, wird oft der Versuch gemacht, den Arzt von dem Gedanken der Erblichkeit abzulenken und ihn durch falsche Vorspiegelungen einer syphilitischen Amme oder Wärterin, die das Kind angesteckt habe, zu täuschen. Die Möglichkeit einer solchen Infection will ich nun keines-

¹⁾ Roger fand unter 249 Fällen die ersten Symptome 115mal im ersten, 217mal vor dem Ende des dritten Monats, aber nur 22mal nach demselben.

wegs in Abrede stellen; doch ist von den Fällen dieser Art, die mir selbst vorkamen, kein einziger so sicher festgestellt, dass ich den hereditären Ursprung absolut ausschliessen konnte. Wohl aber beobachtete ich die directe Uebertragung der Lues auf Säuglinge in armen Familien durch syphilitische Frauenzimmer, welche die Wohnung derselben theilten und mit den Kindern viel verkehrten, vielleicht auch durch Schwämme und andere gemeinsam benutzte Toilettengeräthe. Dagegen ist die früher oft angenommene Infection des Kindes während der Geburt durch die syphilitisch erkrankten Genitalien der Mutter (*Syphilis adnata*) sehr zweifelhaft, z. B. der Fall Troussseau's, welcher einen „infiltrirten Schanker“ an den Nates eines Kindes von dem Contact mit der infiltrirten Vulva der Mutter herleitete. Ich selbst habe einen Fall dieser Art ebensowenig gesehen, wie eine Ansteckung durch die Vaccination, welche in unserer Zeit als „*Syphilis vaccinalis*“ viel Staub aufgewirbelt hat. Dass durch die Einimpfung der Vaccinolymphe, die von einem syphilitischen Kinde stammt, mag von etwas Blut damit vermischt sein (Viennols) oder nicht, eine Uebertragung der Krankheit möglich sei, wird man wohl nicht mehr bestreiten können, nachdem die Contagiosität der secundären Lues überhaupt zweifellos festgestellt ist, und es lässt sich auch nicht leugnen, dass manche der von den Autoren mitgetheilten Fälle von Impf-syphilis beweiskräftig erscheinen. Dennoch beruht über diesen Punkt noch Streit, und ich halte mich um so weniger für berufen, hier ein bestimmtes Urtheil abzugeben, als mir selbst, wie ich schon bemerkte, noch kein einziger wohlconstatirter Fall vorgekommen ist, wohl aber viele Fälle, wo nach der Vaccination Geschwüre an den Impfstellen und verschiedene Ausschläge auftraten, welche dem ungeübten oder oberflächlich Unterscheidenden sehr leicht als Syphilis imponiren konnten, mit dieser Krankheit aber gar nichts zu thun hatten. Ich bin von der Häufigkeit dieser Irrthümer vollständig überzeugt und berufe mich, als auf einen positiven Beweis, noch auf die Arbeit von Joukoffsky⁷⁾, welcher 57 Kinder, die von 11 syphilitischen Impflingen abeingepft wurden, absolut frei von der Krankheit bleiben sah. Auch erinnere ich daran, dass die Lues eine regelmässige Entwicklung der Vaccine zwar nicht hindert, dass aber eine bis dahin latente Syphilis durch Verletzungen, also auch durch die Impfung, manifest werden und dadurch fälschlich die Annahme einer Uebertragung durch die Lymphe entstehen kann. Noch viel weniger fürchte ich die Uebertragung durch die Milch einer syphilitischen Amme, falls nur die Brustwarze derselben gesund ist.

⁷⁾ Oestrich, Jahrb. f. P. V. 2. p. 139.

Trotzdem versteht es sich von selbst, dass Sie ebenso wenig eine suspecte Amme wählen, als die Vaccinelymphi eines Kindes benutzen werden, welches nachweislich Erscheinungen von Lues darbietet oder dargeboten hat.

Abgesehen von vereinzelten Ausnahmen ist also die ganze Summe der in den ersten Monaten des Lebens sich entwickelnden Fälle von Syphilis als hereditär zu betrachten. Mit besonderem Eifer hat man seit langer Zeit das Studium dieser Erblichkeit betrieben¹⁾, und wenn trotzdem bis auf den heutigen Tag noch keine Einigkeit unter den Autoren erzielt ist, vielmehr die Ansichten derselben in vielen Punkten von einander abweichen, so beweist dies nur, wie schwer es ist, sich Klarheit über Dinge zu verschaffen, die ihrem Wesen nach nur durch offene Geständnisse der Beteiligten erkannt werden können. Jeder Tag aber bringt uns neue Beispiele dafür, dass gerade in Bezug auf Syphilis die Beteiligten nur selten volles Vertrauen verdienen und dass der Arzt trotz der sorgfältigsten Nachforschung hier argen Täuschungen ausgesetzt ist. Mit Sicherheit wissen wir, dass die Vererbung der Lues sowohl von väterlicher wie von mütterlicher Seite her erfolgen kann. Der Vater überträgt die Krankheit unmittelbar durch den Samen, mit welchem er die Frau schwängert, die Mutter durch die Eizelle, aus welcher sich der Fetus entwickelt. Die Eltern müssen also secundär syphilitisch sein, und primäre Affectionen könnten nur insofern einflussend auf das Kind wirken, als sie die Entwicklung secundärer Erscheinungen bei der Mutter während der Schwangerschaft herbeiführen, eine Quelle der hereditären Lues, welche von manchen Autoren, z. B. Kassowitz, entschieden in Abrede gestellt wird. Ob diese Ansicht aber richtig, ob nicht vielmehr eine Infection des Fetus durch das ernährend Blut der nachträglich syphilitisch gewordenen Mutter möglich ist, halte ich noch keineswegs für ausgemacht, letzteres vielmehr für sehr wahrscheinlich. Dingen, welche eine solche Uebertragung durch das Blut leugnen, sprechen sich natürlich auch gegen die Möglichkeit aus, dass eine von Syphilis freie Mutter durch das Blut ihres von väterlicher Seite her luetischen Fetus angesteckt werden könnte; andere (z. B. Zeissl) halten dies allerdings für möglich; besonders Hutchinson und neuerdings Fournier berufen sich hier auf die Erfahrung, dass Frauen, die mit syphilitischen Männern verheirathet sind, nicht selten erst dann angesteckt werden, wenn sie concipiren, nicht aber so lange die Ehe unfruchtbar

¹⁾ Kohner, Klinische und experimentelle Mittheilungen aus der Dermatologie und Syphilidologie. Erlangen 1864.

bleibt. Auch einige neue Beobachtungen von Behrend¹⁾ sprechen entschieden dafür, dass eine solche „Placentarinfektion“ vorkommt, aber keineswegs nothwendig eintreten muss. Wie dem auch sei, so viel ist sicher, dass syphilitische Mütter ungemein häufig abortiren oder nicht lebensfähige Früchte zu früh zur Welt bringen, deren oft macerirte und abgelöste Epidermis irrtümlicher Weise für das Product eines fötalen Pemphigus gehalten wird. Diese Neigung zur Frühgeburt, welche auf einer Endometritis decidialis, Verdickung der Placenta oder auf ungetragenen gummiösen Wucherungen derselben beruht (Virchow), vielleicht auch auf Atherom oder Endarteritis syphilitica der Nabelvene (Winckel), ist in diagnostischer Beziehung bedeutsam, insofern sie in zweifelhaften Fällen von *Luës hereditaria* die Waagschale zu Gunsten desselben belastet.

Durch die Länge der Zeit und besonders durch wiederholte spezifische Curen kann eine Abschwächung oder temporäre Heilung der Eltern erfolgen, wodurch sich wohl die Thatsache erklärt, dass im Anfange solcher Ehen die Neigung zum Abortiren am stärksten ist, allmählig aber mehr und mehr schwindet, dass ferner die zuerst geborenen Kinder besonders heftig befallen zu werden pflegen, und die später folgenden gesund bleiben können. Nicht selten beobachtet man aber eine merkwürdige Alteration gesunder und syphilitischer Kinder, die nur daraus zu erklären ist, dass die *Luës* der Mütter von Zeit zu Zeit wieder manifest wird, zu anderen Zeiten in einem Zustande von Latenz verhaart, welcher die Gesundheit des Fötus nicht zu gefährden braucht. Auf diese Weise kann die Möglichkeit der Vererbung sehr lange bestehen bleiben; Kassowitz schätzt sie auf 10 bis 14 Jahre, aber der folgende von mir beobachtete Fall lehrt, dass sogar 20 Jahre darüber hingehen können:

Der Vater des betreffenden Kindes war als Bräutigam mit einem noch nicht völlig geheilten Schanker in die Ehe getreten. Das erste Kind, welches ein Jahr nach der Hochzeit geboren wurde, soll wiederholt an Anschwellungen der Schenkelgelenke gelitten haben, und ich selbst hatte Gelegenheit, bei diesem Kinde, als es zu einem jungen Mädchen von 17 Jahren heranwachsend war, noch eine umfangreiche Erythrasme am linken Hüftgelenke zu feststellen. Die Mutter selbst litt während der neunzehnjährigen Ehe wiederholt an vorübergehenden Anginen und hartnäckigen Geschwüren in der Umgebung der Kniegelenke, welche immer durch Jodkali und Iodoform, Zinnmercur behandelt werden mussten. Während dieser langen Zeit gebor sie noch zwei völlig gesunde Kinder, abortirte dann aber mehrere Mal, bis sie im 20. Jahre der Ehe wieder von einem Kinde entbunden wurde, welches 14 Tage nach der Geburt von den ausgeprägten Erscheinungen der hereditären Syphilis befallen wurde und einer längeren Mercurialkur unterworfen werden musste.

¹⁾ Berl. klin. Wochenschr. 1883. p. 107.

Später wurde er in hohem Grade neblisch, litt öftlich an Convulsionen und Blödsinn, wuchs aber schließlich, Dank einer vortheilhaften Pflege, zu einem gesunden Jüngling heran.

Ob es möglich sei, an der Form der infantilen Lues den väterlichen oder mütterlichen Ursprung derselben zu erkennen, bezweifle ich vorläufig. Die Ansicht von Bärensprung, Hecker und Kaysel¹⁾, dass die infantile Syphilis, besonders die Affection der Leber, die Vererbung von väterlicher Seite her constatare, scheint mir mit Rücksicht auf die unüberwindlichen Schwierigkeiten, welche sich hier einer sicheren Annahme entgegenstellen, noch keineswegs sicher gestellt zu sein. —

Ich komme nun zur Behandlung der Krankheit. Meine reichen Erfahrungen in diesem Gebiete fasse ich in dem kurzen Satze zusammen: das einzig sichere Heilmittel der infantilen Syphilis ist das Quecksilber. Die Wirkung desselben ist, wie ich schon oben bemerkte, oft geradezu erstaunlich und durch ihre Schnelligkeit in hohem Grade überraschend. Weder Jodkali, noch Jodoësen, die von Munkes empfohlen wurden, hatten einen Vergleich mit dem Mercur aus. Von den Mercurialpräparaten ziehe ich für das zarte Lebensalter, in welchem sich die Kranken befanden, das Calomel und das Hydrargyrum oxydul. nigrum, in Dosen von 0,01 bis 0,015 früh und Abends gegeben, allen anderen vor. Letzteres bewirkt bisweilen, namentlich im Beginn der Cur, Erbrechen. Jede andere Eiaverleibung des Quecksilbers, etwa durch Mercurialisirung der Aune oder gar eines milchgebenden Thieres halte ich für unstatthaft, und zwar um so mehr, als der Uebergang des Quecksilbers in die Milch noch keineswegs zweifellos ist. Wenigstens zeigten die in dieser Richtung unternommenen Versuche von Kahler²⁾, dass die Milch dreier einer Schmiercur unterworfenen Mütter vollkommen frei von Quecksilber war. Ebensovienig kann ich Ihnen die Einreibungen mit grauer Salbe oder die subcutanen Injectionen von Sublimat für die Behandlung der Syphilis hereditaria empfehlen. Derselben könnten nur da in Betracht kommen, wo ausgebreitete syphilitische Hautausschläge nicht vorhanden sind, oder wo intestinale Complicationen (Diarrhoe, Erbrechen) den inneren Gebrauch des Mercur verbieten. Alle Kinder, bei denen ich die Inunctionscur mit grauer Salbe in Gebrauch zog, waren schon über das zweite Lebensjahr hinaus, und litten an Syphilis recidiva, welche sich im Allgemeinen mehr durch condylomatöse Bildungen, als durch ausgebreitete Exantheme charakterisirt (Einheilung von 1,0 bis 2,0 Ungent.

¹⁾ Bayr. ärztl. Intelligenzbl. 1876, No. 21.

²⁾ Ärztl. Correspondenzbl. 1875, No. 23.

einer, täglich). Auch Sublimatsingspritzungen machte ich in diesen Fällen mit gutem Erfolg, worauf ich bei der Betrachtung der Syphilis älterer Kinder zurückkommen werde. Von den Bädern mit Sublimat (1,0 auf ein Eßl.) sah ich in zahlreichen Versuchen keine constante Wirkung, und empfehle sie Ihnen daher nur für die Fälle, welche durch fortgeschrittene Atrophie, Erbrechen oder Diarrhoe die innerliche Anwendung des Mercur bedenklich erscheinen lassen.

Kondylomatöse Wucherungen werden mit Calomel beupst, oder wenn sie bereits geschwärtzt waren, mit einer Auflösung von Lapis infern. (0,5 : 15 Wasser) täglich gepinselt. Letzteres empfehle ich auch für die Nasenschleimhaut, falls die Koryza hartnäckig den inneren Mitteln widersteht; in den meisten Fällen aber reicht die interne Cur zur Heilung derselben aus.

Die eminente Wichtigkeit der natürlichen Ernährung für syphilitische Säuglinge wurde schon oben erwähnt. Es versteht sich von selbst, dass, wenn die Mutter selbst syphilitisch ist, sie auch ihren kranken Säugling ohne Bedenken nähren kann. Anders verhält sich die Sache, wenn an der Mutter absolut keine Zeichen der Krankheit wahrzunehmen sind und auch jede vorausgegangene syphilitische Affectio in Abrede gestellt wird. Unter diesen im Allgemeinen selteneren Umständen dürfte das Selbstnähren nur dann zu gestatten sein, wenn die Lippen und die Mundhöhle des Kindes keine krankhaften Erscheinungen (Blasen, Kondylome) darbieten. Dasselbe gilt von der Amme, da es keinem Zweifel unterliegt, dass ein solches Kind die Syphilis auf die wund gewordene Brustwarze einer gesunden Amme übertragen, dass spezifische Geschwüre an der Mamma und weiterhin secundäre Erscheinungen sich auf diesem Wege entwickeln können. Selbst das Saugen an der Koryza muss als ein beim Säugen an der Mamma nicht unbedenkliches Moment betrachtet werden (Roger). Allerdings lassen sich die Beobachtungen von Günsburg¹⁾ gegen eine solche Ansteckung geltend machen, indem derselbe von 31 Ammen syphilitischer Kinder (eine Amme nährte sogar 11 solcher Kinder zwei Jahre hintereinander) nicht eine einzige erkranken sah und daraus schließt, dass die hereditäre Lues auf die Säuglinge nie übergehe, dass vielmehr alle Fälle, in welchen dies geschehen sein soll, durch eine erworbene Syphilis der Kinder zu erklären seien. Ich halte indess diese etwas gezwungene Deutung gegenüber den Beobachtungen einer Infection gesunder Ammen durch zweifellos hereditär syphilitische Kinder für sehr problematisch, und rathe Ihnen daher zur Vorsicht.

¹⁾ Oesterr. Jahrb. f. K. 1872. II. p. 368.

Meiner Ansicht nach ist der Arzt verpflichtet, die Amme von der Lues des ihr anvertrauten Kindes in Kenntnis zu setzen und ihr die Möglichkeit einer Infection vorzustellen. Es bleibt ihr dann überlassen, ob sie, betrogen durch reichliche Entschädigung, sich dieser Gefahr aussetzen will oder nicht. Wenn auch bei dieser Gelegenheit die bedenklichsten Familiengeheimnisse zu Tage treten können und der Arzt sich einer Infringation schuldig macht, so glaube ich doch, dass alle diese Gründe uns nicht veranlassen dürfen, eine gesunde Amme ohne ihr Wissen der syphilitischen Infection auszusetzen. Die Sache ist inless nicht so schlimm wie sie aussieht, denn die Ammen gehen fast alle auf die Anerbittungen ein, und bleiben auch in den meisten Fällen frei von Syphilis. Wenigstens hatte ich selbst noch keine Gelegenheit, eine auf diesem Wege entstandene Infection der Amme zu beobachten, obwohl mehrere der betreffenden Brustkinder im hohen Grade hereditär syphilitisch waren. Die grösste Beilichkeit und besonders die sorgsamste Beobachtung jeder an der Mamma entstehenden Excoriation ist dabei der Amme zur Pflicht zu machen. Durch Rhagaden der Lippen und durch hochgradige Koryza kann dem Kinde zwar das Saugen erschwert werden, doch sah ich daraus nie eine Gefahr für die Ernährung erwachsen.

Schliesslich noch ein paar Worte über das Verhalten des Arztes den Eltern gegenüber. Während in der Armen- und poliklinischen Praxis der unumwandene Ausdruck des Arztes, dass das Kind syphilitisch sei, fast niemals böse Folgen hat, pflegt diese Erklärung in den höheren Gesellschaftsklassen ernste Familienereignisse nach sich zu ziehen. Ich rathe Ihnen daher, falls Sie nicht spontane Geständnisse bekommen, Ihre Ueberzeugung für sich zu behalten, nur die Amme und, wenn Sie der völligen Unschuld der Mutter sicher sind, den Vater ins Vertrauen zu ziehen. Glücklicher Weise ist das Bild der Krankheit charakteristisch genug, um auch ohne Geständnisse der Eltern die Diagnose stellen und die passende Behandlung einleiten zu können. Dennoch bleibt die Constatirung des Gesundheitszustandes der Eltern immer ein emment wichtiges Moment, weil nur durch eine ausreichende spezifische Behandlung derselben verhindert werden kann, dass die noch folgenden Sprösslinge der Ehe ebenfalls syphilitisch werden.

Trotz dieses charakteristischen Krankheitsbildes kommen inless zuweilen Fälle vor, in denen selbst der erfahrene Arzt nicht im Stande ist, mit Sicherheit die Diagnose der Syphilis zu stellen, wo es also im höchsten Grade unbesonnen wäre, durch halbe Bedensarten und Fragen die Eltern in Aufregung zu versetzen. Man bemerkt z. B. eine intertriginöse Rötze um den Anus und die Genitalien, inmitten derselben lie-

und da oberflächliche runde Erythematismen. Diese Intertrigo verbreitet sich allmählig, trotz aller Reinlichkeit, über die untere Partie des Rückens oder über den grössten Theil des Rumpfes, und die geröthete Haut bedeckt sich mit gelblich weissen Lamellen, die aus abgestossenen mit Serum vermischten Epidermiszellen bestehen. Oder es bilden sich in den intertriginösen Hautfalten, besonders in den Inguinalgegenden, langliche, mit grauweissen Belag versehene, in die Tiefe dringende Ulcerationen. Zufällig können auch Koryza oder rothe Flecken an verschiedenen Stellen hinzutreten und die Diagnose noch schwankender machen. In den meisten Fällen dieser Art werden Sie durch das Freibleiben der Lippen und Mundwinkel vor Irrthümern bewahrt bleiben; keinesfalls aber wird es schaden, wenn Sie, um Ihr ärztliches Gewissen zu beruhigen, die von mir empfohlene Mercurialbehandlung einleiten, wobei es sich dann bald herausstellen wird, ob in der That Syphilis vorliegt. —

Ich schliesse das Kapitel mit einigen Bemerkungen über die Syphilis des späteren Kindesalters, welche ich, zumal in meiner klinischen Abtheilung, in einer ansehnlichen Reihe von Fällen zu beobachten Gelegenheit hatte.

Die 28 Kinder, welche ich dieser Schülervorlesung zu Grunde lege, befanden sich in dem Alter zwischen 2 und 12 Jahren, und waren mit Ausnahme von 6 sämmtlich Mädchen. Die möglich sorgfältige Anamnese ergab nur in 6 Fällen mit Sicherheit, dass die syphilitischen Erscheinungen als Residive einer bereits in den ersten Lebensmonaten zum Vorschein gekommenen Lues hereditaria zu betrachten waren; in allen anderen Fällen liess sich ein solcher Zusammenhang nicht mit Bestimmtheit nachweisen, und man blieb daher unter diesen Umständen im Zweifel darüber, ob man es mit einer hereditären oder mit einer durch spätere Ansteckung erworbenen, von den Angehörigen aber absichtlich verschwiegenen Form zu thun hatte. Ich ziehe das Geständniss dieses Zweifels jedenfalls der Annahme einer sogenannten Syphilis tarda vor, d. h. einer Form, welche, obwohl hereditär, doch erst im späteren Kindesalter, im 8. bis 12. Jahre und gar noch später, zum ersten Mal in die Erscheinung treten soll. Dass eine solche Syphilis tarda möglicher Weise vorkommt, will ich keineswegs in Abrede stellen, weil gewissenhafte Beobachter sich in diesem Sinne aussprechen; mir persönlich aber ist ein über jedem Zweifel erhabener Fall von „Syphilis tarda“ noch niemals begegnet. Ich würde auch als einen solchen nur denjenigen anerkennen, in welchem ich persönlich durch fortgesetzte Beobachtung von der Geburt an den Mangel aller syphilitischen Symptome in der ersten Lebenszeit, zugleich aber auch die Lues der Eltern con-

station konnte, da die Aussagen der letzteren fast immer unzuverlässig, oft auch mit Absicht lügenhaft sind.

Bei 5 Mädchen zwischen 4 und 12 Jahren konnten die Symptome mit voller Bestimmtheit auf ein Stuprum oder wenigstens auf einen Versuch desselben zurückgeführt werden, wobei die Angabe des ältesten (12jährigen) Kindes, sie sei im Schlaf auf einer Treppe von einem Manne überfallen worden, bei dem äußerst frohen Benehmen der Patientin sehr bedenklich erschien. Nur in einem dieser Fälle ergab die Untersuchung ein zerrissenes Hymen; sonst war dasselbe immer intact, so dass eine vollständige Inmissio penis nicht zu Stande gekommen sein konnte; wohl aber war die ganze Umgebung des Hymen bis zur inneren Fläche der Labien öfters geröthet und empfindlich, auch mehr oder weniger Fluor albus vorhanden⁶⁾. — Bei zwei Geschwistern von 9 und 11 Jahren sollte die Krankheit durch eine syphilitische Kinderwärterin entstanden sein. Im Alter von 2 Jahren war das eine dieser Mädchen von letzterer angestreckt worden und hatte dann die Lues auf die Schwester, welche anhaltend mit ihr zusammen war, übertragen. Da die Glaubwürdigkeit der Eltern unzweifelhaft war, so enthält dieser Fall wiederum eine dringende Warnung zur Vorsicht bei der Wahl von Dienstboten und Kinderpflegerinnen. Auch durch den Verkehr mit öffentlichen Dirnen, welche von unermittelten Familien Zimmer abgemietet hatten, sah ich 3- bis 5jährige Kinder syphilitisch werden. Die Quelle der Infection in allen solchen Fällen liegt theils in den Liebkosungen der Kinder, theils in dem gemeinschaftlichen Gebrauche von Schwämmen und anderen Gegenständen der Toilette und des häuslichen Bedarfs.

Die Erscheinungen, mit welchen die Lues des späteren Kindesalters auftritt, unterscheiden sich im Wesentlichen nicht von denjenigen der Erwachsenen. Bemerkenswerth scheint mir nur das Vorherrschende der kondylomatösen Formen. Wenn ich auch nicht mit Violet⁷⁾ darin übereinstimmen kann, dass syphilitische Exantheme unter diesen Umständen niemals vorkommen sollen, so muss ich diesem Autor doch darin Recht geben, dass die breiten Kondylome auf der Haut und den Schleimhäuten die vorzugsweise häufigste Erscheinungsform in diesem Alter bilden. Die Schleimgapeln zeigen sich in mehr oder minder dichten Massen, nicht selten theilweise an ihrer Oberfläche macerirt und ulcerös,

⁶⁾ Bei 3 Mädchen von 4, 6 und 12 Jahren beobachtete ich in Folge eines versuchten Stuprums zwar keine Lues, wohl aber eine mehr oder minder bedeutende Entzündung des Intitius mit Fluor albus und zahlreichen spitzen Kondylomen an den Labien.

⁷⁾ Syphilis infantile. Paris 1874.

rings um den Anus und auf den grossen Labien, wo sie bisweilen wulsthaft knollige, die ganze Schamlippe einstellende Massen bilden. Bei einem 12jährigen Mädchen sah ich einen förmlichen Doppelbogen breiter zusammengeprägter Kondylome, der sich von der Commissur der grossen Schamlippen über diese hinweg bis zum Anus und seitlich bis in die Schenkelbeugen erstreckte. Auch die innere Fläche der Oberschenkel, die Nates, selbst die Hautfalten zwischen Hals und Brust waren bisweilen der Sitz dieser Neubildungen, neben welchen auch sehr häufig an den Mundwinkeln, auf der Schleimhaut der Mandeln und des angrenzenden Gaumens, seltener der Wangen, weissliche, theilweise erodirte, von Spalten (Rhagaden) zerklüftete kondylomatöse Wucherungen erschienen. Auch die Ober- und Unterlippe waren hier und da der Sitz von Rhagaden mit infiltrirter Umgebung. Besonders häufig zeigten sich aber gummiöse Veränderungen des Zungenrückens in der Form runder oder mehr geradlinig umgrenzter, kleinerer oder grösserer Infiltrationen der Schleimhaut, welche sich durch eine dunklere Farbe und grössere Resistenz von der Umgebung deutlich absetzten, bisweilen auch das Niveau etwas überragten, und in diesem relativ seltenen Falle an ihrem hervorstechendsten Theile weisslich getrübt oder erodirt erschienen. Auffallend war die fast gleichmässige gummiöse Affection der Zunge bei zwei Schwestern von 9 und 11 Jahren.

Die Seltenheit syphilitischer Exantheme wurde bereits erwähnt. Dass sie aber vorkommen können, bewiesen mehrere Fälle, in welchen Roseola der Stirn und der behaarten Kopfhaut, Psoriasis palmaris und plantaris beobachtet wurden. Ja bei einem 6jährigen Mädchen bestand neben Kondylomen der Urethra, Pharyngeschwüren und einem Gumm der Zunge eine fast über den ganzen Körper verstreute Psoriasis, ebenso bei einem 7jährigen Knaben, welcher gleichzeitig Kondylome am Anus, auf den Mandeln und der Gaumenrapsie darbot. Kleine bewegliche Anschwellungen der Lymphdrüsen fanden sich in der Regel, und in mehreren Fällen waren sogar die meisten äusserlich sichtbaren Drüsen (die cervicalen, occipitalen, trachealen und inguinalen) deutlich geschwellen. Affectionen des Knöchelensystems hatte ich öfters zu beobachten Gelegenheit.

Ein 12jähriges Mädchen, vorgestellt am 26. Juni 1873, klagte seit einem Jahre über heftige Schmerzen im rechten Otenare, besonders während der Nacht. Das Os hantet um das Doppelte geschwellen, am meisten in der Mitte, anheben und kneten, gegen Druck sehr empfindlich. Im Alter von 3 Jahren syphilitische Infection, später Affectionen im Halse (?). Fast alle Drüsen im Nacken und in den Gehäuselhaken geschwellen. Schon früher behandelt, aber immer Recidive, Welcher Verlauf nicht bekannt.

Mädchen von 11 Jahren, vorgestellt am 3. November 1874. Seit $1\frac{1}{2}$ Jahren sehr empfindliche bedeutende Aufreibung der rechten Tibia mit häufige nichtliche Schmerzen. Drüsen unter dem Kiefer geschwollen, sonst keine syphilitischen Symptome. Jodkali, Am 25. schon bedeutende Besserung. Am 30. Juli 1875 keine Spur des früheren Leidens mehr wahrzunehmen. Im Laufe des folgenden Jahres (das Mädchen wurde wegen einer Insufficienz der Mitralklappe poliklinisch behandelt) wiederholte kleine Rezidive, welche den erneuten Gebrauch des Jodkali erforderten.

Knabe von 7 Jahren, am 15. Febr. 1876 vorgestellt: von einer laetischen Mutter stammend. Seit 8 Wochen allmähliche Entwicklung einer narkotischen, karies empfindlichen, ziemlich spitzen Eosinose an der Spina mentalis, welche bereits zu einem Abscess der überliegenden Bedeckungen geführt hatte. Schwellung der Nasenleiste, Stöckschnapfen, Drüsenentzündungen. Schon früher wiederholt syphilitische Symptome. Aus der Cur fortgelassen.

Bedeutende Defecte in der Rachenhöhle, vollständige Zerstörung der Uvula, Adhäsion des Gaumensegels an der hinteren Paryaxwand, atrophische Destruction der Nasenschleimwand und des harten Gaumens konnte ich nur ausnahmsweise beobachten. Die von Hutchinsonson stark betonte Veränderung der Zähne (kurze, schmale, auseinanderstehende und gekerbte obere Incisoren), welche mit einer Alveolarperiostitis in Zusammenhang stehen soll, möchte ich um so weniger als sicheres Zeichen einer latenten Syphilis betrachten, als diese Beschaffenheit der Schneidezähne sich nicht selten auch bei Kindern findet, welche von Lues absolut frei sind. Ebenso erscheint mir die weitere Ausführung dieses Gegenstandes von Parrot *) äußerst zweifelhaft; ich würde die von ihm beschriebenen Formveränderungen der Zähne weit eher als rachitische betrachten.

Die Behandlung war durchweg eine mercurielle, abgesehen von den sehr seltenen Fällen, in welchen lediglich eine Knochenaffection bestand. Hier versuchten wir zunächst das Jodkali (2; 120), welches die Schmerzen schnell linderte, auch eine Abschwellung der Knochen bewirkte, aber fast nie vor Rezidiven schützte. Sonst wandten wir von vornherein das Quecksilber an, entweder in Form der Schmiercur mit Unguent. diarr. (1.0 bis 2.0 täglich), von welchem im Durchschnitt 25.0 bis 40.0 verrieben wurden, oder der Sublimatinjectionen (0.004 pro die), welche etwa 14 Tage lang fortgesetzt wurden und nur einmal, bei einem 4-jährigen Knaben, eine mercurielle Stomatitis mässigen Grades zur Folge hatten. Gegen breite Kondylome wurde dabei Aetzung mit Argent. nitr. oder Bestreuung mit Calomel erfolgreich angewendet.

*) Gaz. des Hôp. 1881. No. 74, 78, 80.

IV. Die dyspeptischen Zustände der Säuglinge.

Bevor ich noch zu den krankhaften Zuständen komme, welche ich unter dem Namen der „dyspeptischen“ zusammenfasse, richte ich Ihre Aufmerksamkeit auf ein Symptom, welches zwar als pathologisch erscheint, aber so häufig vorkommt, dass man es kaum als ein solches betrachten kann. Ich meine das Erbrechen oder Speien der Säuglinge. Dasselbe ist lediglich die Folge eines zu hastigen Saugens, sei es an der Brust oder an der Flasche, wodurch eine Ueberladung des Magens eintritt, der sich nun dieses Ueberschusses von Milch durch eine Art von Regurgitation ohne erhebliche Würgebewegungen entledigt. Je nachdem diese sofort nach dem Saugen oder einige Minuten später eintritt, stürzt die Milch entweder ungeronnen oder häufiger mit Kaseingerinnseln vermischt (gekäst) wieder aus dem Munde. Dieser Vorgang kann sich jedesmal nach dem Saugen wiederholen oder auch seltener eintreten, was natürlich von der Menge der Nahrung abhängt, welche das Kind zu sich nimmt. Durch Bewegungen, z. B. durch Wiegen des Kindes auf den Armen u. a., wird der Vorgang befördert, der, wie gesagt, bei zahllosen Kindern vorkommt und von der Natur dazu bestimmt zu sein scheint, durch rasche Entleerung überschüssiger Nahrungsmengen die Entwicklung dyspeptischer Zustände zu verhüten. Begünstigt wird diese Regurgitation durch gewisse dem Magen des Säuglings zukommende Eigenthümlichkeiten, nämlich durch eine mehr verticale Lage, sowie durch die im Vergleich mit dem späteren Lebensalter noch geringe Entwicklung des Fundus und der grossen Curvatur, wodurch eine relativ geringere Capacität des Magens bedingt wird. So lange daher die Kinder bei diesem „Erbrechen“ und „Speien“ sonst gesund bleiben und gut gedeihen, hat man keinen Grund ärztlich einzugreifen. Man beruhige die besorgten Mütter, gebe ihnen den Rath, dem Kinde etwas seltener und milder lange die Brust oder Flasche zu reichen, um eine Ueberfüllung des Magens zu vermeiden, lasse das Kind nach dem Saugen sofort ruhig ins Bett legen und vermeide besonders alle schaukelnden Bewegungen. Der Erfolg wird dann meistens nicht lange auf sich warten lassen, wenn auch die weitere normale Entwicklung des Magens das Ubrige beiträgt.¹⁾

Dennoch kommen nicht selten Fälle vor, in denen ein Aufhals als

¹⁾ Uffelmann (Handb. d. persönl. u. öffentl. Hygiene des Kindes, Leipzig 1881, p. 235) theilt einen Fall von Erbrechen eines Säuglings mit, welches durch Auskipfen der Saugflasche mit Eisessig erzeugt wurde. Die betreffende Milch enthält viel und Spuren von Arsenik. In ähnlichen Fällen hat man also auch zu solche Anlässe zu denken.

einfaches „Spielen“ auftretendes Erbrechen erstere Bedeutung gewant, indem die Wägung ein Stehenbleiben des Wachsthumms andeutet und bald auch das Aeusserere des Kindes durch die beginnenden Züge der Atrophie bekundet, dass es sich um etwas mehr als ein blosses Regurgitiren überschüssiger Milch handelt. Unter diesen Umständen tritt das Erbrechen auch nach dem Genuss verhältnissmässig geringer Quantitäten von Milch auf, ja die Kinder bequemen sich erst nach vielen Bemühungen seitens der Umgebung zu einem kurzen Saugen, und dennoch erfolgt unmittelbar darauf oder nach einiger Zeit Erbrechen ungetrunkener oder wenig gekauter Milch. In solchen Fällen kann der Arzt Tage lang in dem ängstlichen Zweifel verharren, ob es sich um einen dyspeptischen Zustand oder um ein beginnendes Cerebralleiden, besonders um tuberkulöse Meningitis handelt. Ich behalte mir vor, bei der Schilderung dieser Krankheit darauf zurückzukommen, und will hier nur anführen, dass das dyspeptische Erbrechen häufig durch Ructus vorher verkündet und begleitet wird, welche ganz in diesem Alter ungewöhnliche Gasbildung im Magen bekunden. In der Regel ist die erbrochene Milch mit mehr oder weniger zähem Schleim vermischt, eine Erscheinung, welche ich für besonders wichtig halte. Die Stahlgänge können in den ersten Tagen oder selbst Wochen dieses Zustandes, den ich als *Dyspepsia gastrica* bezeichne, ihre normale Beschaffenheit nahezu beibehalten und höchstens eine grünliche oder braunere Farbe darbieten, meistens aber zeigen sie ebenfalls schleimige Beimischungen und einen ungewöhnlich fetiden Geruch. Die Frequenz derselben braucht dabei nicht vermehrt zu sein. In der Regel leiden diese Kinder viel an Blähungen, und ehe diese abgehen, zeigen sich meistens meteoristische Auftreibungen des Unterleibs, zumal in der Gegend des Colon transversum.

In einer anderen Reihe von Fällen (*Dyspepsia intestinalis*) fehlt das Erbrechen entweder gänzlich oder spielt wenigstens wegen seiner Seltenheit eine untergeordnete Rolle. Die dyspeptischen Erscheinungen machen sich vielmehr von Anfang an in der Sphäre des Darmkanals geltend. Viele Kinder schreien anfallsweise mit grosser Heftigkeit, krümmen sich zusammen, verdrehen die Augen und werden erst wieder ruhig, wenn einige laut schallende Flatus abgegangen sind (*Colica flatulenta*). Die Stühle, welche anfangs die eben geschilderte Beschaffenheit darbieten, werden bald frequenter und dünnflüssiger, enthalten eine Menge gelb oder grünlich gefärbter unzerdauner Flocken und Klümpchen, welche aus Kasein, Kalksalzen und Fett bestehen, mehr oder weniger zähen Schleim, zeigen eine grünliche, selbst spinatgrüne Färbung (*Biliverdin*) und einen sauren oder höchst widrigen ammoniakalischen

Geruch. In 24 Stunden können 15–20 solcher Stühle erfolgen, welche meistens stark sauer reagiren; gewöhnlich aber ist ihre Zahl, wenigstens im Beginn des Leidens, auf 5–10 beschränkt.¹⁾ Der Appetit ist vermindert, die Zunge bald rein, bald grauweis belegt, die Urinsecretion sparsamer.

Sobald die geschilderten Symptome sich bei einem Säuglinge bemerkbar machen, dürfen Sie nicht säumen, die Ursachen derselben zu erforschen, denn nur durch Beseitigung derselben, nicht durch Medicamente lässt sich die Dyspepsie dauernd heilen. Zunächst müssen Sie natürlich an die Nahrung des Kindes denken, weil dieselbe erfahrungsgemäss fast immer die Ursache dieser Störungen bildet. Selbstverständlich sind künstlich aufgefütterte Kinder am häufigsten diesen Dyspepsien unterworfen; schlechte Beschaffenheit oder Verfälschung der Kuhmilch sind oft genug Schuld, noch häufiger die unzureichende Ernährung mit mohligen Surrogaten zu einer Zeit, in welcher die ungenügende Speichelsecretion deren Anwendung verbietet (S. 73). Aber auch Brustkinder bleiben keineswegs verschont; eine, wenn auch chemisch oder physikalisch nicht nachweisbare Alteration der Mutter- oder Ammenmilch, sei es durch Gemüthsaffecte, durch übermässige körperliche Anstrengung, Mangel an Nahrung, Eintritt der Menstruation, kann erfahrungsgemäss Dyspepsie beim Kinde hervortreiben und muss daher sorgfältig beachtet werden. Unter vielen anderen führe ich als schlagendes Beispiel ein 4 monatliches Kind an, welches bei seiner Amme prächtig gedieh, bis dieselbe eine suppurative Tonsillitis bekam, welche ihr die grössten Schmerzen bereitete und den Schlaf raubte. Sofort bekam das Kind Durchfall, täglich 5–6 dünne grüne foetide Stühle, bis die Ruptur des Mandelabscesses erfolgte. Von demselben Tage an verschwand auch die Dyspepsie des Kindes. Dass im Volke die unglaublichsten Missgriffe bei der Ernährung der Kinder begangen werden, die in den gebildeten Klassen nur ausnahmsweise vorkommen, erwähnte ich bereits. Kleine Kinder, welche an der Brust oder mit der Flasche ernährt werden, essen oft schon nach den ersten 5 bis 6 Monaten vieles mit, was die Familie genossen; Kartoffeln in verschiedener Form, Kohl, Hülsenfrüchte, Aepfel, Weintrauben, Pflaumen werden solchen Kindern sehr häufig beigebracht, auch fehlt es mir nicht an Fällen, wo Wurst, Plaukuchen u. dgl. m. als

¹⁾ Fett ist schon in den normalen Kinderstühlen bis zu 20% und mehr enthalten; ebenso findet man in denselben immer viele Microccoen und Stäbchenbakterien als Zeichen beginnender Fäulnis. Ich werde bei der Cholera auf diese Dinge zurückkommen.

Nahrungsmittel dienen. Unter diesen Umständen können Sie sich nicht darüber wundern, dass die dyspeptischen Zustände zu den häufigsten Erkrankungen der Säuglinge, zumal in den niederen Ständen gehören. Am häufigsten werden Sie über die dyspeptischen Diarrhöen zur Zeit des Nahrungswechsels, der Entwöhnung, beobachten, mag diese nur erst am Ende des ersten Jahres oder wegen zwingender Umstände (Ausbleiben der Milchabsonderung, Krankheit) schon ein paar Monate nach der Geburt stattfinden. Bei dieser Gelegenheit können die meisten Abgrüße vor, und die sogenannte *Diarrhoea ab lactatione* nimmt in Bezug auf Frequenz eine hervorragende Stelle unter den dyspeptischen Zuständen ein.

Was geht am dabei im Magen und Darmkanal vor? Die Beantwortung dieser Frage war eine verschiedene je nach der Zeit, in welcher sie aufgeworfen wurde. Die in früheren Zeiten allgemein angenommene Ansicht von einer „Säurebildung“ in den Verdauungsorganen, die nun auf den säuerlichen Menschensuch und auf die saure Beschaffenheit der grünen Stühle stützte, machte, als die pathologische Anatomie mehr in den Vordergrund unserer Wissenschaft trat, der anatomischen Erklärung Platz, dass ein „Katarth“ der Magen- und Darmschleimhaut die Ursache der dyspeptischen Erscheinungen bilde. Das Ungenügende dieser Deutung war indess schon den früheren französischen Autoren aufgefallen, von denen z. B. Barriër die von uns als „dyspeptische“ bezeichneten Erscheinungen unter dem Namen „*Diatreses*“ von der „*Diarrhoe*“ unterschied. So kam man wieder auf die chemische Anschauung zurück, die meiner Ansicht nach auch die allein richtige ist. Es handelt sich hier offenbar um anomale Verdauungsprozesse, wahrscheinlich Gährungsvorgänge des Magen- und Darminhalts, deren schliessliches Resultat die excessive Bildung von Milchsäure und von Fettsäuren ist. Auf welche Weise dieser Prozess zu Stande kommt, lässt sich bis jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Möglicher Weise kommt durch den Reiz der schädlichen Nahrung zunächst ein Reizzustand der Magen- und Darmschleimhaut mit reichlicher Schleimabsonderung, also ein katarthaler Prozess zu Stande. Durch die alkalische Beschaffenheit dieses Schleims muss die Salzsäure des Magensaftes, welche zur normalen Digestion nothwendig ist, neutralisirt werden, und da dieselbe dann nicht in normaler Weise auf den Mageninhalt einwirken kann, so verwandelt sich der Zucker der Milch oder derjenige, welcher aus geautzten Amylaceen hervorgeht, in Milchsäure, aus welcher schliesslich die Butter- und Fettsäuren hervorgehen. Diese Fermentationsvorgänge finden entweder im Magen allein statt, wobei dann nur die erste Form (*D. gastrica*) sich ausbildet, oder

weit häufiger auch noch weiter unten im Darmkanal (*D. intestinalis*); denn es begreift sich leicht, dass wenn nicht alle gärenden Magencontenta durch Ekelreizen entleert werden, die Gährung ihren Fortgang nehmen muss, sobald die anomalen Contenta mit ihren Gährungsregenera weiter abwärts gelangen und mit dem Darminhalt in Contact treten. Der säuerliche Geruch aus dem Munde, die Schleimmassen im Erbrechen, welches meistens sauer riecht, die fötiden Ausleerungen, die Schärfe derselben, welche leicht Erythema um den Anus herum hervorrufen, die Flatulenz und der Abgang fötider Gase durch den Anus, sowie die aus dem Magen entleerten Ructus — alle diese Erscheinungen bilden den klinischen Ausdruck des anomalen chemischen Processes. Ich hatte sogar Gelegenheit, bei einem wenige Monate alten Kinde dieser Art nicht nur eine deutlich erkennbare Dilatation des Magens, sondern auch stinkende Ructus und in den stets erbrochenen Milch- und Schleimmassen eingeschlossen buttergelbe Flocken zu beobachten. Die in diesem Fall wiederholt versuchte und immer leicht gelungene Einführung einer einfachen Magenpumpe entleerte ebenfalls diese Massen und hatte dann stets ein rasches Einsinken der zuvor stark ausgeblühnten Magengegend zur Folge, freilich ohne den letalen Ausgang abzuwenden zu können. Solche anomalen Gährungsprocesses sind übrigens keineswegs dem Säuglingsalter ausschliesslich eigen. Auch späterhin, oft genug noch bei Erwachsenen, sehen wir durch Überladung des Magens mit quantitativ und qualitativ schädlichen Speisen und Getränken ähnliche Vorgänge zu Stande kommen, die unter dem Namen *Status gastricus, biliosus, sabburalis, Diarrhoea stercoralis* u. s. w. beschrieben worden sind. Während aber bei älteren Kindern und Erwachsenen dieser Process mit der Entleerung der gärenden Massen nach oben und unten sein Ende zu erreichen pflegt und deshalb fast immer in acuter Form auftritt, kommt dieser rasche Abschluss bei Säuglingen nur dann vor, wenn die Diät sofort in normaler Weise regulirt wird. Beschränkung der Nahrung durch selteneres Darreichen der Brust, Ersatz derselben durch abgekochtes mit etwas Gummi arabicum versetztes Wasser, stärkere Verdünnung der Kuhmilch genügen oft, um binnen wenigen Tagen das Uebel zu beseitigen. Leider sind aber die Verhältnisse sehr häufig nicht geeignet, die Kinder vor neuen Anfällen derselben Art zu bewahren. Nur zu oft werden die dyspeptischen Erscheinungen längere Zeit nicht beachtet und im Volke gewöhnlich auf die Zahnerkrankung geschoben, mit welcher sie gar nichts zu thun haben. Ohne Hilfe eines Arztes versucht man sie durch mehrlige Nahrungsmittel (Hafersehlen, Mehlsuppen u. s. w.) zu beseitigen, und verschlimmert dadurch nur die Sache. So dauern denn die anomalen fötiden Ausleerungen und

oft auch das Erbrechen Wochen lang fort, und die Folge davon ist eine mehr und mehr zunehmende Atrophie, wie ich sie Ihnen früher (S. 63) geschildert habe. Zu dem ursprünglich chemischen Prozesse gesellt sich dann bald auch ein anatomischer, indem der fortgesetzte reizende Contact der in Gährung begriffenen Contents schliesslich eine permanente katarthalische Affection der Schleimhaut zur Folge haben muss. Die Section solcher Kinder ergiebt streckenweise eine Hyperämie und Wulstung der Mucosa, wobei sowohl die solitären Follikel, wie die Peyer'schen Plaques mehr als gewöhnlich über dem Niveau der Schleimhaut hervortreten. Ich werde an einer späteren Stelle auf diese Dinge näher eingehen, bei deren Beurtheilung im vorliegenden Falle immer der Standpunkt festzuhalten ist, dass es sich hier nicht um einen primären Darmkatarth handelt, dass derselbe vielmehr als ein in Folge chemischer Prozesse secundär entstandener aufgefasst werden muss. Mitunter ist übrigens die Veränderung der Schleimhaut trotz einer Monate langen Dauer der Krankheit höchst unbedeutend und nur bei sorgfältiger Untersuchung nachweisbar.

Ihr weitere Verlauf dieses Zustandes wird vorzugsweise durch die Verhältnisse, zumal durch die Möglichkeit bestimmt, für eine passende Ernährung und Behandlung zu sorgen. In einer Reihe von Fällen beobachtet man daher Monate lang ein Alterniren zwischen Besserung und Verschlimmerung, welches meistens davon abhängt, dass zeitweise die Anordnungen des Arztes sorgsamer befolgt, dann aber wieder vernachlässigt werden. Je mehr sich die Folge der wiederholten Residive, d. h. der chronische Darmkatarth mit seinen folliculären Veränderungen, ausbildet, um so anhaltender und profuser wird die Diarrhoe, so dass fast bei jedem Wechsel der Windeln Fäcalmassen in denselben gefunden werden, welche nicht mehr die ursprüngliche Beschaffenheit der dyspeptischen zeigen, sondern grösstentheils ganz dünnflüssig, gelb oder grünlich gefärbt sind und nur äusserst geringe Mengen festerer Nahrungsreste, viele Schleimfetzen und hier und da kleine punktförmige Einsprengungen von Blut, aber nur selten grössere Mengen des letzteren enthalten. Ein Beispiel dafür ist folgender Fall:

Emma S., 2 Monate alt, am 19. Febr. 1875 mit Luxa hereditaria aufgenommen. Mercuriakur. Am 29. beginnt Diarrhoea dyspeptica, selten Erbrechen, abwechselnde Besserung und Verschlimmerung, letztere dauernd vom 18. Januar 1874 an; täglich 4—5 grüne, blutgestreifte, bisweilen ganz rathbraune Stühle. Zunehmende Atrophie, Syst. Auspumpen des Darms mit einer Lösung von Plumb. acet., mit welchem öfters ein Theelöffel voll dicken schwärzlichen Slates entleert wird. Am 21. Januar Temp. 35.6, Collaps und Tod. Die Section ergab Fettsüßer und Entzünd des Dickdarms mit 5 folliculären Eruptionen in der Um-

gehung der Drosselklappe, welche wohl als die Quelle der Rührung angesehen waren.

Die Atrophie macht nunmehr rapide Fortschritte; die Mundschleimhaut bedeckt sich mit Soor; Gesicht, Hände, Unterschenkel und Füsse werden häufig oedematös. Fieber kann ganz fehlen oder tritt nur als geringe Temperaturerhöhung in den Nachmittags- und Abendstunden auf, doch ist der Durst wegen der copiosen Wasserverluste oft so vermehrt, dass die abgezehrten Kinder schon beim Erblicken des Löffels gierend die trockenen Lippen öffnen. Der weitere Verlauf und schliessliche Ausgang ist derselbe, den ich Ihnen bei Gelegenheit der „Atrophie“ geschildert habe.

Weit seltener tritt die Dyspepsie von vornherein acut mit so stürmischen Erscheinungen auf, dass sich schon nach wenigen Tagen ein bedenklicher und selbst tödtlicher Erschöpfungsgrad ausbildet. Das Krankheitsbild ist hier ganz ähnlich demjenigen, welches Sie später bei der Schilderung der infantilen Cholera kennen lernen werden, doch kommen die Fälle, welche ich hier im Sinn habe, immer sporadisch, auch mitten im Winter vor, also zu einer Zeit, in welcher die eigentliche Cholera nicht aufzutreten pflegt. Auch lässt sich dann fast immer ein Diätfehler gröberer Art als Ursache nachweisen, und zwar sogar in wohlhabenden Familien, wo den kleinen Kindern durch zu zärtliche Verwandte oder durch das Hauspersonal in wohlwollendster Absicht unendliche Lockerbissen beigebracht werden. Stürmisches Erbrechen, profuse, rasch auf einander folgende dünne stinkende Ausleerungen, die allmählig immer heller und farbloser werden, erneuerter Durst, verändertes Gesicht, ganz besonders Einsinken der Augen, kühle Temperatur der Haut, Schwinden des Pulses und Depression der Fontanelle, endlich eklampthische Convulsionen finden sich hier wie in der Cholera; nur werden diese Symptome hier durch eine acute Dyspepsie, dort aber durch einen epidemischen, wahrscheinlich infectiösen Einfluss erzeugt. Die Ursache des raschen Collapsus, der sich in solchen Fällen bemerkbar macht, liegt wahrscheinlich in den stürmischen serösen Entleerungen nach oben und nach unten, welche durch den Reiz der gährenden Massen auf die Schleimhaut und die Reflexwirkung auf die Peristaltik bedingt werden. Diese copiosen Wasserverluste erklären uns einerseits die rasche Resorption der Parenchymassäfte, wodurch der Verfall der Gesichtszüge und das Einsinken der Fontanelle verursacht werden, andererseits die hochgradige Schwäche des Herzens, welche in der Apathie und Somnolenz (arterielle Anämie und venöse Hyperämie des Gehirns), in dem Schwinden des Pulses und dem Sinken der Temperatur ihren Ausdruck findet. Solche Fälle können dabei ebenso tödtlich werden, wie die epidemische Cholera in den

Sommermonaten, doch gestaltet sich ihre Prognose erfahrungsgemäss im Allgemeinen günstiger, weil nach der stürmischen Austossung der sekretären Darmcontenta die Affecten meistens aufhört und die gesunkenen Kräfte sich wieder heben. Im Falle eines tödtlichen Ausgangs ergeben die Sectionen in der Regel gar keine oder höchstens leichte katarrhalische Veränderungen der Magen- und Darmschleimhaut, zuweilen durchgehends eine der allerniedrigen Anämie entsprechende enorme Blässe derselben mit leichter Schwellung der Follikel.

Unter diesen Verhältnissen müssen Sie nun immer darauf gefasst sein, die eigenthümliche Veränderung des Magens anzutreffen, welche unter dem Namen der „gallertartigen Magenverweichung, Gastromalacia“ die Aerzte viele Jahre lang beschäftigt hat. Der geringste Grad derselben, welchen man ziemlich oft findet, besteht in einer breiartigen Weichheit der Schleimhaut des Fundus und auch wohl der hinteren Magenwand, so dass sich dieselbe mit dem Skalpelstiel wie eine dicke Gummilösung abstreifen lässt. Es sind also gerade solche Partien betroffen, welche bei der gewöhnlichen Lage der Leichen am stärksten der Einwirkung der Magencontenta ausgesetzt sind. Seltener greift die Erweichung durch alle Hauto des Magens hindurch, welche dann an der betreffenden Stelle in eine Art grauer, röthlicher oder schwarzbrauner, halldurchsichtiger Gallerte verwandelt sind, die einen Geruch nach Buttersäure hat und das Lakmuspapier röthet. Meistens wird dieselbe noch durch den serösen Überzug zusammengehalten, doch kann auch dieser vor der Section leicht einrissen, und man findet dann an der Stelle des Fundus nur noch einzelne mit den gallertigen Massen und dem Mageninhalt vermischte Reste desselben. Von entzündlichen Erscheinungen ist nirgends eine Spur wahrzunehmen, und das Mikroskop ergiebt in den erweichten Partien nur eine schleimartige, mit einigen Epithelsellen durchsetzte Substanz und einzelne noch intacte mit dunkeln Gerinnseln angefüllte Blutgefässe. Die Frage, über welche so lange Zeit gestritten wurde, ob nämlich die Gastromalacia eine wirkliche Krankheit oder nur eine nach dem Tode entstandene chemische Veränderung des Magens sei, ist heut unzweifelhaft zu Gunsten der letzteren Ansicht entschieden. Es handelt sich hier um eine postmortale Selbstverdauung der Magenwand durch die Contenta, welche also nur da erwartet werden kann, wo noch Nahrungsmittel genossen worden und der Tod während der Digestion erfolgt ist. So erklärt es sich denn auch, dass meistentheils nicht nur der Magenfundus, sondern auch die angrenzenden Organe, Milz, linke Niere, Netz, Zwerchfell und selbst der untere Lappen der linken Lunge mehr oder weniger verdaut und erweicht angetroffen werden. Dass

man früher diese Alteration als eine Krankhafte betrachtet und mit einem bestimmten Symptomencomplex ausgestattet hat, der mit unserer acuten Dyspepsie oder Cholera vollständig übereinstimmt, erklärt sich eben daraus, dass bei diesen Krankheiten anomale Gährungsvorgänge der Magencontenta die Hauptrolle spielen, und daher nach dem Tode die deletäre Einwirkung desselben auf die Wandung weit leichter eintreten muss, als bei anderen krankhaften Zuständen. —

Die verderblichen Folgen, welche wir aus einer in ihrem Anfangen vernachlässigten Dyspepsie hervorgehen sahen, machen uns eine frühzeitige und ernstliche Behandlung zur Pflicht, die freilich nur da mit guten Aussichten erfüllt werden kann, wo die Lebensverhältnisse der kleinen Patienten günstig sind und unsere Vorrichtungen sorgfältig befolgt werden. Bei den Kindern der Armen kommt unsere Hülfe oft schon zu spät, und selbst wenn sie rechtzeitig erbeten wird, stösst sie auf schwer zu beseitigende, vorzugsweise in dem Mangel einer angemessenen Nahrung begründete Hindernisse.

In vielen Fällen treten Sie erst dann an das Krankenbett, wenn die Natur durch massenhafte Entleerungen nach oben und unten die schädlichen Contenta aus dem Verdauungskanal bereits entfernt hat. Sie finden das Kind nur noch erschöpft, und haben dann nichts weiter zu thun, als die Regulirung der Diät zu überwachen. Haben Sie ein Brustkind vor sich, so muss zunächst, wenn nicht ein entschiedener Däufehler nachweisbar ist, jede Möglichkeit einer schädlichen Veränderung der Milch ins Auge gefasst werden. Gemüthsaffekte und Ueberanstrengung der Säugenden verändern die Milch nur vorübergehend, und das Kind kann daher wieder an die Brust angelegt werden, sobald die dyspeptischen Ausdeutungen aufgehört haben. Man hüte sich aber besonders vor Ueberfütterung, die nur zu oft an dyspeptischen Zufällen schuld ist. Schon die Muttermilch bedarf zu ihrer Verdauung mindestens 2 Stunden, die Kuhmilch mindestens 3 Stunden, und diese Intervalle müssen daher genau eingehalten werden, bevor das Kind wieder Nahrung bekommt. Leider stösst man in der Praxis hier oft auf unverständigen Trotz, aber die Untersuchungen von Biedert¹⁾, welcher nachwies, dass die Menge der aufgenommenen Nahrung in den ersten Monaten, zumal bei Pöppelkindern, das eigentliche Nahrungsbedürfniss oft weit übersteigt, fordern dringend dazu auf, dem Unverstand des Publikums energisch zu begegnen, d. h. die Nahrungsmenge herabzusetzen. Um so nöthiger ist dies bei wirklich vorhandener Dyspepsie. Man thut daher immer gut,

¹⁾ Jahrb. f. Kinderheilk. XVII. p. 251, 288.

24 bis 86 Stunden lang die Brust seltener als gewöhnlich nehmen zu lassen und dafür etwas dünnen Hafer- oder Gerstenschleim zu geben. Sollte der Eintritt der Menstruation bei der Amme jedes Mal Dyspepsie des Kindes erzeugen, so bleibt nichts weiter übrig als ein Wechsel der Amme oder die Entziehung. In der Majorität der Fälle habe ich indess keine üble Einwirkung der Menstrues auf die Milch beobachtet, und mich daher nur sehr selten veranlaßt gesehen, aus diesem Grunde eine Amme fortzuschicken. Ähnlich verhält es sich mit acuten krankhaften Zuständen der Säugenden, die, wie ich Ihnen oben an einem schlagenden Beispiel bewies (S. 114), dyspeptische Zustände hervorrufen können, aber dies keineswegs immer thun. Nur wo die acute Krankheit der Säugenden voransichtlich eine kurze und leichte ist, darf man das in Folge derselben an Dyspepsie leidende Kind während dieser Zeit mit künstlicher Nahrung hinhalten; im entgegengesetzten Falle müssen Sie sofort eine Ersatzamme zu beschaffen suchen. Handelt es sich aber von vornherein um ein Pappelkind, so werden Sie, nachdem der Anfall vorüber ist, die gewohnte Nahrung, wenn Sie dieselbe für angemessen halten, vorsichtig wieder versuchen. Treten dennoch Recidive ein, so muss natürlich ein Wechsel der Ernährung vorgenommen werden, und in diesem Falle kommt zunächst die Frage in Betracht, ob man nun statt der bisher von Anfang an oder seit längerer Zeit geübten künstlichen Aufzucht eine Amme nehmen soll. Gestalten es die Verhältnisse der Eltern, so muss man unbedingt dazu rathen. Man begegnet zwar dabei manchen Schwierigkeiten, weil die Kinder die gewohnte Saugflasche, aus welcher ihnen die Milch mühelos in den Mund fiel, dem ungewohnten Saugen an der Mamma vorziehen und das letztere öfters entschieden verweigern. Dennoch gelingt es meistens, wenn man nur Geduld hat, diese Schwierigkeit zu überwinden und das Kind an die Brust zu gewöhnen. Ja ich sah Kinder von 3—4 Monaten, die von Geburt an künstlich gefüttert waren, sich noch ohne viele Umstände an die Ammenbrust gewöhnen. Freilich ist die Sache damit nicht immer abgethan, denn auch die Milch der Amme kann aus verschiedenen Gründen (S. 114) dem Kinde nicht zureichen und dyspeptische Symptome verursachen, so dass man abermals zu einem Ammenwechsel geöthigt wird, und die Fälle, wo ein solches Kind drei oder mehr Ammen nach einander bekommt, bis endlich die passende gefunden ist, gehören keineswegs zu den Seltenheiten.

Die leitenden Grundsätze für die diätetische Behandlung der infantilen Dyspepsie lassen sich nur ganz im Allgemeinen angeben, da Ihnen öfters Fälle begegnen werden, welche sich diesen Regeln aus un-

erklärlichen Ursachen nicht anpassen lassen und in anderer Weise behandelt werden müssen. So kamen mir zuweilen Dyspepsien vor, welche trotz eines mehrfachen Nahrungswechsels fortbestanden und erst aufhieten, sobald die Kinder entwöhnt wurden. Andere, welche überhaupt nur künstlich aufgefüttert waren, reagierten gerade gegen die Kuhmilch, die ich immer als das beste Surrogat betrachte (S. 75) durch dyspeptische Zufälle, so dass man dieselbe weglassen und durch andere Nahrungsmittel, besonders durch die oben (S. 76) erwähnten Kindermehle ersetzen musste. Indessen ist die Befürchtung vieler Aerzte, dass eine gute Kuhmilch unter diesen Umständen nicht vertragen wird, wenn auch sehr verbreitet, doch im Allgemeinen nicht gerechtfertigt. Ich rathe Ihnen, sich hier weniger durch theoretische Bedenken, als durch die Praxis leiten zu lassen, und immer erst wiederholte Experimente mit der Kuhmilch zu machen, bevor Sie zu Surrogaten übergehen. Wie häufig wurden mir kleine Kinder mit dyspeptischer Diarrhoe zugeführt, die aus Schen vor der Kuhmilch nur mit Haferschleim und dünner Mehlsuppe gefüttert und dabei immer mehr atrophirt waren! Ich kehrte drost zur Milch zurück, und oft genug sah ich dann die Stühle und das Allgemeinbefinden sich von Tag zu Tag bessern. Die Erfahrung lehrte mich aber, dass oft unter diesen Verhältnissen die Milch besser kalt als warm vertragen wird, wahrscheinlich, weil sie dann weniger zur Gährung neigt; man lasse sie daher nach dem Abkochen erkalten oder, zumal bei acuter Dyspepsie, in Eis stellen und gebe sie den Kindern in dieser Temperatur zu trinken. Die Meisten nehmen sie willig, viele sogar mit Begierde, und der Augenblick, in welchem die Kinder die kalte Milch zurückweisen und sich wieder mit Vorliebe der erwärmten zuneigen, war mir immer ein günstiges Vorzeichen der beginnenden Heilung. So lange aber dyspeptisches Erbrechen besteht, wird man immer gut thun, die kalte Milch nur löffelweise dem Kinde zu geben, weil das Trinken aus der Flasche leicht eine Ueberladung des Magens und Vomitus erzeugt.

Kind von 10 Monaten, seit 6 Wochen erkrankt, seit $1\frac{1}{2}$ Wochen an Diarrhoe leidend, gegen welche Salicinum mit wechselndem Erfolg gebracht war. Am 18. December 1864 plötzliche Steigerung, zahlreiche diarrhöische hellgelbe Auslassungen, seltene Erbrechen, lebhafte Unruhe, geringer Vortritt der Gekrösstöße, aber beim Druck empfindliches Unbehagen. Statt der Milch war in den letzten Tagen nur Kaffatrübe gegeben worden, doch weder diese, noch kleine Dosen Opium, noch Calomel wirkten günstig. Vielfache erfolglos innerhalb 24 Stunden wohl gegen 20 Auslassungen und häufiges Erbrechen, dabei starke Hitze und unstillbares Durst. Milch wie Arrow root am 22. gegeben, hatte wiederholtes Erbrechen und noch stärkere Diarrhoe zur Folge. Von nun an liess ich von Stunde zu Stunde

ein paar Kinderlöffel in Eis gekühlter Milch, und zur Stillung des Darms (denn kleine Klättchen und eiskaltes Wasser mit wenig Zucker vermischt reizen). Als Medicament wurde nur eine Mandelmilch, ebenfalls in Eis gekühlt, theilweise verabreicht. Am folgenden Tage bereits erhebliche Besserung; Ruhe und mehrstündiger Schlaf, Puls und Temperatur normal, Stuhl bedeutend geringer; Erbrechen hatte sie noch einmal nach starken Schreien erlangt und die drei erfolgten Anmerkungen waren durchaus normal. Am 24. völlige Besserung, wobei das Kind die bisher mit Gier genommene kalte Milch verweigerte und sich wieder der gewohnten Lauge mit Arrow root versetzten Milch geneigt zeigte. Eine noch fortbestehende Anorexia mit dickem weißlichen Zungenbelag wich binnen einer Woche dem Getränke kleiner Dosen Trux. rhei aquosa.

Kind B., 1 Jahr alt, seit der vor 14 Tagen erfolgten Entwöhnung an dyspeptischen Durchfall leidend. Am 12. November 1875 fiel ich dasselbe stark kollabirt, kühl, mit kaum fühlbarem Pulse, Milch und alle anderen Getränke wurden sofort ausgelassen, täglich 12—15 dünne bräunliche stinkende Anmerkungen. Verordnung: eiskalte Milch schrittweise zu geben, 2 Kamillenblätter täglich, Magister. Bismuth 0,00 2stündlich. Am 14. kein Erbrechen mehr, kalte Milch gering genommen, wird gut vertragen. Nur noch 6—7 malig niedrige Anmerkungen täglich. Dagegen Creosot gtl. IV. auf 50,0 Wasser, 2stündlich ein Theelöffel. Heilung nach 4 Tagen.

Diese Beispiele, die mir in grosser Anzahl zur Verfügung stehen, enthalten gewiss eine Aufforderung, bei acuter Dyspepsie der Säuglinge sich der eiskalten Milch als Nährmaterial zu bedienen. Dennoch ist die Milch auch in dieser Form nicht immer einen günstigen Erfolg, und man ist dann genöthigt, statt derselben andere Getränke, Brihe, Gerstensolheim, Abkochungen von Salep, Arrow root oder Kindermehl zu verordnen. Bei unstillbarem Erbrechen liegt auch der Versuch nahe, die Ernährung per rectum vorzunehmen, und ich habe dies ein paar Mal durch Klystire von Pepton (nach Adamkiewicz bereitet, etwa ein Theelöffel voll auf eine halbe Tasse Fleischmilch) versucht, indess keinen Erfolg davon gesehen, wahrscheinlich, weil die gleichzeitig sehr roge peristaltische Darmbewegung durch die Klystire noch gesteigert wurde. Dieselben wurden in fast unveränderter Gestalt sogleich wieder ausgestossen.

So viel von der Diät. Was die medikamentöse Behandlung anbelangt, so empfehle ich Ihnen in frischen Fällen von Dyspepsie, d. h. solchen, die nicht über 3 oder 4 Tage alt sind, mögen sie sich nun durch Erbrechen, Durchfall oder durch beides kundgeben, als erstes Mittel das Calomel [je nach dem Alter der Kinder in der Dosis von 0,005 bis 0,015 3stündlich mit Puls, gummos. 0,5 (F. 2)]. Die Wirkung dieses Mittels ist wahrscheinlich eine antifermentative, ohne dass sich über die Art derselben etwas bestimmtes sagen lässt. Die von Mialhe vertretene Ansicht, nach welcher sich das Calomel durch das Chloratrium des Magen- und Darminhaltes in Sublimat umwandeln soll, ist nur in so weit

nichtig, als diese Umwandlung sehr allmählig und überhaupt nur dann stattfindet, wenn grosse Mengen Calomel lange im Darm verweilen. Beides trifft aber für unseren Fall nicht zu. Auch glaube ich nicht, dass das Calomel die katarthalsche Reizung der Schleimhaut günstig beeinflusst, wie man es z. B. bei der Application desselben auf die hyperämische Conjunctiva der Auger beobachtet. Halten wir uns daher an die praktisch festgestellte therapeutische Wirkung! Nachlass des Erbrechens, Verminderung der Stühle, Abnahme des Fortors und breitere Beschaffenheit derselben treten häufig schon am zweiten oder dritten Tage des Gebrauchs hervor, und in einer Reihe von Fällen bedarf es dann keines anderen Mittels. Vielleicht muss auch die wenn auch nur geringe abführende Wirkung, welche selbst so kleine Calomeldosen bei Säuglingen haben, als eine günstige Nebenwirkung aufgefasst werden, weil es in den betreffenden Fällen doch zunächst darauf ankommt, die animalen Darmcontents so schnell als möglich aus dem Organismus zu entfernen. Hat die Affection schon 4 Tage oder länger bestanden, so darf man sich von Calomel nicht mehr so günstige Erfolge versprechen, wie in ganz frischen Fällen, doch ist das Mittel auch dann noch immer des Versuches werth, da ich wenigstens nie einen nachtheiligen Einfluss desselben beobachtet habe¹⁾.

Dem Calomel zunächst steht meiner Erfahrung nach die Salzsäure (F. S.), welche Sie auch in nicht mehr ganz frischen Fällen mit gutem Erfolg anwenden können. Dies Mittel wirkt, wie die Versuche von Schottin²⁾ ergeben, entschieden gährungswidrig. Derselbe zeigte an gährenden in einer Brutmachine befindlichen Flüssigkeiten, dass sowohl die Milch- als die Buttersäuregährung durch Zusatz von Schwefelsäure sofort «stirbt» und erst von neuem beginnt, nachdem die Säure durch ein Alkali abgestumpft ist. „Die Salzsäure wirkt entschieden noch günstiger, weil sie daneben noch die Proteinstoffen im Magen zu lösen und für den ausfallenden Magensaft zu vicariiren vermag.“ In frischen Fällen dürfen Sie keinen Zusatz von Opium machen, dessen verstopfende Wirkung sich durch starke Gasaufreibung der Därme zu rächen pflegt. Sind aber mehrere Tage verstrichen, ohne dass die dünnen Ausleerungen nachlassen, darf man also annehmen, dass nach der Entleerung der schädlichen Contents noch ein Reizzustand der Schleimhaut und eine vermehrte Peristaltik fortbesteht, so ist der Zusatz von Tinctur. thebaica

¹⁾ Vergl. über die Wirkung des Calomel auf Gährungsprocess u. s. w. Weysslieff, Zeitschr. f. physiol. Chemie. VI. p. 312.

²⁾ W. öbler, Handb. der physiol. Therapie. Göttingen 1876. p. 382.

(etwa 3—4 gtt. zu der Mixtur) sehr zu empfehlen, schon deshalb, weil dieselbe durch Beschränkung der Peristaltik der Salzsäure Zeit gewährt, ihre Wirkungen nachhaltig auszuüben.

Die Erfolge, welche ich mit dem Calomel und der Salzsäure erzielte und früher¹⁾ veröffentlichte, haben seitdem durch zahlreiche Fälle Bestätigung erhalten. Dennoch zieht es noch immer viele Aerzte, welche der Säure alkalische Mittel, zunal das Natron bicarbonicum, vorziehen. Wenn dasselbe auch die Säure der gährenden Magencontenta momentan zu neutralisiren vermag, so wird es doch dem Gährungsprocess selbst nicht beikommen können, und ich kann daher weder diesem, noch anderen alkalischen Mitteln, z. B. dem benzoesauren Natron, das Wort reden. Wo Calomel und Salzsäure im Stich lassen, empfehle ich Ihnen weit eher das Creosot wegen seiner entschieden antifermentativen Wirkung, zunal in Fällen, wo das Erbrechen vorherrscht; aber auch da, wo nach dem Vorübergehen der stimmungsschen Erscheinungen noch stinkende dünne Stühle fortlaufen, gegen welche die Salzsäure erfolglos blieb, zeigte dies Mittel sich wirksam, sobald es nur in ausreichender Dosis gegeben wurde (F. 4). Die folgenden Fälle zeigen, dass man auch stärkere Gaben nicht zu scheuen braucht.

Krank von 7 Monaten, Pippilkind. Seit einigen Tagen Erbrechen der Milch, theils flüssig, theils geronnen, mit säuerlichem Geruch. Dabei blasse, blassgelbe, weinstöhrliche, äusser stechende Stühle. Salzwasser allein und mit Opianextract vermischt ohne Wirkung. Ich versuchte am Creosot gtt. 8, Aq. coctum. 45/0, Symp. simpl. 15/0 2stündlich 1 Theelöffel. Nach zwei Tagen Aussetzen des Vermögens, aber Fortdauer der Durchfälle, die später durch kleine Dosen Opian gestillt wurde.

Kind von 6 Wochen, Pippilkind. Seit 24 Stunden Durchfälle und Erbrechen nach jedesmaligen Trinken. Das Erbrochene nicht stark sauer, Creosot gtt. 4 auf 60/0 2stündl. 1 Theelöffel. Nach 4 Tagen nur noch 1—2 normale Stühle täglich, kein Erbrechen mehr.

Bei Kindern von 6 Wochen, resp. 7 Monaten betrug also die jedesmalige Dosis $\frac{1}{4}$, resp. $\frac{1}{2}$ Tropfen, da 60/0 Flüssigkeit etwa 16 Theelöffel entsprechen. Ausser mit den genannten, für mich in erster Reihe stehenden Mitteln stellte ich sowohl in der Klinik, wie in der Privatpraxis noch Versuche mit anderen Medicamenten an, welche im Ruf einer antifermentativen Wirkung stehen, nämlich mit dem Chloralhydrat (1,0 und mehr auf 100,0), der Karbolsäure, der Aq. chlorica, und dem Resorcin. Nur das erstere leistete in Fällen dyspeptischen Erbrechens, wenn auch nicht constant, gute Dienste, von den drei anderen bin ich aber ganz zurückgekommen und halte, wenn es den fortgesetzten

¹⁾ Beiträge zur Kinderheilk. N. F. p. 293.

Gebrauch der Kohlensäure für nicht unbedenklich. Ebenso wenig entsprach das eine Zeitlang viel empfohlene Pepsin meinen Erwartungen, und zwar wohl deshalb, weil wir nicht im Stande sind, die Indication desselben im einzelnen Falle genau festzustellen. Das Mittel kann doch offenbar nur da helfen, wo die dyspeptische Gährung entweder durch eine verminderte Secretion des Magensaftes oder durch die Abnahme seines Pepsin Gehaltes erzeugt wird. Wie soll man aber diese Veränderungen auch nur mit einiger Sicherheit diagnosticiren? Unter diesen Umständen bleibt also die Anwendung des Pepsins gegen die infantile Dyspepsie immer ein Experiment, welches man von vorn herein oder nach der fruchtlosen Anwendung anderer Mittel anstellen kann, dessen Erfolg aber als ein glücklicher Zufall zu betrachten ist. Ich verordnete das Pepsin entweder rein (0.06—0.1), oder mit Salzsäure versetzt (F. 5), in der Form der in allen Apotheken käuflichen Pepsinconsenz. Natürlich kann das Pepsin nur da sich wirksam erweisen, wo überhaupt proteinhaltige Substanzen, zumal Milch, noch genossen werden. Man muss dann das Mittel immer eine halbe Stunde vor oder nach dem Genuß der Nahrung nehmen lassen.

Richard K., 10 Wochen alt, Püppelkind, schlecht genährt, am 7. December 1866 vorgestellt. Seit einigen Tagen kein Schlaf, häufige Krämpfe, täglich 10—12 dünne, grüne, den After wundmachende Stühle, geringer Bettesinn, kein Erbrechen, kein Fieber, Calomel ohne Erfolg gebraucht. Pepsin (0.06 3—4 mal täglich) bewirkt nach 12 Tagen Heilung. Am 13. April 1867 von neuem wegen Erbrechen nach jedes Nahrungsgenusses in die Poliklinik gebracht. Dasselbe besteht schon seit einigen Wochen, Stuhl im Munde. Pepsin 0.06 4 mal täglich. Schon am 16. letzten Tages Nachlass des Erbrechens, am 23. vollständige Heilung.

Mädchen von 15 Wochen, am 6. Mai 1873 vorgestellt, Püppelkind. Seit 4 Wochen Erbrechen, besonders häufig nach dem Genuß der Milch, und Diarrhöe. Graue Ursubst, mäßige Atrepsie, viel Dunst, Stühle sehr fetide. Pepsin 0.06 4 mal täglich. Am 14. Heilung. Täglich nur 3 normale Stühle.

Knabe von 6 Wochen, Brustkind, am 13. Januar 1874 vorgestellt. Unmittelbar nach jedem Trinken starkes Erbrechen, häufige grüne stinkende Aussternungen, Calomel ohne Wirkung. Am 24. Pepsin 1.0 3 mal, Symp. simpl. aa 25.9. Acidi hydrochlor. gr. 10 2 mal, 1 Theelöffel. Am 27. Erbrechen viel seltener und erst 10—15 Minuten nach dem Saugen. Stühle besser. Pepsin auf 1.5 gesteigert. Am 31. Heilung.

Unter gewissen Umständen hat also das Pepsin Erfolge aufzuweisen, und man kann bei der Dyspepsie, wie Sie sehen, dahin kommen, alle von der Erfahrung erprobten Mittel nach einander zu versuchen. In dem einen Falle wird dies, in dem anderen jenes Medicament sich wirksamer zeigen, ohne dass wir im Stande sind, die Gründe dieser Verschiedenheiten aufzufinden. Den bereits genannten reihen sich noch mehrere

Mittel an, von denen bei der Schilderung der „Diarrhoe“ weiter die Rede sein wird, besonders das Bismuthum subnitricum (Magisterium Bismuthi). Der Zeitpunkt, in welchem die Beimischung vieler Schleimfetzen in den Stühlen anzeigt, dass die chemischen Vorgänge die Darmschleimhaut in einen katartholischen Zustand zu versetzen beginnen, scheint mir vorzugsweise zur Anwendung dieses Mittels geeignet. Kindern im ersten Jahre kann man dreist 0,05 bis 0,2 Magist. Bismuthi, mit Pulv. gummos. 0,5, 5 bis 6mal täglich geben, und bei Wochenlangen Dauer sah ich oft von einem Zusatz von Extr. Opii aquos. 0,002 bis 0,005 eine gesteigerte Wirkung. Auch später, wenn die Symptome des chronischen Intestinalkatarrhs immer mehr in den Vordergrund treten, bildet das Wisnuth eines unserer zuverlässigsten Mittel. Auch das Argentum nitricum (0,05:100) leistet in manchen Fällen dyspeptischer Diarrhoe unverkennbar gute Dienste, ist daher bei grösserer Hartnäckigkeit derselben immer des Versuches werth. Nach erfolgter Heilung empfehle ich Ihnen als Tonicum für die Verdauung besonders das Rheum, welches in Form der Tinctura rhei vinosa (je nach dem Alter 5 bis 15 gtt. 3—4mal täglich) einige Wochen fort gebraucht werden muss.)

V. Die Koryza der Säuglinge.

Die grosse Empfindlichkeit der kindlichen Nasenschleimhaut zeigt sich schon beim Neugeborenen, welcher bald nach der Geburt und in den ersten Lebenswochen auf den Contact der atmosphärischen Luft mit häufigen reflectorischen Niesen antwortet. Eine Erkältung, welche den Neugeborenen, besonders beim unvorsichtigen Waschen oder Baden, trifft, erzeugt leicht einen Schnupfen mit schnüfflendem Athem und serös-schleimiger Absonderung, welche bei nicht sorgfältiger Reinhaltung an den Nasenlöchern zu gelbbraunlichen Krusten vertrocknet und den Lufteintritt noch mehr beeinträchtigt. Diese Tendenz zum Schnupfen finden Sie nun auch bei Säuglingen während des ganzen ersten Lebensjahres. Nach dem, was ich Ihnen früher (S. 84) mittheilte, werden Sie es begreiflich finden, dass in allen solchen Fällen ein leiser Verdacht auf Syphilis hereditaria sich dem Arzte aufdrängt, und zwar um so mehr, als ja die Koryza das erste Symptom der Lues bilden, allen an-

¹⁾ Ueber die von Demme (18. Bericht üb. d. Thätigkeit d. Jenner'schen Kinderhospitals 1880, p. 42) wiederholt und zum Theil mit Erfolg vermehrte Transfusion (3,0 Blut zu 5—8 Malen) stellt mir eigene Erfahrung. Demme selbst spricht sich über den Werth dieser Methode, welche die gesunkene Ernährung heben soll, sehr zurückhaltend aus.

deren Erscheinungen desselben wochenlang vorausgehen kann. Aus diesem Grunde sind wir verpflichtet, bei jeder Koryza, die sich in die Länge zieht, das Kind und die Eltern in dieser Beziehung zu unterrichten, um bei einer Bestätigung des Verdachtes sofort die allein hilfreiche spezifische Behandlung einleiten zu können.

Obwohl nun die syphilitische Koryza denselben Gefahren mit sich führen kann, wie jeder gewöhnliche nicht spezifische Schnupfen der Säuglinge, geschieht dies doch nur selten. In den meisten Fällen bildet dieselbe nur ein Glied in der Kette der andern Erscheinungen, ohne eine besonders vorwiegende Bedeutung in Anspruch zu nehmen. Ungleich häufiger sehen wir bei der einfachen, durch Erkältung entstandenen Koryza Symptome auftreten, welche in mehrfacher Hinsicht verderblich werden können. Die Gefahr, von welcher das Kind bedroht wird, liegt zunächst darin, dass der Schnupfen sich in diesem Alter mit grosser Schnelligkeit nach unten auf die Schleimhaut des Kehlkopfes, der Trachea und selbst der Bronchien ausbreiten kann. Heiserkeit des Geschreies, Husten, Fieber, Dyspnoe entwickeln sich nicht selten binnen wenigen Tagen, und die Untersuchung ergibt dann eine mehr oder weniger diffuse Bronchitis und Bronchopneumonie. Andererseits kann die katarrhalische Wulstung der Nasenschleimhaut, welche die ohnehin schon sehr enge Nasenhöhle des Kindes erheblich verengt, eine mehr oder weniger hochgradige Dyspnoe zur Folge haben, welche jedem mit der Koryza combinirten Tracheal- und Bronchialkatarrh ein besänftigendes Gepräge giebt, ohne dass die Auscultation und Percussion die Befürchtungen rechtfertigt. Aber auch in Fällen von ganz reiner uncomplicirter Koryza kommt es bisweilen zu plötzlichen Anfällen von Dyspnoe, welche den eilig citirten, mit dem früheren Zustande des Kindes nicht bekannten Arzt leicht in Verlegenheit setzen. Bouchut beschreibt asphyktische Symptome, welche dadurch entstehen sollen, dass das Kind in der Unmöglichkeit, durch die verstopfte Nase Luft zu holen, nunmehr durch den Mund mit einer solchen Gewalt athmet, dass die Zunge durch Aspiration plötzlich nach hinten geschwellt und mit der unteren Fläche ihrer Spitze gegen den harten Gaumen gepresst wird, wodurch der Eintritt der Luft in den Rachenraum verhindert werden muss. Diese Ansicht von einer Aspiration der Zunge durch gewaltsames Einathmen wird von Manden, auch von Kussmaul und Hensell¹⁾ getheilt, und man kann die Möglichkeit des Vorganges, zumal wenn das Zungenbändchen lang und schlaff ist, nicht in Abrede stellen. Mir persönlich ist

¹⁾ Hensl und Pfeuffer's Zeitschr. III. Reihe, Bd. XXIII, p. 291. 1875.

die Aspiration der Zunge allerdings nur einmal, und zwar nicht bei Koryza, sondern in einem Falle von Spasmus glottidis vorgekommen, wobei ich nur mühsam mit dem Zeigefinger über die fest gegen den Gaumen gepresste, nach oben ungeschlagene Zunge bis zur Wurzel gelangen und diese mit Gewalt nach vorn ziehen konnte. Die Dyspnoe bei der Koryza kleiner Kinder musste ich jedoch immer als die Folge der Obstruction der Nasenhöhle auffassen, und sah dieselbe in sehr acuten Fällen bisweilen einen Grad erreichen, der zu Verwechselungen mit Croup Anlass geben konnte.

Im März 1861 wurde ich zu einem 7 Wochen alten Kinde gerufen, bei welchem seit etwa anderthalb Stunden heftige Störkämpfe eingetreten waren. Nach der Aussage der erschrockenen Eltern war das Kind noch vor einigen Stunden vollkommen wohl gewesen und bei starkem Getriebe ausgetragten worden, hatte aber fast unmerklich nach der Rückkehr ohne jede Veranlassung, namentlich ohne zu saugen, die Anfälle bekommen. Da der Sturm bei meiner Ankunft vorüber war, dachte ich an Anfälle von Glottiskampf und Hess, um denselben kennen zu lernen, das Kind an die Brust legen. Sofort erfolgte ein neuer gewaltiger Anfall, fast ebenso intensiv wie beim Croup. Mit dem Ausbruche höchster Angst in dem cyanotischen Gesicht, offenem Munde und gewaltsamen Action aller inspiratorischen Muskeln schnappte das Kind nach Luft, wobei jedesmal ein pfeifendes Geräusch gehört wurde. Dasselbe klang aber nicht so wie beim Spasmus glottidis, sondern stammte deutlich aus der Nase. Rachenhöhle vollkommen frei. Nach einigen Minuten allmählicher Nachlass, bald auch Schlaf, während dessen In- und Expiration von Schüffeln begleitet waren. Der untere Theil der Nase etwas angeschwollen. Ich liess das Kind in den nächsten 12 Stunden nur mittelst des Löffels ernähren, öfters warme Oelreizungen in den Nasenreihen machen und gab 2mal täglich Calomel 0,015. Am nächsten Tage hatte sich ein schleimig-eitrigiger Ausfluss aus der Nase eingestellt, welcher nach einigen Tagen wieder verschwand.

In Fällen dieser Art, die immerhin zu den seltenen gehören, ist besonders die jähe Entwicklung der katarrhalischen Schleimhautwulstung bemerkenswerth, analog derjenigen, welche auch bei Erwachsenen im Verlaufe eines starken Schnupfens, besonders in liegender Stellung während der Nacht so häufig eintritt und das Athembolen durch die Nase beeinträchtigt. Auch hier erlischt mit der gesteigerten Wulstung die Secretion, und in der Regel bringt erst das Aufrichten in eine sitzende Stellung Erleichterung, wie es wohl jeder an sich selbst erfahren hat. Auch bei dem eben erwähnten Kinde wurde die Dyspnoe am besten durch Heraustragen des kleinen Patienten mit aufgerichtetem Oberkörper gemindert. Meiner Ansicht nach findet eine entschiedenere Analogie statt zwischen diesen Fällen von acuter Koryza, dem sogenannten Pseudocroup und gewissen sehr acut auftretenden Anfällen von Bronchialkatarrh, auf welche ich bei einer späteren Gelegenheit zurückkommen werde. Eine zweite Gefahr liegt in der Behinderung des Saugens.

Das Kind, welches während dieses Actes auf das Athmen durch die Nase angewiesen ist, vermag dies nicht mehr und muss die Warze oder den Saugpfropfen sehr häufig loslassen, um durch den Mund inspiriren zu können, wodurch mit der Zeit die Ernährung ernstlich beeinträchtigt werden muss. Aus demselben Grunde sieht man bei starker Koryza gerade während des Saugens nicht selten heftige dyspnoische Anfälle entstehen.

Die Koryza befallt fast immer beide Nasenhöhlen zu gleicher Zeit; nur selten findet man dieselbe auf die eine Seite beschränkt. So beobachtete ich im Juni 1874 ein 8 Wochen altes Kind, welches früher vollkommen gesund, zumal der Lues in keiner Weise verdächtig war, aber seit etwa 14 Tagen an einem gelblichen serösen Ausfluss aus der rechten Nasenhöhle litt, während die linke vollkommen intact war. Seitlicher Druck auf die rechte Nasenhälfte förderte den Ausfluss. Dabei bestand schnüffelnder Athem und Dyspnoe während des Saugens, so dass das Kind die Warze oft fahren lassen musste. Auspinselung der rechten Nasenhöhle mit einer Solut. argenti nitrici führte binnen 14 Tagen Heilung herbei.

Die angeführten Beispiele enthalten zugleich alles, was ich Ihnen über die Behandlung der Koryza zu sagen habe. Vor allem erheischt die Ernährung des Kindes Ihre Sorgfalt. Wird das Saugen durch Dyspnoe verhindert, so muss man die der Mutter künstlich entzogene Milch oder die Kuhmilch mittelst eines Löffels einfössen, womit ich selbst noch immer ausgekommen bin. Verrarete wohl der Fall von Kussmaul'schen, wo das 6 Monate alte Kind wegen der oben erwähnten Aspiration der Zunge eine volle Woche mittelst der Schlundsonde ernährt werden musste. Zum inneren Gebrauch empfehle ich Ihnen bei sehr neuem Auftreten der Koryza das Calomel zu 0.01—0.015 2 stündlich, auch da, wo kein Verdacht auf Syphilis vorliegt. In den leichteren Fällen haben Sie indess nichts weiter zu thun, als das Lumen der Nasenlöcher durch Empinseln von Oel und durch Entfernung der Krusten frei zu halten. Bei mehr chronischem Verlaufe sind Auspinselungen der Nase mit einer Lösung von Lapis infernalis (1:50) in den meisten Fällen hilfreich.

VI. Der Retropharyngealabscess.

Dass diese Affection trotz aller Beschreibungen vielen Aerzten noch so gut wie unbekannt ist, liegt zunächst in ihrem immerhin seltenen Vorkommen; denn trotz des grossen Materials, welches mir zu Gebote steht, verfüge ich selbst doch nur über etwa 50 Fälle. Daher kommt es,

dass viele Ärzte, namentlich solche, die nicht Massen kranker Kinder zu sehen bekommen, die Krankheit überhaupt gar nicht kennen lernen und den ersten Fall, welcher sich ihnen darbietet, gewöhnlich verkennt. Nur derjenige Arzt, dem es vergönnt war, einen Fall von Retropharyngealabscess genau zu beobachten, ist gegen einen diagnostischen Irrthum ziemlich gesichert, denn das Bild der Krankheit ist ihm unvergesslich eingeprägt, und die Erinnerung an das einmal Erlebte erleichtert ihm die Diagnose.

Es handelt sich hier um eine fast immer ziemlich schleichend sich entwickelnde Abscessbildung in dem zwischen der Halswirbelsäule und dem Pharynx befindlichen Bindegewebe, mit schliesslicher Bildung eines Tumors, welcher mehr oder weniger in die Pharynxhöhle hineinragend erhebliche Störungen der Deglutition und endlich auch der Respiration zur Folge haben kann.

Den ersten Fall dieser Art beobachtete ich schon im Jahre 1850¹⁾ und verdanke dessen Diagnose, wie ich gern gestehe, nur dem Umstande, dass ich zufällig einige Tage vorher zwei von Fleming im *Dublin Journal*, Febr. 1850 veröffentlichte Fälle dieser Art gelesen hatte. Diese erste und noch zwei andere Beobachtungen finden sich in dem von Romberg und von mir herausgegebenen Buche „Klinische Wahrnehmungen und Beobachtungen“ (Berlin 1851, S. 120) zusammengestellt, und das damals entworfene Bild hat durch zahlreiche spätere Beobachtungen keine Aenderung erfahren. Fast alle meine Fälle betrafen Kinder, welche das erste Lebensjahr noch nicht oder nur um ein Geringes überschritten hatten, die meisten waren sogar noch jünger, das jüngste Kind erst 4 Monate alt. Nur zweimal betraf die Affection Kinder von resp. 2 und 3½ Jahren, welche zufällig an einem und demselben Tage (26. Juli 1880) in die Poliklinik kamen. Die Krankheit ist in ihren Anfängen äusserst dunkel; Weinerlichkeit, Unruhe, häufige Verweigerung des Saugens sind die ersten Symptome, aus denen sich noch keine Diagnose stellen lässt. Zwar ist zu vermuthen, dass von vorn herein Schmerzen beim Schlucken vorhanden sein müssen, aber die Dysphagie ist ein Symptom, welches bei so kleinen Kindern, die noch nicht klagen können, im Anfange nicht zu ermitteln ist. Nur die schmerzhafto Verziehung der Gesichtszüge während des Trankens kann Verdacht erwecken, fehlt aber nicht selten auch nach völliger Entwicklung des Tumors, ebenso wie die Regurgitation der genossenen Flüssigkeiten. Das erste wirklich verdächtige Zeichen bleibt für mich immer ein schnarchender Ton beim Athmen, besonders

¹⁾ Casper's Wochenschr. 22. Juni 1850.

während des Schlafes, und gerade dies Symptom lässt den Ungeübten das Leiden oft als einen Schnupfen auffassen, der zuweilen, keineswegs aber immer, dasselbe begleitet. Die Inspection des Pharynx, welche jeder gewissenhafte Arzt unter diesen Umständen vornehmen sollte, ergiebt in der Regel nichts, höchstens eine durch Schleim verdeckte Wulstung und Röthe der Rachenschleimhaut, und man beruhigt sich dann bei der Annahme einer katarrhalischen Schwellung der Choanae. In der Regel vergehen 1¹/₂ bis 2 Wochen und mehr, ehe der Abscess durch seine Volumenzunahme die Athmung ernstlicher beeinträchtigt. Dann aber beginnt eine neue Reihe von Erscheinungen, welche geeignet ist, den mit der Krankheit nicht vertrauten Arzt unter der Maske eines starken Larynxkatarrhes oder gar eines Croup zu täuschen. Die Respiration wird mühsam, die inspiratorischen Hülfsmuskeln arbeiten energisch, und jede In- und Expiration ist von einem schnarchenden Geräusche begleitet. Beim Versuch zu trinken entstehen leicht Anfälle von Suffocation, und oft wird die Flüssigkeit aus Nase und Mund regurgitirt. Das ängstliche Gesicht kam in den höchsten Graden der Krankheit einen cyanotischen Anflug zeigen. Bedeutungsvoll schien mir früher der normale Klang der Stimme und der Mangel des Hustens, weil ich darin einen wesentlichen Unterschied vom Croup zu finden glaubte. Spätere Erfahrungen belehrten mich indess, dass dies keineswegs constant ist, dass vielmehr Fälle vorkommen, in welchen durch einen begleitenden Katarrh des Larynx Heiserkeit und Husten entsteht. Um so dringender wird daher die Pflicht der tetlichen Untersuchung. In vielen Fällen von Retropharyngealabscess sieht man schon ausserlich auf einer oder beiden Seiten der oberen Halsgegend eine diffuse Schwellung, und fühlt auch mehrere angeschwellene Lymphdrüsen, welche durch ihre oberflächliche Lage sofort den Eindruck machen, als wären sie durch einen Druck von innen nach aussen gedrängt worden. Die Venae jugulares externae sind häufig stark turgescent. Alle diese Symptome haben indess noch nichts Charakteristisches; die sichere Diagnose beruht einzig und allein auf der Localuntersuchung des Pharynx mittelst des über die Zunge in den Rachen geführten Fingers. Bei Kindern, welche bereits Zähne haben, ist diese Untersuchung schwieriger, weil dieselben oft in den eingeführten Finger beißen, und ich pflege dann den letzteren durch einen Bleeding zu schützen. Auch müssen Sie darauf gefasst sein, bei sehr hochgradiger Dyspnoe durch die locale Untersuchung nicht bloss asphyktische Erscheinungen, sondern, wie es Fleming beobachtete, sogar Convulsionen zu erregen. Dennoch ist es mir noch jedesmal ohne grosse Mühe gelungen, den Abscess als eine im Rachen von der Wirbelsäule her

prominirende Geschwulst deutlich zu fühlen, entweder im oberen Theile, so dass ich gleich hinter dem Velum auf die Geschwulst stiess, oder was viel unerwünschter ist, tiefer unten, im Niveau der Epiglottis oder noch tiefer. Die Geschwulst ist meistens halbkugelig rund, seltener oval, deutlich fluctuirend, etwa Wallnussgross, und sitzt entweder in der Mediallinie oder mehr seitlich. Hat man sie einmal gefühlt, so ist man der Diagnose sicher, denn andere fluctuirende Geschwülste mit den geschilderten Symptomen und einem acuten Verlauf kommen in der betreffenden Gegend bei so jungen Kindern nur ausnahmsweise vor¹⁾. Mit der Diagnose ist aber auch die Therapie gegeben. Ich empfehle Ihnen dringend, sobald Sie die Fluctuation deutlich constatirt haben, mit der Incision der Geschwulst keinen Augenblick zu zögern. Denn wenn auch die dyspnoischen Erscheinungen, welche durch die Behinderung des Luft-eintrittes in den Larynx entstehen, noch nicht einen momentan bedrohlichen Grad erreicht haben sollten, sind Sie doch nicht sicher, dass der Tumor sich unerwartet spontan öffnet und sein Inhalt theilweise durch Aspiration in den Larynx gelangt. Ich selbst erlebte es, dass ein College, welcher den betreffenden Fall behufs einer klinischen Vorstellung bis zum nächsten Tage „conserviren“ wollte, diese Verzögerung mit dem plötzlichen Erstickungstode des Kindes während der Nacht bezahlen musste. Solche Fälle, oder der von Noll mitgetheilte, wo der Abscess 7 Tage, nachdem man ihn entdeckt, noch nicht geöffnet war und schliesslich durch Ruptur in den Oesophagus und Eitersenkung lethäl endete, müssen als warnende Beispiele aufgestellt werden.

Es giebt also nur ein Heilmittel, die rasche Incision. Ich habe dieselbe in allen mir bisher vorgekommenen Fällen mit einem geraden, oder bei tiefer Lage des Abscesses mit einem gekrümmten Entouri oder Tenatom vorgenommen, welches bis nahe zur Spitze mit Papier oder Heftpflaster umwickelt wurde. Mit dem Zeigefinger der linken Hand drückt man die Zunge des Kindes, dessen Kopf von einem Assistenten oder einer Wärterin fest gehalten werden und sich in aufrechter Stellung befinden muss, dergestalt nieder, dass die Spitze des Fingers die zu eröffnende Geschwulst berührt und deutlich fühlt. Man benutzt nun diesen Finger wie eine Leitungssonde, führt das Messer vorsichtig längs desselben bis an seine Spitze, d. h. also bis an den Tumor, sticht dreist in denselben hinein, wobei sich die Rachenhöhle sofort mit gelbem Eiter füllt,

¹⁾ Vergl. z. B. den Fall eines Lipoms hinter dem Pharynx (Taylor, Lancet. 1876. II. p. 683), oder denjenigen eines Abscesses zwischen Zunge und Kehldeckel (Pavly, Klin. Wochenschr. 1877. 22).

und erweitert beim Herausziehen des Messers die kleine Wunde. Um das Auswerfen des Eiters zu erleichtern, bringe man den Kopf des Kindes sofort in eine nach vorn geneigte Lage. Mit der gelungenen Incision ist in den meisten Fällen alles zu Ende, und ein schnellerer, überraschender Wechsel lässt sich kaum denken, als der Uebergang von der hochgradigsten Dyspnoe, welche den baldigen Tod in Aussicht zu stellen schien, zur vollständigen Euphorie. Fast immer sah ich die Athemnoth wie durch einen Zauberschlag verschwinden, die äussere Anschwellung am Hals rasch einsinken, die Turgescent der Jugularvenen abnehmen, und schon nach wenigen Minuten blickt das anscheinend verlorrene Kind behaglich um sich und nimmt gern die lange verweigerte Brust.

Indess ist die Sache doch nicht constant so rasch und ohne Zwischenfälle abgethan, wie ich es Ihnen hier geschildert habe. In mehreren Fällen boten sich mir weit grössere Schwierigkeiten dar, welche vorzugsweise in der tiefen Lage des Abscesses ihren Grund hatten. Ich konnte dann nur mit Mühe denselben mit der Spitze des Zeigefingers noch erreichen und das gekrümmte bistouri so tief hinabsenken. Besonders bei sehr jungen Kindern mit äusserst enger Mund- und Rachenhöhle fand ich dies öfters recht schwierig, indem bei den wiederholten Versuchen der Operation durch den über den Larynx hinweggeführten Finger starke Suffocationsanfälle bedingt wurden¹⁾. Dann stockt der Athem, die Kinder werden bläulich, röcheln die Augen, der Puls wird unregelmässig, klein — und es bleibt nichts übrig, als den Finger schnell herausziehen und die Respiration wieder herzustellen. Dennoch stand ich niemals ab, den Versuch zu erneuern und war auch stets so glücklich, das Ziel zu erreichen, wasser in einem Falle, wo der Abscess so tief hinter dem untersten Theile des Pharynx sass, dass ich von vorn herein an einem Erfolge verzweifelte. Für die Operation dieser sehr tief liegenden Retropharyngeal- und Retrooesophagalabscessen empfiehlt sich daher ein cathirtes Pharyngotom, welches ich selbst indess noch nie benutzt habe. Die leichtere Einführung, die geringere Besorgniss vor Verletzung anderer Mund- und Rachentheile und die Möglichkeit, das Instrument in eine grössere Tiefe zu führen, müssen für die bezeichnete Art von Abscessen dem Pharyngotom den Vorrang sichern. Wiederholt beobachtete ich auch, dass die einmalige Incision des Abscesses nicht genügt. Derselbe hatte sich vielmehr, wahrscheinlich in Folge einer zu kleinen Oeffnung, bereits am nächsten Tage wieder

¹⁾ Einen solchen Fall theilte ich bereits in meinem „Beitrag zur Kinderheilkunde“ N. F. Berlin 1868. p. 292 mit.

gefüllt, die Krankheitssymptome waren von neuem eingetreten, und es musste nun eine zweite Operation vorgenommen werden, welche fast immer zur völligen Heilung ausreichte. Nur in einem Falle war ich gezwungen, den Abscess dreimal zu öffnen, bemerke aber, dass ich mich beim zweiten Male statt des Bistouris meines Fingernagels bedient hatte, eine hier und da empfohlene Methode, welcher ich nicht das Wort reden kann. Nach der Incision rathe ich Harn, fleissig laue Wassereinspritzungen in die Nasen- und Rachenhöhle zu machen, um Blut und Eiter so viel als möglich auszuspielen. Die Gefahr einer Aspiration dieser Flüssigkeiten während der Operation ist zwar nicht ganz ausgeschlossen, aber in keinem meiner Fälle vorgekommen; ebenso wenig habe ich jemals durch Hineingelangen von Milch in die Incisionswunde üble Folgen beobachtet.

Wird die Operation nicht rechtzeitig unternommen, so kann es, wie ich bereits anführte, zur spontanen Ruptur während des Schlafes mit Aspiration von Eiter in die Luftwege und zu tödlicher Suffocation kommen. Andererseits kann sich der Eiter hinter dem Pharynx oder Oesophagus selbst bis ins Mediastinum herabsenken, und der Tod erfolgt dann schliesslich an Erschöpfung durch die umfangreiche Suppuration. In dem folgenden Falle verbreitete sich die Eiterung gleichzeitig bis unter die äusseren Theile des Halses:

Ein mageres schwächliches Kind von 10 Monaten wurde am 2. April 1873 in meine Poliklinik gebracht. Seit etwa 14 Tagen sollte es nicht gehörig schlucken können; dabei bestand zunehmender, zum Theil raschelnder Athem, copioses Schleimabscederung im Rachen und eine diffuse Schwellung beider Submaxillargegenden, in welchen man ein paar bis zur Wallnussgrösse geschwollene Lymphdrüsen fühlte. Venen am Schläfenbein ungewöhnlich turgescirend. Der eingeführte Finger stösst im Sinus der Epiglottis auf einen fluctuirenden, wallnussgrossen, von hinten in den Pharynx aus hervorragenden Tumor, den ich sofort incidirte. Leichtlicher Eiterausfluss. In den nächsten Tagen entschieden Besserung aller Symptome, aber der Eiterausfluss aus der Wunde fortwährend, die äussere Anschwellung wenig vermindert, Drüsenmassen unverändert. Am 9. konnte ich beiderseits an den Seitentheilen der oberen Halspartie eine grosse fluctuirende Anschwellung constatiren, von denen die linke zuerst, die rechte am 11. geöffnet wurde, nachdem das Kind in die Charité aufgenommen war. Beide Incisionen entleerten mässige Eitermengen, aber die Wunden schlossen sich nicht, die Eiterung dauerte innen und aussen fort, Abmagerung und Collapse machten täglich Fortschritte. Tod am 19. Die Section ergab hinter dem Pharynx bis zur Speiseröhre hinab einen grossen Eiterherd, welcher sich nach beiden Seiten bis in die Submaxillargegenden hinein erstreckte, und hier nach aussen geöffnet worden war. Ausserdem beschränkte Brucelpeptosemie, Hyperplasie der Mesenterialdrüsen, kleine Tuberkel in der Leber, Wirbelsäule normal¹⁾.

¹⁾ In solchen innerlich sehr seltenen Fällen kann es auch durch den Druck

Sie ergeben daraus, dass die ursprünglich auf das retropharyngeale Bindegewebe beschränkte Eiterung sich auch seitlich weiter ausdehnen und zwischen den Muskeln hindurch dringend äusserlich am Halse zum Vorschein kommen kann. Den Durchbruch des Abscesses in den Pharynx hatte ich nur einmal zu beobachten Gelegenheit:

Magers kleines Kind von 15 Monaten, am 10. Januar 1863 in meiner Poliklinik vorgestellt. Seit etwa 8 Tagen völlige Aphonie, vorher schon längere Zeit Husten und Heiserkeit. Athem schwächernd, besonders im Schlafe, Röthe und Schleimaufbauung im Pharynx, ein Tumor weder innen noch aussen nachweisbar. Catarrh der Bronchien, dyspnoische Athmung, Absetzen beim Saugen, keine Dysphagie, mässiges Fieber. Tod am 14. unter Athembeschwerden. Section: bei der Trennung des Köpflappes vom Zungenbein stürzte eine grosse Menge gelben Eiters hervor, als dessen Quelle ein mindestens erbsengrosses Loch in der hinteren Pharynxwand erschien. Dasselbe hatte ganz das Aussehen eines runden Magengeschwürs, und befand sich gerade am Übergange des Pharynx in den Oesophagus. Aus diesem Loch quoll noch fortwährend Eiter heraus. Nach dem Abpräpariren des Schlandes ergab sich zwischen diesem und der Wirbelsäule ein ausgedehnter Eiterhauf, der sich etwa vom Epistropheum bis an den 6. Cervicalwirbel erstreckte. In dieser ganzen Strecke bestanden nur noch zerstückte Reste von Bindegewebe. Die Wirbelsäule zeigt keine krankhafte Veränderung. Auf und unter den Stimmländern sass ein klein-pulmante Massen, welche sich als Tuberkel auswiesen. Dabei kleine Entzündung der Bronchialdrüsen und Tuberkulose der Lungen.

Dieser Fall zeigt, dass wenn der Retropharyngealabscess sich in den Pharynx öffnet, die Diagnose desselben unmöglich werden kann, weil dann der Eiter des Abscesses durch die Rupturstelle grösstentheils in den Schlund abfließt, von dem Kinde verschluckt wird und dabei weder äusserlich, noch im Pharynx eine Geschwulst zu Stande zu kommen braucht.

Noch seltener als die retropharyngealen sind nach meiner Erfahrung diejenigen Abscesse, welche sich an einer Seitenwand des Pharynx, zwischen diesem und den Weichtheilen des Halses bilden, und daher einen fluctuirenden Tumor an der rechten oder linken Seitenwand hinter und unter der Tonsille bilden. In zwei Fällen erfolgte eine Ruptur des Abscesses in den äusseren Gehörgang, die gewiss zu den seltensten Ereignissen gehört.

Am 10. April 1874 consultirte mich ein befreundeter College wegen eines Halbleidens, an welchem sein 15 Monate altes Kind seit mehreren Tagen erkrankt war. Die Hauptsymptome waren Verlust der Laute, Dysphagie, Schlingen beim Versuch zu schlucken, mässiges Fieber, schwacher Athem im Schlafe. Die linke Mandel

des Eiters auf die Gegend des Foramen stylohyaloideum zu einer Paralyse des N. facialis kommen (Zakai).

eines geschwollen und stark geröthet; dicht hinter und unter demselben sah und fühlte man an der Seitenwand des Pharynx einen roten fuchsinrothen Tumor von Umfange einer halben Wallnuss. Auch innerlich unter dem Proc. mastoideus zeigte sich eine diffuse Anschwellung. Respirationsbeschwerden nicht bemerkbar. Als ich am 12. bekufs der Incision des Abscesses die Untersuchung wiederholte und dabei einen stärkeren Druck auf die Geschwulst ausübte, strömte plötzlich ein Strom gelben mit Blutstreifen vermischten Eiters aus dem linken Ohr, worauf der Tumor sofort verschwinden war und jeder operative Eingriff aufgegeben wurde. Am 13. dauerte der Eiterabfluss aus dem Ohr in mäßigem Grade fort, besonders beim Druck unterhalb des Proc. mastoideus. Das Kind war vollkommen wohl, schlief ohne Schnarchen, die Mündel fast normal, von Tumor keine Spur mehr wahrnehmbar. Störungen des Gehörs sind nicht zurückgeblieben.

Da die Kinderfrau angab, sie habe schon Tags zuvor etwas Eiterausfluss aus dem Ohre bemerkt, so ist wohl als sicher anzunehmen, dass der an der Seitenwand des Pharynx befindliche Abscess sich durch das lockere Bindegewebe allmähig einen Weg bis zum Meatus auditorius gebahnt und diesen siebähnig durchbrochen hatte. Durch die Compression des Tumors wurde die Ruptur dann plötzlich eine vollständige. Ganz analog verlief der zweite (Mai 1881) in der Poliklinik beobachtete Fall. Einen ähnlichen beschreibt auch Bokai¹⁾, nur war hier der Abscess bereits von innen geöffnet worden, hatte sich dann wieder gefüllt und entleerte sich beim Druck zumehr zugleich aus dem linken Ohr, worauf vollständige Heilung erfolgte.

Sehr selten öffnet sich phlegmonöser Abscess des Halsbindegewebes in den Pharynx, was ich bei einem 5-jährigen Knaben beobachtete, der am 11. April 1881 mit einer eitrigen vom rechten Kieferwinkel bis zur Scapula und vorn bis zur zweiten Rippe sich erstreckenden harten Induration aufgenommen wurde. Scharlach oder Diphtherie waren auszuschliessen. Der Pharynx war geröthet, die rechte Wand desselben scharf gedrängt, die Uvula nach links verschoben. Dysphagie, starke Speichelsecretion. Temp. Ab. 40,1. Am 12. spontane Ruptur des Abscesses in den Pharynx. Auswürgen von stinkendem Eiter, Blut- und Gewebestetzen. Temp. normal. Den 13. wegen Fluctuation Einschnitt am Halte und Entleerung stinkenden Eiters. Drainage. Am 25. Heilung.

Mit vereinzelten Ausnahmen gehörten alle von mir beobachteten Fälle zu den idiopathischen Abscessen, d. h. zu denen, welche bei ganz gesunden Kindern, unabhängig von einer anderen Krankheit, zu Stande kommen. Einzelne Kinder waren höchstens etwas atrophisch, hatten aber an keinem anderen Körpertheile Abscesses dar. Von einem Leiden der Halswirbelsäule war ebenso wenig die Rede, wie von irgend einer Allgemeinkrankheit, unter deren Einfluss der Abscess sich hätte entwickeln können. Ueber die Aetiologie aller dieser Fälle herrscht

¹⁾ Jahrb. f. Kinderheilk. N. 1876. p. 354.

daher völliges Dunkel, und die Annahme Bokai's und Anderer, dass die Entzündung und Eiterung des retropharyngealen Bindegewebes ursprünglich von den vor der Wirbelsäule liegenden Lymphdrüsen ausgeht, ist keineswegs vollkommen sicher gestellt. Mir selbst kam zwar ein Fall bei einem 3-jährigen Kinde vor, welches noch deutliche Narben skrophulöser Drüsenabscesse in beiden Schmaxillargegenden zeigte, doch halte ich denselben nicht für ausreichend, um mit absoluter Sicherheit den Abscess von einer Adenitis retropharyngealis herzuleiten.

Den Ausgang der Abscessbildung von einer Spondylitis der Halswirbel beobachtete ich nur einmal bei einem 1½-jährigen Kinde, welches seit Anfang Decembers 1874 eine erschwerte und schmerzhaft bewegte des Kopfes und eine auffallend steife Haltung desselben zeigte. Am 5. April 1875 hingerufen, fand ich diese Erscheinungen bedeutend gesteigert, ausserdem aber Beschwerden beim Schlucken, erschwerten und schmerzenden Athem während des Schlafes und einen wallnussgrossen sehr tief liegenden Abscess an der hinteren Pharynxwand. Derselbe wurde noch an demselben Tage incidirt und eine beträchtliche Menge Eiter entleert. Die Diagnose der Wirbelcaries wurde später durch das Erscheinen von Congestionsabscessen am Rücken und Halse, durch Lähmung der Arme und Paresen der unteren Extremitäten bestätigt.

Schliesslich sei noch erwähnt, dass ich in einem Falle von Scharlachfieber bei einem 1½-jährigen Kinde eine Abscessbildung im submaxillaren Bindegewebe beobachtete, welche schliesslich bis in den Pharynx durchbrach, aber auch von aussen geöffnet werden musste. Von dieser Beziehung wird bei der Scarlatina weiter die Rede sein. Ein paar ähnliche Fälle werden auch von Bokai und Lewandowsky ¹⁾ beschrieben.

VII. Die Dentition und ihre Erscheinungen.

Wenn auch das Hervortreten der Zähne im Allgemeinen den Abschluss des Säuglingsalters bezeichnet, und die Natur selbst dadurch zu verstehen giebt, dass die ausschliessliche Ernährung mit Flüssigkeiten einer consistenteren Nahrung Platz machen darf, so ist doch damit noch keineswegs die Verpflichtung zu einem Nahrungswechsel ausgesprochen. In der Regel brechen die ersten Zähne zwischen dem 7. und 9. Lebensmonat hervor, und doch ist es allgemein üblich, die Mutter- oder Ammenbrust mindestens bis zum Ende des 9. Monats, meistens noch etwas länger fortzugeben, selbst wenn die Kinder bereits alle ihre Schneide-

¹⁾ Klin. Wochenschr. 1882, Nr. 8.

zähne besitzen. Dabei kann die Säugende freilich durch das Beissen des Kindes in die Brustwarze beeinträchtigt werden, und dass dadurch zufällig auch für das Kind unangenehme Folgen entstehen können, lehrt der von mir am 5. Januar 1878 in der Poliklinik beobachtete Fall eines 1jährigen gesunden Kindes, welches durch den plötzlichen Aufschrei der geborenen Mutter erschreckt, zusammen zuckte und augenblicklich in Convulsionen verfiel.

Jeder Arzt weiss aus Erfahrung, dass die verschiedensten Beschwerden der Säuglinge, sogar derer, welche das erste Semester des Lebens noch nicht überschritten haben, von den Angehörigen auf die „Zähne“ bezogen werden. Aberglaube und Intoleranz reichen sich hier die Hand, zumal in der Armenpraxis, um allerlei Unheil, das oft nur schwer wieder gut zu machen ist, zu stiften. Jede Diarrhoe, jeder Krampfanfall, die bei solchen Kindern auftreten, werden von den „Zähnen“ abhängig gemacht, und demzufolge vernachlässigt oder gar als heilsam angesehen. Aerztliche Hilfe wird dann oft erst zu einer Zeit nachgesucht, wo sie zu spät kommt. Dieser alten, im Publicum trotz aller Belehrung noch immer in vollster Blüthe stehenden Tradition setzt nun ein grosser Theil der jetzigen Aerzte die entschiedenste Negation entgegen. Die Zahnung, so lautet ihre Ansicht, sei ein physiologischer Vorgang, der keine krankhaften Erscheinungen machen könne. Alles, was man früher als solche betrachtete, sei eitel Täuschung durch zufällige, neben der Dentition einhergehende Krankheiten, welche mit dieser nicht das Geringste zu thun hätten. Es fragt sich aber doch, ob diese entschiedene Negation durchweg eine berechtigte ist, und in vollster Anerkennung des Verdienstes, welches sich dieselbe in Bezug auf die Beschränkung der „Zahnkrankheiten“ erworben hat, kann ich doch einige Bedenken gegen die Maasslosigkeit dieser Ansicht nicht unterdrücken. Wir wissen, dass der Zahndurchbruch dadurch zu Stande kommt, dass die wachsende Zahnwurzel die bereits fertige Krone allmählig verschiebt und nach der Durchbrechung des überliegenden, durch den zunehmenden Druck immer mehr verdünnten Zahnfleisches aus der Alveole heraustreibt. Ist es nun so ganz undenkbar, dass dieser langsam vor sich gehende Process eine reizende Einwirkung auf die Dentalseize des N. trigeminus ausübt und reflectorische Erscheinungen zur Folge haben kann, welche nicht bloss im Gebiete der motorischen, sondern auch in demjenigen der Gefässnerven auftreten? Ich glaube diese Frage bejahen zu dürfen, und halte es besonders für zu weit gehend, jede Möglichkeit einer durch Zahneizung bedingten Krampfform zu leugnen. Ich werde Ihnen später Fälle mittheilen, wo z. B. partielle Krämpfe der Hals- und Nackenmuskeln ent-

scheiden mit dem Durchbruch einer Zahngruppe zusammenhängen. Auch die unbestreitbare Thatsache, dass ein hartnäckiges Erbrechen, eine Diarrhoe, oder selbst ein spastischer Hosten, welche Tage oder Wochen lang der Behandlung Trotz boten, mit einem Mal verschwinden, sobald ein oder ein paar Zähne aus der Alveole hervorgetreten sind, lässt sich wohl nur durch die von den Dentalisten des Quintus ausgehende reflectorische Anregung der Peristaltik oder des Vagus erklären. Man sollte sich davor hüten, die Ansichten unserer ärztlichen Vorfahren mit jener Ueberhebung, welche bei einem Theil der jüngeren Schule Mode geworden ist, über Bord zu werfen und ohne ausreichende praktische Erfahrung Principien aufzustellen, die immer erst das Resultat eines langen ärztlichen Lebens und sehr zahlreicher eigener Beobachtungen sein dürfen. Thatsache ist, dass ein grosser Theil der zahnenden Kinder während des Durchbraches einer Gruppe verstimmt ist, Schmerzen empfindet, unruhig schläft, und in der Gewichtszunahme etwas zurückbleibt.

Obwohl das Erscheinen der ersten Zähne im Durchschnitt zwischen dem 7. und 9. Lebensmonate stattfindet, fehlt es doch nicht an Beispielen einer viel früher vor sich gehenden Zahnung, und ich selbst beobachtete wiederholt Fälle, in denen ein oder zwei Schneidezähne schon am Ende des zweiten oder dritten Monats, oder etwas später hervortraten. Weit häufiger erleidet der Process eine Verspätung, und selbst bei Kindern, welche vollständig gesund sind, insbesondere nicht die leiseste Spur von Rachitis darbieten, sieht man nicht selten den ersten Zahn erst im 10. oder 11. Monate durchbrechen. Auch wird Ihnen bereits eine andere Anomalie bekannt geworden sein, welche bei gewissen historischen Persönlichkeiten als der Vorbote eines energischen gewalthätigen Charakters betrachtet wurde, ich meine die mit auf die Welt gebrachten Zähne. Nach dem, was ich selbst beobachtete, kann man zwei Formen derselben unterscheiden. Bei der ersten sieht man einen oder zwei spitze, mehr oder minder hakenförmige Zähne, welche nur in einer Duplicatur des Zahnfleisches angeheftet, von Anfang an lose und leicht beweglich sind. In der Regel hat man es mit den beiden mittleren Incisoren des Unterkiefers zu thun, die bei einem 3 Wochen alten Kinde fast von normaler Form, nur mit sägeartig geriffelter Schneide erschienen. Wahrscheinlich hat der Zahnkeim in solchen Fällen nicht bloss eine vorzeitige Entwicklung, sondern auch eine abnorm oberflächliche Lage gehabt, so dass die Krone noch vor der Ausbildung der Wurzel nach aussen gelangt ist. Solche Zähne habe ich stets sofort mit einer Pinzette ohne Mühe entfernt, weil dieselben gewöhnlich die Brustwarzen der Säugenden und die untere Fläche der

Zunge verletzen, an welcher sich ein oder zwei den Zähnen entsprechende Ulcerationen bilden können. Nur in einem Falle, wo diese Geschwüre unter einer Bepinselung mit Solut. Zinc. sulphur. (2%) heilten, wurden die Zähne allmählig fester in der Alveole und ich liess sie daher sitzen, weiss aber nicht, was schliesslich daraus geworden ist. Bei der zweiten Form aber fand ich wirklich in der Alveole festsitzende Zähne, welche sich indess von den normalen später hervortretenden durch eine raube Oberfläche und gelbliche Farbe, also durch einen Defect des Schmelzes unterschieden. Diese Zähne erforderten behufs ihrer Entfernung eine grössere Gewalt, und ich rathe Ihnen, dieselben, so lange sie nicht lose geworden sind, lieber unangestastet zu lassen. Sobald dies aber geschieht, halte ich es für geboten, sie auszumachen, weil ich in diesen Fällen immer einen krankhaften Process in der Alveole beobachtet habe, der erst nach der Entfernung des Zahns heilen kann. Die drei folgenden Fälle mögen Ihnen als Beispiele dieser Form dienen:

Mädchen von 3 Monaten, am 2. April 1875 in die Poliklinik gebracht. Im linken Oberkiefer hatte schon bei der Geburt ein Zahn gewachsen, welcher am 5. Tage extrahirt worden war. Bald darauf Anschwellung der linken Wange. Die Untersuchung ergab bedeutende Verdickung des linken Oberkiefers, fistulöse Oeffnungen am Alveolarrande, aus welchen Eiter ausströmte, Eiterausfluss aus der linken Nasenhöhle und aus einer unter dem Augenbinnenrande befindlichen Fistel. Der Eiter war in hohem Grade eitrighaft. Fluctuierender Abscess in der Gegend des linken Jochbogens. Am 20. Auslösung mehrerer nekrotischer Knochensplindchen aus dem Alveolarrande, später künstliche Entfernung eines grösseren Sequesters. Weiterer Verlauf unbekannt.

Mädchen von 5 Monaten, vorgestellt am 5. October 1877. Nach der gewaltsamen Extraction eines im linken Oberkiefer mit auf die Welt gebrachten Zahns hatte sich eine schmerzhafte Anschwellung der linken Wange gebildet. Bei der Untersuchung fand sich der Oberkiefer verdickt, eitrighaft, fistulöse Oeffnungen am linken Alveolarrande und Eiterausfluss aus der linken Nasenhöhle. Aus der Behandlung hergeblieben.

Knabe von 2 Monaten, am 4. Januar 1878 vorgestellt. Die ganze linke Hälfte des Unterkiefers stark geschwollen, gegen Druck sehr empfindlich, das Zahnfleisch dunkelroth und gewulstet. Druck unter dem Kiefer bewirkte Eitererguss in die Mundhöhle, der übrigens auch spontan erfolgte. In der Gegend des ersten Backenzahns zeigte sich im Zahnfleisch eine kleine Oeffnung als Quelle des Eiters, und die in dieselbe eingeführte Sonde stiess auf einen harten Widerstand. Die Anamnese ergab, dass der erste linke Schneidezahn schon im Alter von 6 Wochen hervorgebrochen war, und zwar gleichzeitig mit der Anschwellung und Eiterung. Bei der zweiten Vorstellung des Kindes am 18. war auch der erste Backenzahn aus der erwähnten Oeffnung völlig zu Tage getreten. Beide Zähne waren ziemlich lose im Kiefer und sollten entfernt werden. Leider wurde das Kind der ferneren Beobachtung entzogen.

Dieser Fall, in welchem es sich nicht eigentlich um angeborene

Zähne, sondern nur um eine überaus frühzeitige Dentition handelt, scheint mir auf den ganzen Vorgang Licht zu werfen, indem er es wahrscheinlich macht, dass eine Periostitis des Alveolarraumes, sei es im Ober- oder Unterkiefer, durch Schwellung und Exsudation innerhalb der Alveole die Zahnkrone nach aussen drängt. Ich halte demnach die Periostitis für das Primäre, nicht etwa, wie ich früher annehmen zu müssen glaubte, für das Product der gewaltsamen Extraction des Zahns, und glaube auch die beiden ersten Fälle in gleicher Weise auffassen zu müssen. Wodurch das vor oder bald nach der Geburt entstandene Knochenleiden veranlasst wurde, muss ich dahin gestellt sein lassen; jedenfalls konnte Syphilis hereditaria in allen drei Fällen mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Die Extraction der betreffenden Zähne dürfte also unter diesen Umständen nicht nur unbedenklich, sondern sogar nothwendig sein, um die Alveole von dem reizenden Fremdkörper zu befreien. Ein von Samelsohn¹⁾ beobachteter Fall von Periostitis der Augenhöhle bei einem 14 Tage alten Kinde spricht gleichfalls für diese Ansicht. „Die Ursache der Erkrankung, welche mit einer enormen Protrusion des Bulbus einherging, war der vorzeitig zum Durchbruch dringende erste Backzahn, nach dessen Extraction der ganze Process sehr glücklich verlief. Der Zahn zeigte eine gut entwickelte Krone und den Beginn der Wurzelbildung.“ Ich glaube, dass nicht der „vorzeitig zum Durchbruch dringende Zahn“ als Ursache des Processes anzusehen ist, sondern dass eine aus unbekannten Gründen entstandene Periostitis des Oberkiefers den Zahn vorzeitig herausdrängte. Auch in 3 von Klementowsky²⁾ mitgetheilten Fällen sehen wir schon bei Kindern in den ersten Tagen und Monaten des Lebens durch eine nekrotisirende Entzündung des Zahnfleisches und Periosts Blosslegung der Alveole, Hervortreten und Ausfallen der Zähne bedingt werden. Leider kann ich aus dem Referate über diese Arbeit, welche mir im russischen Original nicht zugänglich war, nicht klar erkennen, ob die Ansicht des Verfassers, es habe sich dabei um eine brandige Stomatitis gehandelt, in der That eine berechtigte ist. —

Auch der zu normaler Zeit vor sich gehende Dentitionsprocess kann von verschiedenen localen Krankheitserscheinungen begleitet werden, welche unzweifelhaft als Producte der Zahnreizung betrachtet werden müssen. Sehr häufig beobachtet man eine allgemeine Rötung der Mundschleimhaut, besonders das Zahnfleisch, welches hier und da mit kleinen

1) Centralblatt f. Kinderheilk. I. 1878. p. 290.

2) Ibid. II. 1879. p. 186.

Häutchen abgestorbenen Epitheliums bedeckt ist, und eine stark vermehrte Speichelsecretion. Jede Berührung des Zahnfleisches ist empfindlich und ruft leicht kleine Blutungen hervor. In anderen Fällen beschränken sich die entzündlichen Erscheinungen auf die unmittelbare Umgebung der durchbrechenden Zähne, welche dann dunkel geröthet und zum Theil oberflächlich ulcerirt erscheint, oder der Sitz kleiner, öfters recidivirender Abscesse wird. Auch kommt es bisweilen zur multiplen Entwicklung jener gelblich grauen Plaques auf der Zunge und anderen Theilen der Schleimhaut, welche wir später unter dem Namen „Stomatitis aphthosa“ näher kennen lernen werden. Unter den vollständig entwickelten Zähnen sind es besonders die beiden mittleren Incisoren des Unterkiefers, welche durch ihre schnelle Schärfe die untere Fläche der Zunge beim Saugen, oder auch bei starkem Husten verletzen und kleine Ulcerationen derselben erzeugen. Ja bei einem 8 Monate alten ganz gesunden, insbesondere nicht hustenden Kinde fand ich durch die schnelle Schärfe der beiden mittleren Incisoren das Frenulum linguae bis auf einen kleinen Rest durch ein gelblich graues, leicht blutendes Geschwür zerstört, welches, ganz ähnlich dem beim Keuchhusten vorkommenden, durch das fortwährende Hinübergleiten der unteren Zungenfläche über die Zähne, hier beim Saugen, entstanden war. Alle diese localen Symptome aber sind doch im Verhältniss zu der grossen Majorität der Fälle, in denen die Dentition ohne jede locale Störung im Munde vor sich geht, selten, und gerade dieser Umstand bildet meiner Meinung nach eine Stütze für die oben entwickelte Ansicht, dass auch Störungen entfernter Organe, die ebenfalls in den meisten Fällen vermisst werden, doch unter gewissen Umständen, zumal bei besonders nervösen, zu Reflexactionen disponirten Kindern auftreten können. Mag man nun diese Ansicht theilen oder nicht, so ist man jetzt wohl darüber einig, dass jeder Versuch, den Durchbruch des Zahns zu erleichtern und dadurch die von der „erschwerten“ Zahnung abhängigen Erscheinungen zu beseitigen, absolut nutzlos ist. Das von England her überkommene Verfahren, das Zahnfleisch bis auf den durchbrechenden Zahn mit dem bistouri zu sacrificiren, habe ich selbst in früheren Jahren oft genug ausgeführt, um mich von seiner Erfolglosigkeit zu überzeugen. Ich sah dabei weder den Zahn früher zum Vorschein kommen, noch etwa stattfindende spastische Zufälle, zumal Glottiskrampf, irgendwie beeinflusst werden. Ja, diese früher so vielfach gerühmte Methode scheint mir das Bedenken zu erregen, dass die sich bildende Narbe den Widerstand, welcher sich dem Durchbruche des Zahns entgegenstellt, eher noch erhöhen kann. Der einzige Nutzen, den man von der kleinen Operation erwarten darf, ist

in den seltenen Fällen von ungewöhnlich starker Hyperämie des Zahnfleisches die Blutenleerung, welche indess unter solchen Umständen leicht excessiv werden kann. Aus allen diesen Gründen habe ich seit vielen Jahren die Scarification vollständig aufgegeben, und stimme darin wohl mit den meisten Aerzten überein.

Der Durchbruch der 20 Milchzähne, die ein Kind haben muss, erfolgt, wenn auch nicht immer, so doch meistens, in gewissen Abschnitten, welche durch eine Pause von einander getrennt werden. Wie ich schon bemerkte, brechen zwischen dem 7. und 9. Monate, häufig später, selten früher, die beiden mittleren unteren Schneidezähne zuerst hervor, auf welche dann nach einigen Wochen die beiden mittleren Incisoren der oberen Zahnsreihe folgen. Zunächst kommen dann die beiden seitlichen oberen und unteren Incisoren, deren Durchbruch unter normalen Verhältnissen bis zum Ende des ersten Jahres beendet zu sein pflegt. Abweichungen von dieser Ordnung, wobei z. B. die oberen Incisoren den Reigen eröffnen, und dann erst die unteren erscheinen, kommen nicht ganz selten vor. Die Gruppe der 4 vorderen Back- oder Mahlzähne pflegt zwischen dem 15. bis 18. Monate zu erscheinen, nur selten entwickeln sich dieselben, wenigstens zum Theil, vor der vollendeten Eruption der seitlichen Incisoren. Zwischen dem 18. und 20. Monate erfolgt in der Regel der Durchbruch der die Lücke zwischen den Back- und Schneidezähnen ausfüllenden 4 Eck- oder Augenzähne, und den Beschluss machen die 4 hinteren Backzähne, welche zwischen dem 20. und 26. Monate hervorsprossen. Damit ist der Process der ersten Dentition beendet. Dies alles gilt indess nur für gesunde Kinder. Durch eine schlechte Constitution, zumal Rachitis, wird die Zahnung sehr häufig in der Weise retardirt, dass die ersten Incisoren erst am Schlusse des ersten Jahres, oder noch viel später zum Vorschein kommen, und durch längere Pausen zwischen den einzelnen Gruppen der ganze Vorgang bis weit ins 3. Lebensjahr hineingezogen werden kann. Eine der seltensten Anomalien zeigte ein 5jähriges, nicht rachitisches Kind, bei welchem die beiden äusseren oberen Incisoren erst im 4. und 5. Lebensjahr zum Vorschein gekommen waren. Auf alle möglichen Abnormalitäten der ersten Dentition kann ich hier nicht eingehen. Erwähnt sei nur noch die bisweilen vorkommende Doppelbildung, die z. B. in einem meiner Fälle den rechten Eckzahn betraf. Statt eines einzigen, waren zwei Eckzähne, ein fast normaler vorderer und ein etwas schief nach hinten stehender vorhanden, welcher zugleich kleiner und spitzer erschien. —

Ich schliesse hiermit die Pathologie der frühesten Kindheit ab, und gehe zur Betrachtung derjenigen Krankheiten über, welche das

Kindesalter überhaupt, also auch Neugeborene und Säuglinge betreffen können. Die Varietäten der klinischen Erscheinungen, welche durch dies zarte Alter bedingt werden, sollen dabei die ihnen gebührende Berücksichtigung finden.

Dritter Abschnitt.

Krankheiten des Nervensystems.

I. Die Convulsionen der Kinder.

Die Neuropathologie verdankt einen grossen und wichtigen Theil ihres Materials dem Kindesalter. Die Disposition des kindlichen Nervensystems zu Erkrankungen kommt indess nicht allen Theilen desselben in gleicher Weise zu. Während von den Centralorganen vorzugsweise das Gehirn äusserst zahlreichen Erkrankungen unterliegt, wird das Rückenmark, abgesehen von den angeborenen Affectionen desselben (*Spina bifida*) und der myelitischen Kinderlähmung, weit seltener afficirt. Unter den sogenannten Neurosen aber treten diejenigen der Sensibilität (Neuralgien und Anaesthesien) vollkommen in den Hintergrund gegen die Störungen der Bewegungssphäre, zumal die Convulsionen, welche eins der häufigsten Leiden des Kindesalters von der Geburt an bis etwa zum Ablauf des 3. Lebensjahres bilden. Man hat auf verschiedene Weise, auch experimentell (Saltmann), versucht, diese ausserordentliche Tendenz des kindlichen Organismus zu krampfhaften Zuständen zu erklären. Wenn Saltmann aber die grosse Neigung zu Reflexerscheinungen in der ersten Lebenszeit junger Thiere bis zum 10. Tage von dem Fehlen aller Reflexhemmungscentra im Gehirn und Rückenmark abhängig macht¹⁾, so kann man doch die grosse Neigung zu Krämpfen, die noch bei älteren Kindern im zweiten und dritten Jahre stattfindet, nicht mehr auf solche Weise erklären. Halten wir uns daher lieber an die ärztliche Beobachtung, welche uns die grosse Neigung der Kinder zu reflectorischen Krämpfen täglich bestätigt. Beobachten Sie nur ein kleines Kind eine Zeit lang ruhig, so werden Sie sehen, wie der ganze Körper desselben oft schon bei plötzlichem Geräusch, bei unvernutheter Berührung zusammenzuckt, oder wie es bei heftigem Schreien plötzlich durch Glottiskrampf apnoeisch

¹⁾ Vergl. dagegen die Vermuthung Tarshankoff's, Centrall. f. Kinderheilk. II. 1879. p. 183.

wird. Und wie häufig bewirkt hier eine einfache Indigestion durch den von Magen und Darmkanal ausgehenden Reflexreiz allgemeine Convulsionen, welche unter gleichen Umständen bei Erwachsenen gewiss nur ausnahmsweise beobachtet werden!

Das Bild der Convulsionen oder der *Eclampsia infantilis*, wie man sie gewöhnlich nennt, weicht von dem des epileptischen Insults nicht wesentlich ab. Gewöhnlich beginnt der Anfall mit einem Verdrehen der Augen nach oben oder nach der Seite, oder mit einer unbewuslichen Starrheit des Blickes, wobei das Bewusstsein schwindet. Zuckungen der Gesichtsmuskeln, bisweilen nur einseitig mit Verziehung des Mundwinkels, schliessen sich an, die Kiefer sind durch Trismus geschlossen oder werden durch Krampf der Pterygoidei seitlich an einander verschoben, wobei Zähneknirschen entsteht. Auch Kaubewegungen werden öfter beobachtet. Tetanische Starre der Extremitäten, die von kurzen, wie durch elektrische Ströme erregten Zuckungen mehr oder weniger häufig unterbrochen wird, fehlt nur selten. Die Finger sind meistens stark flektirt und lassen sich nur schwer strecken, die Füsse in Dorsalflexion oder in der Form des *Pes equinus*, je nachdem die Strecker oder Beuger vorzugsweise von der krampfhaften Starre ergriffen sind. Auch die Rumpfmuskeln nehmen Theil; Retroversion oder Hin- und Herschleudern des Kopfes, Contraction der Athmuskeln mit bedingungsweisen Pausen der Respiration, abwechselnd mit sehr schnellen oberflächlichen Athembewegungen, Harte der Bauchmuskulatur, unwillkürliche Austreibung von Urin und Faeces sind, wenn nicht constante, doch sehr häufige Begleiter. Schon nach wenigen Secunden bekommt das entstellte Antlitz um Nase und Mund herum einen bläulichen (cyanotischen) Schimmer, und durch die gewaltsame Action der Zunge, Kau- und Wangenmuskulatur wird der Mundspeichel in Form eines schäumenartigen Schaums aus der Lippenfuge getrieben, der bei älteren mit Zähnen versehenen Kindern durch Zerbeißen der Zunge nicht selten mit etwas Blut vermischt ist. Diese Erscheinungen, welche die Eltern, zumal unerfahrenen, in den höchsten Schrecken versetzen, dauern in der Regel nur wenige Minuten; die Zuckungen nehmen dann an Intensität und Häufigkeit allmähig ab, die starren Glieder lösen sich, das Gesicht wird ruhiger und wieder besser gefärbt, und nur schwache, das betäubt daliegende Kind von Zeit zu Zeit durchfahrende Zuckungen erinnern schliesslich noch an den abgelaufenen Sturm, wie die fernem Blitze und leisen Donner eines abziehenden Gewitters. Oft aber ist diese Ruhe nur eine temporäre und täuschende. Noch ehe das Kind aus seiner Betäubung erweckt ist, beginnt der Anfall mit neuer Wuth, und so können sich die Krämpfe drei- bis viermal hintereinander wiederholen, wobei in

den Intervallen der soporöse Zustand, völlige Bewusst- und Empfindungslosigkeit fortbestehen. Die Fortdauer der Reflexsensibilität kann hier leicht täuschen, denn es kommt zuweilen vor, dass die Berührung der Conjunctiva eine Contraction des Orbicularmuskels, das Anspritzen kalten Wassers eine Reflexzuckung zur Folge hat; in den meisten Fällen aber fehlt diese Erscheinung, und oft genug konnte ich meine Fingerspitze auf die Conjunctiva bulbi legen, ohne die geringste Wirkung auf den Augenschließmuskel zu beobachten. Man darf indess diesen Mangel der Reflexsensibilität nicht sofort als ein tödtliches Zeichen betrachten, wie es von mancher Seite geschieht, da ich eine Anzahl solcher Kinder, welche diese Erschütterung darboten, vollständig genesen sah. Weit bedeutender ist die Dauer des Paroxysmus. Die nur von kurzen soporösen Pausen unterbrochenen Anfälle können sich stundenlang hinziehen, und Sie begreifen, dass unter diesen Umständen die Hemmung der Respiration, die venöse Stauung im Gehirn, schließlich auch die völlige Erschöpfung der Kräfte den Tod des Kindes herbeiführen können. Aber selbst dann ist der letzale Ausgang durchaus nicht immer zu befürchten, und jeder Arzt wird sich solcher Fälle erinnern, wo trotz der vielständigen, oder Tage und selbst Wochen lang sich immer wiederholenden Convulsionen die Kinder sich vollständig wieder erholten.

Gewöhnliche, auf wenige Minuten beschränkte Anfälle sind häufig schon vorüber, wenn der eilig hinzugerufene Arzt erscheint. Derselbe findet dann das Kind in der Regel noch soporös vor, und dieser Zustand geht unmerklich in einen gesunden Schlaf über, welcher mehrere Stunden, ja die ganze Nacht dauern kann, und aus welchem das Kind in vielen Fällen scheinbar gesund, als ob nichts vorgefallen wäre, erwacht. Dennoch sei man hier immer auf der Hut. Ein Epileptisanfall böht selten selbst; früher oder später muss man auf eine Wiederholung gefasst sein, und die Fälle, in welchen täglich oder alle paar Tage die schreckliche Scene sich wiederholt, gehören nicht zu den Seltenheiten. In vielen anderen Fällen aber vergehen Wochen, ja Monate, bevor ein neuer Anfall eintritt.

Wenn Sie zu einem solchen Kinde gerufen werden und dasselbe noch mitten in seinem convulsivischen Anfälle finden, so bleibt Ihnen keine Zeit, sich ausführlich nach der Entstehung des Uebels bei der erschrockenen Umgebung zu erkundigen. Man verlangt von Ihnen vor allem rasche Beseitigung der Krämpfe, und glücklicher Weise bedarf es auch keiner genaueren Anamnese, um die Therapie des Anfalls danach einzurichten. Die causale Indication muss hier zunächst der vitalen Platz machen, und ich kenne kein Mittel, welches die letztere sicherer erfüllt,

als Einathmungen von Chloroform. Halten Sie sich nicht mit anderen Dingen, wie Chloralkoholat, abführende Klystire, kalte Umschläge, Ansetzen von Blutegeln an den Kopf u. s. w. auf, sondern überall, wo es darauf ankommt, einen das mittlere Maass, also etwa fünf Minuten überschreitenden Anfall zu unterdrücken, wenden Sie sofort das Chloroform an. Ein Theelöffel Chloroform auf ein Schöpfgeschüssel gegossen und in der Art vor die Nase des Kindes gehalten, dass noch eine Luftschicht dazwischen bleibt, ist oft schon genügend. Schon nach wenigen Athemzügen beruhigt sich die krampfartige Erregung, und man kann die Inhalationen dreist bis zum völligen Nachlassen der Convulsionen fortsetzen. Selbstverständlich muss man während dieser Zeit den Puls und Athem des Kindes genau beobachten, um nöthigenfalls das Verfahren sofort unterbrechen zu können. Doch habe ich selbst noch niemals eine unangenehme Wirkung erlebt, obwohl ich die Inhalationen in vielen Fällen von Eklampsie, selbst bei ganz kleinen Kindern von 4—6 Monaten in Gebrauch zog. Bei einem 5 Monate alten Kinde, welches über 40 Anfälle im Laufe eines Tages hatte, liess ich jedesmal, sobald ein neuer Anfall sich ankündigte, Chloroform einathmen; stets richteten ein paar Athemzüge hin, um die Zuckungen rasch zu besänftigen, und am nächsten Tage, nach einer gut durchschlafenen Nacht, war das Kind, abgesehen von einer grossen Ermattung, vollkommen wohl. Ja, ich wagte es wiederholt in solchen Fällen, die Angehörigen selbst mit der Anwendung des Chloroforms bekannt zu machen, liess dieselben selbstständig damit vorgehen, sobald neue Anfälle eintraten, und habe das Vertrauen bis jetzt nicht zu bereuen gehabt. In der That ist es ja unmöglich, wenn der Arzt nicht den ganzen Tag bei dem Kinde sitzen kann, in jedem Augenblicke sachverständige Hülfe bei der Hand zu haben, und es bleibt daher nur übrig, den Versuch mit den Angehörigen oder noch besser mit einer guten Wärterin zu wagen. Cyanotische Färbung des Gesichts in Folge der Convulsionen war mir nie eine Contraindication gegen das Chloroform; sie verschwand immer, sobald das Mittel zu wirken begann. Ebenso wenig hielt mich eine Bronchopneumonie, in deren Verlaufe Convulsionen eintraten, ab, das Chloroform anzuwenden. Die Krämpfe liessen bald auf, während die Lungenaffecten ihren weiteren Verlauf nahmen. Dennoch darf ich Ihnen nicht verschweigen, dass Chloroform kein absolut sicheres Mittel gegen den eklampthischen Anfall ist. Abgesehen davon, dass es überhaupt nur palliativ wirkt und die Wiederholung der Convulsionen nicht zu hindern vermag, fand ich es auch in einzelnen sehr heftigen Fällen so gut wie unwirksam; die durch die Inhalationen erzeugten Fressen dauerten kaum ein paar Minuten und die

Anfall endete schliesslich durch Erschöpfung lethäl. Man hat sich sogar vor der Anwendung des Mittels zu hüten, wenn man das Kind bereits collabirt, mit einem sehr kleinen raschen Pulse und kühl werdenden Extremitäten befindet. Solche Fälle bilden aber immer eine kleine Minorität und können unserer warmen Empfehlung der Inhalationen keinen Eintrag thun. Die von Parry, Bland, Troussseau u. a. empfohlene Compression der Carotiden, welche ich selbst wiederholt versuchte¹⁾, giebt viel zu unsichere Resultate, um mich ernstlich in Betracht zu kommen.

Sobald der Eklampsieanfall, zu dem Sie gerufen wurden, entweder spontan oder unter Beihülfe der Chloroforminhalationen sein Ende erreicht hat, tritt die Frage nach der Ursache der Krankheit an Sie heran, denn nur durch die Erfüllung der causalen Indication werden Sie im Stande sein, die Wiederkehr der Anfälle zu verhüten. Es kann hier nicht meine Aufgabe sein, auf die Pathogenese des epileptiformen Anfalls überhaupt ausführlich einzugehen; nur daran möchte ich Sie erinnern, dass auf experimentellem Wege eine dreifache Entstehungsweise der Anfälle sicher nachgewiesen ist, die Anämie des Gehirns durch Contraction der kleinsten Hirnarterien (Kussmaul und Tenner), die kaltesitzige Durchschneidung des Rückenmarks oder des Ischiadicus mit darauf folgender Reizung der betreffenden Gesichtshälfte (Brown-Séquard), und Schläge auf den Kopf, welche kleine Blutextravasate in der Medulla oblongata zur Folge hatten (Westphal). Für die Pathogenese der infantilen Convulsionen lässt sich meiner Ansicht nach nur die erste und dritte Versuchreihe verwerthen. Es fehlt einerseits nicht an einzelnen Beispielen, wo ein heftiger Fall oder Schlag auf den Kopf epileptiforme Anfälle, sogar mit habituellem Wiederholung, bei Kindern zur Folge hatte, und ich selbst habe zwei solcher Fälle beobachtet. Andererseits kann eine Anämie des Gehirns in Folge von Herzschwäche bei erschöpfenden Krankheiten (Transitionskrämpfe), oder eine spastische Contraction der kleinen Arterien mit Ischämie wohl da angenommen werden, wo es sich um eine Reflexcrise oder um einen Fieberanfall handelt, der mit Convulsionen auftritt. Mit diesen Deutungen scheint mir indes die Pathogenese der Eklampsie keineswegs erschöpft zu sein. Ich erinnere nur daran, dass während des Anfalls häufig eine vermehrte Spannung, ja eine Prominenz und lebhafte Pulsation der grossen Fontanelle beobachtet wird, Erscheinungen, welche eher auf eine vermehrte Blutfülle, als auf eine Anämie des Gehirns hindeuten.

¹⁾ Beiträge zur Kinderheilk. N. F. Berlin 1878. p. 97.

Wenden wir uns nun zu den durch die ärztliche Erfahrung festgestellten ätiologischen Bedingungen der Eklampsie, so drängt sich Ihnen in jedem Falle zunächst die für die Prognose entscheidende Frage auf, ob die Convulsionen von einer materiellen Erkrankung des Gehirns ausgehen oder nicht, eine Frage, welche Sie, zumal wenn Ihnen das Kind noch unbekannt ist, nicht sofort entscheiden können. Man hat die Halbseitigkeit der Convulsionen zu Gunsten eines cerebralen Ursprungs geltend gemacht, und ich gehe zu, dass dies im Allgemeinen richtig ist, wenn bei Wiederholung der Anfälle immer nur dieselbe eine Hälfte des Körpers ergriffen wird und die andere frei bleibt. Man darf dabei aber nicht übersehen, dass zuweilen auch doppelseitige Convulsionen bei nur einseitiger Affection des Gehirns vorkommen, z. B. bei Tuberkeln desselben, und dass andererseits auch halbseitige Krämpfe in nicht wenigen Fällen beobachtet wurden, in denen kein wirkliches Cerebralleiden vorlag. Wiederholt sah ich die ersten Anfälle unter diesen Verhältnissen sich auf die eine Seite des Gesichts oder die eine Körperhälfte beschränken, oder den Paroxysmus nur aus einer Rotation des Kopfes mit Verdrehen der Augen und Zuckungen eines Arms bestehen, und die Krämpfe erst später auch auf der andern Körperhälfte auftreten. Ja selbst bei einem 8jährigen Kinde, welches an einer Darmirritation zu Grunde ging, sah ich die am Todestage auftretenden Convulsionen ausschließlich die rechte Gesichts- und Körperhälfte befallen. Trotzdem bleibt die Halbseitigkeit der Krämpfe immer ein bedeutsames Symptom, welches uns dringend anfordert, den Zustand des Kindes während der krampffreien Zeit recht gründlich auf eine Gehirnaffection zu prüfen und eine genaue Anamnese anzustellen. Sie dürfen dabei nicht vergessen, dass manche Gehirnerkrankheiten, z. B. Tuberkeln und Geschwülste, lange Zeit, selbst viele Monate hindurch sich nur durch von Zeit zu Zeit eintretende Eklampsieanfälle verrathen können, welche dann leicht für „idiopathische“ gehalten werden, bis plötzlich Hemiplegie oder Sopor den Irrthum aufklären. Die Entscheidung ist für den Arzt oft eine schwere Aufgabe, und ich mache Sie besonders darauf aufmerksam, dass auch bei Reflexkrämpfen zumal kleiner Kinder in den Intervallen sehr häufig Erscheinungen sich zeigen welche bedenklich erscheinen können, Masses Aussehen, Apathie, Aufhören des Lächelns, häufiges Zusammenschrecken, verstärkte Pulsation der Fontanelle, leichte Fieberbewegungen. Der vorsichtige Arzt wird hier immer gut thun, mit einem definitiven Urtheil zurückzuhalten, bis die weitere Beobachtung, das Ausbleiben frusterter Cerebralsymptome, Beruhigung gewährt.

In allen Fällen von Convulsionen, welche sich mehr oder minder

häufig wiederholen, empfehle ich Ihnen, Ihre Aufmerksamkeit zunächst auf das Knochensystem des betreffenden Kindes zu richten. Meiner Erfahrung nach wird die Tendenz zu Convulsionen durch keine andere Ursache in so hohem Grade gefördert, wie durch die Rachitis, und durch zahllose Fälle belehrt, pflege ich bei jedem Kinde, welches wegen Eklampsie in meine Behandlung kommt, sobald die Epiphysen der Rippen, der Vorderarmknochen und die Schädelknochen zu untersuchen. Bei den meisten Kindern zwischen dem 6. Lebensmonat und der Mitte des 8. Lebensjahres fand ich dann die mehr oder weniger entwickelten Zeichen der Rachitis. Fast immer sind in diesen Fällen gleichzeitig Anfälle von Stimmeritzenkrampf vorhanden, welche entweder die Krampfanfälle eröffnen, oder mit denselben abwechseln; nur selten fehlte der Glottiskrampf ganz und die Eklampsie bestand für sich allein. Worin diese Disposition der rachitischen Kinder zu Krämpfen begründet ist, bleibt vorläufig dahingestellt; eine mangelhafte Ernährung der Nervencentra dafür verantwortlich zu machen, wäre vereilt, da die Eklampsie ebenso gut bei wohlgenährten Rachitischen, wie bei Atrophischen vorkommt. Jedenfalls muss man gerade bei solchen Kindern auf Wiederholungen der Anfälle gefasst sein, für welche nur in den wenigsten Fällen bestimmte Gelegenheitsursachen aufzufinden sind.

Meiner Ansicht nach spielt die Rachitis hier eine weit einflussreichere Rolle, als die Dentition, die man so gern für die in dem betreffenden Lebensalter vorkommenden Krämpfe verantwortlich macht. Mit demselben Rechte könnte man die Rachitis selbst von der Zahnung herleiten, was doch keinem Vernünftigen einfallen wird. Nur selten beobachten wir Convulsionen bei zahnenden Kindern, die nicht rachitisch sind, es müssten denn ganz bestimmte Reflexanlässe nachweisbar sein. Zu diesen letzteren kann freilich, wie ich früher (S. 139) bemerkte, auch ein Zahndurchbruch unter besonders ungünstigen Umständen gehören, aber diese Fälle sind jedenfalls selten und schwer zu beweisen, und die Neigung vieler Mütter, die Convulsionen ihrer Kinder als „Zahnkrämpfe“ zu bezeichnen, darf Sie nie von der genauem Erforschung anderer, weit häufiger einwirkender Anlässe ablenken. Unter diesen nehmen nun Reizzustände der Verdauungsorgane unstreitig die erste Stelle ein. Schon bei Neugeborenen und Säuglingen sehen wir bei dyspeptischen Zuständen auf dem Wege des Reflexes convulsivische Anfälle nicht selten zu Stande kommen, und besonders eine ungeschickte künstliche Ernährung, wobei Ueberfütterung stattfindet, kann die Quelle der heftigsten eklampischen Zufälle werden.

Bei einem 4 Monate alten Kinde dieser Art, welchem über 2 Liter Kuhmilch

täglich gegeben worden und um hochgradiger Meteorismus sich ausgebildet hatte, sah ich 16 Tage hintereinander zahlreiche convulsivische Anfälle auftreten, welche sich nicht selten 50–60mal an einem Tage wiederholten, so dass von einem Intervall kaum die Rede war. Die Anfälle begannen meistens mit einem Drängen zum Stuhl und Rötung des Gesichts oder mit kollernden Geräuschen im Leibe, und die Stühle bestanden aus hellen, lehmigen, mit unangenehm harten Küsseln vermischten Massen. Nachdem durch Ricinöl und Klystire die schädlichen Darmcontenta entfernt und der Meteorismus beseitigt war, gelang es durch vorsichtige Anwendung der Chloroforminhaltungen (Einsaugen auf den Kopf) auch die enorm gesteigerte Reflexirregbarkeit abzuschwächen und die Ekklampsie zu beseitigen. Das Kind wurde dann durch eine Amme genährt.

Es war dies einer von den Fällen, in welchen die Krämpfe anfänglich nur halbseitig aufgetreten waren (Rotation des Kopfes nach rechts und Zuckungen des rechten Arms) und dadurch der Verdacht eines wirklichen Cerebralleidens erregt hatten. Der weitere Verlauf bewies, dass man es mit Reflexkrämpfen, die vom Darmkanal ausgingen, zu thun hatte, und ich mache in dieser Beziehung noch auf das den Convulsionen fast immer vorausgehende Drängen und Kollern im Leibe, so wie auf die Beschaffenheit der Stuhlgänge aufmerksam. Die Abhängigkeit der Ekklampsie von den Verdauungsstörungen war hier so evident, dass selbst das später constatirte Zurückbleiben der psychischen Entwicklung nicht für ein primäres Cerebralleidens gelten kann, sondern viel eher als eine Folge der zahllosen convulsivischen Anfälle betrachtet werden muss.

Auch die Fälle von Säuglingen, bei denen bald nach einem heftigen Gemüthsaffekt der Mutter Ekklampsie eintritt, gehören in diese Kategorie, insofern hier nur an eine den kindlichen Digestionsorganen nachtheilige Veränderung der Milch gedacht werden kann. Im späteren Kindesalter, bis gegen die zweite Dentition hin, können durch Ueberladung des Magens und Darmkanals mit qualitativ oder quantitativ schädlichen Stoffen ebenfalls die heftigsten convulsivischen Anfälle hervorgerufen werden. Aus der grossen Reihe der von mir beobachteten Fälle dieser Art mögen die folgenden als Beispiele dienen:

Kind von 3½ Jahren. Mittags reichlicher Genuss von Gurkenrost und Pfaffen. Abends Ekklampsieanfälle, die mit opisthen Passen etwa 2 Stunden dauerten. Kalte Fomentationen des Kopfes, Klystire, nach Aufhören des Sopor ein Brechmittel. Heilung.

Kind von 2 Jahren, gesund, erkrankt am 3. October mit Frost, in der Nacht starke Hitze. Am 4. um 9 und 12 Uhr Ekklampsieanfall. Nach demselben vollständige Anorexie, gelb belegte Zunge, Uebelkeit. Brechmittel, später Infus. Sennae. Heilung.

Kind von 2 Jahren, gesund am 17. März reichlich Sauerholz, worauf heftiger Meteorismus und ungewöhnliche Schlingigkeit folgten. Beides bestand am 18. Morgens fort; plötzlich Uebelkeit, Erbrechen und um 11 Uhr heftige Ekklampsieanfälle,

die mit kurzen Unterbrechungen bis 2 Uhr anhielt. Durch zwei Klystire wurden ein paar harte Stühle entleert. Um 2½ Uhr fand ich das Kind noch völlig bewußtlos, die Augen fest geschlossen, schwer zu öffnen, die Kiefer aufeinander gepreßt, Respiration rasselnd, unregelmäßig, von Zeit zu Zeit noch leichte Zuckungen der Extremitäten. Puls 120, sehr voll. Thor.: Strapismus im Nacken, kalte Fomentationen des Kopfes, 4 Blutigel hinter den Ohren, Calomel 0.06 zerstückelt. 6 Uhr: starke Nachtlung. Bewusstsein zurückgekehrt, das Kind hat Urin gelassen und zu essen verlangt, mit einer halben Stunde ruhiger Schlaf. Keine Öffnung. Infus. Sennae comp. 50/0. Am 19. nach starken Ausleerungen völliges Wohlbefinden; Krämpfe kehren nicht wieder.

Weit seltener als vollständige Eklampsieanfälle treten in Folge von dyspeptischen Vorgängen anderweitige nervöse Symptome auf, welche besonders dem Anfänger in der Praxis amerserst beunruhigend erscheinen und selbst dem Erfahrenen Bedenken erregen können. Ich werde später Gelegenheit haben, Ihnen einen solchen Symptomencomplex zu schildern, welchen ich unter dem Namen „Asthina dyspeptica“ beschrieben habe. Hier will ich Ihnen nur ein paar Fälle kurz vorführen, in deren einem Aphasia, im anderen Verlust des Bewusstseins ohne Convulsionen durch gastrische Störungen bedingt wurde.

Am 12. Juli 1881 wurde ein 3jähriger Knabe in die Poliklinik gebracht, welcher nach Aussage der erschrockenen Mutter bis vor einer Stunde vollkommen gesund war, seitdem aber kein Wort mehr sprechen konnte. In der That war es unmöglich, das Kind zum Sprechen zu bringen; nur beim Kratzen brachte es das Wort „Ja“ schwach hervor. Der Blick war angewendet starr, sonst nichts krankhaftes aufzufinden. Nach einer halben Stunde erfolgte plötzlich starkes Erbrechen, wobei mehrere fast ganz erhaltene Kirschen entleert wurden, und unmittelbar darauf stellte sich die Sprache völlig wieder her.

Im Oktober 1882 wurde ich von einem befreundeten Collegen bei einem 6jährigen Knaben consultirt, welcher Tage zuvor reichliche Mengen von rothem Obol, Kirschen u. s. w. zu sich genommen und in der darauf folgenden Nacht von heftiger Diarrhoe befallen worden war. Die nächsten Ausleerungen halbrothlicher Massen erfolgten unwillkürlich im Halbschlaf. Gegen Morgen Fieber, Unruhe, das Bewusstsein, klarer Blick; Mittags Zunahme dieser Erscheinungen in dem Grade, dass der Verlust eines Hirnschens zuge wurde. Nach Calomel noch mehrere grüne, schleimige Stühle. Abends Wiederkehr der Perception und der Sprache. Am nächsten Tage noch ruhigen Schlaf völlige Genesung bis auf einen gastrischen Zungenbelag.

Sie sehen aus diesen Fällen zugleich die Art der Behandlung. Emetica und Purgantia, Calomel, Öl. ricini, Infus. Sennae comp. u. s. (Formel 6 und 7) bilden hier den Heilapparat, welcher die reflexregirte Materia peccans aus dem Magen- und Darmkanal schnell entfernt. Bei stärkerer Aufregung und Spannung des Unterleibs thun Sie gut, schon während der Dauer der cerebralen Symptome ein Klystir von Milch

und Honig (2 : 1) oder auch von kühlem Wasser zu geben, um den Darm möglichst schnell zu entleeren. Blutentleerungen sind im Allgemeinen nicht zu empfehlen¹⁾. Wenn ich dieselben in einem der erwähnten Fälle anwendete, so geschah dies mit Rücksicht auf die unermüdete Dauer der Convulsionen (von 11 bis 2 Uhr), wobei eine bedeutende venöse Stauung im Gehirn und den Meningen vorausgesetzt werden musste. Um die schlimmen Folgen derselben möglichst zu verhüten, liess ich einige Blutegel appliciren, und empfehle Ihnen dies Verfahren für analoge Fälle, die keineswegs selten sind:

Bei einem 1 $\frac{1}{2}$ jährigen Kinde, welches am 20. März 1873 reichlich Kollöbren gegessen hatte, traten Abends Convulsionen ein, welche mit kurzen Entschluchungen bis zum Morgen anhielten, worauf spontan starkes Erbrechen und Diarrhoe folgten. Bei einem 4jährigen Knaben dauerten die durch *separata* Intervalle verbundenen Anfälle etwa 24 Stunden, und erzeugten ernsthafte Besorgnisse.

Ein paar Blutegel am Kopf, kalte Fomentationen oder eine Eishase auf demselben sind als prophylaktische Mittel unter diesen Umständen zu empfehlen, doch immer nur bei robusten Kindern. Im Allgemeinen kommt man mit der Application eines Eisentels vollkommen aus.

Die alte Tradition, dass analog den dyspeptischen Zuständen auch die Helminthen (Spulwürmer, Oxyuren und Taenia) häufige Anlässe der Convulsionen bilden sollen, spukt noch immer in den Köpfen der Mütter und selbst vieler Aerzte. Ich will zwar die Möglichkeit dieser Beziehung mit Rücksicht auf die Literatur keineswegs in Abrede stellen, aber meine persönliche Erfahrung lässt mich hier völlig im Stich. Ich habe niemals einen Fall von Eklampsie beobachtet, den ich mit Sicherheit auf den Reiz von Würmern zurückführen konnte, gebe aber gern zu, dass der Gebrauch von anthelminthischen Mitteln für solche Kinder zu empfehlen ist, bei denen schon früher das Vorhandensein von Würmern irgend einer Art nachgewiesen wurde oder wenigstens vermutet werden kann. Der Reflexanlass kann schliesslich auch in den urogenitalen Organen seinen Sitz haben, und ich werde Ihnen später ein Beispiel mittheilen, in welchem der Reiz kleiner Concremente die Ursache wiederholter convulsivischer Zufälle wurde.

Bedeutend für die Diagnose der Aetiologie ist besonders ein fieberhafter Zustand, welcher den eklamptischen Anfällen vorausgeht und nach denselben fort dauert. Auch in den Fällen dyspeptischer Convul-

¹⁾ Zu der von Carby (Hirsch und Virchow's Jahrbuch. I. 1878. II. p. 626) empfohlenen Einführung einer Magensonde, um Gas und Flüssigkeiten zu entleeren und allenfalls ein Brechmittel zu injiciren, fand ich mich bis jetzt noch niemals veranlasst.

sionen, von welchen eben die Rede war, kann Fieber vorhanden sein; niemals aber dürfen Sie unter diesen Umständen die Untersuchung anderer Organe verabsäumen, deren acute Erkrankungen im Kindesalter nicht selten mit Fieber und heftigen Convulsionen beginnen. Ich nenne hier in erster Reihe die primäre Pneumonie, nächstdem auch die Pleuritis und Enteritis, und werde bei der Betrachtung dieser Krankheiten Ihnen Beispiele eines solchen Beginns mittheilen. Hier sei nur bemerkt, dass die Diagnose einer auf diese Weise beginnenden Pneumonie zunächst oft schwer, ja unmöglich ist, weil die physikalische Untersuchung der Brust in diesem frühen Stadium noch keine wesentlichen Abnormitäten ergiebt, so dass man ein paar Tage in Ungewissheit darüber bleiben kann, ob man es nicht mit einer acut entzündlichen Krankheit des Gehirns zu thun hat. Sobald aber die Symptome der respiratorischen Krankheit in den Vordergrund treten, pflegen sich die cerebralen zurückziehen, und man erkennt dann, dass letztere eben nur die Einleitung der Pneumonie bildeten. Auf welche Weise die Convulsionen in solchen Fällen zu Stande kommen, ist nicht recht klar. Man könnte ebenso gut einen von den Lungen, der Pleura, dem Darm ausgehenden Reflexreiz, wie das heftige Fieber beschuldigen, welches bei reizbaren Kindern schon allein hinreicht, um Convulsionen zu erzeugen. Bei zwei Kindern von 6 und 8 Jahren, welche unter sehr heftigem Fieber von einer einfachen Angina tonsillaris befallen wurden, sah ich am ersten Tage wiederholte Eklampsieanfälle auftreten, welche die Umgebung und mich selbst nicht wenig beunruhigten, aber schon am folgenden Tage mit dem Fieber zugleich auf Nimmerwiederkehr verschwanden, und in dem einen dieser Fälle sollte dies, wie die Eltern angaben, schon ein paar Mal vorgekommen sein. Eine ähnliche Beobachtung theilt Faure²⁾ aus der Klinik von Barchez mit. Wir sehen also, dass schon ganz leichte Localaffectionen, wenn sie nur von einem intensiven Fieber eingeleitet werden, in ihrem Beginn Eklampsie mit sich bringen können, und es liegt daher nahe, nur das Fieber dafür verantwortlich zu machen. Bedenkt man, dass der Fieberfrost selbst eine convulsirische Erscheinung ist, so wird man in der Steigerung desselben zu wirklichen Krampfanfällen bei sehr reizbaren Naturen nichts Auffälliges finden. Wahrscheinlich gehören diejenigen Convulsionen, welche zuweilen im Initialstadium acuter Infectionskrankheiten (Masern, Pocken, Scharlach) vorkommen, in dieselbe febrile Kategorie, doch wäre es denkbar, dass hier auch

²⁾ Faure, de l'opisthoton et du rigide dans les maladies aiguës des enfants. Thèse, Paris 1866. p. 12.

der im Blute circulirende Infectionsstoff zur Hervorbringung von Convulsionen das Seinige beiträgt. In allen diesen Fällen können die letzteren natürlich höchstens eine symptomatische Berücksichtigung finden durch eine auf den Kopf applicirte Eiskappe, kühle Bäder von 25–22° R., ausleerende Klystire und leichte Purgantia. Man muss eben abwarten, was aus diesem convulsivischen Initialstadium sich entwickeln wird, und danach die weitere Behandlung einrichten.

Zu den acuten Krankheiten, welche mit heftigen Convulsionen auftreten, gehört auch die Urämie, und grade bei Kindern ziemlich häufig das Wechselfieber, welches sofort mit Krämpfen beginnen kann. In der Regel ist es nur der erste Anfall der Internittens, welcher auf diese Weise verläuft und dann leicht als einfache Eklampsie imponirt, bis die weiteren gewöhnlichen Internittensanfälle den Irrthum aufklären. Weit seltener bietet schon der erste oder zweite Anfall dieser convulsivischen Internittensform das vollständige Bild des perniciosösen Wechselfiebers, welches die äusserste Gefahr droht.

Der folgende von mir beobachtete Fall¹⁾ wird Ihnen dies veranschaulichen:

Ein 2jähriges gesundes Mädchen klagte am Freitag vor Pfingsten 1871 um 10 Uhr Morgens zuerst über Doppeltsehen, bald darauf über kalte Hände, wozu sich bald psychische Störungen gesellten. Das Kind erkannte die Umgebung nicht mehr, verwirrte die Personen und verfiel gegen 1 Uhr in einen convulsivischen Anfall, der nach der Beschreibung vollkommen epileptiform war. Derselbe dauerte abwechselnd mit Coma etwa eine Stunde, dann trat Schlaf ein, nach welchem das Kind, abgesehen von heftigen Kopfschmerzen, gesund erschien. Da es nie zuvor einen solchen Anfall überstanden hätte, Epilepsie in der ganzen Familie nicht vorkam, und auch eine Indigestion entschieden in Abrede gestellt wurde, so dachte ich um so mehr an Internittens, als die Familie am Canal wohnte, wo Malariakrankheiten nicht zu den Selbstenheiten gehören. Der nächste Tag verlief durchaus normal, am Sonntag Nachmittag 4 Uhr aber, also nach dem Tertiantypus, erneuerte sich der Anfall. Ich war selbst zugegen, als das Kind anfangt ihre zu reden, es erkannte plötzlich seine Umgebung nicht mehr und verwechselte die Personen, die Hände waren kalt, in den freien Intervallen, die sich bemerkbar machten, wurde über Schwindel und Doppeltsehen geklagt. Nach einer Stunde erfolgte ein heftiger epileptiformer Anfall, der nach um 6 Uhr ungeschwächt fortdauerte; ich ließ jetzt das Kind cyanotisch, den Puls klein und sehr frequent, und da ich Bedenken trug, unter diesen Umständen das Chloroform anzuwenden, machte ich zunächst eine Injection von Morph. acut. 0,01. Dies aber bald darauf, ermahnt durch die Theilnahme eines bewährten Collegen, auch noch Chloroform einathmen. Schon die ersten Athembühe genigten, um die Convulsionen zu stillen. Das Kind wurde ruhig, die Cyanose schwand, und es trat ein 10-stündiger ruhiger Schlaf ein, aus welchem das Kind gesund erwachte.

¹⁾ Berl. klin. Wochenschr. 1873. No. 26.

Da ich nunmehr überzeugt war, eine Intermission perniciosa vor mir zu haben, verordnete ich, am 3ten dritten Anfall so möglich zu verhüten, sofort Chinin, subper. 0,5 alle 3 Stunden (1,5 am ersten Tage), am zweiten Tage 2stündlich 0,18, am darauf folgenden 0,12, so dass in der ersten Woche nach dem Anfall etwa 6,0 Chinin verbraucht waren. Das Resultat war, dass kein Anfall wieder eintrat; nur am Dienstag Mittag bekam das Kind Kopfschmerzen, Schwindel und lag an zu zittern, doch dauerte dieser Zustand nur etwa 20 Minuten. Seit dieser Zeit bis jetzt habe ich das Kind häufig genug gesehen, um seine vollständige Gesundheit verbürgen zu können.

Ausser den bisher geschilderten Ursachen der Convulsionen können auch psychische Anlässe bei Kindern mit sehr reizbarem Nervensystem einen Krampfanfall erzeugen, besonders plötzlicher Schreck, seltener Furcht, und ich möchte manche Fälle, in welchen nach einem Fall auf den Kopf Convulsionen eintraten, mehr auf den Schreck, als auf das Trauma selbst zurückführen. Unter diesen Umständen bleibt es nicht immer bei einem Anfall, vielmehr kann sich derselbe mehrfach wiederholen. So wurde mir am 5. Januar 1878 ein schon erwähntes 1jähriges Kind in die Poliklinik gebracht, welches vollkommen gesund gewesen, und in dessen Familie von Epilepsie nichts bekannt war. Vor 5 Monaten biss das Kind während des Saugens mit seinen früh entwickelten zwei Schneidezähnen die Mutter in die Mamilla und verfiel, als letztere heftig aufschrie, nach einem Zusammenfahren des ganzen Körpers sofort in starke Convulsionen, welche sich seitdem noch 4 mal ohne Ursache und ohne dass eine rachitische Anlage bemerkbar war, wiederholt hatten. Solche Fälle müssen immer die Befürchtung erregen, dass die Krankheit habituell werden und sich zur Epilepsie ausbilden könne.¹⁾ Die Erfahrung lehrt, dass die Epilepsie sehr häufig schon im Kindesalter beginnt, und wer wollte also mit Sicherheit vorher bestimmen, ob eingetretene Anfälle von Eklampsie, zumal solche, bei denen sich keine therapeutisch angreifbare Ursache nachweisen lässt, nur eine transitorische Bedeutung haben oder den Beginn einer habituellen Epilepsie anzeigen. Eine Continuität der Anfälle findet hier durchaus nicht immer statt, vielmehr können die im frühen Kindesalter eingetretenen Convulsionen Jahre lange Pausen machen und sich erst im reiferen Alter wieder einstellen. Unter andern beobachtete ich einen 12jährigen Knaben, welcher in seinem zweiten und dritten Jahre an epileptiformen An-

1) Unter den Fällen von Reflexepilepsie bei Kindern ist besonders ein von Demme (Jahresber. des Berner Kinderspitals 1879) mitgetheiltes bemerkenswert. Derselbe betrifft einen 7jährigen Knaben, dessen Anfälle nach der Extirpation eines Maxillarkarapolyten sofort verschwanden. Der am Tage vor der Operation gemachte Versuch, mit der Spitze des Zeigefingers den Polypen herauszuziehen, bewirkte einen etwa 3 Minuten dauernden epileptischen Anfall.

fällen gelitten hatte, dann bis zum 11. Jahre verschont geblieben und erst seit einem Jahre wiederum von der Epilepsie befallen worden war. Als Aura des Anfalls erschien hier eine Benommenheit des Sensoriums, in welchem Zustande er noch bis auf die Straßenseite hinstürzte, dann aber niederstürzte und in Convulsionen verfiel. Die diagnostischen Kriterien für eingewurzelte Epilepsie, nämlich Verminderung der psychischen Energie, Verlust des Gedächtnisses, Alteration des Charakters sind abgesehen von den mit epileptischen Anfällen einhergehenden angeborenen Atrophien des Gehirns, im Beginn des Leidens bei Kindern nie zu erwarten und können daher zur Unterscheidung einer transitorischen Eklaupsie von der beginnenden Epilepsie kaum verworther werden. Unter den Fällen von wirklicher Epilepsie, welche ich im Kindesalter sich entwickeln sah, scheinen mir die folgenden einer Erwähnung werth:

Bei einem 10-jährigen Knaben, welcher nach einer im zweiten Jahre überstandenen „Gehirnentzündung“ Hallucinationen, besonders die häufig wiederkehrende Erscheinung eines Schafes zurückbehalten hatte, waren mit dem Ende des 3. Jahres die epileptischen Anfälle mit dem Gefühl von Schwindel als Aura aufgetreten.

In zwei anderen Fällen waren die Anfälle resp. 3 Wochen und 2 Monate nach einer Kopferkrankung (Stoß gegen einen Baum und Quetschung durch ein Wagenrad) eingetreten; beide Kinder klagten über häufige Kopfschmerzen, waren geistig etwas zurückgeblieben, und im zweiten Falle ging Uebelkeit als Aura den Anfällen voraus.

Bei einem 3-jährigen Kinde traten seit einem Jahre epileptische Anfälle nach einem Fall eingestellt, wobei argförmlicher Weise eine Stricknadel unter dem Kinn eingedrungen war und den Boden der Mundhöhle durchbohrt hatte.

Ein 3-jähriges Kind bekam den ersten Anfall wenige Stunden nach dem Anblick der Leiche eines geliebten Bruders.

Ein 13-jähriges böhmisches Mädchen hatte im ersten Lebensjahre einen Krampfanzfall überstanden, der sich im dritten und zwölften Jahre wiederholte. Erst im 5. Jahre konnte sie sprechen. Seit dem 7. Jahre traten Anfälle eines eigenartigen Krampfes im Halse, nämlich das Gefühl einer Strangulation des Larynx, stossweise, nach aufeinander folgende Exspirationen mit starrem Blick und leichten Remanenzen des Kopfes. Jeder Anfall wauert mit heftigen Palpitationen des Herzens nach einer Dauer von wenigen Sekunden. Mitteln treten 10–12 solcher Anfälle an einem Tage auf, während sonst auch einige Wochen ohne Anfall vergehen können. Intelligenz und Gedächtniss schwach; häufig tritt unmotivirtes Lachen ein. Oft Schmerz im Nacken. Keine Menstruation menstruala benennbar. Nach starkem Saugen traten die beschriebenen Anfälle einige Zeit einzeln auf. Oertliche Blutentziehungen im Nacken und Purgantia blieben ohne Erfolg, vielmehr traten statt jener Anfälle bald vollständige epileptische Paroxysmen auf, deren Erbrechen und die Halskrämpfe als Aura vorausgingen. Man hatte also die letzteren, welche etwa 6 Jahre bestanden hatten, nur als Abortivfälle, als eine Aura in der Sphäre des Vagus zu deuten.

Ein 12-jähriges Mädchen litt seit 5 Jahren an Epilepsie. Aura jedes Anfalls war

Ohrengerauschen, besonders auf dem rechten Ohr, welches sie aus dem Schlafe weckte. Die Anfälle traten nur bei Nacht auf.

Bei einem seit mehreren Jahren epileptischen Knaben von 14 Jahren bestand als Aura der Anfälle Nistitation beider Augenlider und Nickenbewegung des Kopfes. Vor dem Eintritte der Epilepsie hatte diese Aura als selbstständige Krankheit in Anfällen bestanden, die mehrmals stundenlang dauerten.

Ein 3jähriges Kind, dessen Brodter blindstarr ist, ist seit einigen Wochen an epileptischen Anfällen, deren Aura darin bestand, dass das Kind mitten im Spiel plötzlich mit starrtem Blick, anscheinend blind, gerath auf einen Punkt hin lief und dann bewusstlos unter Zuckungen in den Augenwinkel und Armen zusammenstreckte.

Ein 11 jähriges Mädchen, in dessen Familie Manie und Epilepsie erblich sind, hatte vor 9 Monaten nach einem heftigen Schreck angefangen, Nachts aus dem Schlafe zu phantasiren und laut zu singen. Später gewannen sich dann schmerzhaft Zuckungen des Beins, allmählig auch der Arme, des Gesichts und der Augen. Schliesslich kam es zu vollständigen epileptischen Anfällen, bei Tage und bei Nacht, aber bisher nie im Freien. Geringe Anstrengung, kleine Strafen bewirkten leicht einen Anfall. Nachts litt sie oft an Heisshunger und verschlang dann glatt die Speisen, ohne rechtliches Bewusstsein davon zu haben.

Ich halte es für überflüssig, die Epilepsie, welche von derjenigen der Erwachsenen in keiner Weise abweicht, hier ausführlich abzuhandeln. Die mitgetheilten Fälle, die nur zum Theil erblicher Natur sind, zeigen Ihnen besonders die verschiedenen Arten von „Aura“, welche in einzelnen derselben Jahre lang als eine scheinbar selbstständige Affection bestand und erst später durch die Entwicklung vollständiger Anfälle ihre eigentliche Natur bekundete. Ich rathe Ihnen daher in allen Fällen, wo derartige Nervensymptome, seien es nun Zuckungen einzelner Glieder, des Kopfes, der Augen, oder Hallucinationen, oder psychische Anomalien bei sonst gesunden Kindern auftreten, die Sache nicht leicht zu nehmen, sondern an die Vorboten der Epilepsie zu denken. In einem Theil meiner Fälle beobachtete ich auch noch Delirien, nicht bloss nach den Anfällen, sondern auch in den Intervallen, seltener sogenannte „somnambule“ Erscheinungen, wie Aufstehen aus dem Bette in der Nacht, Niederkauern unter dem Tische, Klettern auf hohe Möbeln, alles im Halbschlaf mit erloschenem oder nur theilweise erhaltenem Bewusstsein, unaufhaltsamen Trieb im Zimmer herumzuspringen, zu klettern, laut zu singen. Mitunter erreichten die Delirien einen so hohen Grad, dass sie als „Extase“ bezeichnet werden konnten, z. B. bei einem 11jährigen Mädchen, welches in den Intervallen ganz stupide erschien und fortwährend das Wort „Was“ wiederholte. Ich bemerke ausdrücklich, dass es sich in allen diesen Fällen um wirkliche Epilepsie, nicht um „hysterische“ Affecte, von welchen bald die Rede sein wird und die in der That weit häufiger in dieser Form auftreten, handelte. Solche

Beschreibungen sind indess der Epilepsie im Kindesalter keineswegs eigenthümlich, werden vielmehr auch bei Erwachsenen oft genug beachtet. Mir kam es nur darauf an, Sie mit der Entwicklung der Epilepsie bei Kindern und den Schwierigkeiten bekannt zu machen, welche sich in manchen Fällen der Unterscheidung derselben von einer unschuldigen Eklampe entgegenstellen. —

Ich habe schliesslich noch einige therapeutische Bemerkungen hinzuzufügen, da die früheren (S. 153) sich nur auf diejenigen Fälle von Convulsionen bezogen, in denen eine causale Indication vorlag. Leider giebt es aber viele Convulsionen, bei denen eine bestimmte Ursache nicht aufzufinden ist, und dazu gehören besonders diejenigen, welche bei rachitischen Kindern mit oder ohne Glottiskrampf so häufig vorkommen. Hier ist freilich die Behandlung der Rachitis meiner Ansicht nach die Hauptsache, und wo die convulsivischen Zufälle nur selten und in leichter Form eintreten, bin ich immer dafür, ohne Rücksicht auf dieselben Eisen, Leberthran und laue Bäder mit Salz oder Malzabkochung anzuwenden, worauf ich bei der Rachitis zurückkommen werde. Aber es werden Ihnen oft genug solche Fälle vorkommen, in denen Convulsionen sich so häufig und intensiv wiederholen, dass sie wenigstens für den Augenblick das Hauptleiden bilden und zunächst eine therapeutische Berücksichtigung erheischen. Ich muss Ihnen aus offen bekennen, dass unsere Kunst unter diesen Umständen sich keiner grossen Erfolge zu rühmen hat. Ein sicheres Mittel, die Wiederkehr der Anfälle zu verhüten, kenne ich nicht, und deshalb werden Sie mir wohl erlassen, den seit Jahrhunderten empfohlenen Wust unwirksamer Medicamente hier von aciem aufzustreichen. Viele Aerzte schwören noch heut auf die Zinkpräparate, besonders auf die Flores Zinci, das Zincum sulphuratum und valerianicum. Nach meinen Erfahrungen kann ich aber diesen Mitteln keinen Vorzug vor vielen anderen absolut gewordenen einräumen, und habe sie in der That, ebenso wie die Asa foetida und den Moschas, längst aufgegeben. Von grösserer Bedeutung scheinen ein paar in neuester Zeit wirklich in Anwendung gekommene Mittel, das Bromkali und das Chloralhydrat. Ich bin weit davon entfernt, denselben eine spezifische Wirkung zuzutrauen, und es fehlt mir auch leider nicht an Beispielen, in welchen sie wenig oder gar nichts leisteten. Andererseits kann man diesen Mitteln eine das erregte Nervensystem beruhigende Wirkung nicht absprechen, und sie sind daher immer eines Versuches werth. Ich verordne das Kal. bromatum je nach dem Alter der Kinder zu 0,3 bis 1,0 3 mal täglich (F. 8); das Chloralhydrat innerlich zu 1,0 bis 2,0 auf 100,0 oder in Klystirform 0,2 bis 0,5 ꝑr. dosi (F. 9). Bei diesen Dosen pflegt

auch im kindlichen Alter keine schlafmachende Wirkung eintreten, die übrigens unter solchen Umständen nicht zu fürchten wäre, weil die zur Ek-lampsie neigenden Kinder eher schlaflos oder wenigstens sehr unruhig und schreckhaft zu sein pflegen; bei sehr grosser Unruhe, Schlaflosigkeit und sich rasch hintereinander wiederholenden Krämpfen kann es daher nöthig werden, das Chloral in voller Dosis (1,0) oder selbst das Morphinum zu verordnen.

II. Der Stimmritzenkrampf.

Unter den krampfhaften Affectionen des Kindesalters, welche nur ein beschränktes Nervengebiet betreffen, aber die Tonsistenz zeigen, in jedem Augenblick aus einer partiellen eine allgemeine zu werden, steht der Stimmritzenkrampf in Bezug auf Häufigkeit oben an. Derselbe kommt im Allgemeinen häufiger bei Knaben, als bei Mädchen vor, und betrifft fast ausschliesslich das Alter zwischen dem 6. und 24. Lebensmonate. Jenseits desselben habe ich den Glottiskrampf fast nie beobachtet, wohl aber öfters vor dem 6. Lebensmonate, selbst schon bei Kindern von 5 bis 6 Wochen. Im Volke wird die Krankheit gewöhnlich mit dem Namen „innere Krämpfe“ oder „Wegbleiben“ bezeichnet.

In der That können Sie schon bei einem gesunden Kinde, welches mitten im heftigsten Schreien und Toben plötzlich „wegbleibt“, d. h. mit zurückgeworfenem Kopf, dunkelrothem, etwas cyanotischem Gesicht, stockendem Athem und starr gestreckten Extremitäten da liegt, viele Züge der Affection wahrnehmen. Das Uebermass des Schreiens, verbunden mit der leidenschaftlichen Erregung, scheint hier einen Krampf gewisser Athemmuskeln zu erzeugen, der in der Regel nach wenigen Secunden wieder einem vollkommen normalen Verhalten Platz macht, und sein Analogon in anderen Spasmen, welche durch eine Ueberanstrengung der betreffenden Muskeln ins Leben gerufen werden, findet (Schreibe-, Schuster-, Melkerkrämpfe u. s. w.). Im krankhaften Zustande ist nun ein solcher Anlass zur Erzeugung des Krampfes zwar nicht nothwendig, denn es genug schon wir die Anfälle inmitten völliger Ruhe, ja gerade beim Erwachen aus dem Schlafe eintreten; immerhin aber wirkt auch hier jede respiratorische Anstrengung, namentlich Schreien, ebenso begünstigend ein, wie psychische Einflüsse, Aetzer und Schreck. Um meinen klinischen Zuhörern den Anfall zu demonstrieren, pflege ich das Kind durch einen Druck auf den Larynx zum Schreien zu bringen, und der Erfolg bleibt nur selten aus.

Die einfachste Form des Anfalls besteht in einem momentanen Wegbleiben des Athems, einer nur wenige Secunden dauernden Apnoe, auf

welche ein paar giemende oder pfeifende Inspirationen folgen. Zwischen diesen und dem höchsten Grade liegen nun zahlreiche Abstufungen, welche sich unmöglich einzeln beschreiben lassen. Gemeinsam ist allen das plötzliche Stocken der Respiration; das Kind wirft sich meistens gewaltsam hinten über, sein Antlitz ist bleich und um den Mund und die Nasenflügel herum etwas bläulich gefärbt, die Arme und Beine sind oft extendirt, die Finger in die Hohlhand eingeschlagen, auch die Zehen hinstrecken gegen die Planta flexirt. Die Wiederkehr der Respiration verräth sich durch mühsame, erst schwach, dann lauter pfeifende Athemzüge, womit der Anfall nach einer Dauer von zwei bis mehreren Secunden sein Ende erreicht. Der Eintritt des „Giemens“ bezeichnet also schon den Nachlass des Paroxysmus, insofern es der durch die noch verengte Glottis strömenden Luft seinen Ursprung verdankt; so lange der Krampf auf seiner Höhe verharrt, findet überhaupt gar keine Athmung statt, und es kann also auch kein „Giemens“ entstehen. Daher sind diejenigen Anfälle am meisten zu fürchten, bei denen die Apnoe sich über die gewöhnliche Zeit hinauszieht und gar kein pfeifender Ton gehört wird. Hier kann der völlige Verschluss der Glottis binnen wenigen Secunden durch Asphyxie tödtlich werden, und dieser Umstand muss in prognostischer Hinsicht von vorn herein ins Auge gefasst werden. Denn wohlwiegend kann ein Kind an leichten, schnell vorübergehenden Anfällen leiden, welche kaum ein Bedenken erregen, bis unglücklich und unerwartet ein Anfall eintritt, welcher augenblicklichen Tod zur Folge hat. Seien Sie also in Ihrer Praxis auf der Hut und machen Sie in jedem, scheinbar noch so leichten Falle von Stimmitonkrampf, der Ihnen vorkommen wird, die Angehörigen mit der Möglichkeit eines schlimmen Ausganges bekannt.

Auch die weitere Ausdehnung der convulsivischen Affection darf dabei nicht übersehen werden. Denn auch in den leichteren Graden des Spasmus glottidis der ganze Anfall nur in einer mehr oder minder flüchtigen Contractur der Musculi arytaenoides bestehen, also lediglich in der Sphäre des N. recurrens sich abspielen, so sieht man doch sehr häufig die spastische Erregung zunächst auf andere Gebiete des respiratorischen Systems (Brustmuskeln, Zwerchfell) übergreifen, wodurch auffallende Unregelmässigkeiten des Athmungsrythmus, z. B. rasch aufeinander folgende Inspirationen ohne merkliche Expiration, oder vollständige Apnoe bedingt werden. Weiterhin nehmen oft genug die Augenerreuten Theile (Aufwärtsrollen der Bulbi), und die im Anfall so häufig beobachteten Contractionen der Finger- und Zehenmuskeln, oder gar der Flexoren des Vorderarms, die ich z. B. bei einem 5 Monate alten Kinde sehr deut-

lich beobachtete, geben Zeugnisse von der über ihnen weiten Bahnen sich ausbreitenden Erregung. Selbst trismusartige Contractionen der Masseteren und Temporal Muskeln konnte ich während der Anfälle ein paar Mal beobachten, und es fehlt dann nur noch das Erlöschen der Sensibilität und des Bewusstseins, um den Anfall zu einem eklamptischen zu stempeln. So weit sich bei der Kürze der Paroxysmen und dem zarten Alter ein Urtheil über diese Dinge fällen lässt, glaube ich in der That, bei schweren Anfällen des Glottiskrampfes eine schnell vorübergehende Pause des Bewusstseins annehmen zu müssen. Jedenfalls kommen Fälle vor, in denen die Kinder 10—15 Minuten nach dem Anfall wie betäubt daliegen. Daher kann es auch nicht auffallend erscheinen, dass Anfälle des Spasmus glottidis sehr häufig mit eklamptischen Paroxysmen alterniren, oder dass nicht selten der Glottiskrampf die Scene eröffnet und rasch in allgemeine Convulsionen übergeht. Zweiten beobachtete ich auch eine Fortdauer der erwähnten Finger- und Zehnencontracturen während der Intervalle der Anfälle. Die Combination des Spasmus glottidis mit der Eklampsie ist so häufig, dass ich schon in einer früheren Arbeit unter 61 Fällen 46 als solche bezeichnen konnte, in welchen beide Affectionen gleichzeitig bestanden, während nur 15 den Stimmritzenkrampf allein darboten. Seit jener Zeit hat sich die Zahl meiner Beobachtungen enorm vermehrt, aber das angegebene Verhältniss blieb stets dasselbe, und ich pflege daher in jedem Falle von Stimmritzenkrampf die Eltern darauf vorzubereiten, dass plötzlich einmal allgemeine Convulsionen ausbrechen können.

So wollen sich der Beziehungen erinnern, welche zwischen der Eklampsie und der Rachitis stattfinden, mag nun dieselbe allein oder mit dem Spasmus glottidis combinirt auftreten (S. 151). Diese Beziehung zeigt sich gerade bei dem letzteren in so entschiedener Weise, dass ich in jedem Falle sofort die Kopfknochen, die Rippen- und Extremitätenepiphysen untersuche, und nur selten rachitische Veränderungen derselben vermisst. Selbst bei kleinen Kindern von 3—4 Monaten, bei welchen rachitische Alterationen durchaus nicht häufig vorkommen, fand ich, wenn sie an Spasmus glottidis litten, wiederholt die Schädelhäute noch klaffend, ihre Umgebung weich und einrückbar, die Epiphysen der Rippen bereits deutlich geschwollen. Nach meinen Erfahrungen kann ich dreist behaupten, dass mindestens zwei Dritttheile aller an Glottiskrampf leidenden Kinder rachitisch sind, und muss daher in diesem Zusammenreffen mehr als eine Zufälligkeit sehen. Daraus erklärt sich auch die Familienanlage zum Glottiskrampf, die bereits beobachtet wird. Nur ausnahmsweise beschränkte sich die Rachitis lediglich auf die Schädel-

knochen, deren Ossification dann beträchtlich zurückgeblieben war, z. B. bei einem 7 Monate alten, früher syphilitischen elenden Knaben in der Weise, dass der voluminöse Kopf, die klaffenden Nähte und Fontanelles, combinirt mit den häufigen Anfällen von Glottiskrampf und Ekklampsie an einen chronischen Hydrocephalus denken liess, eine Befürchtung, welche sich durch die vollständige Heilung des Patienten als grundlos erwies. Als Elsässer sein Buch über den „weichen Hinterkopf“ schrieb, worauf ich bei Gelegenheit der Rachitis näher eingehen werde, liess er sich durch die Weichheit und partielle Usur der Schädelknochen, besonders des Hinterhaupt- und der Schenkelbeine verleiten, den Spasmus glottidis von diesem Knochenleiden abhängig zu machen, indem er annahm, dass beim Liegen der Kinder das Gehirn durch die erweichten Knochen nicht genügend gegen den Druck geschützt sei. Ich kann nur versichern, dass ich Hunderte von Fällen auf „Craniotabes“ untersucht und dieselbe nur sehr selten in der von Elsässer beschriebenen Weise gefunden habe. Jedenfalls haben wir sie auch als eine rachitische Erscheinung aufzufassen, und nur von diesem Standpunkte aus ist ihr Zusammenhang mit dem Spasmus glottidis zu beurtheilen. Es ist unglaublich, wie enorm die Frequenz der Anfälle bei solchen rachitischen Kindern werden kann. Im Laufe eines Tages erfolgen nicht selten 20, ja 30 Anfälle; jeder Schreck, jeder Versuch zu trinken, jedes Geschreie ruft dieselben hervor, und gerade bei so hochgradiger Reizbarkeit hat man jeden Augenblick das Hinzutreten allgemeiner Convulsionen zu fürchten. Zieht sich dieser Zustand mit abwechselnder Besserung und Verschlimmerung, aber ohne vollständige Pausen, Wochen und Monate lang hin, so kann eine völlige Erschöpfung eintreten, welcher das Kind schliesslich erliegt.

Ein 1jähriger Knabe, sehr schwächelnd und rachitisch, litt, als ich ihn im Dec. 1869 zuerst sah, schon seit zwei Monaten an Anfällen von Spasmus glottidis, welche später mit Ekklampsie alternirten. In den letzten Wochen war die letztere stark in den Vordergrund getreten, so dass während 15–16 Anfällen von Convulsionen innerhalb 24 Stunden erfolgten. Das Kind erstarrte wüthlich. Die verschiedensten Mittel, auch Kreuzschritte ins Zahnfleisch, die ich dem behandelnden Arzte concedirte, blieben ohne allen Erfolg; nur ausnahmsweise kamen Pausen von 12–18 Stunden vor. Von Mitte December bis Ende März wurden über 600 Ekklampsieanfalle, alternirend mit Spasmus glottidis beobachtet. Auch der constante Strom blieb völlig wirkungslos, und das Kind ging Anfangs Mai im Collaps zu Grunde, nachdem die erste Schädelfraktur durchgebohren war.

In anderen Fällen wird der Tod, wie ich schon erwähnte, plötzlich durch Apnoe in Folge der Verschliessung der Glottis herbeigeführt, ein Ausgang, der indess nach meinen Erfahrungen nicht so häufig vorkommt,

als Sie glauben könnten. Der Tod erfolgt dann in der Regel ganz plötzlich, mitten in völligem Wohlbefinden, ähnlich wie bei Individuen, in deren Glottis ein fremder Körper eingedrungen ist. Auch hier hat man die schon (S. 128) erwähnte Aspiration und Aufwärtsrollung der Zunge gegen den harten Gaumen beschuldigt, und ich will nicht in Abrede stellen, dass die gewaltsamen Inspirationen, welche beim Nachlassen des Krampfes eintreten, diesen Vorgang möglich machen, da ich ihn selbst in einem Falle deutlich beobachten konnte:

Ein jüdisches, an Spasmus glottidis leidendes 1-jähriges Kind, welches sich in meiner Klinik befand, wurde von mir wegen eines Bronchialkatarrhs an der Rückenfläche ausstretet und dabei von der Watteria stark nach vorn über gelagert. Plötzlich trat ein so heftiger Anfall von Apnoe ein, dass das Kind sofort stark cyanotisch wurde. Kalte Wassereinreibungen bewirkten den Eintritt der Respiration, aber trotz der plötzlichen näheren Athemzüge drohte der Zustand jeden Augenblick tödlich zu werden. Ich führte schnell meinen Finger in den Mund des Kindes, und fand die mit der ausgetreten Spitze hart an den Gaumen gedrückte Zunge so stark nach hinten gezogen, dass ich mir gewaltsam Bahn brechen musste, um über die Zungenwurzel zu kommen. Ich zog diese nun rasch nach vorn, und sofort stellte sich die Respiration in normaler Weise wieder her.

Solche Fälle geben Anlass, die Aspiration der Zunge überhaupt als die Ursache der apnoeischen Erscheinungen beim Glottiskrampf zu betrachten, eine Ansicht, welche ich für ganz unberechtigt halte, denn in sehr zahlreichen Fällen von Glottiskrampf fand ich bei der Untersuchung des fast immer offen gehaltenen Mundes die Zunge in völlig normaler Lage. Die Aspiration derselben ist daher gewiss eine nur zufällige und seltene Complication, welche indess nicht übersehen werden darf, weil sie, wie auch der oben erwähnte Fall lehrt, in therapeutischer Hinsicht eine Rolle spielen kann.

In einer dritten Reihe von Fällen endlich wird der Tod durch einen heftigen und in die Länge gezogenen Eklampsieanfall oder durch dessen Folgen herbeigeführt. Die Sectionen, welche ich in mehreren Fällen dieser Art zu machen Gelegenheit hatte, ergaben constant eine starke venöse Hyperämie der Pia, meistens auch der Gehirnsubstanz, ein paar Mal Oedem der Pia und serösen Erguss in den Ventriceln. Ich betrachte aber diese Befunde nur als Folgen der bedeutenden venösen Stauung, die während der eklampsischen Anfälle zu Stande kommt, denn am stärksten ausgeprägt fand ich sie immer da, wo zum Spasmus glottidis und der Eklampsie noch ein drittes stauungsbeförderndes Moment hinzukam, nämlich der Keuchhusten. Ich beobachtete diese Complication nicht ganz selten, und zwar gesellte sich dieselbe entweder den bereits längere Zeit bestehenden Krampfanfällen hinzu, oder der Keuchhusten

eröffnete die Scene, und erst in seinem Abnahmestadium entwickelte sich der Glottiskrampf. Die Complication ist natürlich nur eine zufällige, da der Keuchhusten lediglich durch eine spezifische Infection entstehen kann, aber die Verbindung beider Krankheiten mit einander begünstigt in hohem Grade das Auftreten allgemeiner Convulsionen und begründet meiner Erfahrung nach eine ungünstige Prognose.

Auf die Unklarheit der Beziehungen zwischen Rachitis und Spasmus glottidis beziehe ich nach dem, was früher darüber gesagt wurde (S. 151), nicht zurückzukommen. Die Thatsache steht fest, ihre Deutung fällt, und alle Versuche dazu, z. B. der neueste von Oppenheimer⁹⁾, sind gezwungen und anfechtbar. Schlecht genährte, schwächliche Kinder, besonders also diejenigen der Armen, werden vorzugsweise beimgesucht, doch bleiben auch gut entwickelte, scheinbar Mühende keineswegs verschont. Bei einmal gegebener Disposition kommt der Spasmus glottidis spontan oder durch reflectorische Reizungen zum Ausbruch, unter denen der Durchbruch der Zähne (S. 139), wenn er auch sehr überschätzt wird, doch immer eine nicht ganz absehbare Rolle spielen kann. Dasselbe gilt von Anomalien der Verdauung, Verstopfung oder Diarrhoe.

E. R., 11 Monate alt, Mitte März 1875 entwickelt. Wenige Tage darauf dyspeptische Diarrhoe, und zugleich Anfälle von Spasmus glottidis mit fast continuirlichen, auch in den Intervallen fortwährenden Contractionen der Finger und Zehen. Heftiges Schreien, Verlust der Laute. Auch im Schlaf häufige Anfälle. Nach lauen Bädern und kleinen Calomelkuren tritt Verstopfung ein, so dass Klystire nöthig werden. Am 28. stark heftige Zunge, Anorexie, alternirend stinkende Durchfälle, mit welchen die bereits sehr verminderten Anfälle des Glottiskrampfes von neuem häufig auftreten. Nach Acid. murat. schnelle Besserung, Ernährung mit Nestlé'schem Mehl, welches gut vertragen und von nun an dauernd gereicht wird. Nach 4 Wochen Heilung bis auf leichte rachitische Knochenveränderungen.

Unter den Bedingungsclassen muss auch der Einfluss der Kälte und des Katarrhs der oberen Luftwege als ein hervorragender bezeichnet werden. Dies zeigt sich schon durch das Ueberwiegen der Krankheit in der kühlen Jahreszeit. Von jeher habe ich in den Monaten Januar bis incl. April die weitaus grösste Zahl der Fälle in der Poliklinik wie in der Privatpraxis beobachtet, und ich warne daher Mütter dringend davor, die zum Stimmritzenkrampfe disponirten Kinder dem Einathmen der kalten Luft auszusetzen. Ein Recidiv der schon verschwundenen Krankheit kann sofort die Folge sein, ganz besonders, wenn sich ein Katarrh des Larynx und der Trachea entwickelt. In diesen Fällen be-

⁹⁾ Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. XXI. H. 5 u. 6.

kommt das „Grimmen“ der Inspiration einen rauhen heiseren Klang, welcher sich aus der katarrhalischen Affection der Stimmröhre leicht erklärt.

Alle diese, und vielleicht noch andere minder klar vorliegende Reflexanalysen können auch bei Kindern, welche keine rachitischen Veränderungen darbieten, den Glottiskrampf erzeugen, aber so weit meine eigene Erfahrung reicht, sind diese Fälle unendlich seltener, als die mit Rachitis complicirten. Die in dem betreffenden Alter an und für sich schon bestehende erhöhte Reflexerregbarkeit scheint daher durch diese Complication erheblich gesteigert zu werden. Alles, was man sonst über die Aetiologie des Glottiskrampfes geschrieben, ist hypothetisch oder geradezu falsch, namentlich die Ansicht, dass die Krankheit von einer Vergrößerung der Thymsdrüse herrühre (*Asthma thymicum*), welche noch immer ihre Anhänger hat. Weder bei der Section, noch durch Percussion während des Lebens konnte ich jemals eine solche Vergrößerung nachweisen, und durch Friedleben's schöne Untersuchungen ist es wohl unabweifelhaft geworden, dass man vollkommen normale Thymsdrüsen früher für hypertrophische gehalten hat. —

Die Aussichten, mit welchen Sie an die Behandlung des Spasmus glottidis herantreten, sind nicht allzugünstige. Sie kennen namentlich die Gefahren, auf welche Sie von vorn herein die Angehörigen vorbereiten haben. Andererseits können Sie dieselben damit beruhigen, dass die Majorität der Fälle, wenn auch erst nach monatelanger, durch wiederholte Recidive bedingter Dauer, schliesslich mit vollkommener Genesung endet. Dieses günstige Resultat wird, wie ich glaube, vorzugsweise durch eine Verbesserung des gestörten Allgemeinerfindens, also der rachitischen Anlage, erzielt, und ich pflege daher auf dies Moment mein Augenmerk zu richten, wenn nicht die allzu häufige Wiederkehr der Anfälle zunächst ein Einschreiten erfordert. In Bezug auf das letztere kann ich nur wiederholen, was ich Ihnen bereits S. 160 bei Gelegenheit der Ekklampsie mittheilte. Weder Bromkali, noch Chloralkydrat gaben mir zuverlässige Resultate. Ist auch der Erfolg im Beginn der Cur bisweilen überraschend, so fehlt ihm doch die Nachhaltigkeit, und man muss trotz des Fortgebrauchs der Mittel immer auf Recidive gefasst sein. Vom Zink sah ich auch hier keine Wirkung und halte die gerühmten Erfolge desselben für Täuschungen. In einigen Fällen schien mir der Moschus beruhigend und die Frequenz der Anfälle mildernd zu wirken, in anderen blieb er absolut wirkungslos. Ich gab in der Regel Tinct. Moschi 10 grt. ein- bis zweistündlich. Wo es aber darauf ankommt, der enormen Häufigkeit der Anfälle und der daraus hervorgehenden Erschöpfung des Kindes ein möglichst rasches Ziel zu setzen, wende ich

unbedenklich das Morphinum an (F. 10). Sobald Ruhe und Schläfrigkeit eintritt, setze man das Mittel aus, um nicht toxische Erscheinungen zu bekommen; aber bei gehöriger Ueberwachung sah ich dieselben niemals eintreten, und hatte wiederholt die Freude, durch dies Mittel Kinder, welche man schon halb verloren gab, dauernd zu beruhigen und der drohenden Todesgefahr zu entziehen. Was die Bekämpfung des einzelnen Anfalls betrifft, so wird man nur ausnahmsweise dazu Gelegenhcit haben, weil, bevor der Arzt hinzukommt, der Anfall entweder vorüber oder das Kind erstickt ist. Aus diesem Grunde ist auch die Empfehlung der Tracheotomie für den Nothfall eine illusorische. Wohl aber empfiehlt es sich, die Angehörigen darüber zu belehren, wie sie sich im Anfall zu verhalten haben. Anspritzen von kaltem Wasser auf Gesicht und Brust können die gefahrdrohende Apnoe sofort unterbrochen und sind von den Angehörigen immer zu versuchen, ebenso wie das schon p. 165 empfohlene Hervorziehen der Zunge. Schwieriger ist schon die künstliche Respiration, welche ebenso, wie die Faradisation des Phrenicus, nur vom Sachverständigen ausführbar ist.

Die therapeutische Berücksichtigung der Reflexkrämpfe steht, wo eben nicht die symptomatische Ursache eine augenblickliche Nothwendigkeit ist, in erster Reihe; Schutz vor kalter Luft, Behandlung eines etwa vorhandenen Katarcts, Purgantia bei Verstopfung, antidyseptische Mittel, wo es sich um dyspeptische Diarrhoe handelt, Scarification des Zahnfleisches bei Dentitionsreizung ist, wie ich schon oben bemerkte, absolut wirkungslos. Vor allem aber empfehle ich Ihnen die Behandlung der zu Grunde liegenden Disposition durch die antirachitischen Mittel, reine warme Luft, Malz- und Salzläder, Eisen und Leberthran.

III. Die idiopathischen Contracturen.

Sie werden sich erinnern, dass während der Anfälle des Glottiskrampfes sehr häufig spastische Contracturen der Finger und Zehen beobachtet werden, welche zuweilen noch in den Intervallen fortdauern. Solche Contracturen können nun auch unabhängig vom Stimmritzenkrampf auftreten und sich auf weitere Gebiete des Muskelsystems ausdehnen. Die Verhältnisse, unter denen sie vorkommen, sind im Allgemeinen dieselben, wie bei den klonischen Anfällen, nicht selten alterniren sie mit diesen und mit Spasmus glottidis, wobei sie entweder nur flüchtig sind, oder viele Stunden, selbst Tage lang anhalten können. Am häufigsten finden wir die Finger und Zehen in die Vola und Planta

festirt, seltener extendirt, zumeilen aber auch die Hand-, Fuss- oder Ellenbogengelenke mitbetheiligt, so dass der Vorderarm gegen den Humerus, die Hand gegen den Vorderarm, der Fuss nach oben oder gegen die Planta festirt erscheint. Dass die Contractur schmerzhaft ist, scheint das Schreien der Kinder zu bekunden. In den Fällen, wo dieselbe viele Stunden, Tage oder gar Wochen lang anhält, beobachtete ich mitunter ein Oedem oder eine cyanotische Färbung der Hand- und Fussrücken, welche wahrscheinlich von dem Drucke der starren Muskeln auf die intermusculären Venen abzuleiten sind. Wirkliche Ekchymosen, wie sie Bouchut beschreibt, kamen mir nur in einem Falle vor, den ich Ihnen bald mittheilen werde. Im Anfange traten die Contracturen meistens nur paroxysmenweise auf, wurden aber im weiteren Verlaufe oft mehr oder minder anhaltend. Im Schlafe trat meistens eine Erschlaffung ein, während Bouchut die Contracturen öfters dabei fortdauern sah. Der Umstand, dass dieselben fast immer doppelseitig sind, kann, wie bei den Convulsionen (S. 150), für ihre rein nervöse harmlose Natur geltend gemacht werden; ein halbseitiges Auftreten dagegen würde immer den Verdacht einer Erkrankung der gegenüberliegenden Gehirnhälfte erwecken müssen, und besonders als Symptom der Hirntuberkel kamen mir diese halbseitigen Contracturen, welche dann oft mit Paralyse und Tremor verbunden waren, sehr häufig vor. Der folgende Fall lehrt aber, dass auch die Halbseitigkeit ausnahmsweise (dispathisch in Folge einer Reflexreizung) auftreten kann:

Am 24. November 1876 wurde ein sonst gesunder Säugling von 11 Monaten in meine Poliklinik gebracht. Vor 5 Wochen war der erste Zahn erschienen, welchem schnell noch drei andere gefolgt waren. Bei der Untersuchung fand ich eine Contractur der rechten unteren Extremität im Hüft- und Kniegelenk, sowohl in der Rückenlage, wie beim Versuch, das Kind aufrecht zu stellen, wobei der Fuss etwa die Stellung wie bei *Coxitis*, nur noch in weit höherem Grade, annahm. Der Versuch der Streckung war schmerzhaft und erregte heftiges Geschrei. Nach Angabe der Mutter sollte diese Contractur bis jetzt vor dem Durchbruche jedes Zahns eingetreten sein und mit dem erfolgten Durchbruche ihr Ende erreicht haben. Auch die Zehen sollten dabei starr gegen die Planta fixirt werden. Seit 14 Tagen dyspeptische Diarrhoe mit Stuhl. Mitte December war der Zustand noch un verändert. Leider verlor ich das Kind schnell aus dem Auge.

Wie hier in den Zahnnerven, kann der Reflexreiz aber auch in anderen Nervenbahnen seinen Sitz haben, und hier sind besonders dyspeptische Zustände, gerade wie bei der Ekklampsie (S. 152) als Ursachen zu bezeichnen. Meteorismus, lehnige harte Faeces oder dyspeptische Diarrhoe. Ich selbst habe wiederholt Fälle dieser Art gesehen, und auch die Lite-

natur ist nicht arm an denselben.¹⁾ In anderen Fällen bilden die arthropodischen Organe die Redesstätte²⁾:

Kind von 5 Monaten, an der Brust genährt, mager, soll von Geburt an vor jeder Umarmelung stark geschrien haben. Am 10. Oct. 1861 zuerst untersucht. Vor 14 Tagen Eklampsieanfall, der sich nach einer Woche wiederholte. Schon mit dem ersten Anfalle trübten die Zehen beider Füße in anhaltender Plantarflexion, nach dem zweiten wurden die Finger und Kniegelenke von ähnlichen Contracturen befallen. Starbheit der betreffenden Flexoren, Streckmuskeln sehr schwierig. Auch Hals- und Nackenmuskeln zeigten Eigebität mit erschwerter Bewegung des Kopfes. Seit drei Wochen zeigen sich auf den mit stark pigmentirten Urin getränkten Windeln runde, stecknadelkopfgroße Bröckel, die als harnsaure Concretionen erkannt wurden. An verschiedenen Körperstellen Purpuraflecken auf der Haut, welche unmittelbar nach den Convulsionen aufgetreten sein sollen. Am 17. nach lauem Malabädern und Abgang von noch 3 ähnlichen Stücken bedauerlicher Nachlass der Contracturen, aber wiederholte Zuckungen in den oberen und unteren Extremitäten. Oedem des unteren Augenlides und des linken Beins und Fußes, neue Purpuraflecken von Gruschengröße auf Kopf und Thorax. Erst am 21. Nov. sah ich das Kind wieder und fand von den früheren Zufällen keine Spur mehr. Derselben waren auch nach 2½ Jahren, wo das Kind mir wieder vorgestellt wurde, nicht wiedergekehrt. Die Behandlung hatte aus la warmen Bädern und kleinen Dosen Eisen bestanden.

In diesem Falle finden wir in Folge der anhaltenden Contracturen die kleinen Eklmysen und partiellen Oedeme, welche ich vorher erwähnte. Convulsionen eklampsischer Natur eröffneten hier die Scene, worauf alsbald sich auch die Contracturen bemerkbar machten. Sie sehen also, dass beide Erscheinungen die gleiche Bedeutung haben müssen, und in der That wird die Differenz zwischen beiden anschliesslich durch die Fortdauer des Bewusstseins in dem einen, und durch das Schwinden desselben im anderen Falle begründet. Denken wir uns die Pause des Bewusstseins bedingt durch die spastische Theilnahme der kleinen Hirnarterien, deren Folge eine arterielle Anämie des Gehirns sein muss, so hätte man eben nur diese Theilnahme auszuschalten, und der Unterschied zwischen den Eklampsieanfällen und unseren Contracturen wäre so gut wie aufgehoben, da die tonische Form der letzteren auch in den gewöhnlichen convulsivischen Anfällen nicht selten vorkommt. Auch die mitunter sehr lange Dauer der Contracturen begründet nur eine scheinbare Verschiedenheit, da, wie wir sahen, auch eklampsische Anfälle, durch kurze Pausen eines soporösen Zustandes von einander getrennt, sich Tage lang hinzie-

¹⁾ Vergl. z. B. *Kayser*, Zur Lehre von der Arthrogryposis des Säuglingsalters. *Archiv f. Kinderheilk.* Bd. II. 140. Dabei gehört auch ein von *Riegel* bei einem Erwachsenen beobachteter Fall (*Centralbl.* 1874. Nr. 12), in welchem durch eine erfolgreich durchgeführte Hautwärmende Heilung erzielt wurde.

²⁾ S. meine Beiträge zur Kinderheilk. N. F. Berlin 1878. p. 337.

ben können. Aus diesen Gründen betrachte ich die Contracturen in ihrem Wesen als durchaus identisch mit den Convulsionen, als eine Art von Abortivform derselben, und kann in Betreff ihrer Aetiologie und Behandlung nur auf das bei der Eklampsie Gesagte verweisen. Damit stimmt denn auch die Thatsache überein, dass die Contracturen ebenso wie die letztere besonders häufig bei rachitischen Kindern beobachtet werden. Auch treten sie, wie die Eklampsie, bisweilen mit einem intermittirenden Typus auf. Bereits an einer früheren Stelle²⁾ theilte ich zwei Fälle dieser Art mit.

Bei einem 3jährigen Mädchen traten 14 Tage lang allmählich gegen 7 Uhr starre Contracturen aller vier Extremitäten ein, wobei die Arme im Ellenbogengelenke stark dehtirt, die Beine gegen den Untersieb gezogen und die Füße in der Form des Pes varus erkieimen. Diese von drucker Höhe des Gesichts und lebhaftem Geschrei begleiteten Anfälle dauerten 2 Stunden, worauf das Kind einschlief und bis zum folgenden Abend vollkommen wohl war. Chinin besorgte die Anfälle in kurzer Zeit. In einem andern Falle, welcher einem 6jährigen Knaben betraf, trat seit mehreren Tagen täglich um 5 Uhr Nachmittags eine allmählig sich abiegende, schließlich ganz starre Contractur des rechten Sternocleidomastoideus mit Caput stansum auf, welche bis zum Abend dauerte und dann verschwand, um erst am andern Nachmittag wiederzukehren. Auch hier brachte der Gebrauch des Chinins schnelle Heilung.

Von manchen Autoren werden die in Rede stehenden Contracturen mit der in neuester Zeit viel besprochenen Tetanie zusammengezwungen. Dass ihrem Wesen nach sehr unklare und in ihren Erscheinungen keineswegs constante Krankheit kommt zwar auch bei Kindern, im Allgemeinen aber häufiger bei Erwachsenen vor, und ich habe daher keine Veranlassung, hier auf dieselbe einzugehen. Meiner Ansicht nach thut man gut, die Contracturen der Kinder, die ich Ihnen schilderte, von der Tetanie gänzlich zu trennen, da sie der Eklampsie viel näher stehen, als dieser. Insbesondere konnte ich das von Trousseau angegebene und von Anderen bestätigte Zeichen der Tetanie, nämlich Hervorrufen der Contractur durch Druck auf die zuführende Arterie des betreffenden Gliedes bei den idiopathischen Contracturen der Kinder, mit denen ich es zu thun hatte, bisher niemals nachweisen. Ebenso wenig hat die jüngst von Strümpell³⁾ unter dem Namen „Myotonia congenita“ beschriebene Krankheit mit unseren Contracturen etwas gemein. —

Bei dieser Gelegenheit gestatten Sie mir, noch einige Worte über

²⁾ L. c. p. 101.

³⁾ Berl. Min. Wochenschr. 1881. Nr. 2. — Bernhardt, Virchow's Archiv. Band 73.

die seltenste convulsivische Erscheinung im kindlichen Alter, nämlich über den Tremor hinzuzufügen. Während derselbe bei Erwachsenen und Greisen theils als selbstständiges Leiden (Tremor senilis, potatorum, mercurialis u. s. w.), theils als Begleiter wichtiger Centralkrankheiten (Paralysis agitata, Sklerose des Rückenmarks) häufig beobachtet wird, fand ich den Tremor im Kindesalter fast nur in gelähmten oder contrahirten Gliedern bei Tuberkulose des Gehirns, Meningitis basilaris und anderen Gehirnkrankheiten.²⁾ Nur einmal hatte ich Gelegenheit, einen allgemeinen Tremor ohne schwere Begleiterscheinungen und mit günstigem Ausgange zu beobachten:

Am 5. Februar 1879 wurde ein früher gesundes, wohlgenährtes Kind von 15 Monaten in die Poliklinik gebracht, welches vor 4 Wochen an einer Lungenerkrankung gelitten haben sollte. Erst seit etwa 14 Tagen bestand ein anhaltendes Zittern beider Hände und Füße, wie auch des Kopfes, der gewöhnlich etwas nach hinten retrahirt war, aber leicht nach vorn und seitlich bewegt werden konnte. Das Kind schrie sehr häufig und aufhaltslos, als ob es Schmerz empfinde, und auch das Geschrei bestand ausgiebig dem Zittern der Extremitäten nicht aus convulsivischen, sondern aus wackernden Tönen. Seit dem Beginn dieses Zustandes hatte das Kind das Stehen wieder verloren, war aber im Stande, mit den zitternden Händen Spielzeug zu fassen und zu halten. Dabei vollständige Exophtalmie und normale Function aller Organe. Nach der Aufnahme in die Kinderklinik bestand der Zustand zunächst unverändert fort. Am 18. zeigte sich Abnahme des Zitterns, und schon am 20. völlige Heilung. Die Behandlung bestand in der Darreichung von Chloralhydrat (1,0:120).

Es ist mir unmöglich, die Ursache des Zitterns in diesem überaus seltenen Falle anzugeben. Bei dem sonst völlig ungetrübten Gesundheitszustande des Kindes glaubte ich einen von der Dentition ausgehenden reflectorischen Ursprung annehmen zu müssen, und obwohl während der Dauer unserer Beobachtung kein Zahndurchbruch vorkam, möchte ich diese Annahme doch aufrecht erhalten. Es ist immerhin denkbar, dass das Emporstreten des Zahns eine Zeitlang die Alveolarnerven drückt und reizt, und dann Reflexerscheinungen herbeiführt, das weitere Vorschreiten aber, noch ehe der Zahn zu Tage getreten ist, die Nerven wieder von dem Drucke befreit. Diese Ansicht von der Entstehung des Tremor drängte sich mir sofort bei der Vergleichung des Falles mit anderen auf, in welchen ähnliche, wenn auch stärker markirte und auf bestimmte Muskelgruppen beschränkte Bewegungen in Folge des erwähnten Reflexreizes zu Stande kommen. Ich meine die Krampfform, welche in neuerer Zeit unter dem Namen

²⁾ Einen interessanten Fall eines allgemeinen Tremor bei einem 4 Monate alten Kinde, welcher bis zum Schlusse des 11. Monats dauerte und mit Zurückbleiben der geistigen Entwicklung verbunden war, theilt Dumas mit (19. Jahresber. S. 26).

IV. Der Nickkrampf, Spasmus nutans.

die Aufmerksamkeit erregt hat. Meine ersten Beobachtungen dieser Art wurden schon im Jahre 1851¹⁾ publicirt.

Dieselben betrafen Kinder von resp. 6 und 8 Monaten, mit anhaltenden wiegenden Bewegungen des Kopfes nach vorn und hinten, welche dem Kindern das Aussehen der bekannten chinesischen Papefer gaben. In dem einen Falle war hienächst auch ein Aufwärtsrollen der Augen damit verbunden. Während des Schlafes hörten die Bewegungen auf, im wachen Zustande nur auf kurze Zeit, wenn man die Aufmerksamkeit des Kindes auf irgend eine Weise fesselte. Gewaltsame Bewegung durch Festhalten des Kopfes erregte lebhaften Unruhe und Weinen. Das Kind war heiss, die Speicheldrüsen profus. In beiden Fällen blieb die Behandlung erfolglos; erst nach 4wöchentlicher, resp. mehrwöchentlicher Dauer machte der Durchbruch von Zähnen (im ersten Falle des ersten Schneidezahns) sofortige Heilung.

Ungefähr um dieselbe Zeit wurden von Faber und Ebert²⁾ ein paar ganz ähnliche Fälle beschrieben, und bei der einmal angeregten Aufmerksamkeit der Aerzte ergab es sich bald, dass die Affectio keineswegs eine sehr seltene ist. Von den seit jener Zeit von mir selbst beobachteten Fällen dieser Art theile ich Ihnen die folgenden mit.

Kind von 3 Monaten. Im wachen Zustande seit mehreren Wochen fast anhaltende Nickbewegungen des Kopfes mit leichter Rotation nach rechts, vollständige Pause im Schlaf. Mit den Nickbewegungen combinirt sich ein anhaltender Nyctagmus des rechten Auges, wobei die Schwingung nach innen die stärkere ist. Nach einigen Wochen Nachlass der Kopfbewegungen in Folge eines Zahndurchbruchs, während der Nyctagmus noch fortwährt.

1jähriger Kind. Dieselben Erscheinungen wie im vorigen Falle, nur besteht statt des Nyctagmus ein Strabismus convergens des rechten Auges. Nach einer Pause, welche dem Durchbruche zweier Zähne folgte, Wiedereintritt des Affektes, nachdem das Kind einen Brechdurchfall und Brechialkatarrh durchgemacht hatte, Heilung nach 14 Tagen spontan.

Kind von 6 Monaten, am 19. Januar 1877 in der Poliklinik vorgestellt. Sonst gesund. Seit 3—4 Wochen besteht der Krampf, anfangs intermittirend, jetzt fast anhaltend, nur im Schlaf vollständige Pause. Die Bewegungen finden nach vorn statt, nickend, mit einer leichten Rotation des Kopfes von rechts nach links verbunden. Augenmuskeln nicht theilhaftig. Beide mittleren Schneidezähne der oberen Zahnreihe schimmern durch das Zahnfleisch. Weiterer Verlauf unbekannt.

Kind von 10 Monaten, gesund, mit zwei Zähnen. Seit 3 Monaten bestehen anhaltend ruhende Kopfbewegungen von einer Seite zur andern, verbunden mit einem leichten Wiegen nach vorn, Pause im Schlaf. Fernst man die Aufmerksamkeit des Kindes durch einen vorgehaltenen Gegenstand, oder hält man den Kopf gewaltsam

¹⁾ Remberg und Henock, *Klinische Wahrnehmungen und Beobachtungen*, Berlin 1851. S. 57.

²⁾ *Annalen der Charité*, I. 1856.

den, so hängen zwar die Kopfbewegungen auf, es tritt aber dann sofort Nystagmus beider Augen auf. Verlauf unbekannt.

1jähriger Knabe, mit 7 Zähnen, am 13. Februar 1878 mit einem Collegen untersucht. Seit etwa 14 Tagen häufige schwache rotatorische Bewegungen des Kopfes von rechts nach links mit heftigen Nicken verbunden. Dabei fast anhaltend Nystagmus des linken Auges. Sonst gesund. Nach einigen Wochen spontane Heilung, ob sich einen neuen Zahndurchbruch? konnte ich nicht erfahren.

Mädchen von 10 Monaten, gesund. Seit 14 Tagen Spasmus nutans mit heftigen Rotationen des Kopfes nach rechts. Bewegungen fast anhaltend, nur im Schlaf Pause. Sobald man den Kopf fasst, hören die Bewegungen auf, und es tritt ein heftiges Nystagmus des rechten Auges ein, der nicht stattfindet. Zwei Schenkelabszesse im Unterkiefer, die oberen im Durchbruch begriffen. Verlauf unbekannt.

Kind von 9 Monaten, melitisch, früher schon mit Eklimpsie und Glottiskrampf behaftet, jetzt gesund, mit normaler Zahnentwicklung (2 Schneidezähne). Die Nickbewegungen beschränkten sich hier nicht auf den Kopf, sondern betrafen den ganzen Oberkörper, traten in Anfällen mehrmals täglich auf und waren so heftig, dass der Kopf bisweilen fast bis zu den Knien niedergebeugt wurde. Krampfartige Bewegungen der Augen begleiteten zuweilen den Anfall. Nach 14 Tagen Abnahme der Intensität und Frequenz der Anfälle. Weiterer Verlauf nicht bekannt.

Alle diese Fälle zeigen, dass die den Spasmus nutans charakterisierenden Bewegungen sich fast niemals auf den eigentlichen Kopfnicker (Sternocleidomastoideus) beschränken, sondern neben diesem auch noch die Rotatoren des Kopfes in Anspruch nehmen. Nickbewegung und mehr oder weniger deutliche Rotation, meistens constant nach derselben Seite hin, sind fast immer mit einander verbunden. Denn kamen bei fast allen Kindern noch krampfartige Bewegungen der Augenmuskeln, meistens Nystagmus, nur selten Strabismus oder Rollbewegungen, gewöhnlich auf beiden Augen, weit seltener auf das Auge derjenigen Seite beschränkt, nach welcher der Kopf rotirt wurde (einseitiger Krampf). Die Bewegungen sind meistens permanent, weit seltener treten sie anfallsweise auf, und pausieren immer während des Schlafes. Durch Festhalten des Kopfes oder Erregung der Aufmerksamkeit kann man in der Regel die Nick- und Drehbewegungen momentan hemmen, wobei aber der Nystagmus stärker wird, oder wenn er nicht vorhanden war, erst auftritt. Nur in dem letzten meiner Fälle nahmen auch die Rumpfmuskeln Theil, wodurch der ganze Oberkörper nach Art einer Pagode sich rhythmisch vorüber bewegte.

Dass bei einem Theil dieser Kinder der Reflexreiz von der Dentition ausging, ist durch das Verschwinden der spasmodischen Erscheinungen nach erfolgtem Zahndurchbruch bewiesen. In den anderen Fällen, welche sich der weiteren Beobachtung entzogen, ist dieselbe Ursache zwar wahrscheinlich, aber nicht zweifellos, zumal da man wohl annehmen kann, dass auch andere Reflexreize den Spasmus nutans ebenso gut erregen

können, wie die Zahnang. Interessant ist vom anatomisch-physiologischen Standpunkte die häufige Combination mit specifischen Affectionen der Augenmuskeln (Nystagmus, Strabismus), welche auch von anderen Beobachtern (Ebert, Demme) erwähnt wird und darauf hindeutet, dass die Wurzelheerde des Accessorius Willisii und der obersten Spinalnerven, welche die betreffenden Hals- und Nackenmuskeln versorgen, in sehr naher Beziehung zu denjenigen der Augenerven (Oculomotorius) stehen. Auch ein Fall, welcher ein älteres Individuum betrifft, bestätigt dies Zusammentreffen von neuem.

Am 26. März 1872 erschien in der Klinik ein 12-jähriger Knabe, welcher seit seinem 2. Lebensjahre in Folge einer Cerebrospinalmeningitis tuberculosa war. Seine Intelligenz war intact, ein Talent zum Zeichnen sogar in hohem Grade entwickelt. Bei diesem Knaben bestanden fast anhaltende, nach links neigende, mit einem leichten Nicken verbundene Kopfbewegungen, verbunden mit einem permanenten Nystagmus, welcher bedeutend zunahm, sobald man den Kopf festhalten suchte. Die Gesandtheit war übrigens ungetrübt, und ich bin, zumal der Knabe nicht vorderkam, auch nicht im Stande, eine Vermuthung über die Ursache jener Erscheinungen, die mit denen des Spasmus nutans äusserlich ganz übereinstimmenden, auszusprechen.

Von der bisher beschriebenen reflectorischen Form des Spasmus nutans muss man nun eine zweite, weit bedenklichere unterscheiden, die unstreitig von einem centralen Leiden und zwar des Gehirns abhängt. Schon die ersten, von englischen Autoren (Newham, Willshire) herrührenden Schilderungen beziehen sich auf solche Fälle, in welchen Störungen der Intelligenz und epileptische Zufälle sich mit Nachbewegungen, nicht nur des Kopfes, sondern auch des ganzen Oberkörpers verbunden. Letztere traten entweder in Anfällen auf, wobei die wogenden Körperbewegungen wohl 50–100mal in der Minute erfolgten; oder waren mehr permanent, dann aber milder intensiver. Der Ausgang war durchweg tödtlich, doch fehlen meines Wissens sichere Sectionsergebnisse. Ich selbst beobachtete nur einen Fall ähnlicher Art, in welchem die krankhaften Bewegungen einige Tage nach einem Fall auf den Hinterkopf eingetreten sein sollten, und der Tod plötzlich erfolgte; die Section wurde leider verweigert. Auch die nicht selten vorkommenden Fälle, wo bei schwach- oder blödsinnigen Kindern ein häufiges Vornüberfallen des Oberkörpers mit Ausspreizung der Arme und leichtem Verdrehen der Augen eintritt, möchte ich hierher rechnen. So ersehen daraus, dass nicht alle Fälle von Spasmus nutans auf gleiche Weise zu beurtheilen sind, und ich werde auch später Gelegenheit haben, Ihnen Beispiele einer dritten Form anzuführen, welche mir bisweilen als ein

¹⁾ Vgl. Hochkult, Jahrb. f. Kinderheilk. XIII. p. 39.

Glied in der Kette anderer spasmodischer Erscheinungen verkam, die man unter dem Namen „Chorea magna“ zusammenfassen pflegt.

Aus den oben mitgetheilten Fällen ergiebt sich, dass die Behandlung der reflectorischen Form eine rein expectative sein muss. Wollen Sie die gegen Convulsionen überhaupt empfohlenen Mittel (S. 160) versuchen, so mögen Sie es thun, dabei aber wohl bedenken, dass dieselben keinen Erfolg versprechen, bevor nicht die Quelle der Reflexreizung, welche hier meistens die Dentition bildet, verstiegt ist.

Beiläufig will ich noch erwähnen, dass ich mehr oder weniger anhaltende Wiegebewegungen des Oberkörpers bei kleinen Kindern wiederholt als Ausdruck onanistischer Reizung beobachtet habe. Diese Bewegungen sind also willkürliche und dürfen nicht mit dem wirklichen Spasmus nutans verwechselt werden. — Die sonst noch bei Kindern vorkommenden partiellen Krämpfe, seien es solche der Nacken-, der Extremitäten- oder der Gesichtsmuskeln, letztere besonders reflectorisch in Begleitung von Augenkrankheiten auftretend, stimmen mit denjenigen des erwachsenen Alters völlig überein; nur über eine sehr seltene Form derselben seien mir noch einige Worte gestattet, weil mir dieselbe in dieser Weise bei Erwachsenen noch nicht vorgekommen ist; ich meine die Lachkrämpfe, welche ich in 3 Fällen, in welchen der Reflexreiz offenbar vom Darmkanal ausging, zu beobachten Gelegenheit hatte. Die beiden ersten, schon früher¹⁾ beschriebenen, betrafen merkwürdiger Weise die Kinder zweier Schwestern.

Kind von 4 Wochen, an der Brust, seit 3 Tagen mässige Diarrhoe, vor einigen Tagen plötzlich Zuckungen der Gesicht- und Rumpfmuskeln, wobei das Kind zum Schrecken der Mutter heftig aufschrie. Dauer der Anfälle etwa 5 Minuten, Wiederholung 3—4mal täglich. In den Intervallen oft gewöhnliches Drängen mit dunkler Farbe des Gesichts und Stöhnen, doch ohne Schreien. Inhas. specac. (0,12) 90 mit Tinct. theb. grt. II beständige binnen 7 Tagen alle diese Erscheinungen.

Kind von 18 Tagen, Störung, Obstruction, heftige Unruhe, Schreien, Anziehen der Beine, Aufwärtsrollen der Ballen, Zusammenkneifen der Hände mit heftigem Auflachen, Meteorismus des Unterleibs. Nach lauen Bädern, Ouleterierungen und Ol. ricini reichliche Stühle. Schwinden aller Zufälle. Recidiv nach einem halben Jahr. Heilung durch dieselbe Behandlung.

Dam kommt nun noch ein dritter Fall:

Kind von 3 Monaten, Diarrhoe seit einer Woche, zugleich fast allmählich Zucken in den Armen und Beinen, häufig auch bei Tage lautes Auflachen, darzischen lauwider gleitende Inspirationen. Nach Stillung der Diarrhoe liess die Lachlust auf, während die Zuckungen noch mitunter wiederkehrten. Schliesslich Heilung.

¹⁾ Beitr. zur Kinderheilk. N. F. 1868. S. 85.

V. Der Veitstanz, Chorea minor.

Die Krankheit, welche uns jetzt beschäftigen wird, ist wohl die häufigste aller Neurosen, welche das kindliche Alter etwa von der zweiten Dentition an bis gegen die Pubertät hin heimsuchen. Ungleich seltener kommt sie vor dieser Zeit vor, doch habe ich selbst mehrere Fälle bei 4 und 5-jährigen Kindern beobachtet. Erwachsene werden nur ausnahmsweise befallen, vorzugsweise Schwangere, worauf ich hier nicht näher eingehe. Die Zahl der erkrankten Mädchen überwiegt bedeutend diejenige der Knaben.

Die Erscheinungen der Chorea sind so eigenthümlich, dass derjenige, welcher sie einmal beobachtet hat, sie kaum mit einer andern convulsivischen Affection verwechseln wird. In völlig ausgebildeten Fällen finden wir den ganzen Körper des Kindes in einer anhaltenden Unruhe und Bewegung, welche an die zappelnde Action eines „Hampelmanns“ erinnert und nicht ohne Komik ist. Am intensivsten sind fast immer die Extremitäten ergriffen. Arme und Hände können kaum einen Augenblick ruhig gehalten werden, zeigen vielmehr fortwährende zappelnde Bewegungen und wunderliche Verdrrehungen, während die Schenkel sich bald heben, bald senken, der Kopf nach der Seite herabgezogen und mehr oder weniger rotirt wird. Auch die Gesichtsmuskeln nehmen Theil, die Augen schliessen und öffnen sich abwechselnd, die Stirn wird gerunzelt und schnell wieder geglättet, die Mundwinkel nach der einen oder andern Seite hin verzogen. Dabei sind die unteren Extremitäten häufig noch im Stande, den Körper zu stützen und zu tragen; oft aber ist auch hier das Zappeln und Schlenkern so stark, dass das Gehen mehr oder weniger erschwert wird, und die Kinder vielfach strucheln und fallen. Ja in schwereren Fällen ist nicht nur das Gehen und Stehen, sondern auch das Sitzen gar nicht mehr möglich. Lässt man die Zunge herausstrecken, so geschieht dies häufig mit einem Ruck, und ebenso rasch schnellt sie wieder in den Mund zurück; aber selbst wenn die Kinder im Stande sind, sie einige Secunden lang herauszustrecken, bemerkt man doch immer ein deutliches Vibriren ihrer Muskelbündel. Durch diese Theilnahme der Zungenmuskulatur wird auch die Sprache stammelnd und undeutlich, und ist in schweren Fällen ganz aufgehoben. Trotz aller Anstrengung, wobei die Muskelbewegungen im Gesicht und auch im übrigen Körper sich bedeutend steigern, sind die Kinder dann nicht im Stande, ein Wort herauszubringen, und gerade diese Erscheinung pflegt die Eltern am meisten zu ängstigen. Die vielfach klaggegebene Befürchtung, dass das Kind stumm bleiben könnte, ist indess nie ge-

rechtfertigt; Sie dürfen mit ruhiger Zuversicht die völlige Wiederherstellung der Sprache in Aussicht stellen.

Dies für eine grosse Zahl von Fällen passende Krankheitsbild bietet aber vielfache Abweichungen, sowohl in Bezug auf den Grad, wie auf die Verbreitung der krampfhaften Bewegungen dar. Sehr häufig erreichen dieselben nicht die geschülterte Intensität, bleiben vielmehr im ganzen Verlaufe der Krankheit verhältnissmässig schwach und werden nur steigender, sobald die Patienten aus dem ruhigen Zustande in den der Bewegung übergehen. Auch nehmen in diesen geringeren Graden nicht immer alle Theile gleichmässig Antheil, und ganze Muskelgebiete können auch wohl gänzlich verschont bleiben. Von diesem geringsten Grade der Krankheit bis hinauf zu ihrer stärksten Entwicklung findet man nun eine Reihe von Zwischenstufen, welche sich unmöglich beschreiben lassen, in denen aber eine sich immer verstärkende Intensität und Dauer der spastischen Bewegungen bemerkbar ist, bis endlich in den höchsten Graden die Energie und Permanenz derselben eine so bedeutende wird, dass fast alle Muskeln vom Gesicht bis zu den Füssen herab ununterbrochen eine Reihenfolge der grössten Bewegungen ausführen, welche dem Körper kaum einen Augenblick Ruhe lassen, denselben vielmehr nach den verschiedensten Richtungen hin schleudern, gegen die Kanten der Bettstelle werfen und an vielen Stellen Contusionen verursachen können. Ich sah solche Kinder mit blauen Flecken bedeckt, schliesslich sogar aus dem Bette geschleudert werden und musste wiederholt das Letztere mit dicken Kissen auspolstern, um ernstere Verletzungen zu verhüten. Auch das Schlucken kann erschwert sein, wobei ein Theil des Genossenen wieder ausgestossen wird. Aber selbst in diesen heftigsten Fällen bleibt die Gruppe der Augenmuskeln, abgesehen vom *Ocululus palpebrarum*, fast immer verschont; wenigstens konnte ich selbst nur ausnahmsweise eine Theilnahme derselben beobachten, ebenso wenig die von einigen Autoren ¹⁾ erwähnte abwechselnde Erweiterung und Verengerung der Pupillen, welche ganz unabhängig vom Einfluss des Lichtes auftreten und mit Abschwächung des Selbstvermögens während der Dilatation verbunden sein soll. Ich behalte mir fernere Untersuchungen über dies Phänomen vor, welches jedenfalls ausserordentlich selten sein muss.

In sehr vielen Fällen von Chorea finden Sie die Bewegungen auf der einen Hälfte des Körpers weit stärker als auf der anderen, oder die Krankheit tritt überhaupt nur halbseitig auf, während die andere

¹⁾ Cadet de Gassicourt, *Traité clinique des maladies de l'enfance*. T. II. p. 235. Paris 1882.

Seite völlig verschont bleibt (Hemichorea). Diese Beschränkung zeigt sich entweder nur im Beginne oder bleibt dauernd bis ans Ende der Krankheit. Noch vor kurzem sah ich bei einem 14jährigen Knaben während der zweitäglichen Dauer der Chorea ausschliesslich die Extremitäten der rechten Seite in hohem Grade ergriffen, während die linksseitigen nie eine Spur der Krankheit darboten. Nur die Muskelbündel der Zunge zeigten auch in Fällen von Hemichorea auf beiden Seiten deutliche Bewegungen, was aus der vielfachen Kreuzung dieser Bündel leicht zu erklären ist. Die Befürchtungen, welche sich an die Halbseitigkeit der Convulsionen und Contracturen (S. 156) knüpfen, gelten nach meiner Erfahrung nicht für die Hemichorea, welcher ich im Allgemeinen keine ernstere Bedeutung beilegen kann, als der doppelseitigen.

Die Choreabewegungen sind, selbst in den heftigsten Fällen, fast niemals vollkommen gleichmässig, vielmehr wechselt ihre Intensität von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde. Oft glaubt man schon zu einer entschiedenen Besserung, und plötzlich nimmt die Krankheit wieder eine schlimme Wendung. Steigernd wirkt unter allen Umständen jede intendirte Bewegung; der Versuch zu schreiben, kleine Gegenstände zu fassen, die Arme über den Kopf zu heben u. s. w. bewirkt eine erhebliche Zunahme, ja selbst das Fixiren des Blickes auf einen Gegenstand kann, wie ich in einem durch Theilnahme der Augenmuskeln ausgezeichneten Falle beobachtete, dieselbe Wirkung haben. Daher sind solche Kinder zu allen Beschäftigungen, welche die Finger in Anspruch nehmen, Schreiben, Nähen, Klavierspielen u. s. w. meistens ganz unfähig. Die beim Schreibversuche herungeschleuderte Feder beschmutzt das Papier mit Tintenflecken. In intenseren Fällen bewirkt schon jeder Versuch zu sprechen, sich aufzurichten, die gewaltigste Steigerung. Viele sind nicht einmal im Stande, allein zu essen, sondern müssen gefüttert werden, weil sie den Löffel nicht festhalten oder nur auf einem Umwege bis an den Mund bringen können und dabei den Inhalt desselben verschütten. Jede mimische Anregung, z. B. Lachen, ruft wenigstens in den höheren Graden der Krankheit sofort ein lebhaftes Grimassenpiel, oft auch eine Steigerung aller Bewegungen hervor. Steigernd wirkt oft auch die Verlegenheit, das Bewusstsein beobachtet zu werden, während Einzelne gerade unter diesen Umständen die Muskelwuth mehr als sonst beherrschen. Fast immer bewirkt aber der ruhige Schlaf eine vollständige Pause; selbst die heftigsten Bewegungen hören dann auf, und erst beim Erwachen beginnt die Action wieder von neuem. Nur in wenigen Fällen beobachtete ich eine wenn auch nur geringe Fortdauer im Schlafe; die Kinder warfen sich umlag hin und her und zeigten auch wohl leichte

zappelnde Bewegungen, doch können solche Ausnahmefälle, deren Bedingungen mir nicht klar sind, der allgemeinen Regel keinen Eintrag thun. Vor allem muss der Schlaf ruhig und tief sein; ist er dies nicht, so können allerdings die Bewegungen während desselben fortauern, und es ergibt sich daraus die bestimmte therapeutische Indication, dem Kinde ruhige Nächte zu verschaffen und dadurch die Bewegungen wenigstens für eine Reihe von Stunden zu sistiren. Merkwürdig war mir immer der Mangel der Ermüdung trotz der den ganzen Tag andauernden heftigen Bewegungen. Man denke sich diese nur willkürlich mit solcher Ausdauer und Intensität ausgeführt, und man wird zugeben, dass dies entweder gar nicht möglich sei oder die Kräfte gänzlich erschöpfen müsse. In einigen intensiven Fällen, wo es uns gelang, Temperaturmessungen vorzunehmen, (das Thermometer ist dabei immer in Gefahr zerbrechen zu werden) konnten wir keine Steigerung der Wärme trotz der andauernden heftigen Muskelbewegungen constatiren.

Dies sind die Hauptzüge, welche das Krankheitsbild der Chorea zusammensetzen. Alles andere, was sonst noch beschrieben ist, halte ich weder für charakteristisch, noch überhaupt für sicher. Dahin gehört z. B. die Empfindlichkeit der *Pres. spiacoi* zinger Halswirbel, besonders der obersten, gegen Druck, ferner die Möglichkeit, durch eine Compression gewisser Nervenpartien, des *Plexus brachialis* oder des *N. cruralis*, die krampfhaften Bewegungen zu steigern. Die meisten Kinder befinden sich, abgesehen von diesen letzteren, vollkommen wohl, ihre Functionen sind in bester Ordnung, und wenn auch ein Theil der Kranken lächlich und schwächlich aussieht, so ist dies doch keineswegs constant oder gar nöthwendig. Ueber Schwäche eines oder des anderen Arms wird bisweilen geklagt, doch sah ich nie eine vollständige Paralyse; fast immer konnten die von mir gewünschten Bewegungen, freilich nur mit grosser Hast, ausgeführt werden, und nur selten zeigte sich eine in wenigen Tagen vorübergehende Parese einer oberen Extremität, die in einem Falle so erheblich war, dass das Kind die andere Hand zur Hülfe nehmen musste, um die paretische Extremität zu heben. Dies kommt aber, wie gesagt, nur ausnahmsweise vor, und wenn manche Mütter den Krankheitszustand als „Lähmung“ bezeichnen, so geschieht dies nur deshalb, weil ihnen besonders die Unfähigkeit, Hand und Arm in normaler Weise zu gebrauchen, imponirt. Dagegen fand ich bisweilen die psychische Stimmung verändert; die Kinder werden reizbar, weinerlich, heftig, aber nur sehr selten kommt es zu einer wirklichen psychischen Störung, welche sich vorzugsweise durch exstatische Delirien kennzeichnet. Ich erinnere mich nur eines ausgesprochenen Falles dieser Art, bei einem 10jährigen

Mädchen, welches seit vielen Wochen an einer Chorea mittlerer Intensität leidend Anfälle von Ekstase darbot, in denen sie sich als eine „Prinzessin“ gebend, von ihrer Umgebung Dienstleistungen aller Art verlangte und darauf bezügliche Boden hielt. Mit der Chorea verschwand zugleich dieser abnorme geistige Zustand. Verlust des Gedächtnisses, Stumpfseinn, partielle Anästhesie, von denen einzelne Autoren sprechen, habe ich selbst nicht beobachtet.

Der Verlauf der Krankheit ist fast immer ein langwieriger, auf viele Wochen, oft auf mehrere Monate ausgedehnter. In der Regel wird die erste Entwicklung als eine sehr allmähliche, kaum merkliche bezeichnet. Unstete Bewegungen der einen Hand, Verziehung der Gesichtsmuskeln eröffnen die Scene, und nicht selten werden Schulkinder von unerfahrenen Lehrern deshalb und wegen der vielen „Tintenkleckse“ geächtet. Mit Blutströmen auf den Händen, die von Schlägen mit einem Kantei herrührten, kam ein armes Mädchen dieser Art in meine Klinik. Allmählig steigert sich nun die Intensität und Ausdehnung der Bewegungen, bis sie etwa nach 4 bis 5 Wochen ihre Höhe erreichen und dann langsam wieder abnehmen, so dass einige Monate bis zur völligen Heilung verstreichen. Im Allgemeinen neigen die Fälle mit langsamer Entwicklung und von mittlerer Intensität zu einem mehr chronischen Verlaufe, während ich solche, die stürmisch auftraten und die höchsten Grade der Krankheit darboten, mitunter binnen 6 Wochen glücklich enden sah. Ein tödtlicher Ausgang wurde durch die Chorea nur in sehr seltenen Fällen, welche fast alle ausserst acut verliefen, meistens in einem, unter den heftigsten mit Delirien verbundenen krampfhaften Bewegungen sich ausbildenden comatösen Zustande herbeigeführt. Unter allen Chorea-kranken, welche ich beobachtete, und ihre Zahl beläuft sich auf einige Hundert, sah ich diesen Ausgang doch nur in zwei Fällen eintreten, von denen der eine hier eine Stelle finden mag.

Ein 10-jähriges ungarisches Mädchen, bei welchem ich am 6. Mai 1876 consultirt wurde, litt seit 20 Wochen an einer immer intensiver sich gestaltenden Chorea. Zunahme besonders seit 4 Wochen. Schmächtige anhaltende Bewegungen, welche zum einen Aufenthalt im Bette nöthigten. Im Schlafe völlige Pausen. Seit etwa 3 Wochen Bewusstseinsverlust des Sensoriums, grosse Agitation, Unmöglichkeit aufrecht zu sitzen, wobei Kopf- und Oberkörper hin- und herschwenken, Abnahme des Gesichtes und Gehörssinn, paralytische Dysphagie, so dass die Ernährung mittelst der Schlandsonde nöthig war, Choreaebewegungen in den letzten Tagen nur noch mässig fortdauernd. Puls äusserst klein, 30—60 in der Minute; am Herzen nichts Abnormes wahrzunehmen, Stuhlreinerdung, enormer Abmagerung. Alle Mittel erfolglos. Tod im Collaps nach einer Woche. Section nicht gestattet.

Das letztere war leider auch bei dem zweiten Kinde der Fall, doch

bemerkte ich schon hier, dass die bei letthal gewordener Chorea gefundenen Veränderungen der Centralorgane durchaus nichts Charakteristisches ergeben haben. Insbesondere scheinen mir die in neuester Zeit beschriebenen mikroskopischen Veränderungen der grossen Ganglienzellen des Rückenmarks und der peripherischen Nerven noch viel zu unsicher zu sein, um hier bei denselben zu verweilen.

Fälle von Unheilbarkeit der Chorea sind mir, wohlverstanden im Kindesalter, ausser den eben genannten bisher nicht vorgekommen, nur einmal, bei einem neunjährigen blinden Knaben, sollte dieselbe nach Aussage der Verwandten schon über ein Jahr bestehen, freilich nur in sehr mildem Grade; der schliessliche Ausgang blieb mir unbekannt. Die Verwechselung mit anderen Zuständen, auf welche ich bald kommen werde, hat meine Ansicht nach zur Annahme ungeheilt gebliebener Fälle viel beigetragen. Dagegen zeichnet sich die Krankheit durch eine ungewöhnliche Neigung zu Recidiven aus, und ich rathe Ihnen daher, in jedem Falle die Eltern darauf vorzubereiten, dass früher oder später Rückfälle eintreten können, welche ebenso heftig auftreten und ebenso lange dauern können, wie der erste Anfall, in der Regel aber milder und rascher verlaufen. Das Intervall, welches zwischen dem ersten Anfall der Chorea und dem Recidiv liegt, variirte in den von mir beobachteten Fällen zwischen drei Monaten und zwei Jahren. Mehrfache Recidive kamen mir wiederholt vor:

Mädchen von 8 Jahren, Chorea im Sommer 1844, Recidive im Februar und November 1846, im November 1847 und 1848, im September 1849, endlich im Dezember 1850; also im Ganzen 6 Recidive binnen 6 Jahren. Im Januar 1848 acuter Gelenkrheumatismus, worauf im November beim 5. Recidiv eine Insufficienz der Nierentubuli constatirt wurde.

Mädchen von 13 Jahren, am 10. Februar 1874 vorgestellt. Vor 4 Jahren zweites Mal Chorea. Nach einem Jahre heftiges Recidiv. Anfangs Februar 1874 der dritte Anfall.

Mädchen von 13 Jahren, am 13. Mai 1874 vorgestellt. Erster Anfall vor 3 Jahren, seitdem jährlich ein Recidiv. Dauer immer 3–5 Monate.

Mädchen von 10 Jahren, am 31. Mai 1875 vorgestellt. Vor 2 Jahren Chorea. Erstes Recidiv vom November 1874 bis Februar 1875. Zweites Recidiv seit einigen Tagen.

Vorläufig sei hier bemerkt, dass die Beziehung der Chorea zum Rheumatismus, von welcher bald die Rede sein wird, für die Entstehung der Recidive nicht immer in Betracht kommt. Nur der erste der eben mitgetheilten Fälle könnte an einen solchen Einfluss denken lassen, während in den drei andern von irgend einer rheumatischen Erkrankung nie die Rede war. Wohlthut diese Neigung zu Rückfällen, die ja auch andern Nervenkrankheiten, zumal convulsrischen, zukommt, bedingt

wird, ist unbekannt und wird es auch bleiben, so lange wir überhaupt noch keine Einsicht in das Wesen und den Sitz der Krankheit gewonnen haben.

Diese Einsicht ist uns bis jetzt versagt, obwohl es an Hypothesen und auch an experimentellen Deutungen nicht fehlt. Schon beim ersten Anblick der Choreaerregungen wird Ihnen der Unterschied derselben von anderen convulsivischen Krankheiten, z. B. Epilepsie oder Tetanus, recht in die Augen fallen. Während nämlich die letzteren entweder starke Contracturen oder ruckweise erfolgende, wie durch elektrische Entladung bewirkte Zuckungen darbieten, beobachten Sie in der Chorea nur solche Bewegungen, welche auch im normalen Zustande ausgeführt werden, Flexion und Extension, Adduction und Abduction, Pronation und Supination; nur finden alle diese Bewegungen unwillkürlich und mit grosser Hast statt. Es sind also, wie Ramberg hervorhob, immer combinirte oder coordinirte Muskelactionen, welche an Intensität zunehmen, sobald die Patienten irgend eine Muskelgruppe zu einem bestimmten Zweck in Action setzen wollen, und diese Unfähigkeit, eine Reihe von Mithbewegungen zu verhindern, bildet einen Hauptzug in dem Bilde der Chorea. Dass aber nun das Coordinationscentrum wirklich der Sitz der Krankheit ist, lässt sich bis jetzt nicht beweisen, ja die Autoren sind nicht einmal darüber einig, ob die Chorea vom Gehirn oder vom Rückenmark ausgeht. Frühere Versuche lehren allerdings, dass decapitirte Thiere noch combinirte Bewegungen ausführen können¹⁾ und auch die Experimente von Chauveau, Legros und Onimus²⁾ lassen sich für den Sitz der Krankheit im Rückenmark, und zwar in den Nervenzellen des Hinterhorns oder in den Fasern, welche diese Zellen mit den motorischen verbinden, geltend machen; andererseits spreicht die bisweilen beobachtete Combination mit psychischen Zuständen (Delirien, Ecstase u. s. w.) auch für eine Theilnahme des Gehirns. In meiner Klinik vertrat ich schon seit Jahren die Ansicht, dass die Chorea, wie die Epilepsie, überhaupt keine Krankheitseinheit, sondern nur eine Erscheinungsform ist, dass man daher am besten thäte, den Namen „Chorea“ auf die bestimmte, mit wenigen Ausnahmen dem Kindesalter eigenthümliche Neurose zu beschränken, sonst aber nur von „choreawartigen Bewegungen“ zu sprechen, die unter diesen oder jenen Umständen auftreten können. Zu diesen gehören unzweifelhaft auch Erkrankungen der Centralorgane, und zwar besonders des Gehirns.

¹⁾ Ramberg, *Lab. d. Nervenk. I.* S. 202.

²⁾ Robin's *Journal*. 1870. S. 301.

In einigen Fällen von Tuberculose desselben beobachtete ich in Verbindung mit Hemiplegie oder mit partieller Lähmung eines Arms fast unhaltende automatische Bewegungen desselben, welche denen der Chorea sehr ähnlich waren. In dieselbe Kategorie gehört die „postparalytische“ Hemichorea in hemiplegischen und anästhetischen Gliedern, deren Sitz von Charcot in die *Cerebra radiata* verlegt wird (?), ferner die mit den Choreabewegungen verwandte „Athetose“. Hier und da sind auch bei Erwachsenen, selten bei Kindern, Fälle von chronischer, auf viele Jahre ausgedehnter Chorea beobachtet worden, bei deren Section man verschiedenartige Alterationen des Gehirns oder des Rückenmarks antraf.

In der unendlich grösseren Majorität der Fälle von Kinderchorea aber kann eine materielle Erkrankung der Centralorgane ausgeschlossen werden, was schon aus dem fast immer glücklichen Ausgange der Krankheit hervorgeht, und es bleibt daher nur übrig, dieselbe als eine „Neurose“ aufzufassen, die wahrscheinlich von einem Erregungsanstande der Coordinationscentra ausgeht. Die Ursachen dieses Erregungsanstandes bleiben uns freilich in vielen Fällen verborgen. Unter 36 selbst beobachteten Fällen konnte ich 11mal trotz der genauesten Nachforschung absolut keinen Anlass auffinden. Alle Organe waren gesund, auch die Blutmischung anscheinend eine ganz normale. In den übrigen Fällen bestand ein paar Mal Anämie mit Blässe der Haut und Schleimhäute, Venengeräuschen am Halse und allgemeiner Schwäche. Schreck oder Furcht, also psychische Eindrücke, schienen wiederholt den Anlass zur Entwicklung der Chorea abzugeben:

Ein 12jähriges Mädchen wurde durch das Anspringen eines Hundes so erschreckt, dass sie ein paar Tage beinahe sprachlos war. Gleich darauf brach die Chorea aus. Bei einem 10jährigen Mädchen entwickelte sich dieselbe fast unmittelbar nach einem Schlag auf den Kopf, der sie mehr erschreckte, als sonst beschädigte. Bei einem 11jährigen Mädchen nach einem Schreck, der sie in die Wahnung treibender fremder Mäen hat verurtheilt. Ein 12jähriges Mädchen bekam Chorea nach dem ersten Seelade, welches sie nur mit Widerstreben und grosser Furcht genommen hatte.

Als eine der häufigsten Ursachen muss aber unbedingt der Rheumatismus in seinen verschiedenen Formen bezeichnet werden. Die von französischen und englischen Autoren (Bouteille, Séz, Hughes, Bright u. A.) veröffentlichten Beobachtungen dieser Art erregten bei uns anfangs nicht die verdiente Aufmerksamkeit, und erst allmählig lernte man ihre Richtigkeit würdigen. Schon in den Jahren 1846, 1851 und 1868¹⁾ veröffentlichte ich selbst eine Reihe von Fällen dieser rheu-

¹⁾ Kunze und Hensch, *Klinische Ergebnisse* S. 20. — Dieselben,

matischen Chorea und hatte seitdem sowohl in der Klinik, wie in der Privatpraxis vielfache Gelegenheit, mich von der Häufigkeit derselben zu überzeugen. Ein reiches Material bietet besonders die Arbeit von Roger ¹⁾. Am häufigsten ist es der acute Gelenkrheumatismus, in dessen Abnahme- oder Recrudescenzstadium sich die Chorea entwickelt, und ich rathe Ihnen daher, bei solchen Kindern sich immer auf das Auftreten derselben gefasst zu machen. Am seltensten beobachtete ich die Chorea schon im Acutestadium der Polyarthrit, wobei durch die anhaltenden Bewegungen der afficirten Gelenke die heftigsten Schmerzen entstehen, die Kinder schreien und toben und in einen Zustand gewaltiger psychischer Erregung verfallen können. Zumeilen beobachtet man auch ein Alterniren beider Affectionen, z. B. in einem Falle von Roger, wo 6 Anfälle von acutem Rheumatismus und 5 Anfälle von Chorea gezählt wurden. Fast ebenso häufig aber sind es anscheinend leichte rheumatische Zustände, welche die Chorea in ihrem Gefolge haben, wandernde Schmerzen mit leichten Anschwellungen einzelner Gelenke, welche nur ein paar Tage bestehen und kaum von Fieber begleitet sind, oder auch nur Schmerzen im Rücken, in den Waden, in verschiedenen Gelenken ohne jede Anschwellung und ohne Fieber. Wiederholt konnte ich beobachten, dass das Wiederauftreten solcher rheumatischen Affectionen im Verlaufe der Chorea die schon in der Abnahme begriffenen Bewegungen von neuem steigerte. Es kommen sogar Fälle vor, in denen ein ganz beschränktes rheumatisches Leiden, z. B. ein Caput obstipum, Chorea zur Folge hat. Bei einem 14jährigen Knaben mit Hemichorea dextra waren auch die vorausgehenden Schmerzen und Anschwellungen lediglich auf die Hand- und Fussgelenke der rechten Körperhälfte beschränkt gewesen, was aber keineswegs constant ist. Seltener eröffnete die Chorea die Scene und der Rheumatismus machte sich erst später bemerkbar, z. B. in einem der bei Gelegenheit der Revue (S. 182) mitgetheilten Fälle, wo erst nach dem vierten Choreanfall ein acuter Gelenkrheumatismus mit Endocarditis eintrat. Dasselbe beobachtete ich in folgenden Fällen:

Bei einem 12jährigen Mädchen, welches innerhalb völliger Gesundheit von Chorea befallen worden, traten während ihres fast 2 Monate währenden Verlaufs wiederholt schmerzhafter Anschwellungen der Fuss- und Handgelenke und vage Gliederschmerzen auf.

Klinische Wahrnehmungen und Beobachtungen. S. 66. — Herzoch, Beiträge zur Kinderheilk. N. P. S. 105.

¹⁾ Arch. gén. de méd. Dec. 1866 u. f.

Die 12jährige Mädchen, aufgenommen in die Klinik am 18. December 1872 mit Chorea, wurde Anfangs Februar geheilt entlassen. Von Rheumatismus wurde nie eine Spur bemerkt, auch das Herz vollkommen normal gefunden. Im November 1873 wurde sie von einem acuten Gelenkrheumatismus befallen, worauf im December ein heftiges Recidiv der Chorea eintrat. Bei der Untersuchung in der Poliklinik wurde namentlich eine Insufficienz der Mitralklappe constatirt.

Sie ergeben aus diesen Fällen, dass die Chorea schon die erste Aeusserung des rheumatischen Leidens sein kann, und dass sie leicht ein Recidiv macht, wenn sich bei einem früher mit Chorea behafteten Kinde ein solches Leiden entwickelt. Dass man nun unter diesen Verhältnissen sehr häufig Fehler des Klappenapparats im Herzen, sei es der Mitralis oder der Aortenklappen, findet, erklärt sich leicht aus der bekannten Beziehung des Rheumatismus zum Endocardium. Ich habe es mir daher zur Pflicht gemacht, in jedem Falle von Chorea sofort das Herz genau zu untersuchen, und fand oft genug Klappenfehler und ihre Folgen, welche sich noch durch kein subjectives Symptom, nicht einmal durch Palpitationen verrathen. Dass man sich dabei hüten muss, anämische Geräusche im Herzen mit organischen zu verwechseln, muss ich besonders hervorheben, da es sich gerade hier nicht selten um anämische Kinder handelt. Wenn man aber behauptet, die Chorea sei in solchen Fällen immer die Folge des Herzleidens, sei es nun durch Reflex von diesem aus oder durch embolische Vorgänge, die sich in den grossen Hirnanglien abspielen sollen, so halte ich diese Ansicht aus dem Grunde für irrtümlich, weil ich nicht selten Fälle von Chorea rheumatica beobachtet habe, in welchen das Herz absolut frei war, andererseits aber aus Erfahrung weiss, dass, wo ein Klappenfehler besteht und rheumatische Affectionen von den Angehörigen in Abrede gestellt werden, diese wegen ihrer Geringfügigkeit oft übersehen worden sind. Auch wäre es wohl möglich, dass Chorea als Aeusserung des Rheumatismus mit einer Endocarditis verläuft, ohne dass Schmerzen oder Gelenksanschwellungen kurztröfen (Boitel, Sie, Roger). Jedenfalls wird man zugeben müssen, dass embolische Prozesse im Corpus striatum und Umgegend wohl ganz andere Folgen haben und schwerlich so rasch in vollständige Heilung übergehen würden, wie man es in fast allen solchen Chorea-fällen beobachtet. Die Affection des Herzens hat also meiner Ansicht nach mit der Chorea nichts zu schaffen; beiden liegt vielmehr die gleiche Ursache, der Rheumatismus zu Grunde, der in unerklärter Weise auf das Coordinationscentrum einzuwirken scheint.

Ungleich seltener wird Chorea als Folgehebel acuter Infectionskrankheiten beobachtet. So sah ich so bei einem 8jährigen anämischen

Knaben etwa zwei Wochen nach dem Ablauf einer Diphtherie, bei zwei anderen Kindern in Verbindung mit dem Scharlachfieber sich entwickeln. Im Allgemeinen aber halte ich Bauchschmerz gegenüber dem Auftreten der Chorea als Nachkrankheit der Scharlacha für selten und konnte auch nie die Behauptung desselben bestätigen, dass die Chorea unter diesen Umständen bisweilen nur 6 bis 8 Stunden dauern soll. Zwei von mir beobachtete Fälle begleiteten den Scharlachprocess, waren also keine Nachkrankheiten. Bei einem 7jährigen Mädchen, welches schon einmal Chorea überstanden hatte, erfolgte im Blüthestadium des Scharlachs ein Recidiv derselben, während im zweiten Falle wichtige Complicationen stattfanden.

Am 2. Februar 1876 wurde ich bei einem 3jährigen Knaben consultirt, welcher schon in der ersten Woche des Scharlachs an schmerzhaften Anschwellungen der Fingergelenke, End- und mittel Fingergelenke gelitten hatte. Wenige Tage darauf entwickelte sich eine intensive Chorea, welche, als ich das Kind sah, bereits anderthalb Wochen dauerte. Die Untersuchung ergab ein lautes systolisches Geräusch an der Herzspitze, sehr stürmische Reaction, heftiges Abends exzessives Fieber. Am Ende der 3. Woche kinnathagische Nephritis mit tödtlichem Ausgang durch Longuetödem. Früher hatte der Knabe als an Chorea gelitten, auch ein ganz normales Herz gehabt.

Man könnte hier daran denken, dass die scarlatinöse Synovitis allein oder in Verbindung mit der Endocarditis die Chorea erzeugt habe, und es läge dann nahe, die locale Affection der Gelenke oder des Endocardiums auch beim Rheumatismus als die eigentliche Ursache der Chorea zu beschuldigen. Ich glaube indess vielmehr, dass nicht die Localprocessen, sondern die allgemeinen, sowohl beim Rheumatismus wie beim Scharlach anzuklagen, Syntoxitis und Endocarditis aber nur als Complicationen zu betrachten sind.

Eine durch Reflexreiz hervorgerufene Chorea, welche man also der Chorea gravidarum an die Seite stellen könnte, ist nur im kindlichen Alter noch nicht vorgekommen. Warmreiz wird entschieden häufiger angenommen, als thatsächlich begründet, und nur wenigstens ist es noch niemals gelungen, durch Anthelminthica, auch wenn sie Würmer abtrieben, eine Chorea zu heilen.

Wie wirken nun intercurrente Krankheiten auf die Chorea ein? Diese Frage ist in verschiedener Weise beantwortet worden und die folgenden Fälle beweisen, dass sich in der That nichts sicheres darüber sagen lässt.

Knabe von 9 Jahren, am 27. Jan. 1873 aufgenommen mit Chorea, deren Dauer unbekannt ist. Herz normal, aber Puls unregelmäßig und aussetzend. Am 6. Februar durch eine heftigsten stürmischen Fieber bis zu 41,0 mit Koll. Brechnus.

Am folgenden Tage 37,8, aber Chorea sehr intensiv. In den nächsten Tagen Entwicklung einer rechten halbseitigen Pleuritis; schon am 10. Februar bestehender Nachlass der Choreaebewegungen; Puls immer langsam und unregelmäßig. Den 2. März Chorea beinahe ganz verschwunden. — Vom 17. Mai an Recidiv. Puls immer 68, etwas unregelmäßig. Pleuritische Exsudat fast resorbiert. Heilung nach vierzehn Tagen.

Knabe von 18 Jahren (20. Februar 1873). Seit 8 Tagen Chorea dextra ohne Ursache. Kein Rheumatismus. Hies normal, Oberkörper völlig gesund. Trotz der Anwendung der bewährtesten Mittel Fortdauer bis Ende Mai, wo eine Abnahme bemerkbar wird. Am 1. Juni durch einen Fall Luxatio humeri im Ellenbogengelenk. Vermittelt durch der sehr schmerzhaften Einnahme ist die Chorea völlig und für immer verschwunden. — Im folgenden Herbst neuer Rheumatismus mit Endocarditis, aber ohne Recidiv der Chorea.

Knabe von 7 Jahren, in der Klinik an Chorea behandelt. Sympotisches Geräusch an der Mitralklappe. Eine Angina tonsillaris, mit 42,0 Temp. verlaufend, bleibt ohne jeden Einfluss.

Mädchen von 10 Jahren, in der Klinik an Chorea behandelt, außerdem tuberkulös. Wieder eine intercurrente Angina diphtheritica (39,4 bis 40° Temp.), nach der darauf folgenden Masern beeinflussen in irgend einer Weise den Verlauf der Chorea.

Sie sehen also, dass febrile Krankheiten keineswegs, wie Einige behaupten, den Verlauf der Krankheit constant abkürzen. Auffallend bleibt freilich das schnelle Verschwinden in Folge der Luxation, doch muss hier bedacht werden, dass die Chorea nach einer 4 monatlichen Dauer überhaupt schon in der Abnahme war und wahrscheinlich auch spontan um diese Zeit erloschen sein würde. Diese Naturheilung der Krankheit nach einer im Durchschnitt etwa dreimonatlichen Dauer trübt auch so leicht die Beurtheilung der angewendeten Therapie, und fordert zur strengsten Kritik der empfohlenen zahlreichen Mittel auf. Zu einer gewissen Zeit scheinen diese alle zu helfen, weil die Krankheit eben spontan zu Ende geht, und Sie werden es deshalb gerechtfertigt finden, wenn ich hier auf Mittel, denen ich absolut keinen Werth beilegen kann, nicht näher eingehe. Leider muss ich aber die Frage, ob es ein den Verlauf der Chorea sicher abkürzendes Mittel geht, entschieden verneinen. Allerdings steht für mich der Arsenik, den ich nach Romberg's Empfehlung seit dem Beginn meiner Praxis anwende, noch immer in erster Reihe, aber auch dies Mittel zeigt keine constanten Wirkungen; öfters sah ich trotz seines beharrlichen Gebrauchs die Krankheit Monate lang fortbestehen, während in der Majorität der Fälle eine die Heftigkeit der Bewegung mildernde Wirkung bald bemerkbar wurde, und viele mit diesem Mittel behandelte Fälle auch in verhältnissmäßig kurzer Zeit (5 bis 6 Wochen) günstig verliefen. Wenn die Versuche (Sklarck) richtig sind, nach welchen der Arsenik den

empfindungsleitendes Theil der Medulla functionserfähig machen soll, so wäre damit eine Deutung des Effects gegeben, welche sich mit der von Legros und Orimus (S. 183) aufgestellten Ansicht von dem Wesen der Chorea vereinigen lässt. Der Arsenik passt nach meinen Erfahrungen für alle Fälle von Chorea, also auch für die rheumatische, wenn nicht eine Contraindication durch Magen- oder Darmleiden vorliegt. Gerade bei Anämischen schien er mir besonders empfehlenswerth. Ich lasse immer die Sol. arsen. Fowleri zu 2 bis 3 Tropfen (F. 11) 3 mal täglich etwa eine Stunde nach dem Frühstück, Mittag- und Abendbrot nehmen, und sah bei dieser Anwendungsweise nur ausnahmsweise Uebelkeit oder Diarrhöen entstehen, welche ein Aussetzen des Mittels gebieten. Die meisten Kinder vertrugen den Arsenik viele Wochen lang vortreflich, und ich halte daher alle ausgesprochenen Befürchtungen und Mahnungen (nomina sunt odiosa) für Annehmlichkeiten, die von Unerfahrenen erdichtet sind. Ueber die von Einigen empfohlene hypodermatische Anwendung des Arsenuks (1 Th. Sol. Fowl., 2 Th. Aq. dest., davon 20 bis 30 Theilstriche einer Pravaz'schen Spritze zu injiciren) fehlt mir die Erfahrung¹⁾, jedenfalls würde ich in Fällen, wo der Magen das Mittel nicht verträgt, von derselben Gebrauch machen. Ein Zusatz von Opium (etwa 1,0 Theilstr. theil. auf die oben empfohlene Mischung) schien mir in einigen sehr heftigen Fällen die Wirkung zu steigern.

Sollten wegen Schlaflosigkeit auch bei Nacht anhaltende heftige Bewegungen stattfinden, so empfehle ich Ihnen Abends 0,5 bis 1,0 Chloralhydrat zu reichen. Einigen an der heftigsten Form der Chorea leidenden Kindern gaben wir diese Dosis sogar ein paar Mal täglich, worauf sehr bald Schlaf und Abnahme der²⁾ gewaltigen Bewegungen erfolgte, bei einem 10-jährigen Mädchen aber als Chloralwirkung ein dem Scharlach sehr ähnliches Erythem über einen grossen Theil des Körpers ausbrach. Das Chloral passt indess immer nur für diese Verhältnisse zur Einleitung der Cur und muss, nachdem grössere Ruhe und Schlaf erzielt ist, dem Arsenik Platz machen.

Die früher behandelte abführende Methode ist, ebenso wie die Anwendung des Tart. stibiatu8 mehr und mehr in Vergessenheit gerathen, was bei der schwächlichen anämischen Constitution vieler choreakrankter Kinder gewiss gerechtfertigt ist. Wo aber diese Contraindication nicht besteht, die Patienten vollnährte, vollsaftig und fettreich sind, schien mir

¹⁾ Garin, *Aspirin f. Kinderheilk.*, 1. 385. Injection von 4–5 Tropfen Sol. Fowl. jeden 2. oder 4. Tag, oder selbst täglich. Frische Fälle sollen nach etwa 18 Injectionen geheilt werden sein.

die Anwendung von Abführmitteln vortheilhaft zu wirken. Ich lasse dann zuerst ein paar Tage lang purgiren, und auch weiterhin allwöchentlich auf 24 Stunden den Arsenik ansetzen und dafür einen bis anderthalb Löffel Öl, rari oder Infus. Sennae compositum nehmen. Von den vielen sonst noch empfohlenen Mitteln haben Sie meiner Erfahrung nach keine günstige Wirkung zu erwarten, noch nicht von grossen Dosen des Breunkali oder vom Strychnin, welches ich nach Troussseau's Vorgang sowohl innerlich, wie hypodermatisch (0,002–0,003 täglich) wiederholt versuchte. War auch die Wirkung des letzteren in einem Falle überraschend, so überzeugte ich mich doch bald, dass dies nur scheinbar und zufällig war. Ebenso wenig kann ich Zerstäubungen von Aether längs der Wirbelsäule, Schwefelbäder (Kali sulphurat. 50,0 bis 100,0 auf ein Bad), oder den constanten Strom, von denen Andere Rühmens machen, empfehlen.¹⁾

Geistige Anstrengungen sind während der Dauer der Chorea möglichst zu vermeiden, und der Schulbesuch muss deshalb und auch mit Rücksicht auf die Mitschüler eingestellt werden, da diese nur zu sehr geneigt sind, an den Chorea-kranken ihren Spott zu üben. Eine Uebertragung der Krankheit auf andere Kinder habe ich nie beobachtet können, während die Möglichkeit derselben durch Nachahmungstrieb, zumal in Schulen und Instituten, von Anderen behauptet wird. In sehr heftigen Fällen haben Sie die Kinder im Bette zu halten und dasselbe rings mit Kissen auszustopfen, um Contusionen zu verhüten. Eine nahrhafte Diät, reine Luft, kalte Abreibungen in den Morgenstunden, insofern sie den Kindern nicht zuwider sind, sonst heisse Bäder, eine passende Gymnastik, zur Nachcur endlich die Eisenpräparate (F. 12) sind zu empfehlen. —

Es scheint mir hier die passendste Stelle, einer Affection zu gedenken, welche von den Aerzten öfters mit der Chorea verwechselt und als solche bezeichnet wird, aber durch ihr weit selteneres Vorkommen und durch ihre Erscheinungen sich von dieser wesentlich unterscheidet. Ich bezeichnete bereits in einer früheren Arbeit diese Affection mit dem Namen „Chorea electrica“²⁾, und auch Heunig³⁾ scheint bei dieser

¹⁾ Einige neuere Mittel, salicylaures Natrium, Eserin, Hyocyamin fand ich mich nicht veranlasst zu versuchen. Nach den Erfahrungen Clobet de Garriessou's scheinen sie günstig wirken zu sein.

²⁾ Heunig zur Kinderheilk. N. F. S. 113.

³⁾ Jahrb. d. Kinderh. des Kindes, 8. Aufl. 1864, S. 245.

Benennung analoge Fälle im Sinne gehabt zu haben. In dieser Form bemerken Sie niemals jene hastigen, coordinirten und durch intendirte Muskelaction gesteigerten Bewegungen, welche das Wesen der Chorea begründen; vielmehr befielen sich die Kranken in voller Ruhe, und nur von Zeit zu Zeit, etwa alle 5 Minuten oder auch häufiger, traten blitzartige Zuckungen, besonders in den Muskeln des Nackens und der Schultern, aber auch in anderen Theilen auf, welche mit den durch einen schwachen Inductionstrom hervorgebrachten die grösste Aehnlichkeit haben, in der Regel auch nur schwach und so schnell vorübergehend sind, dass bisweilen eine recht aufmerksame Beobachtung dazu gehört, um sie überhaupt zu sehen. Zu den 4 in der eben erwähnten Arbeit mitgetheilten Fällen sind seitdem noch mehrere hinzugekommen, welche mit jenen durchaus übereinstimmen. Ich beobachtete die Affectio sowohl bei Knaben wie bei Mädchen, sämmtlich im Alter zwischen 9 und 15 Jahren. Bei entflosten Körper kann man das rasche Zucken der einzelnen Muskeln deutlich sehen und fühlen, und die herausgestreckte Zunge zeigte in einigen Fällen ähnliche wurmförmige Bewegungen wie in der gewöhnlichen Chorea. Jede Zuckung dauert nur einen Augenblick, die Intervalle aber sind sehr verschieden; mitunter vergehen nur einige Sekunden bis zum Eintritt der nächsten Zuckung, in anderen Fällen mehrere Minuten, besonders wenn die Aufmerksamkeit der Patienten anderweitig in Anspruch genommen wird. Dabei ist die Sprache ungestört, ebenso das Schreiben, Nähen u. s. w. ungehindert, wenn diese Actioren nicht gerade durch eine rasche Zuckung des Arms unterbrochen werden. Die eine Hälfte des Körpers ist mitunter stärker befallen als die andere, ja bei einem 15jährigen Mädchen beschränkten sich die Zuckungen nur auf die rechte Körper- und Gesichtshälfte, und wiederholten sich hier so häufig, dass sie das Schreiben und Arbeiten mit der rechten Hand erheblich beeinträchtigten. Uebrigens blieb die Motilität vollkommen normal, und auch andere krankhafte Erscheinungen fehlten vollständig. Nur in einem Falle ämterten die Zuckungen, obwohl schwächer und seltener, auch während des Schlafes fort, in allen übrigen Fällen trat eine völlige Pause, wie bei der Chorea, ein. Bei einem 11jährigen Knaben verbanden sich die Zuckungen des Kopfes, wobei das Gesicht nach oben und links geworfen wurde, zuweilen mit einer Nictitatio beider Augen und einem Zucken des linken Ohrs, wobei sich herausstellte, dass dieser Knabe schon vor einem Jahre ein paar Wochen an einem Nickerkrampf beider Augen gelitten hatte. Bei einem anderen 10jährigen Knaben, dessen ganzer Körper durch diese blitzartigen Zuckungen erschüttert

wurde, während der Kopf fast verschaut blieb, erfolgte zugleich mit jedem convulsivischen Ruck eine krampfhaft, von schürfendem Geräusch begleitete Inspiration, welche auf eine Theilnahme des Zwerchfells, vielleicht auch der Glottis hindeutete.

Anamnesticch ergab sich, dass in einem Fall epileptische Krämpfe bis vor zwei Jahren stattgefunden hatten, nach deren Verschwinden die erwähnten Zuckungen eintraten. In zwei anderen Fällen waren reissende Gliederschmerzen und neuer Gelenkrheumatismus, bei einem 14jährigen Mädchen heftige Schreckkrämpfe vorausgegangen. Ein 11jähriges Mädchen sollte die Affection nach einem Fall auf den Kopf, während sie auf Stühlen ging, bekommen haben. Wiederholt aber konnte ich gar keine anamnesticchen Momente von Bedeutung auffinden und war dann meist versucht, das Ganze als die Folge einer Angewöhnung zu betrachten. Ich glaube daher, dass auch diese Zuckungen, wie manche andere Neurosen, z. B. die Chorea und die Epilepsie, nur die Form darstellen, in welcher sich verschiedenartige directe oder reflectorische Reizzustände der Nervencentra äussern können. So kann es kommen, dass in einzelnen Fällen sehr überraschende Combinationen krampfhafter Erscheinungen auftreten.

Am 6. März 1879 erhielt in meiner Poliklinik ein 19jähriges Knabe, welcher seit dem Ende seines 3. Lebensjahres, also 7 Jahre lang, an folgenden Erscheinungen litt. Die linke Körperhälfte, besonders der Arm, bot fast anhaltende choreaartige Bewegungen dar, aber neben denselben ruckte der Arm auch von Zeit zu Zeit ruckweise zusammen, ganz wie im epileptischen Anfall. Früher war auch die linke Gesichtshälfte befallen gewesen, was jetzt nicht mehr der Fall war. Auch die rechte Extremität war ruhiger geworden. Im Schlafe vollständige Pause. Mit den Fingern der linken Hand kann er nichts greifen, wohl aber alles festhalten. Intelligenz und sonstiger Gesundheitszustand durchaus normal. Electricität soll früher günstig gewirkt haben. Aus der Cur weggelassen.

Wir finden also hier eine Combination wirklicher Choreaebewegungen mit klonischen Zuckungen, deren Aetiologie völlig dunkel ist. Leider war dies in den von mir beobachteten Fällen der Chorea electrica die Regel, und die Therapie konnte demgemäss nur eine empirische, wenig versprechende sein. Nur einmal sah ich vom Bromkali eine entschiedene Wirkung, auch bei einem Recidiv, welches in Folge einer fieberhaften Gastroe sich einstellte. In allen übrigen Fällen hatte ich weder von diesem, noch von irgend einem anderen Mittel einen Erfolg zu verzeichnen. Aconit, Atropin, Strychninjectionen, Extr. Calabar — alles blieb wirkungslos. Am meisten würde ich noch zur beharrlichen Anwendung des galvanischen Stroms rathen, da dieser in einzelnen Fällen an-

zweifelsfrei günstig wirkte, zweimal sogar eine vollständige Heilung erzielte, deren Bestand ich freilich nicht garantiren kann¹⁾.

VI. Die hysterischen Affectionen der Kinder.

Aus der Pathologie der Erwachsenen ist Ihnen bekannt, dass die merkwürdigen nervösen Erscheinungen, welche wir unter dem Namen „Hysterie“ zusammen zu fassen pflegen, diesen Namen, der ihre Abhängigkeit vom Genitalsystem des Weibes in sich schliesst, nicht immer verdienen. Sie wissen, dass bei vielen Frauen dieser Art auch die sorgfältigste Untersuchung der Geschlechtsorgane durchaus keine Abnormität erkennen lässt, dass sogar ganz ähnliche Symptome, wenn auch viel seltener, beim männlichen Geschlecht beobachtet werden. Sie werden mir schon, dass auch das kindliche Alter keineswegs von denselben verschont bleibt²⁾. Freilich kann ich nicht mit Bestimmtheit die Identität der Hysterie Erwachsener mit derjenigen der Kinder behaupten, aber ich weiss in der That nicht, mit welchem Namen ich die zum Theil wunderbaren Erscheinungen, um die es sich hier handelt, besser bezeichnen soll, und zu meiner Entschuldigung kann ich mich wohl darauf berufen, dass wir auch über das Wesen der Hysterie Erwachsener so gut wie nichts wissen, dass alle darüber aufgestellten Theorien hinfällig sind, und dass man sich begnügen muss, einen Complex der verschiedensten neurotischen Symptome, motorischer, sensibler, psychischer, ja selbst trophischer, die sich in stets wechselnden Verschlüßungen mit einander combiniren können, als den Ausdruck derselben zu betrachten. Der Ausgangspunkt und der innere Zusammenhang der Erscheinungen bleibt uns dabei gänzlich unbekannt, und die beliebte Annahme einer erhöhten Reflexerregbarkeit, einer „nervösen“ Disposition ist nicht geeignet, die Lücke zu verdecken.

Ganz dasselbe finden wir nun auch bei Kindern, bei Knaben so gut wie bei Mädchen, wenn auch die letzteren im Allgemeinen häufiger befallen werden. Ich bin darauf gefasst, dass die folgende Schilderung von vielen Seiten her Anfechtungen erfahren wird, weil dieselbe eine

¹⁾ Auch Cadei de Gazeioncourt (l. c. p. 236) rühmt die Wirkung der Electricität, und zwar des inducirtten Stroms, während Bergeron von dem Gebrauch des Tactus sticht. (10,05 auf einmal gegeben). d. h. also von einem Reizmittel, gute Wirkung gesehen haben will. — Kemak (Berl. Hin. Wochenschr. 1881, 21—23) heilt einen auch von mir beobachteten Fall durch eine 9 Monate lang fortgesetzte galvanische Behandlung.

²⁾ Vergl. Smüll, über das Vorkommen von Hysterie bei Kindern (Jahrb. f. Kinderheilk. XV, 1880, 1).

Reihe von krankhaften Zuständen, welche gewöhnlich als von einander verschiedene Affectionen abgehandelt werden, in einem Rahmen zusammenfasst, wie die *Chorea magna*, die *Katalepie*, die *Stimmkrämpfe* und manches Andere. Ich will auch zugeben, dass ich dabei im Unrechte sein kann, aber zu meiner Rechtfertigung lässt sich, wie ich glaube, der Umstand geltend machen, dass in der Praxis Uebergänge der einen Form in die andere und Combinationen derselben nicht selten vorkommen, so dass man leicht in Verlegenheit geräth, mit welchem Namen man den vorliegenden Fall bezeichnen soll. Der praktische Arzt, welcher selbst viel gesehen hat, wird diese Auffassung verstehen und auch wohl würdigen, und darauf gebe ich mehr, als auf den Widerspruch des Theoretikers. Bei der grossen Mannichfaltigkeit der Erscheinungen und dem vielfachen Wechsel derselben, solltet in den einzelnen Fällen, halte ich es geradert für unmöglich, ein allgemeines umfassendes Bild dieser „hysterischen“ Zustände im Kindesalter zu entwerfen. Ich kann daher nur versuchen, Ihnen in kurzen Zügen gewisse Kategorien solcher Fälle aus meiner Praxis vorzuführen, welche, soweit es eben angeht, die Verschiedenheit der Formen veranschaulichen.

Die erste Reihe umfasst diejenigen Fälle, in denen die psychischen Symptome prävaliren, vollständige oder unvollständige Pausen des Bewusstseins, Hallucinationen, Delirien. Die unter dem Namen *Katalepie* oder *Eklipsis* beschriebenen Erscheinungen gehören fast alle in diese Kategorie. Das Bewusstsein ist plötzlich verloren oder wenigstens erheblich abgeschwächt, die Kinder Heben mit stierem Blick sitzen oder stehen, sinken auch zuweilen um, wenn man sie nicht stützt; seltener waren sie im Stande, in einem halbbewussten Zustande, wie im Traume, noch herumzugehen, wobei sie bisweilen unverständliche Worte vor sich hin marmelten. In anderen Fällen sind die Augen geschlossen, der Gesichtsausdruck unverändert, die Farbe bleich, aber die normale Beschaffenheit des Pulses und Herzschlags, die unveränderte Temperatur unterscheiden den Zustand von der Ohnmacht. Nach wenigen Secunden, höchstens einigen Minuten ist alles vorüber, das Wohlbefinden völlig wiederhergestellt. Manche wissen gar nichts davon, dass sie einen solchen Anfall gehabt haben, andere erinnern sich noch des Beginnes desselben oder hatten auch ihr Bewusstsein nur zum Theil verloren, ohne indess sprechen zu können, so dass sie wie im Halbschlummer alles, was in ihrer Umgebung geschah, sahen und hörten. Nach dem Anfall fahren sie meistens in der unterbrochenen Beschäftigung fort, als ob nichts vorgefallen sei. Nur ausnahmsweise fand ich im Anfall jene Steigerung des Muskeltonus, welche in der *Katalepie* der Erwachsenen

als „wackelige Regsamkeit der Glieder“ bekannt ist, wobei die Extremitäten in jeder ihnen gegebenen Stellung verharren. Die Anfälle treten fast immer sehr unregelmässig auf, nämlich 5 bis 6mal und noch mehr an einem Tage, zu anderen Zeiten nur alle paar Tage oder Wochen, ohne dass sich bestimmte Ursachen nachweisen lassen. Das Peinliche für den Arzt liegt hier vorzugeweise darin, dass er nie ganz sicher vor der Ausartung dieser Zufälle in epileptische sein kann, obwohl dies in der Regel nicht geschieht. Wenn man auch in der Klinik und Poliklinik nicht immer im Stande ist, den schliesslichen Ausgang zu beurtheilen, und deshalb auch nur viele derartige Fälle entgangen sind, so hatte ich doch in der Privatpraxis oft Gelegenheit, mich vor dem endlichen günstigen Ausgang zu überzeugen, worüber freilich viele Monate mit wechselnder Besserung und Verschlimmerung hingingen. Ich pflege daher immer eine gute Prognose zu stellen, wenn nicht etwa eine hereditäre Anlage zur Epilepsie besteht, oder wirkliche epileptische Anfälle bereits stattgefunden haben. Dies war z. B. bei einem 10jährigen Mädchen der Fall, welches vor 6 Jahren mehrere epileptische Paroxysmen überstanden hatte. Erst vor 3 Monaten war wiederum ein solcher eingetreten, und seitdem erfolgten alle 2 bis 3 Wochen Anfälle, welche sich durch Kribbeln in den Händen und Füssen ankündigten und nur in einer psychischen Alteration, Umliegen in einem bewusstlosen Zustande, Delirien und Hallucinationen bestanden. Obwohl hier durchaus keine Convulsionen bemerkbar waren, wird man doch an der epileptischen Natur dieses Zustandes, der jeden Augenblick wirklichen Paroxysmen Platz machen kann, nicht zweifeln dürfen.

Selbst das Hin- und Herwanken convulsivischer Erscheinungen darf nicht allzusehr beruhigen. In einigen Fällen, wo am Tage wiederholt die oben beschriebenen Anfälle, Pausen des Bewusstseins mit unverständlichem Sprechen, starrm, ins Leere gerichteten Blick eintreten, wurden in der Nacht öfters Delirien mit leichten Zuckungen verschiedener Körpertheile beobachtet, wobei manche Kinder aufrecht im Bette saßen, ohne indess das Bewusstsein ihres Zustandes zu haben. Dass auch bei Tage bisweilen eine solche Complication vorkommt, lehrt der folgende Fall:

Ein 9jähriger Knabe aus vollkommen gesunder Familie wurde im August 1865 während des Gelmachs von Südländern plötzlich von Schwindel befallen. Ende Januar 1866 erfolgte der erste der gleich zu beschreibenden Anfälle, welche sich im April und August wiederholten. Plötzlich, ohne Ursache und ohne Vorboten, klagte er über Schwindel, welches mitunter so heftig war, dass Pat. stürzte; die Rück wurde stief, der Kopf sehr heiss, und es traten von Delirien ein, welche durch stets gleichartige Hallucinationen begleitet zu werden schienen. Von allen Seiten her sah der Knabe grüne „Schräcke“ und bewaffnete Männer auf sich niedrücken,

und zeigte dabei in den Händen keine Zuckungen. Ein solcher Anfall dauerte zwei bis drei Tage, trüßlich nicht permanent, sondern unterbrochen von Intervallen eines ruhigeren Zustandes, in welchen aber das Bewusstsein nie vollkommen klar war. Das Aufhören des Anfalls erfolgte plötzlich und der Knabe gab dann sofort an, dass man alles richtig sei. Mit Annahme von Kopfschmerzen befand er sich in den freien Zeiten vollkommen wohl und alle seine Organe funktionirten auf normale Weise. Ich ließ ihn ein paar Monate lang Bromkali nehmen. In der Nacht vom 23. zum 24. December, also nach einer Pause von 4 Monaten, trat wiederum ein Anfall ein, welcher die am 26. austretenden Massen einleitete. Seitdem ist kein Anfall wieder beobachtet worden, auch die Kopfschmerzen sind längst verschwunden, und aus dem Kraben ist jetzt ein völlig gesunder Schüler geworden.

Ein 2-jähriges Mädchen, am 19. April 1875 in der Poliklinik vorgestellt, aus gesunder Familie, war vor einem Jahre auf den Kopf gefallen und darauf kurze Zeit benommen gewesen. Seitdem litt sie an plötzlichen Anfällen, welche darin bestanden, dass sie plötzlich still stehen oder stehen blieb, mit starren, leuchtenden oder leicht nach oben gerichteten Augen. Ein solcher Anfall dauerte ein paar Minuten und wiederholte sich täglich, selbst ein oder mehrere Male. Zuweilen konnte sie auch während des Anfalls noch einige Schritte gehen, so am Tage zuvor, wo der Anfall sie auf der Strasse hinauswies und sie gerade in ein Kellerfenster hineinging. Blasse Farbe, sonst völliges Wohlbefinden. Nach Bromkali am 26. noch keine Veränderung. Weiterer Verlauf unbekannt. Der Auslass (Fall auf den Kopf) macht den Fall in Bezug auf die Entwicklung von Epilepsie verdächtig.

Die zweite Kategorie umfasst diejenigen Fälle, in welchen convulsivische Erscheinungen prävaliren. Meistens beschränkten sich dieselben auf eine gewisse Nervensphäre, traten z. B. bei einem 8-jährigen anämischen Mädchen in der Form heftiger Anfälle von Singultus auf, welche ein bis zwei Wochen dauerten und nur während des Schlafes pausirten; häufiger betrafen sie die stimmerzeugenden Organe, oder zogen alle Muskeln des Körpers mehr oder weniger in ihr Bereich:

Anna H., 9-jährig, am 21. December 1878 vorgestellt, aus gesunder Familie, hatte nur im 4. Lebensjahre den Krampfanfall (?) überstanden. Seit etwa 3 Wochen stürzt sie in unregelmäßigen Intervallen, etwa alle 3—10 Minuten, plötzlich einen Ton aus, welcher mit dem Brüllen eines wilden Thiers zu vergleichen ist. Während des Schlafes vollständiges Pausen. Versucht sie zu husten, so tritt still dessen sofort der brüllende Ton ein. Sonst vollkommen gesund. Anämik, Chloral, Bromkali ohne Erfolg. Heilung durch Application des galvanischen Stroms nach wenigen Sitzungen. — Auch bei einem 8-jährigen Knaben, welcher seit einigen Wochen an so heftigen Anfällen von Schreikrämpfen litt, dass man ihn Schreien aus der zwei Treppen hoch gelegenen Wohnung auf der Strasse hören konnte, bewirkte die Anwendung der Elektricität unerwartet schnelle Heilung.

Ein 12-jähriges männliches Mädchen klagte über anhaltende Trockenheit im Munde, so dass sie immer trinken musste. Urin normal. Wurde der Durst nicht sofort befriedigt, so erfolgten stöbend Wein- und Schreikrämpfe, welche einige Minuten anhielten. Auch bei einem 12-jährigen gesunden Mädchen beobachtete ich Anfälle von heftiger Dyspnöe mit lautem Schreien, welche nach einigen Minuten in schlagende Bewegungen der Arme und Beine übergingen.

Während nun in diesen und ähnlichen Fällen nur Stimmkrämpfe bestanden, erschienen diese bei anderen Kindern entweder als Vorläufer oder als Begleiter der von mir als „Chorea electrica“ beschriebenen Zuckungen (S. 192). In anderen Fällen verbinden sich die Stimmkrämpfe statt mit Convulsionen mit paralytischen Symptomen, und die folgende Beobachtung lehrt, dass auch im Kindesalter jener plötzliche Umschlag der nervösen Erscheinungen von einem Extrem ins andere vorkommen kann, den wir bei hysterischen Frauen so häufig beobachten.

Knabe von 10 Jahren, am 15. März 1879 in meiner Sprechstunde vorgestellt. Seit dem dritten Jahre ohne erkennbare Ursache kurzes, aber gewöhnliches Zusammenzucken des ganzen Oberkörpers mit Vorwärtsschleudern und Schütteln des Kopfes. Diese Anfälle, welche meistens alle paar Minuten, oft auch in längeren Intervallen auftraten, verhielten sich je nachdem mit einem geraden oder gekrümmten Ton (Stimmkrampf). Vorüberhört singert die Frequenz und Intensität dieser Anfälle, während Bewegung im Freien, Spielen, als fast ganz aufhört. In Schlaf völlige Pause. Seit 7 Jahren waren diese Krämpfe nur völlig ausgeblieben, nur mitunter milder und seltener geworden. Sonst alles normal. Familie ohne nennenswerte Disposition. Die auf meinen Rath von H. Meyer über ein Jahr lang beharrlich fortgesetzte Anwendung des galvanischen Stroms bewirkte schließlich eine ungeahnte Besserung. Die Anfälle waren bis auf geringe Spuren, und besonders die Stimmkrämpfe gänzlich verschwunden. Doch besteht noch immer eine grosse Neigung zu Recidiven¹⁾.

Marie S., 11-jährig. Ist seit Xingjahr 1878 an dyspeptischen Beschwerden. Ende Februar 1879 traten Anfälle von Ructus auf, welche sich 3 Wochen lang sehr häufig wiederholten, meistens sogar den ganzen Tag fortwährend. Mitte März aber plötzlich aufhörten. An ihre Stelle trat nur der Zustand, wegen dessen ich consultirt wurde. Das arme, blasse, abgemagerte Kind lag in einer Sophtauke mit einem widerlichen schmerzhaften Geruchsumdruck, und stieß bei jeder Expiration einen halb wimmernden, halb gekrümmten Ton aus, ohne jedoch eine Thöne zu versetzen. Nur sehr selten verschwand dieser Stimmkrampf, denn als selten kam ich den Zustand wechelt auf, nachdem einige Ructus vorausgegangen waren, und während dieser kurzen Pausen nahmen auch die Gesichtszüge sofort einen ruhigen heiteren Ausdruck an, voraus auf eine Combination der Stimmkrämpfe mit einem ähnlichen Zustande des mündlichen Muskels zu schliessen war. Die Anwendung des galvanischen Stroms blieb hier ebenso wirkungslos, wie die Chloral und der wegen der Dyspepsie verordnete Essig-Bräun. Am 26. März verschwand die letztere vollständig, die Zunge wurde rein, der Appetit vortreflich, während der übrige Zustand derselbe blieb. Durch Einsüßungen von Chloroform liess sich zwar schnell ein völliges Pausiren des Stimmkrampfes erzielen, auch schon bei schwacher Narkose; aber nach 8–10 Minuten trat derselbe in aller Weise von neuem ein. Nur im Schlaf pausirte der Krampf immer vollständig, und die gequälten Eltern konnten sich dann von den depressirenden Eindrücken des ganzen Tages erholen. Anfangs April ver-

¹⁾ H. Meyer, die Elektrizität in ihrer Anwendung auf prakt. Medicin. 4. Aufl. 1888. S. 386.

andere des Ties plötzlich seinen Charakter; er wurde mehr zu einem dumpfen Schreien, und gleichzeitig verlor das Gesicht seinen weinerlichen Ausdruck, die Züge wurden ataktisch und versuchten mit langer Zeit wieder zu hebeln. Dagegen war die Sprache schwer und nur mit Mühe ließen sich einige Worte aus dem Munde herauslocken. Die Applikation eines kalten Schwammes im Nacken, welche wir mehrmals täglich 15–20 Minuten lang versuchten, hatte gar keinen Erfolg, vielmehr dauerte der etwas veränderte Stimmkrampf fast ununterbrochen (abgesehen von der Nacht) fort, und dazu gesellte sich am eine paralytische Schwäche der gesamten Muskulatur, welche es dem Kinde unmöglich machte, den Kopf frei zu halten und auch nur einen Schritt allein zu gehen. Bei jedem Versuch kam schlingendes die Binde, wie bei Ataktischen. Auffallend war dabei die Beharrlichkeit, mit welcher das Kind den ganzen Tag, auf dem Sofa liegend, Pappierpuppen mit der Schere ausschalt. Strychninjectionen in den Nacken (0.002 täglich) und Einzwangeln blieben ohne rechte Wirkung. Zwar versuchte sie bald etwas besser zu gehen, sonst aber blieb der Zustand unverändert, die Sprache fast gänzlich aufgehoben; und jeder Versuch zu sprechen besetzte, wie bei heftig Stüttemden, Facialiskrämpfe hervor. Auch ein andauernder oberflächlicher Katarth blieb ohne Einfluss, der Husten nahm aber bald einen metallischen krampfhaften Ton an. Am 18. April war das Kind plötzlich wieder im Stände, wenn auch nur flüsternd, zu sprechen, ohne Unterstützung etwas zu gehen und den Kopf aufrecht zu tragen. Der Stimmkrampf wurde nun täglich schwächer und war bis zum 1. Mai gänzlich verschwunden. Die Sprache hat und deutlich, das Gehen viel besser und das Aussehen sehr günstig verändert. Nur der spastische Husten bestand in der Weise fort, dass alle paar Minuten eine heftige Inspiration eintrat, auf welche ein einziger kräuselnder oder mehr pfeifender Hustenstoss folgte. Nur während des Schlafes hörte auch dieser Husten gänzlich auf. Unter dem Fortgebrauch der Strychninjectionen (0.005 pro die) besserte sich bis zum 29. auch der Husten, und abgesehen von den bis und wieder noch eintretenden Ruckeln konnte die Genesung eine vollständige genannt werden. Ein nach einigen Monaten eintretendes sehr schwaches Breliv hätte denselben günstigen Ausgang.

Sie ersieht aus diesem Falle den schnellen Wechsel der Erscheinungen: Krampf der Stimmuskeln, Parese und Ataxie der Muskeln des Nackens und der unteren Extremitäten, Stimmlähmung (Flüsterstimme), spastischer Husten wechseln im Laufe weniger Monate mit einander ab. An eine günstige Wirkung der Strychninjectionen glaube ich deshalb nicht, weil ich in ähnlichen Fällen auch ohne jede eingreifende Cur eine Naturheilung eintreten sah.

Am überraschendsten und daher leicht als Simulation betrachtet erscheinen die Fälle der dritten Reihe, in welchen die Krämpfe anfallsweise als coordinirte Bewegungen (Springen, Klopfen, Laufen u. s. w.), entweder in ganz unbestimmten Intervallen, oder nach einem bestimmten Typus auftreten. In der Regel machen sich während dieser Anfälle auch gewisse psychische Alterationen, grosse Aufregung, Schreien, Hallucinationen, Delirien bemerkbar, während in den Intervallen meistens

nur ein verändertes geistiges Wesen, grosse Reizbarkeit, ungewöhnliche Heiterkeit oder häufiger ein Hang zum Weinen beobachtet wird. Diese Erscheinungen des Intervalls können indess auch fehlen und das Kind befindet sich dann ausserhalb der Anfälle absolut wohl. Man pflegt diese Fälle mit dem Namen *Chorea magna* (grosser Veitstanz) zu bezeichnen, und sie verlieren in der That diesen Namen weit mehr als die gewöhnliche *Chorea minor*. Der Name „Veitstanz“ wurde zuerst riner am Ende des 14. Jahrhunderts in Schwaben herrschenden Epidemie beigelegt, welche sich durch eine mit exstatischen Symptomen verbundene Tanzwuth charakterisirte, und gegen welche Pückerfahrten zu einer dem heiligen Veit geweihten Kapelle in der Nähe von Ulm als Heilmittel empfohlen wurden. Sydenham übertrug dann später den Namen „Veitstanz“ auf unsere gewöhnliche Chorea, für welche Bouteville im Jahre 1810 diesen Namen einführte.

Den ausgeprägtesten Fall von *Chorea magna*, der mir vorgekommen, beschrieb ich schon vor vielen Jahren¹⁾, will Ihnen denselben aber hier wegen seiner Seltenheit in kurzen Zügen vorführen:

Louise A., genau 16 zu ihrem 11. Jahre. Zu dieser Zeit häufiges Kränken mit den Zeichen im Schlafe, Beben der Glieder, Schwäche der Beine und Kopfschmerzen (Nov. 1845). Anhaltendes Liegen im Bette, da sie bald nicht mehr gehen konnte. In der Nacht, bald auch bei Tage, Zuckungen der Glieder, im März 1846 einen um den anderen Tag Vormittags vollständiges Opisthotonus, verbunden mit psychischer Verwirrung. Bald darauf Umwandlung in folgende Zefälle. Zwischen 12—1 Uhr Mittags Gedult von Angst und Verlangen entwickelt zu Krämpfen, gleich darauf schnelle leuchtende Respiration abwechselnd mit heftigen Wimmern und Stöhnen, wobei die Arme leicht ruckten. Plötzlich stirbt die Kranke wie tiefstirgend da, rüßt die Augen oder starrt im Leere, springt dann heftig aus dem Bette, schmeißt heftig vor und stürzt mit krachendem Krach in eine kreisförmige Stellung zusammen. Gewaltsam und leicht springt sie wieder auf, geht weiter, ergreift verschiedene Gegenstände, welche sie entweder eigenmächtig festhält oder gewaltsam auf den Boden schleudert. Dann kniet sie nieder, liegt wie in Ohnmacht eine Zeit lang still mit unregelmässig schlagendem Pulse. Zuweilen geht sie nach der Thür oder dem Fenster, rüttelt daran mit enormer Kraft, stangt auf den Boden, rückt die Wände hinaufzitternd, den Staub vom Boden wegzuklopfen, klatscht in die Hände und stürzt endlich auf das Bett, wo sie sich rasches bewegen thut. Nach diesem Verapfel beginnt der eigentliche Anfall. Die Kranke stellt sich plötzlich im Bette aufrecht und springt mit grosser Gewalt und in die Höhe, so dass der Vater, ein kräftiger Arbeiter, kaum im Stande ist, sie zu halten. Erquickt sinkt sie nach diesem Springen nieder, verflucht aber bald darauf mit unauflöslicher Schweißigkeit das Bett, und umkreist 3—7 mal das Zimmer in der Richtung von links nach rechts. Hiernach streift sie die im Wege stehenden Gegenstände und fördert dann im vollen schmerzenden Laufe den Vater

¹⁾ Homburg und Henoch, Klinische Wahrnehmungen und Beobachtungen. Berlin 1851. S. 77.

und Anstellens zu erkennen. Seltz auf derselben Stelle Halt machend, dreht sie sich endlich wie ein Kröchel 4—5 mal um sich selbst und starrt dann mit beschwörendem Blick, stürmischen Herzschlag und dem Rufe „Vater“ diesem in die Arme. Gleich darauf reißt sie sich wieder los, beginnt ihren Kröchel von neuem, wiederholt denselben 4—5 mal und endet jedesmal mit der zuvor beschriebenen Drehbewegung. Hiernächst schließt sich dem Ausdruck der Eltern „eine Tour“, und es beginnt von wieder das als Beispiel geschilderte Bestreben, und nach einigen Minuten die zweite „Tour“. Die Zahl dieser Touren, d. h. die ganze Reihe der Erscheinungen von ersten Aufgehngen an bis zur letzten Kreisbewegung war nicht immer gleich, betrug nie weniger als 15 und nie mehr als 30. Diese Anfälle wiederholten sich von März bis zum Anfang September, also 6 Monate lang, täglich zwischen 2 und 6 Uhr Nachmittags. Vom September an traten sie nur einen um den anderen Tag, aber stets um dieselbe Zeit ein. Während des Anfalls erkannte die Kranke Personen und Gegenstände vollkommen richtig, griff sogar nach Dächern. Das Gehör war äusserst scharf; beim geringsten Geräusch fuhr sie zusammen, unerträglich war ihr insbesondere das schlürfende Geräusch beim Trinken. Die Sprache fehlte zuweilen, nicht immer. Durchdringendes Schreien, Lach- und Weinerkrämpfe wurden häufig beobachtet. Auch Phantasmen fehlten nicht; die Kranke fuhr plötzlich zusammen, griff in die Luft, sprach mit den Erscheinungen, besonders oft mit der verstorbenen Mutter. Die Zahl der Touren, welche sie nach durchzusehen hatte, gab sie jedesmal vorher an und steckte sich darin ste. Konnte sie nicht sprechen, so hielt sie mitten im Laufe so viele Finger in die Höhe, als noch Touren zu durchlaufen waren. Ebenso sagte sie zur bestimmten Zeit voraus, dass sie von nun an nur einen um den anderen Tag den Anfall bekommen würde. Die Gewalt, welche sie untertrieb, wurde von der Kranken ausserhalb ihres Körpers gesucht; sie äusserte oft „es zieht mich so schnell, dass ich kaum noch kann“. Eine Stunde nach Beendigung des Anfalls stand sie auf, ohne geschlafen zu haben, und konnte noch ziemlich weite Wege ohne erhebliche Ermüdung zurücklegen. Die Nacht war meistens ruhig; an den freien Zwischenlagen (von September an) wachte sie aber doch wegen Schwäche der Beine das Bett hüten, und erst um 7 Uhr Abends stellte sich die normale Motilität ein.

So ging es fort bis zum 22. November. An diesem Tage begann der Anfall schon um halb 2 Uhr, bestand aber nur aus einer Tour, auf welche Anfälle von Opisthotonus folgten, die sich von 3 in 3 Minuten mehrere Male wiederholten. Von nun an wurden die Anfälle immer kürzer, bis sie in der zweiten Hälfte des December ganz aufhieten. Dafür stellten sich in derselben Art, wie beim Beginn der Krankheit, einen Tag um den anderen Vormittags Opisthotonus, und abends zwischen 8 und 10 Uhr heftige abnorme Bewegungen ein, wobei auch die Respirationen häufig ergriffen waren (heftiges Athmen, langgezogene Inspirationen). Sie wurde sehr heiser und unwillig. Das im Anfall Erlebte kam ihr nach demselben wie im Traum vor. Erst während des Sommers 1847 verschwanden alle diese Zufälle, traten aber im Herbst von neuem auf und machten im Winter 1847/48 gewöhnlichen Chorea-Bewegungen Platz. Im Februar kehrte der Opisthotonus einen um den anderen Tag wieder, und es fand sich auf dem Scheitel eine Hyste, bei Berührungen empfindliche Stelle, deren Compression besonders Morgens sofort Opisthotonus hervorrief. Die politischen Unruhen des Sommers 1848 wirkten ungünstig ein; in Folge des Zeughaussturmes (14. Juni) verlor sie sogar die Sprache, und ihre geistigen Fähigkeiten gingen an zu leiden. Sie goß z. B. den Kaffee auf den Tisch statt

in die Taube, befiel sie sich der Hölle vom Schneiden u. s. w. Dabei war ihr Aussehen collatirt, die Augen starr, die Pupillen erweitert, die Sprache ganz verloren; nur wenn durch einen Druck auf die bezeichnete Stelle am Scheitel Opisthotonus ausgelöst war, konnte sie einige Worte herausbringen. Dagegen versuchte sie laut zu lachen und bewegte die Zunge vollkommen frei. Im Juni stellten sich die ersten Spuren der Menstruation ein, aber erst im December entwickelten sich dieselben vollständig, nachdem die Anfälle des Opisthotonus mit geringer Unterbrechung drei Tage hintereinander fortgedauert hatten. Von nun an erfolgte eine allmähliche Abnahme der spirituellen Zufälle, und das Allgemeinbefinden besserte sich mehr und mehr, aber erst im Juli 1850 schwanden die letzten Spuren der Krankheit. Ich sah das Mädchen, welche in einem Hahngeschäft thätig war, später noch häufig wieder und konnte mich von ihrer vollständigen geistigen und körperlichen Genesung überzeugen.

Das Ungewöhnliche dieses Falles liegt in seiner langen Dauer, welche vom Ausbrechen der ersten Anfälle des Opisthotonus bis zur vollständigen Heilung fünf Jahre betrug. Eine solche Hartnäckigkeit der Krankheit, mit so wechselnden Erscheinungen, habe ich seitdem niemals wieder beobachtet. Die verschiedensten Aussonnungen veränderter Nerven-thätigkeit finden Sie hier in ein Krankheitsbild verschmolzen, psychische Verstimmung, Hallucinationen und Delirien, Spring- und Laufkrämpfe, Opisthotonus, Choreaerregungen, partielle Hyperaesthesia der Kopfhaut und eine Art von Chorea minor, welche die Patientin in den Stand setzte, die Zahl der „Touren“ und den Wechsel des Typus genau vorauszubestimmen. Etwas Ähnliches habe ich unter solchen Verhältnissen wiederholt beobachtet. Dass unter diesen Umständen der Verdacht einer Simulation nicht und alle anderen Beobachter lange beherrschte, versteht sich von selbst; aber die sorgfältig fortgesetzte Beobachtung entkräftete denselben vollständig. Auch ist es absolut unmöglich, dass die Kräfte des Kindes zu dieser Art von Simulation, besonders während der Zeit vom März bis September 1846, ausgereicht hätten. Gerade in dieser enormen Leistungsfähigkeit der Muskeln, welche die normale um vieles übertrifft, finde ich einen wesentlichen Charakterzug dieser wunderbaren Affectionen, welche ich auch in anderen Fällen mit Erstaunen wiederfand.

Bei einem 8-jährigen, bis vor 3 Monaten völlig gesunden Knaben begann das Leiden mit einer etwa 6 Wochen anhaltenden nervösen Unruhe, die allmählig in die Anfälle von Chorea magna überging. Dieselben traten anfangs nur in der Nacht, später auch bei Tage auf. Nach einer Aura, die in einem drückenden Schmerz über dem rechten Auge bestand, begann der Knabe unruhig zu laufen, zu springen, zu stampfen, wobei er von Zeit zu Zeit ein durchdringendes Geschrei ausstieß. Das Bewusstsein war während des Anfalls getrübt, aber nicht erloschen. Derselbe endete nach einigen Minuten mit einem heftigen Zittern und Schütteln des ganzen Körpers, worauf der Knabe wie aus einem schweren Traum erwachte. Un-

selteneren Ermattung war nicht selten leicht verbunden. Ursache und weiterer Verlauf unbekannt.

Ein 13-jähriges männliches Mädchen, welches ich noch mit Romberg zusammen behandelte, hat während des Verlaufs derselben keine krankhaften Erscheinungen dar. Zwischen 3 und 6 Uhr aber traten täglich Anfälle auf, in welchen bei gänzlich verändertem psychischen Wesen der Spasmus nutans (S. 175) die Hauptrolle spielte. Wohl 40–50 mal in der Minute erfolgten Sink- und Wipfbewegungen des Kopfes und gestimmten Oberkörpers, und zwar so heftig, daß kleine Personen ausserhalb Hirteneinander, daß man die Möglichkeit solcher Nachahmung kaum begreifen konnte. Gegen 6 Uhr Ende des Anfalls. Dauer der Krankheit mindestens 4 Wochen, worauf noch wieder andere hysterische Symptome, enorme Schwäche, Globus, Empfindlichkeit der Kopfhaut u. s. w. zurückblieben. Die Entwicklung der Menstruation wirkte schliesslich völlige Besserung. Als geistige Frau und Mutter sah ich die Patientin später wieder.

Ein 9-jähriges Mädchen, bis auf wiederholte Anginen gesund, wurde mir am 22. Novbr. 1878 vorgestellt. Schon vor einem Jahre sollte sie 4 „Anfälle“ mit Verbrechen des Mundes, aber mit Erhaltung des Bewusstseins überstanden haben. Anfangs October, eine halbe Stunde nach einer Aetzung der Mandeln mit Silberstein, bekam sie einen „Anfall“, wobei sie mit äusserst scharfer, dyspnoischer und von stentorianem Geräusch begleiteter Respiration wiederholt ausreicht in die Höhe sprang. Dauer nur ein paar Sekunden. Solcher Anfälle sollten wohl Tausend eingetreten sein, aber nur bei Tage. Brechkali und Chlorin waren erfolglos gegeben.

Emil S., 10-jährig, mit über 100 Rauten hat an allen Knochen Krampf, welche sich seit dem 9. Lebensmonat entwickelt hatten, ist schon seit einigen Jahren bisweilen an Anfällen von Migräne mit Erbrechen. Er war heftig und reizbar, Arbeit heftig und eifrig in der Schule. Am 4. Mai 1879 Morgens bis Mittag Anfall von Kopfschmerz. Um 2 Uhr plötzlich wieder Steigerung desselben, Beize des Gesichtes, Zuckungen des ganzen Körpers, heftige Bewegungen der Kiefer, Rollen der Augen, heftige Trübung der Semitarsen (Verwechselung der Ferrensen). Alle Bewegungen auffallend heftig und gewaltsam. Dauer des Anfalls $1\frac{1}{2}$ Stunden, worauf vollständige Ruhe und Appetit eintrat. Von 5–7 $\frac{1}{2}$ Uhr Abends ein zweiter noch heftigerer Anfall. Grosse Empfindlichkeit des oberen Nackengegend gegen Druck. Nacht ruhig, Schlaf ohne Zucker. Am folgenden Tage zwischen 6 Uhr früh und 3 Uhr Nachmittags 4 ähnliche Anfälle, wobei Patient mit grosser Gewalt sich aus seinem Bett in das neben ihm stehende springweise hinüberwühlte. Dann vollständige Pause und Euphorie bis zum nächsten Morgen, an welchem früh 7 Uhr ein ganz heftiger und nach vorübergehender Anfall eintrat. Seitdem ist das Uebel nicht wiederkehrt, und der Knabe, wiewohl ich mich wiederholt überzeigte, zu einem gesunden jungen Manne herangewachsen.

Bei einem 12-jährigen gesunden Knaben (November 1870) begann das Leiden mit einer stummen Hyperästhesie der ganzen vorderen Brustwand. Die Region, welche durch die Schlüsselbeine und den unteren Thoraxrand, seitlich durch die Axillillen begrenzt wird, war so empfindlich, dass schon leise Berührungen kaum ertragen wurden. Nach ungefähr 4 Wochen verschwand diese Hyperästhesie plötzlich und machte gewaltigen Anfällen eines spasmodischen Hustens Platz, in welchen, ähnlich wie bei der *Tussis convulsiva*, die langgezogenen Inspirationsen von einem pfeifenden Geräusch (*Spasmus glottidis*) begleitet

varen. Während dieser mit Erstickungsangst verbundenen Anfälle, welche in unregelmässigen Intervallen täglich ein paar Mal eintreten und von mir selbst wiederholt beobachtet wurden, sprang der Knabe so gewaltsam in die Höhe, dass er nur mit Mühe bewältigt werden konnte. Von allen Mitteln wirkten nur Morphium-Injectionen hilfreich. In den Intervallen Euphorie, abgesehen von einer ungewöhnlichen Reizbarkeit des Charakters. Nach 6 Wochen plötzliches Verschwinden aller krankhaften Erscheinungen, welche später noch einmal ein kurzes Recidiv machten, um dann nicht mehr wiederzukehren. Eingetragene in Bad Laachsee.

Dieser Fall zeichnet sich dadurch aus, dass er den Beginn der Krankheit mit einer Sensibilitätsneurose veranschaulicht, den ich sonst nie beobachtet habe. Auch der Umstand, dass die Hyperaesthesia doppelseitig war und sich nicht auf das Gehirnt eines oder mehrerer bestimmter Nerven beschränkte, vielmehr die ganze Vorder- und einen Theil der Seitenpartie des Thorax einnahm, ist bemerkenswerth. Der Fall bildet also einen Uebergang zu der vierten Kategorie, in welcher nämlich sensible und trophische Störungen die Hauptrolle spielen, während die motorischen ganz zurücktreten. Da wir bisher nur drei Fälle dieser Art begegneten, so muss ich diese Kategorie als die seltenste betrachten.

Goldhoff K., 3½ Jahr alt, am 2. Mai 1878 untersucht. Bisheriger gesunder Knabe, vor 4 Wochen Mütter mit normalem Verlauf. Vor 14 Tagen tritt ihm kein Folger ein anderer Knabe auf das Loth gefallen sein. Eine Woche darauf beginnend Schmerzanfälle im Unterleibe, die sich immer mehr steigerten. Die Sitz war der ganze Leib, nach der seitlichen Theile, die Intensität enorm, so dass der Knabe laut schrie und sich gewaltsam so Bett bewegte. Allmählig wurde das Toben, Schreien und Wälzen so prävalirt, dass die Schmerzen dagegen zurücktraten. Die Frequenz der Anfälle nahm täglich zu, nur kurze Pausen eines vollständigen Epilepsie unterbrechen dieselben. Temp. 38–38.5. Puls etwas frequent, belegte Zunge, Fieber aus. Urin reichlich, dunkel, normal. Stuhl regelmässig, Anorexie. Im Unterleibe nichts Abnormes, dagegen enorme Hyperaesthesia der Haut des Abdomens und der ganzen Vorderfläche des Thorax, so dass das Aufsetzen eines Haarfalles schon heftige Schmerzen hervorrief. Therapie: Low'sche Blasen, Acid. muriaticum, Alunda Morphium. Am nächsten Tage (3. Mai) Abnahme der Anfälle an Frequenz und Intensität. Seit 24 Stunden keine Urin gelassen, außer beim Stuhlgang. Hyperaesthesia unverändert, besteht nun auch im Gesicht im Gebiete des 1. Astes linker N. trigeminus. Vom 4. an rasche Abnahme der Hyperaesthesia und der Schmerzanfälle, reichliche Urin- und Flüssigkeitsentlassungen, reize Zunge, Appetit, kein Fieber. Am 8. vollständige Besserung.

Bei einem 12-jährigen, mit kurzen menstruierten Mädchen (23. April 1879), bestanden seit 14 Tagen heftige Anfälle von Cardialgie, welche täglich eintreten, anderthalb Stunden and mit einem anstossenden, das ganze Haus in Aufregung versetzenden Schreien und Toben verbunden waren. Alles sonst normal, nur vorüberige Störung und enorme nervöse Reizbarkeit. Morphium wirkte auch hier schnell beruhigend.

Mädchen von 11 Jahren, ungewöhnlich früh entwickelt, doch noch nicht

verarmt, geboren von einer an Phthisis verstorbenen Mutter. Im September 1878 wurde ich wegen häufiger Anfälle von Epilepsien, zu denen sich in den Abendstunden oft Vomitusbluten gesellten, consultirt. Im Februar 1879 sah ich sie wieder. Seit 10 Tagen trat regelmäßig einen Abend um den anderen gegen 8¹/₂ Uhr ein über allgemeiner Unruhe starker Würgen mit Blutbrechen ein, wofür etwa ein halber Tassenköpf schwärzlich rothes Blut mit vielem Schleim vermischt entleert wurde. Der Anfall dauerte etwa eine halbe Stunde und trat ab bei Tage ein. Empfindungen in der Gegend der rechten Mamma veranlaßten, dass ich mit dem lechardaischen Arzte wiederholt die Lunge untersuchte, aber nie wurde etwas verlässliches dabei gefunden. In den letzten 4 Tagen war das Blutbrechen abendlich um dieselbe Zeit gegen 8¹/₂ Uhr aufgetreten. Der Stuhlgang verlief niemals frei, nur wurde das Essen gut vertragen, ohne je Magenschmerzen zu erzeugen. Weder China in grosser Dosis (1.0), noch die gegen ein Magenleiden gerichteten Mittel, Eukhais, Opium, Nückli, Liqur ferri cinquarklor., Ergotin hatten den geringsten Erfolg.

Das eigenthümliche Wesen des Mädchens, die vorzeitig entwickelte Jungfräulichkeit, der Haug das Bül nicht zu verlassen und der Umstand, dass der Vater selbst gestand, das Mädchen sei von Kindheit auf einem verhehrt worden, erweckten bei mir sofort den Verdacht, dass es sich hier entweder nur um eine Simulation oder um Hysterie handle. Für letztere lag kein Grund vor und die Untersuchung des Zahns, der Kieferhöhle, Zangs u. s. w. ergab nichts, was als eine Quelle des ausgeschleimten Blutes hätte angesehen werden können. Auch hätte der behandelnde Arzt den abendlichen Anfall persönlich abwarten und die Überzeugung gewonnen, dass keine Simulation vorlag. So blieb mir übrig, an Hysterie zu denken, und ich wurde in dieser Annahme noch dadurch bestärkt, dass am 12. um 2 Uhr Nachmittags nach einem Gemüthsaffekt das Blutbrechen zum ersten Mal auch bei Tage eintrat. Wir liessen daher das Kind das Bett verlassen, täglich ausfahren, und rothen, alle Anstrengungen lassen und sich um die Sache überhaupt nicht zu bekümmern. Mitte Mai traf ich Vater und Tochter auf einem Spaziergange, und ersterer theilte mir mit, dass seit meinem letzten Besuche der Anfall nicht mehr eingetreten sei und das Mädchen sich vollkommen wohl befinde. Während des ganzen Sommers dauerte diese Euphorie auf dem Lande fort, nur höchst selten, und immer nur nach Gemüthsaffekten zeigten sich Spuren von Blutbrechen. Nach der Rückkehr in die Heimath trat im October derselbe Symptomencomplex in den Abendstunden wieder auf, aber nicht so regelmässig als früher. Die von dem behandelnden Arzte verordneten Ergotininjektionen wirkten offenbar psychisch, denn schon die Androhung, dieselben zu wiederholen, hatten später, wenn sich Spuren des Blutbrechens wieder zeigten, z. B. im August 1880, die Folge, dass sofort völlige Euphorie eintrat, die sich noch heute besteht.

Ich habe nur dies eine Mal Blutbrechen als Begleiter hysterischer Affektionen gesehen, wohl aber sind von anderen Autoren hier und da solche Fälle berichtet worden.¹⁾ Da ich unter ähnlichen Verhältnissen bei einer Hysterischen Bluthusten ohne Lungenerkrankung beobachtet

¹⁾ Vergl. Balthery, contribution à l'étude des hémorragies nerveuses dans le cours de l'hystérie, Union med. 1880, No. 32, 33. — Lancereux, hémorragies neuro-psychiques, Bol. No. 50.

habe, halte ich das Auftreten von Hämatemesis für ebenso gut möglich. Die Deutung des Vorganges ist freilich schwächer und kann immer nur eine hypothetische bleiben. Wenn ich aber an die plötzliche Röthe des Gesichts in Folge von Gemüthsaffection und an den Fall eines epileptischen Kindes denke, dessen Anfälle jedesmal mit einer allgemeinen starken Röthe der gesamten Haut als Aum begannen, so glaube ich annehmen zu dürfen, dass in Folge einer die gefascerweiternden Nerven der Lunge oder des Magens treffenden Reizung, Hyperämien und Blutungen aus diesen Theilen zu Stande kommen können. Das typische Erscheinen des Bluthrechens in unserem Falle ist nicht überraschend, da auch in einigen zur mitgetheilten Fällen von Chorea magna die convulsivischen Erscheinungen in exquisit typischer Weise auftraten. Wahrscheinlich muss auch hier die Affectio, zu der sich entwickelnden Menstruation in Beziehung gebracht werden.

Die mitgetheilten Beobachtungen sind wohl genügend, um Ihnen ein Bild dieser merkwürdigen Zustände in ihren verschiedenen Formen zu bieten. Alle Modificationen derselben sind freilich damit nicht erschöpft, und ich könnte Ihnen aus meiner Praxis noch mannigfache Abweichungen und Combinationen der Erscheinungen mittheilen. Fälle von Aphonie, Globus, Singultus, Dysphagie. Ebenso weist die Literatur Beobachtungen von Gelenksrheumatis, Ovarialschmerz und selbst von partiellen Anesthesien auf, die sich von den bei erwachsenen Hysterischen gemachten kaum unterscheiden¹⁾. Das Wunderbare, Unbegreifliche derselben regt natürlich immer wieder den Verdacht einer Simulation an, und in der That kann man auch im kindlichen Alter nicht vorsichtig genug in dieser Beziehung sein²⁾. Mir selbst kamen bisweilen solche Fälle vor, unter andern der eines 12-jährigen Mädchens (25. Febr. 1879), welches seit zwei Jahren an häufigen kataleptischen Anfällen litt und in der letzten Zeit wohl 4—5 mal täglich von denselben heimgesucht wurde, von dem Augenblick aber, wo sie in die Kinderstation der Charité aufgenommen wurde, bis zu ihrer Entlassung, also mindestens zwei Wochen lang, nicht einen einzigen Anfall hatte. Aber abgesehen davon, dass Fälle dieser Art meiner Ansicht nach nicht ohne Weiteres als böswillige Simulation, sondern häufig als Ausdruck der „hysterischen“ Nervenerregung aufzufassen sind, kann ich versichern, dass in allen oben mitgetheilten Beobachtungen der Verdacht der Simulation absolut ausgeschlossen war, und ebenso verhält es sich mit vielen analogen Fällen.

¹⁾ Einen merkwürdigen Fall von hysterischem Erbrechen im Anfall beobachtet Rostkötter, Berl. klin. Wochenschr. 1882. S. 322.

²⁾ S. Abelin, Centralblatt f. Kinderheilk. 1878. p. 357.

anderer Autoren. Das vollständige Pausiren der Anfälle des oben erwähnten Kindes während seines Aufenthaltes im Krankenhause kann zumeist um so weniger als Beweis für Simulation gelten, als es tatsächlich feststeht, dass radikale Veränderungen der umgebenden Verhältnisse nicht selten eine temporäre oder selbst dauernde Besserung dieser „nervösen“ Zustände herbeiführen.

Zweifel tritt die Aehnlichkeit mit der Hysterie der Erwachsenen noch viel frappanter auf, z. B. in folgendem Falle:

Am 5. Sept. 1876 erkrankte in der Poliklinik ein 11-jähriges Mädchen, welches von seinem 2. Jahre an in Folge doppelseitiger Katarakte und Atrophia laevi völlig blind war. Bis vor 2½ Jahren gesund, wurde sie in die Schule gesteckt, wo sie mit ausserordentlichem Fleusse lernte und sich ungewöhnlich anstrengte. Bald darauf bekam sie Anfälle von Kopfschmerzen mit Erbrechen, so dass sie die Schule verlassen musste. Mit nun zu gewissem Eifer trieb sie nun Musik, zu welcher sie erhebliches Talent hatte, und spielte täglich über drei Stunden Klavier, natürlich nur nach dem Gehör. Seit einigen Monaten klagte sie über bitternig eintretende Stiche in der Stirn, Schwindel bis zum Umdallen, abwechselnd mit heftigen Kolikschmerzen am Nabel, und mit Anfällen einer raschen dyspnoischen Respiration. Alle diese Zufälle traten täglich zu wiederholten Malen ein, und zwar sofort, wenn man mit dem Kinde davon sprach. Dabei war ihr psychisches Wesen durchaus nicht dem Alter entsprechend, vielmehr frühreife, ungenügend geistvoll und unfähig in der Schilderung ihrer Krankheiten. Auffallend und krankhaft war besonders der Unwille, dass sie der Mutter stets die letzten Worte ihres Reden gerath nachsagte. Dabei schlief sie 12 Stunden hintereinander, ohne dass eine Spur jener nervösen Spasmen sie belästigte. Uebrigens völlige Euphorie, und von einer Pubertätsentwicklung noch nichts zu bemerken. Weiterer Verlauf unbekannt.

Auch Fälle von hysterischer Paralyse der unteren Extremitäten hatte ich bei jungen Mädchen von 11–13 Jahren ein paar Mal zu beobachten Gelegenheit, und zwar noch stärker entwickelt, wie in dem S. 197 mitgetheilten Falle. Mitunter waren heftige, wochenlang anhaltende Schreikrämpfe oder andere hysterische Zufälle vorausgegangen, nach deren Verschwinden die Lähmung in derselben Weise wie bei Erwachsenen eingetreten war. Im Liegen und Sitzen konnten die Beine fast ebenso gut wie im Normalzustande bewegt werden, und die Sensibilität wie die Function der Sphinkteren waren intact; aber die Kinder besappten hartnäckig, nicht stehen und gehen zu können, und beim Versuche kam versagte die Kraft, die Patienten sanken zu Boden, wenn man sie nicht stützte. Der Verdacht einer Medullarkrankheit, welcher die Eltern in solchen Fällen ängstigt, konnte sofort zurückgewiesen werden, und in der That schwanden diese Lähmungen nach einigen Wochen, um anderen nervösen Symptomen Platz zu machen. —

Nicht minder dunkel, als die Pathogenese aller dieser ausserlich verschiedenen, ihrem Wesen nach aber näher verwandten Zustände, sind

ihre aetiologischen Verhältnisse. Ganz bestimmte Ursachen habe ich in keinem einzigen Falle auffinden können. Im Allgemeinen disponirt das weibliche Geschlecht und die Zeit der Pubertätsentwicklung, und man hat daher alle diese Affectionen, zumal die Chorea magna, mit der letzteren in innigste Beziehung gebracht. Da indess auch Knaben und jüngere Kinder zwischen 9 und 11 Jahren keineswegs von den beschriebenen Zufällen verschont bleiben, so müssen ausser jenen Entwicklungsformen noch andere aetiologische Momente wirksam sein können. Es lag nahe, diese letzteren zunächst in Reizungen des Genitalsystems zu suchen, und so hört man denn die Opantie von vielen Seiten her als eine Hauptursache jener nervösen Störungen bezeichnen.¹⁾ Ich will nun keineswegs in Abrede stellen, dass bei stark ausgebildeter „nervöser Predisposition“ dieses Laster, beharrlich betrieben, aetiologisch bedeutsam werden kann, aber bei der grossen Verbreitung desselben müsste man doch die Fälle, um welche es sich hier handelt, weit häufiger beobachten, als es thatsächlich geschieht. Dass man diese Ursache in der Praxis scharf ins Auge fasst, ist jedenfalls sehr gerechtfertigt. Sie werden es kaum glauben, dass manche Kinder schon im zweiten Lebensjahre, ja noch früher maniren, entweder durch wirkliche Manipulation oder durch Aneinanderreiben der Oberschenkel, wobei deutliche Erectionen des kleinen Penis zu Stande kommen, oft auch durch das schon erwähnte rhythmische Wiegen des Oberkörpers in sitzender Stellung (S. 176). In diesem Alter ist das Uebel durch scharfe Ueberwachung noch am leichtesten zu beseitigen, weit schwerer bei älteren Kindern, welche mütterlich jeden unbewachten Augenblick benutzen, dem Laster zu fröhnen. Ich erinnere mich unter andern eines 8jährigen Mädchens, welches sich, wenn sie die Hände zu brauchen Anstand nahm, durch das Reiben der Genitalien an der Kante des Stuhles, auf welchem sie sass, in eine gewaltige Aufregung versetzte, von welcher die glühenden Wangen, die glänzenden Augen, die rasche Athmung Zeugniss gaben. Nicht immer ist aber die Diagnose so leicht, und es bedarf dann der sorgfältigsten Beobachtung der Kinder, zumal vor dem Einschlafen, um so in flagrante zu überraschen. Ein paar Flecken in der Wasche sind keineswegs genügende Indicien für eine sichere Diagnose. Ich habe mich nun in allen Fällen von hysterischen Affectionen und Chorea magna bemüht, gerade über diesen Punkt ins Klare zu kommen, aber in keinem einzigen Falle die absolute Gewissheit erhalten, dass die Ursache in Masturbation zu suchen sei. Immer musste man sich mit der Möglichkeit oder Wahr-

¹⁾ Jacobi, on masturbation and hysteria in young children. *American Journal of obstetrics etc.* VIII, 4; IX, 3. 1870.

scheinlichkeit behelfen, die ja in der Aetiologie überhaupt schon eine viel zu grosse Rolle spielt. Trotzdem werden Sie gut thun, an Opium zu denken und, wo diese in der That nachweisbar ist, sie möglichst zu unterdrücken, denn mag sie auch für sich allein nicht gerade die eigentliche Veranlassung zur Krankheit bilden, so wird sie doch immer durch die Ueberreizung des Nervensystems den Boden für die Entwicklung derselben vorbereiten und die Heilung verzögern können. Wie bedenklich eine solche Ueberreizung werden kann, lehrt z. B. der folgende Fall:

Carl A., 7 Jahr alt, aufgenommen in die Kinderstation am 8. Januar 1873, kommt mit einem 5. Jahre, angegriffen durch das lange fortgesetzte Zusammenschlafen mit einer Verwandten, welcher ihr Spiel mit ihm gestört hatte. Allmählig zunehmende Erschlaffung, *Parsons nocturna*, schlaflose Nächte, und seit 14 Tagen Unfähigkeit zu gehen. Ohne sich festhalten, kann er weder sitzen, noch stehen, noch gehen. Auch gestützt geräth er alsbald ins Schwanken, klagt über Schwindel und zeigt beim Gehversuche deutliche Ataxie, ähnlich wie in der *Tabel dorsalis*. Beim Schließen der Augen bedeutende Zunahme dieser Erscheinungen. Im Bette alle Bewegungen der Beine frei, wenn auch weniger energisch, als im Normalzustande. Sensibilität intact, die von den Paroxysmen angegriffenen Reflexbewegungen aber wieder kräftig und langsamer erfolgend. Urin und Stuhl nur mit Mühe zurückgehalten, meistens unwillkürlich erfolgend. Anfälle und ständige Abmagerung. Therapie: täglich ein warmes Bad von 10 Minuten Dauer mit kalter Branne über Kopf und Rücken, strengste Beobachtung des Patienten und Verhütung jedes anasthetischen Versuches. Schon am 23. bedeutende Besserung des Gehens, Aufhören der Emesis. Am 31. kaum noch ein geringes Schwanken beim Gehen bemerkbar. Mitte Februar völlige Genesung.

Der überaus schnelle günstige Verlauf dieses Falles, welcher anfangs das bei einem Kinde nur sonst niemals vorgekommene Bild einer vorgeschrittenen *Tabel dorsalis* darbot, beweist, dass keine Degeneration, sondern nur eine funktionelle Störung vorlag, dass also durch eine fortgesetzte Reizung der Genitalserven bei Kindern Paroxysmen der unteren Extremitäten mit akaktischen Erscheinungen, mit Abnahme des Muskelsinnes und vermindelter Energie der Sphinkteren zu Stande kommen können, ähnlich den hysterischen Lähmungen der Frauen, welche durch krankhafte Zustände der Sexualorgane, oder auch ohne solche durch allgemeine das Nervensystem deprimirende Einflüsse bedingt werden und unter günstigen Umständen ebenso glücklich verlaufen. In dieselbe Kategorie gehören wohl auch diejenigen Paroxysmen und Ataxien der unteren Extremitäten, welche hier und da bei Kindern mit hochgradiger Phimose und davon herrührender Genitalreizung beobachtet und durch die Operation derselben geheilt wurden¹⁾.

Die meisten Kinder, welche die eine oder andere Form unserer

¹⁾ Oester, *Jahrb. f. Pädiatr.* VII. 1876. 2. Hft. Anat. p. 128

„hysterischen Zustände“ darboten, waren von zarter Constitution, mager, mehr oder weniger anämisch; nur die Mineralität zeigte normale Ernährungsverhältnisse. Fast immer liess sich aber in der Erziehung eine wunderliche Stelle nachweisen, welche der späteren Neurose einen günstigen Boden bereitete. Kinder, die mit ungewöhnlicher Sorgfalt und Verzärtelung erzogen werden, um welche sich so zu sagen der ganze Hausstand dreht, die umgeben sind von äusserst nachsichtigen, allen ihren Launen nachgehenden Persönlichkeiten, deren leiseste Klagen mit übertriebener Angstlichkeit aufgefasst und behandelt werden, sind vorzugsweise jenen wunderlichen Erkrankungen ausgesetzt. Unter diesen Umständen kommt es bisweilen zur Ausbildung einer Art von Hypochondrie, die ich besonders bei einem 8jährigen sehr verzogenen, zarten Knaben beobachtete. Mit peinlicher Angst achtete er auf sein Befinden, untersuchte seine Zunge, jeden Fleck, der sich am Körper zeigte u. s. w. Bei einer so geschaffenen, öfters auch durch Heredität vorbereiteten Anlage kann nun durch alle auf das Nervensystem stark wirkende Reize, Gemüthsaffecte jeder Art, übermässige geistige Anstrengung, Ehrgeiz beim Lernen, endlich auch durch Nachahmungstrieb die Krankheit zur vollen Entwicklung gebracht werden. —

Aus den von mir mitgetheilten Fällen werden Sie bereits ersehen haben, dass eine medicamentöse Behandlung unter diesen Verhältnissen keinen wesentlichen Erfolg verspricht. Ich kenne kein Mittel, welches mir wirkliche Dienste geleistet hätte, mit Ausnahme des Chloalhydrats (0,5—1,0 pro dosi) und des Morphinums (auch als subcutane Injectionen zu 0,005—0,01 pro dosi), von denen ich in einigen Fällen einen palliativen Nutzen zur Beseitigung heftiger spastischer Erscheinungen beobachtete. Auch die bei Schrei- und anderen Stimmkrämpfen von mir versuchten Chloroformeinathmungen wirkten immer nur ganz vorübergehend. In vielen Fällen, z. B. bei Lauf- und Springkrämpfen sind aber auch diese Mittel während der Paroxysmen schwer oder gar nicht anwendbar, oder sie versagen die Wirkung. Man muss dann den Anfall ruhig ablaufen lassen und nur dafür Sorge tragen, dass die Kranken sich durch die Art und Intensität ihrer Bewegungen keine Verletzungen zuziehen. Ebenso wenig sind wir im Stande, den Verlauf der Krankheit im Ganzen durch bestimmte Mittel abzukürzen. Selbst wenn der Typus der Anfälle auf das deutlichste ausgesprochen war, sah ich weder von Chinin noch von Arsenik irgend einen Erfolg. Bei der Häufigkeit einer anämischen Grundlage solcher Fälle thut man immer noch am besten, die Kinder mit kleinen Dosen Eisen zu behandeln oder auch Arsenik wie in der Chorea zu geben, weil dieses Mittel, in kleinen Dosen längere Zeit fort-

gesetzt, einen entschieden günstigen Einfluss auf arämische Constitutionen ausübt. Lauwarme beruhigende Bäder mit Seife oder *Belus alba* (50,0 bis 100,0) auf ein Bad, möglichst lange ($\frac{1}{2}$ Stunde lang) fortgesetzt, gute Nahrung, Genuss der frischen Luft sind dringend zu empfehlen, aber leider nicht immer zu beschaffen. Bei Stimmkrämpfen ist der galvanische Strom zu versuchen; er bringt mitunter schnelle Heilung, während er in anderen Fällen entweder nichts leistet oder gar verschlimmert. Nicht selten wirken alle Manipulationen dieser Art, Elektrisiren, Einführung einer Schlundsonde, eine subcutane Injection, ja schon die laryngoskopische Untersuchung, und besonders die Androhung, diese Maassnahmen zu wiederholen, wunderbar schnell, also offenbar *ir psychisch*. Man hüte sich aber, an eine rasche Besserung übermäßige Hoffnungen zu knüpfen, welche durch plötzliche Wiederrücknahme der Symptome bald Lügen gestraft werden. Glücklicher Weise kann man die Angehörigen von vornherein über den Ausgang beruhigen, und zwar möchte ich behaupten, dass, je wunderbarer und unbegreiflicher die Symptome sich gestalten, je mehr sich ein Wechsel derselben vollzieht, um so sicherer ein glücklicher Ausgang zu prognosticiren ist. Daher können Sie die Fälle von sogenannter *Chorea magna*, von Stimmkrämpfen und hysterischen Paralyseu immer am günstigsten beurtheilen, während die kataleptische Form (unsere erste Kategorie) mit Rücksicht auf die Möglichkeit einer epileptischen Umwandlung immer gewisse Bedenken aufkommen lässt. Immer rathe ich Ihnen, die Angehörigen auf ganz unerwartete Umschläge der Erscheinungen vorzubereiten; wo heut Paralyse besteht, kann in wenigen Tagen diese einer convulsivischen Affection, einer Sensibilitätsneurose, einer psychischen Alteration Platz machen, und dies geschieht bisweilen schon inmitten eines Anfalls. So beobachtete ich im October 1882 einen 9-jährigen Knaben, welcher täglich anfallsweise von Parese der unteren Extremitäten befallen wurde. Im Liegen und Sitzen konnte er dieselben ganz normal bewegen, war aber nicht im Stande, zu stehen oder zu gehen, musste sich vielmehr zu diesem Behufe auf Tische oder Stühle stützen und die Beine nachschleppen. Plötzlich wurde er still, starrte vor sich hin, liess ein paar krampfhaft schluckende Inspirationen hören und war unmittelbar darauf im Stande, ohne Mühe im Zimmer umherzugehen.

Nach der Heilung werden Sie gut thun, die tonisirende Behandlung noch weiter fortzusetzen, und wo es die Verhältnisse erlauben, entweder eisenhaltige Bäder oder lare indifferente Thermalbäder in frischer Berg- und Waldluft gebrauchen zu lassen. Unter den letzteren empfehle ich

besonders die Thermen von Schlangenbad im Taunus, Landeck in Schlesien, Johannishad in Böhmen; unter den ersteren, die bei vorwaltender Anämie am Platze sind, Schwallbach, Pyrmont, Driburg, Plinsberg, in der Schweiz die hochgelegenen Quellen von Tarasp und St. Moritz.

Ich zweifle nicht, dass durch eine Bade- und Luftkur dieser Art die Wiederkehr der zu Bede stehenden Affectionen verhindert, ihr Verlauf im Ganzen daher abgekürzt werden kann. Unter günstigen Lebensverhältnissen wird, glaube ich, ein auf eine Reihe von Jahren ausgezeichneter Verlauf, wie ihn z. B. unser Fall S. 199 aufweist, kaum vorkommen. Bei grosser Hartnäckigkeit des Uebels bleibt indess nur der Versuch übrig, das Kind aus der gewohnten Umgebung des Elternhauses in eine ihm völlig ungewohnte, sei es in eine Krankenanstalt oder in eine fremde Familie zu versetzen. Mit einem einfachen Wechsel des Aufenthalts ist es nicht abgethan, wenn nicht auch die Gesellschaft der Mutter oder der gewohnten Pflegerin dem Kinde entzogen wird. Der Schulbesuch ist selbstverständlich während der Dauer der Krankheit zu untersagen, und auch nach der Heilung ist jede geistige Überanstrengung sorgsam zu vermeiden. Bei Mädchen in der Entwicklungsperiode erfordern die eintretenden Meneses ganz besonders Ruhe und Pflege. Unser Fall S. 199 lehrt ja, dass mit der vollständigen Ausbildung der Pubertät auch ungewöhnlich chronische Zustände dieser Art ein glückliches Ende erreichen können.

VII. Nächtliches Aufschrecken, Pavor nocturnus.

Mit diesem Namen bezeichnet man einen Zustand, welcher durch den Schrecken, den er den Eltern einflößt, oft genug die wohlverdiente Nachtruhe des Arztes stört. Mitten in tiefem Schlafe, besonders häufig in den ersten Stunden nach dem Einschlafen, fahren die Kinder plötzlich empor, schreien heftig und anhaltend, greifen mit den Händen in die Luft oder sitzen mit stierem Blick und ängstlichem Gesichtsausdruck im Bette, unverständliche oder schwer deutbare Worte vor sich hinsprechend. Viele zittern an allen Gliedern, werfen sich entsetzt in die Arme der erschreckten Mutter oder Wärterin, ohne sie indess deutlich zu erkennen, und nur mit Mühe gelingt es, sie zu beruhigen. Nach kurzer Pause wiederholt sich die Scene, nicht selten auch mehrere Male hintereinander, so dass eine halbe Stunde und mehr vergehen kann, bis völlige Ruhe eintritt und das erschöpfte Kind wieder fest einschläft. In der Regel verläuft nun der übrige Theil der Nacht im ruhigen Schlaf, und beim Erwachen weiss das Kind nichts von den Vorfällen der Nacht, erinnert sich auch nicht des Arztes, der während des Anfalls vor seinem

Bette gegessen. Solche Anfälle wiederholen sich nun in unregelmässigen Intervallen, bald allnächtlich, bald nur ein paar Mal in der Woche oder noch seltener. Zwei Anfälle in einer und derselben Nacht gehören zu den Ausnahmen. Am Tage lieten die Kinder durchaus keine Erscheinungen dar, welche sich zu den nächtlichen Paroxysmen in Beziehung bringen lassen; nur einmal hatte ich Gelegenheit, einen solchen Anfall zwischen 11 und 12 Uhr Vormittags zu beobachten, als der betreffende Kranke auf dem Sopha eingeschlafen war. Die Dauer dieses die Umgebung der Kinder in lebhaftest Unruhe versetzenden Zustandes ist ganz unbestimmt; während mitunter das Ganze mit wenigen Anfällen abgethan ist, wiederholen sich dieselben bei anderen Kindern viele Wochen, ja Monate lang, verschwinden aber schliesslich, ohne üble Folgen zu hinterlassen.

Wenn ich diese Affection hier unmittelbar auf die „hysterischen“ Zustände folgen lasse, so geschieht dies keineswegs aus dem Grunde, weil ich eine Verwandtschaft beider annehme. Sah ich auch den Pavor nocturnus in einzelnen Fällen bei Kindern auftreten, die durch eine zu „hysterischer“ Verstimmung disponirende Erziehung verzärtelt und überreicht waren, und gleichzeitig an Kopfschmerzen, Palpitationen des Herzens, schmachthähnlichen Zufällen u. s. w. litten, so war dies doch eben so selten, wie das Auftreten des Pavor im Gefolge von wirklicher Epilepsie, was ich bei einem 10jährigen Mädchen beobachtete. Nachdem hier vor 3 Jahren mehrere epileptische Anfälle mit 8 bis 10 tägigem Intervall stattgefunden hatten, passirten dieselben bis zum Januar 1882, wo plötzlich wieder mehrere Anfälle erfolgten, welche sich im Februar mit Hallucinationen und Schreien combinirten, im März aber spontan verschwanden und Anfällen des Pavor nocturnus, welche mitunter zweimal in einer Nacht eintraten, Platz machten.

Im Allgemeinen begegnet man den letzteren fast ausschliesslich bei jungen Kindern, wo sie bis gegen die zweite Dentition auftreten, während die „hysterischen“ Zustände erst nach dieser Periode vorzukommen pflegen. Auch ist von jener Veränderung des psychischen Wesens, welche bei den letzteren eine wichtige Rolle spielt, hier nichts wahrzunehmen. Das ganze Leiden beschränkt sich vielmehr auf die beschriebenen nächtlichen Anfälle, und mir wenigstens kam es stets so vor, als ob ein schwerer ängstlicher Traum die Kinder aus dem Schlafe schreckte und in den halbawachen Zustand noch hinüberspielte. Dass Traumbilder, Hallucinationen, hier eine Rolle spielen, geht schon daraus hervor, dass die Kinder dieselben oft ganz bestimmt bezeichnen; ich hörte sie flogen, man möge die Ketten wegnehmen, Thiere vertreiben u. s. w. Auch kommt es wohl vor, dass

sie aus dem Bette springen wollen, um dem Schrecken zu entfliehen. Am 10. Mai 1875 wurde ein 4-jähriger Knabe in die Poliklinik gebracht, welcher, nachdem er durch eine Biene heftig erschreckt worden, schon in der darauf folgenden Nacht einen Anfall von Pavor bekam, in welchem er fortwährend von einem „Fisch“ phantasirte, der ihn bedrohte. Dies wiederholte sich ein paar Nächte hintereinander und endete damit, dass das Kind das Schlafzimmer nicht mehr betreten und stets im Freien sein wollte. Je reger die Phantasie des Kindes, je mehr dieselbe durch die beliebten Schwärzgeschichten der Kinderfrauen gereizt wird, um so leichter wird der Pavor eintreten, und es liegt darin gewiss eine Warnung, die von der Umgebung der Kinder beherzigt werden sollte.

Die von West vertretene Ansicht, dass Störungen der Verdauung meistens dem Pavor zu Grunde liegen sollen, kann ich nicht theilen. Mit voller Sicherheit konnte ich nur selten dyspeptische Affektionen nachweisen, deren Beseitigung auch den Pavor rasch zum Verschwinden brachte. Dagegen boten die meisten Fälle durchaus keine Störung der Digestionsorgane dar, und ich musste mich bei der Unmöglichkeit, die Ursachen nachzuweisen, darauf beschränken, jede Erregung der kindlichen Phantasie durch abendliche Erzählungen zu unterbrechen, und vor dem Schlafengehen eine Dosis Kali bromatum (0,5 bis 1,0) zu verordnen, welches mir eine beruhigende Wirkung auszuüben schien. Morphium und Chloral habe ich noch nicht versucht, würde mich aber nicht bedenken, diese Mittel in intensiven Fällen anzuwenden.

VIII. Periphere Lähmungen.

Unter den Nerven, welche am häufigsten von einer peripherischen Paralyse betroffen werden, nimmt bei Kindern, wie bei Erwachsenen, der Gesichtsnerv eine der ersten Stellen ein. Die Paralyse des Nervus facialis kommt nicht selten schon im frühesten Kindesalter, gleich nach der Geburt, zur Erscheinung, indem beim Schließen der Mund nach der gesunden Seite hin verzogen wird, oft auch das Auge der gelähmten Seite offen bleibt. Es kommt eben darauf an, ob der lähmende Anlass die Labial- und Palpebralzweige des Facialis gleichzeitig traf oder die letzteren verschonte. Dieser Anlass ist der Druck der Geburtszange während der Entbindung, welcher in solchen Fällen mitunter eine kleine Ekchymose in der Parästiegegend hinterlässt. Bei den Hebammen und den Eltern des Neugeborenen erregt das Verziehen des Mundes in der Regel grossen Schrecken, da es als ein Zeichen von „Schlagfluss“ betrachtet wird. Sie können aber die Besorgten mit der Versicherung beruhigen, dass die Lähmung wahrscheinlich keinen wesentlichen

Wochen verschwinden wird, sobald das vorhandene Blutextravasat resorbiert ist oder der Nerv sich von den Folgen der Compression erholt haben wird. Ich sage „wahrscheinlich“, denn mit absoluter Sicherheit können Sie den glücklichen Ausgang nicht vorhersagen. In einzelnen Fällen scheint nämlich der Druck der Zange so intensiv und nachhaltig gewesen zu sein, dass degenerative Prozesse (Verfäulnis der Nervenfasern) im Facialis entstehen, welche sich nicht immer ausgleichen, sondern eine für das ganze Leben zurückbleibende Paralyse bedingen. Ich selbst beobachtete einen solchen Fall bei einem 13jährigen Mädchen, und Parrot und Treisier¹⁾ lieferten dafür den anatomischen Beweis.

Weit seltener kommt eine angeborene Lähmung des Facialis vor, welche mit dem Zangendrucke nichts zu thun hat. Ich sah dieselbe nur einmal bei einem 10jährigen Knaben, welcher ohne Kunsthilfe geboren worden und gleich nach der Geburt die Paralyse des linken Gesichtsnerven dargeboten hatte. Sämmtliche Zweige desselben, auch die linke Hälfte des Gaumensegels, waren gelähmt, und das Gehör auf dem linken Ohre aufgehoben, ohne dass jemals eine Erkrankung des letzteren stattgefunden hatte. Eine längere galvanische Behandlung blieb gänzlich erfolglos. Ähnliche congenitale Fälle werden auch in der Literatur hier und da berichtet, doch sind ihre anatomischen Ursachen nicht genügend aufgeklärt.

Die im späteren Kindesalter vorkommenden halbseitigen Gesichtslähmungen entsprechen im Allgemeinen dem Ihnen aus der Nervenpathologie bekannten Bilde. Nur mache ich Sie darauf aufmerksam, dass zur Wahrnehmung der Erscheinungen es hier, fast noch mehr als bei Erwachsenen, darauf ankommt, die Gesichtszüge durch einen Affect in Bewegung zu versetzen. Während der Ruhe sehen Sie im Gesicht des Kindes keine auffallende Veränderung; beim Weinen, Schreien, Lachen tritt aber die Asymmetrie der beiden Hälften sofort hervor. Besonders Schwierigkeiten macht auch beim Kinde oft die Inspection des Gaumensegels, bei welcher man sich mitunter mit einem raschen Blick begnügen muss. Wie das Gesamtbild stimmen auch die Ursachen mit denen der Faciallähmung Erwachsener überein. Der rheumatische Anlass wird auch hier häufiger angenommen, als bewiesen, doch gehören die Fälle, in denen die Einwirkung kalter Zugluft, besonders bei schwitzender Haut, sich evident als Ursache nachweisen lässt, nicht zu den Seltenheiten. Häufiger sah ich Narben von Abscessen oder Drüsen-

¹⁾ Note sur l'analyse pathologique de la paralysie faciale des nouveau-nés. Arch. de Toxicologie, Août 1876.

anschwellungen hinter und unter dem Ohre, in der Gegend des Foramen stylomastoideum, durch ihren Druck auf den austretenden Stamm des Facialis Lähmung desselben erzeugen.

Kind von 2 Jahren, mit vollständiger Paralyse aller Gesichtszweige des linken Facialis. In der Umgebung des Foramen stylomastoideum ein mit dringender Eiter von den Lymphdrüsen ausgegangener Abscess. Nach Öffnung desselben bleibt eine erhebliche Schwellung und Infiltration des Bindegewebes zurück. Vom 25. Febr. 1861 an Beginnung mit Jodtinctur; am 7. März bedeutende Verkleinerung des Geschwulstes, Lähmung unverändert. Fortsetzung des Pincelas und auch innerlich Jod (0,66) mit Jodkali (1,2), Aq. dest. 90, Syr. simpl. 30 4mal täglich 1 Kinderlöffel. Anfangs April vollständige Heilung.

Solche Fälle können beweisen, schon bei sehr zarten Kindern vor. So beobachtete ich die Paralyse des rechten Facialis bei zwei Kindern von resp. 5 und 11 Monaten. Bei dem älteren waren vor, hinter und unter dem Ohre Drüsenabscessen mit diffuser Schwellung des Bindegewebes nachweisbar, während im ersten Falle nur bei sehr sorgfältiger Untersuchung eine tiefliegende Härte unter dem Processu mastoideus gefühlt werden konnte. Bei einem 4-jährigen Kinde entstand Lähmung der Labial- und Nasalläste des linken Facialis durch den Druck eines in der Brossenleiste des Heotyphus sich entwickelnden grossen Abscesses vor dem Ohre. Die Lähmung verschwand fast plötzlich, als der Abscess des zusseren Gehörgangs durchschnitten und seiner Eiter durch denselben entleert.

Als die häufigste Ursache der Facialisparalyse im Kindesalter müssen wir aber die Caries des Felsenbeins betrachten, welche den Nervens Stamm im Canalis Fallopi zerstört. Die zahlreichen Fälle dieser Art, welche ich beobachtete, stimmen alle darin überein, dass stets sämtliche Gesichtszweige des Nerven gelähmt waren, während die halbseitige Paralyse des Gaumensegels nicht immer vorhanden war. Die Uvula stand vielmehr in einer Reihe dieser Fälle vollkommen gerade, und die Gaumenbewegung war auf beiden Seiten gleichmässig, denn nicht nur der Schiefstand der Uvula, sondern auch der Stillstand der einen Hälfte des Velum beim Athmen und Phoniren, wodurch eine Verziehung des Segels nach der einen Seite hin stattfindet, ist hier zu beachten. Wo dies Symptom fehlte, konnte man also schliessen, dass die Destruction des Fallopiischen Canals nur diesseits des Abganges des Nerv. petrosus superficialis major stattgefunden hatte. Die Taubheit auf dem betroffenen Ohre ist bei kleinen Kindern schwer oder gar nicht nachweisbar; um so deutlicher spricht die stets vorhandene, zuweilen mit Blutung verbundene Otorrhoe, mit welcher nicht selten kleine und grössere Knochensequester, oder auch wohl die sauber präparirten Gehörknöchelchen aus dem Meatus auditorius entleert werden; auch eine empfindliche Anschwellung des Schläfenbeins hinter dem Ohre, sowie Röthung und fistulöse Geflüsse können den in der Tiefe zerstörenden Process ver-

kinder. Diese Ursache der Lähmung kommt bisweilen schon in sehr frühem Alter vor. Ich sah sie bereits im dritten und fünften Monate beginnen und entweder unter dem Allgemeinschilde tuberkulöser Atrophie bald tödten, oder auch Jahre lang dauern, bis schliesslich durch die Complicationen, besonders Tuberkulose des Gehirns oder anderer Organe, Meningitis oder Sinus thrombose der Tod herbeigeführt wurde. Je länger die Paralyse besteht, um so atrophischer werden die Gesichtsmuskeln, welche ich bei einem solchen Kinde zu dünnen bräunlich-gelben Streifen verschrunpft fand. Die Sectionen ergaben in den mir vorgekommenen Fällen immer eine extensive cariöse Zerstörung des Felsenbeins, die bisweilen bis an die Dura mater reichte. Aber selbst da, wo dicht unter derselben eine cariöse Höhle sich befand, war die Membran selbst intact, oder höchstens etwas dunkler gefärbt, so dass an einen Durchbruch der Caries in die Schädelhöhle noch lange nicht zu denken war. Aus dem Meatus auditor. externus liess sich bei der Section zuweilen ein langer Sequester extrahiren, worauf man nach Entfernung des äusseren Ohrs in eine umfängliche, den grössten Theil des Felsenbeins einnehmende Höhle hineinblicken konnte; in einzelnen Fällen konnte man auch schon während des Lebens entweder aus dem Meatus oder aus einer in der Pars mastoidea befindlichen Fistelöffnung nekrotische Knochenstücke herausziehen. Die hinter der Ohrmuschel befindlichen Abscesse und Fisteln communicirten stets mit dem Innern des cariösen Knochens.

Fast alle Kinder, bei welchen ich diese Paralyse beobachtete, waren gleichzeitig tuberkulös und gingen früher oder später zu Grunde. Selten kam die Caries durch eine einfache vernachlässigte Otitis media zu Stande, besonders als Nachkrankheit des Scharlachfiebers, und ich empfehle Ihnen daher bei allen von Scarlatina genesenen Kindern die etwa zurückbleibenden Otorrhöen recht sorgfältig zu überwachen. Einige von mir beobachtete Fälle lehrten, dass der vom Mittelohr ausgehende und auf den Knochen sich fortsetzende Destructionsprozess überraschend schnell verlaufen, ja schon wenige Wochen nach dem Ablauf des Scharlachfiebers zur Caries des Felsenbeins mit Facialparalyse führen kann. —

Die weit seltener vorkommenden peripherischen Lähmungen anderer Cerebralnerven bieten für das Kindesalter noch weniger Charakteristisches dar, als die Facialparalyse, und dasselbe gilt von den durch locale Anlässe bedingten Paralysen der Spinalnerven, unter denen nur eine, welche bei der Geburt entsteht, eben wegen dieser Ursache hier in Betracht gezogen werden soll. Nicht bloss auf den Nerv. facialis,

sondern auch auf den Plexus brachialis kann der Druck so stark einwirken, dass dadurch Lähmungen einzelner oder mehrerer Muskelgruppen des betreffenden Arms zu Stande kommen. Rieger¹⁾ beschreibt einen solchen Fall, in welchem sofort nach der Geburt der Facialis und der eine Arm gleichzeitig gelähmt waren, der Eindruck der Zange über der Clavicula noch deutlich sichtbar war, und nach dem bald erfolgten Tode sowohl in der Umgegend des Foramen stylomastoideum, wie des Plexus brachialis Blutergüsse gefunden wurden. Dieselbe Wirkung, wie der Zangenruck, können auch andere geburtshilfliche Handgriffe hervorbringen, besonders erschwerte Extractionen, starke Zerrungen des Arms, wobei bisweilen gleichzeitig eine Luxation oder Fractur desselben beobachtet wurde. Auch das früher (S. 36) betrachtete Hämatom des Sternocleidomastoideus kann unter diesen Verhältnissen gleichzeitig vorhanden sein. Diese „congenitale“ oder eigentlich „artificielle“ Paralyse der oberen Extremität kann, wie diejenige des Facialis, entweder rasch vorübergehen, oder, wenn durch den lähmenden Anlass degenerative Vorgänge der Arminerven eingeleitet werden, viele Jahre, ja das ganze Leben hindurch bestehen und auch mit Störungen der Sensibilität verbunden sein. So beobachtete ich z. B. bei einem 5jährigen Kinde gleichzeitig eine Anaesthesia an der Ulnarseite des Vorderarms. Je nach dem Sitze der Lähmung in den verschiedenen Muskeln nimmt der Arm durch die Contraction der Antagonisten verschiedene Stellungen an; am häufigsten wird er durch das Ueberwiegen der Musc. pectoralis, subscapularis und latissimus dorsi über den gelähmten Infraspinatus unter starker Pronationsstellung der Hand nach innen gerollt. Die faradische Erregbarkeit der gelähmten Muskeln schwindet rasch, und es kommt bald zu einer Atrophie der betreffenden Extremität, an welcher, wie ich wiederholt beobachtete, selbst die Knochen Theil nehmen, so dass die Scapula und die Armknochen später gegen diejenigen der gesunden Seite erheblich verkürzt und die ganze Extremität verkümmert erscheint. Die Behandlung hat nur in der ersten Zeit der Krankheit noch auf Erfolg zu rechnen. Die beharrliche Anwendung der Elektrizität kann hier so lange noch hilfreich werden, als die Nerven noch nicht fertig degenerirt und die Muskeln noch reactionsfähig sind. Später hat man weder von diesem noch von irgend einem anderen Mittel etwas zu erwarten.

Durch übermässige Dehnung des Plexus brachialis können auch im späteren Kindesalter, wie bei Erwachsenen, Paralysen oder wenigstens Paresen der oberen Extremität entstehen, welche mitunter Wochen und

¹⁾ Journ. f. Kinderheilk., 1894. S. 405.

Monate lang dauern. Ich beobachtete z. B. eine solche Parese des linken Arms bei einem kleinen Mädchen, welches beim Anziehen des Mantelchens eine heftige Zerrung des Arms nach hinten und aussen erlitten hatte. Die Bewegung der Extremität, besonders nach oben und aussen, war ausserst beschränkt, und es dauerte mehrere Wochen, bis nach beharrlicher Anwendung von reizenden Frictionsen und schliesslich der Elektricität, die Function des Deltoidens vollständig restituit war. Solche Fälle können, wenn die Ursache nicht klar vorliegt, zu lebhafter Bemerkung Anlass geben, indem nicht nur die Eltern, sondern auch der gewissenhafte Arzt den Verdacht eines cerebralen Ursprungs der Lähmung nicht los werden können, bis die Besserung entschieden hervortritt. Dasselbe gilt von denjenigen Paresen und Paralyseu einer oberen oder unteren Extremität, welche bisweilen bei Kindern nach heftigen eklampthischen Anfällen einige Tage lang zurückbleiben. Hier ist es nicht möglich, von vorn herein zu bestimmen, ob es sich nur um eine vorübergehende Motilitätsstörung oder um ein Cerebralleiden handelt, da, wie wir bald sehen werden, sehr ernste Gehirnkrankheiten, zimal Tuberkel, sich nicht selten durch plötzlich auftretende Convulsionen und zurückbleibende Paralyseu ankündigen, welche auch einiger Zeit wieder schwinden, dann ganz unerwartet wiederkehren, oder durch den Ausbruch einer lethalen Meningitis tuberculosa ihre wahre Natur documentiren. Ich rathe Ihnen daher, in der Diagnose aller Fälle von partiellen Lähmungen, deren peripherischer Anlass nicht über jeden Zweifel erhaben ist, immer zurückhaltend zu sein und die Möglichkeit eines centralen Leidens auch dann nicht ausser Acht zu lassen, wenn noch kein weiteres Symptom eines solchen vorhanden sein sollte.

Selbstverständlich hat man unter diesen Umständen auch stets an die Möglichkeit einer Verletzung der betreffenden Gelenke, an eine Luxation oder Subluxation des Schulter- oder Vorderarmgelenks, ja selbst an Fracturen der Knochen zu denken und daraufhin genau zu untersuchen. Ich würde dies gar nicht erwähnen, wenn ich nicht in der Poliklinik ein paar Mal erlebt hätte, dass diese traumatischen Affectionen von unachtsamen Aerzten als Paresen gedeutet worden waren. Das Gegentheil kommt bisweilen an der unteren Extremität vor, wo ein Nachstehen des Beins, ein leichtes Hinken fälschlich als beginnende Coxitis aufgefasst wird, während es nur von einer Quetschung der Muskulatur durch einen Fall herrührt und bei ruhiger Lage in kurzer Zeit verschwindet.

IX. Die spinale Kinderlähmung.

Diese Krankheit, welche früher, als man ihre anatomischen Verhältnisse noch nicht kannte, unter dem Namen „essentielle Paralyse“ beschrieben wurde, verdient wegen ihrer relativen Frequenz und wegen der schweren Folgen, welche sie für das ganze Leben der von ihr befallenen Kinder haben kann, ihr besonderes Interesse. Die meisten Fälle, welche Sie zu sehen bekommen, betreffen Kinder von $1\frac{1}{2}$ bis 4 Jahren. Die Eltern gehen an, dass das Kind seit einigen Wochen oder Monaten einen Arm oder ein Bein nicht mehr bewegen könne. Bei der Untersuchung finden Sie in einem Theil der Fälle die betreffende Extremität in der That ganz bewegungslos; das Kind macht nicht den geringsten Versuch mit der Hand etwas zu fassen oder auf dem Fusse zu stehen. Das ganze Glied ist schlaff, wie dasjenige einer Puppe, so dass Sie es ohne Widerstand hin- und herschleudern können. Dagegen ist die Sensibilität fast immer vollständig intact. In anderen Fällen zeigt die Paralyse bereits eine Abnahme; gewisse Bewegungen des Gliedes können ausgeführt werden, andere sind absolut unmöglich. So wird z. B. der Vorderarm im Ellenbogengelenke, die Hand im Handgelenke ziemlich gut flexirt und extendirt, während die Bewegungen des Oberarms nach aussen und oben, die Pronation und Supination der Hand gar nicht oder nur in sehr beschränktem Maasse möglich sind.¹⁾ Dabei befindet sich das Kind gewöhnlich vollkommen wohl, alle seine Functionen, auch die der Sphinkteren, sind in bester Ordnung, das Aussehen meistens vortreflich. Die Entstehung des Leidens wird Ihnen von den Angehörigen fast durchweg in ähnlicher Weise geschildert, wie in den folgenden Fällen, die ich als Beispiele anführe:

Am 20. Juli 1874 wurde ein 4-jähriges Mädchen in meine Sprechstunde gebracht. Von jeher gesund erkrankte sie im Septbr. 1873, also vor etwa 10 Monaten, plötzlich mit einem heftigen Fieber, wobei die Temperatur bis auf 41° hinaufging. Das Kind klagte dabei über Kopfschmerz und war sehr frigg; sonst keine localen Symptome. Nach zwei Tagen Aufhören des Fiebers; beim Versuch aufzustehen bemerkte man Lähmung beider unteren Extremitäten und des rechten Arms. Nach Ablauf von 3—4 Tagen stellte sich die Kraft in den Beinen wieder her; das Kind kann nun gehen, aber der Arm bleibt gelähmt und zeigt bei der Untersuchung die charakteristischen Erscheinungen, von denen gleich die Rede sein wird.

¹⁾ Näheres über die Localisation der Paralyse in gewissen Muskelgruppen und deren Beziehung zu entsprechenden Bezirken im Rückenmark s. von E. Romak, *Archiv f. Psychiatrie u. Nervenkrankh.* Bd. IX. Heft I.

Kind von 1½ Jahren, in der Poliklinik vorgestellt am 15. Oct. 1881. Vor 5 Wochen mehrtägliges Fieber. Darauf Paralyse aller vier Extremitäten. Bei der Vorstellung sind die Bewegungen der Arme schon wieder beinahe normal, die Paraplegie aber noch unverändert. Eine Woche später wird auch das linke Bein schon kräftlich bewegt, während das rechts völlig paralysirt ist. Sensibilität durchaus normal.

Dies ist der gewöhnliche Verlauf. Inmitten völliger Gesundheit werden die Kinder von Fieber, meistens mit sehr hoher Temperatur befallen, klagen dabei, wenn sie alt genug sind, über Kopfschmerzen und sind etwas unruhig; seltener liegen sie in einem wirklich soporösen, halb bewussten Zustande, aus welchem sie nur schwer aufzurütteln sind, oder zeigen gar Zuckungen und Contracturen. Noch seltener eröffnet ein convulsivischer Anfall die Scene. Nach einigen Tagen, höchstens nach einer Woche geht dieser Zustand vorüber, und die Eltern sehen nun zu ihrem Schrecken, dass einzelnes oder mehrere Glieder nicht mehr bewegt werden können. Entweder sind beide Beine und ein Arm, oder eine obere und eine untere Extremität auf verschiedenen Seiten, seltener Arm und Bein derselben Seite in hemiplegischer Form, noch seltener beide Arme, oder beide Beine, oder gar alle vier Extremitäten befallen. Mitunter beschränkt sich auch die Lähmung von vorn herein nur auf ein einzelnes Glied. Das Charakteristische liegt aber darin, dass die Lähmung gleich im Beginn auf ihrer Akme steht; was sie bringen kann, bringt sie entweder sofort, ähnlich wie die apoplektische Lähmung der Erwachsenen, oder wenigstens in den ersten 24—48 Stunden, und zeigt von da ab eine entschiedene Tendenz zur Besserung. Nur ausnahmsweise wurde mir berichtet, dass die Paralyse in den ersten Wochen nach ihrer Entstehung noch zugenommen habe. Die Wiederherstellung der Motilität geht häufig, wie in den eben mitgetheilten Fällen, sehr rasch von Statten; schon nach einigen Tagen oder nach einer Woche ist ein oder das andere Glied wieder funktionsfähig, oder es können einzelne Muskelgruppen eines Gliedes wieder bewegt werden, während andere absolut gelähmt bleiben, wodurch dann das Bild einer unvollständigen Paralyse der betreffenden Extremität zu Stande kommt. Nach einigen Wochen ist die Lähmung oft nur noch auf einen Arm oder auf ein Bein beschränkt, in welchem sie dann aber eine traurige Beharrlichkeit zu zeigen pflegt. Nach vielen Monaten, nach vielen Jahren ist der Zustand noch immer unverändert und bleibt es nicht selten für das ganze Leben. In anderen Fällen können aber die paralytischen Erscheinungen Monate lang bestehen und erst dann auf überraschende Weise sich bessern, wie z. B. in folgendem Falle:

Kind von 2 Jahren, vorgestellt in der Poliklinik am 17. März 1882. Vor 7 Monaten einige Tage lang Fieber und allgemeines Unwohlsein. Darauf Paralyse der Nackenmuskeln und aller vier Extremitäten. Nach einigen Wochen kann der Kopf wieder gehalten werden, aber die Lähmung der oberen und unteren Extremitäten besteht 3 Monate lang fast unverändert fort, so dass das Kind nichts greifen und das Bett nicht verlassen kann. Erst nach dieser Zeit schwindet unter elektrischer Behandlung die Paralyse des rechten Arms und linken Beins, schliesslich auch die der rechten unteren Extremität und des linken Vorderarms, so dass bei der Vorstellung in der Klinik nur noch eine Lähmung und Atrophie des linken Oberarms, namentlich des Deltoideus zu constatiren ist.

Sobald die Paralyse einige Wochen oder gar Monate bestanden hat, gesellt sich zu ihr eine Reihe von Erscheinungen, welche als ganz charakteristische gelten müssen und die Diagnose dieser Krankheit sofort unserer Zweifel setzen. Diese Erscheinungen sind: zunehmende Atrophie der gelähmten Extremitäten, Abnahme der Temperatur und der elektrischen Erregbarkeit, besonders der faradischen, welche früher als die galvanische schwindet (Entartungsreaction). Das gelähmte Glied nimmt in Folge der Muskelatrophie an Umfang mehr und mehr ab, ganz besonders schwindet die Partie des Deltoideus und der Schultermuskeln, so dass man zwischen Akromion und Oberarmkopf leicht eingehen kann und die Schulter, von hinten gesehen, im Vergleich mit der gesunden, stark abgedacht erscheint. Aber auch der Ober- und Vorderarm im Ganzen werden atrophisch, alle Muskeln sind welk und dünn und die Gelenkbänder auffallend schlaff, wobei infolgedessen zu beachten ist, dass bei sehr fettleibigen Kindern die Atrophie der Muskeln durch das überliegende Fett geringer erscheinen kann, als sie tatsächlich ist. Schon die aufgelegte Hand nimmt die kühlere Temperatur der gelähmten Extremität, verglichen mit der gesunden, deutlich wahr, und durch zweckmässig construirte Thermometer war man im Stande, diese Abnahme, die bis 1°C . betragen kann, zu messen. Sehr charakteristisch ist auch das Verhalten der Theile gegen den elektrischen Strom. Die Reaction reluxirt fast ebenso schnell, wie bei peripherischen Lähmungen, besonders früh gegen die faradische Elektrizität, während der galvanische Strom noch wirkt oder gar eine erhöhte Reaction auslösen kann. Schon am 5. Tage nach dem Eintritt der Paralyse, häufiger erst nach einer Woche, ziehen sich die Muskeln theilweise nur schwach, theilweise gar nicht mehr auf den faradischen Reiz zusammen, immer ein schlimmes Zeichen, da die Muskeln, welche schon einige Wochen nach dem Beginne der Krankheit keine Reaction mehr zeigen, leicht für das ganze Leben functionsunfähig bleiben. Der Plantarreflex (beim Kitzeln der Fusssohle) ist in der Regel nicht vorhanden, ebenso wenig der Patellarreflex (Kniephänomen), doch hat

dieser Mangel aus dem Grunde weniger zu bedeuten, weil diese Erscheinung auch bei gesunden Kindern schwerer zu beobachten und häufiger vermisst wird, als bei Erwachsenen¹⁾.

Neben der Atrophie der Muskeln wird auch ein Zurückbleiben des Knochenwachsthum's beobachtet, wodurch die Extremität gegen die gesunde verkürzt erscheint. Diese Hemmung der Knochenentwicklung hält, wie Duchenne und Volkmann hervorheben, nicht immer gleichen Schritt mit dem Grade und der Ausdehnung der Paralyse und der Muskelatrophie; letztere können vielmehr sehr ausgesprochen sein und das Glied doch kaum verkürzt erscheinen, während in anderen Fällen, wo Lähmung und Atrophie nur sehr beschränkt auftreten, das Knochenwachsthum erheblich gehemmt sein kann, eine Thatsache, welche Charcot für den directen Einfluss der centralen Erkrankung auf die Nutrition des Knochen-systems geltend zu machen sucht.

Wird die Lähmung innerhalb 10—12 Monaten, von ihrem Beginn an gerechnet, nicht geheilt, so ist überhaupt nur wenig Hoffnung mehr vorhanden, dass dies überhaupt noch geschehen wird. Um diese Zeit pflügt sich dann eine neue Reihe von Erscheinungen zu entwickeln. Da nämlich die Lähmung und Atrophie nicht alle Muskeln einer Extremität gleichmässig, sondern fast immer nur einzelne Muskeln und Muskelgruppen betrifft, so müssen die Antagonisten derselben, welche ihren Tonus und ihre Contractilität nicht eingebüsst haben, durch ihre Zusammenziehung Deformitäten herbeiführen, die sich bei der grossen Mehrzahl als *Pes equinus* darstellen, aber auch in der Form des *Pes varus*, der Krumphand und anderer abnormer Stellungen der oberen oder unteren Extremität auftreten können. Diese Erklärung der Deformitäten durch den Tonus der Antagonisten war bis auf die neueste Zeit die allgemein angenommene, und hat auch heute noch zahlreiche Anhänger. Erst Volkmann suchte an ihre Stelle eine andere zu setzen, nach welcher die Deformitäten lediglich durch die Stellung der Glieder und ihre eigene Schwerkraft zu Stande kommen sollen, während Andere (Hitzig) die Bindegewebsschrumpfung der in ihrer Nutrition beeinträchtigten Muskeln zur Erklärung mit heranziehen. Jedenfalls ist mit dem Eintritt der Deformitäten die Krankheit als eine abgeschlossene zu betrachten; es handelt sich dann nur noch um eine Verkrüppelung, mit welcher die Betroffenen das ganze Leben hindurch bis ins höchste Alter sich fortzuschleppen müssen.

¹⁾ Eulenburg, Deutsche Zeitschrift f. prakt. Med. 1878. No. 31. Haase, Beitr. zur Statistik der Reflexe bei Kindern. Diss. Greifswald 1882.

Die anatomischen Untersuchungen, zu denen Charcot und Cornil in der Pariser Salpêtrière 1864 die erste Anregung gaben, beweisen, dass die früheren Ansichten über das Wesen der Krankheit als einer „essentiellen“, oder einer peripherischen Nerven- oder Muskelaffectio, unrichtig waren. Sie haben vielmehr die Vermuthungen derjenigen Aerzte (Héine), welche das Rückenmark als den eigentlichen Ausgangspunkt bezeichneten, durchaus bestätigt. Frische Sectionen während oder bald nach dem einleitenden Fieber fehlen allerdings noch; fast alle anatomischen Beobachtungen rühren vielmehr aus den späteren Stadien der Krankheit, meistens sogar von Erwachsenen und alten Leuten her, welche ihre Kinderlähmung bis ins höhere Alter verschleppt hatten. Aber aus allen Beobachtungen geht doch die unzweifelhafte Thatsache hervor, dass es sich hier um einen entzündlichen Process in der grauen Substanz der Vorderhörner des Rückenmarkes handelt, der sich bis in die vorderen Seitenstränge hinein erstrecken kann. Je nach dem Sitze der Lähmung findet man entweder im oberen oder unteren Theile der Medulla beschränkte myelitische Herde, besonders in der Hals- und Lendenanschwellung. In relativ noch frischen Fällen, wie sie von Roger und Damaschino¹⁾ beschrieben wurden (die Lähmung hatte hier nur 2 und resp. 6 Monate bestanden), hatten diese Herde eine Höhe von etwa 1 bis 1½ Ctm., und die grösste Breite von 1—2 Mm. In ihrer Mitte, zeigten eine weichere Consistenz, röthere Farbe und ergaben unter dem Mikroskop eine Vermehrung des Capillargefässnetzes, Verdickung der Gefässwände mit profuser Kernbildung in denselben und sehr zahlreiche Körnchenzellen. Die multipolaren Ganglionzellen der Vorderhörner und die austretenden motorischen Wurzelfasern waren atrophisch und eine geringe Sklerose der weissen Vorder- und Seitenstränge nachweisbar. Ganz ähnlich verhielt sich der Fall von Roth²⁾, welcher 11 Monate gedauert hatte, nur griff der Herd rechtsseits nicht nur in den Vorderseitenstrang, sondern auch in das Hinterhorn über. Je älter das Leiden ist, um so mehr tritt diejenige Erscheinung, auf welche Charcot ein besonderes Gewicht legt, nämlich die Atrophie der multipolaren Ganglionzellen in den Vordergrund, verbunden mit Sklerose der grauen Vorderhörner und Atrophie der austretenden motorischen Wurzelfasern; in veralteten Fällen, besonders wenn die Section erst in höherem Alter gemacht wird, kann es zu einer diffusen Atrophie der Vorderhörner und der weissen Substanz der Vorderseitenstränge, mit Schwund

¹⁾ Gaz. méd. 1871.

²⁾ Virchow's Arch. 1873. Bd. 58. S. 263.

der grossen Ganglienzellen und reichlicher Entwicklung von Corpora amylacea kommen (Charcot, Leyden¹⁾).

Was den Muskelschwund betrifft, welcher in dieser Krankheit eine so bedeutende Rolle spielt, so scheint schon in einer früheren Periode ein grosser Theil der Primitivbündel einfach zu atrophiren, ohne eine fettige Degeneration einzugehen (Damaschino, Volkmann und Stendener). Die Fetthäufung in den Sarkomeranschläuchen tritt erst in einer späteren Zeit an die Stelle der schwindenden Primitivbündel und gleichzeitig auch in den Interstitien derselben auf, bisweilen in solcher Menge, dass die Atrophie der Muskeln dadurch maskirt wird, und das Volumen derselben normal oder sogar vermehrt erscheint (Laborde, Charcot). Diese Fettbildung ist indess keineswegs constant; sie kann in einzelnen Muskeln vorhanden sein, in anderen fast ganz fehlen, wobei dann das interstitielle Bindegewebe mehr oder weniger hypertrophirt erscheint. Nach diesen Verschiedenheiten richtet sich nun auch das makroskopische Verhalten der Muskeln, die entweder dünn, masserthlich, gelblich, oder voluminös, dann aber fast ganz in Fett umgewandelt erscheinen. Bei allgemeiner Abmagerung schwindet übrigens auch das Fett, und die Atrophie der Muskeln tritt dann um so deutlicher hervor. Auch die Nervenwurzeln und Nervenstämme der gelähmten Theile werden nicht selten atrophisch gefunden, erscheinen dann verdünnt und grau, während in anderen Fällen die Verdickung ihrer Scheide und die Zunahme des interstitiellen Bindegewebes und Fettes die Atrophie verdeckt²⁾.

Nach den geschilderten Befunden kann es wohl keinem Zweifel mehr unterliegen, dass die spinale Kinderlähmung einem herdförmig auftretenden myelitischen Prozesse, welcher vorzugsweise die graue Substanz der Vorderhörner, zumal der Hals- und Lendenanschwellung, befällt, ihre Entstehung verdankt³⁾. Mit der Zeit kann, wie bereits bemerkt wurde, auch ein Ubergreifen des Processes auf die Vorderseitenstränge, und zwar in diffuser Form nach oben und unten stattfinden, und in einzelnen Fällen wurde selbst eine Theilnahme der grauen Substanz des Hinterhorns beobachtet, woraus sich die Thatsache erklärt, dass hier und da, aber immer nur ausnahmsweise, auch Störungen der Sensibilität (Anaesthesie, spontane Schmerzen) beobachtet wurden. Mir selbst kam ein Fall dieser Art vor, in welchem der grösste Theil des gelähmten

¹⁾ Klinik der Rückenmarkskrankh. Berlin 1875.

²⁾ Vergl. über die Muskel- und Nervenveränderungen Eisenlohr, Deutsches Archiv f. klin. Med. Bd. XXVI. p. 543.

³⁾ Kussmaul schlägt deshalb vor, die Krankheit Poliomyelitis acuta anterior zu nennen.

Beins gleichzeitig unempfindlich war, während bei einem anderen 2jährigen Kinde (18. Juli 1879) die Krankheit vor 3 Wochen mit einem 4tägigen Fieber und lebhaften Schmerzen im linken Arm begonnen hatte, welcher dann am 5. Tage total gelähmt, aber nicht anästhetisch war. Eine Theilnahme der Sphinkteren der Blase und des Mastdarms wurde nur ausnahmsweise beobachtet. Auch die Nackenmuskeln sah ich nur zweimal befallen, einmal bei einem 3jährigen Kinde, welches nach einem 2tägigen febrilen Initialstadium plötzlich eine Paralyse der rechten Oberextremität und der rechtsseitigen Nackenmuskeln darbot, so dass der Kopf nicht mehr aufrecht gehalten werden konnte, hin und her schwankte und im Liegen nur nach links bewegt werden konnte. Diese Lähmung verlor sich schon nach einer Woche, während diejenige des Arms fortbestand und sich bald mit Atrophie des Deltoideus und der Schaltermuskeln, und mit Temperaturabnahme verband. Ganz ähnlich verlief der zweite Fall.

Alle Autoren negiren die Theilnahme des Gehirns. Leyden¹⁾ bemerkt ausdrücklich, dass der Facialis, Hypoclossus und die Augenmuskeln niemals betheiligt gefunden wurden, und dass er nur in einem Fall einen kleinen sklerotischen Herd in der *Modulla oblongata* gefunden habe, der während des Lebens keine Symptome bedingt hatte. Um so wichtiger erscheint mir die folgende Beobachtung:

Bertha M., 2½ Jahr alt, am 1. Mai 1876 in meine Poliklinik gebracht. Vor drei Wochen plötzlich Fieber mit Erbrechen und anfallsförmige Somnolenz. Diese dauerten zwei Tage. Schon am dritten Tage Schwäche der rechten Hand bemerkt, am Tage darauf Lähmung des ganzen rechten Arms. Somnolenz hält noch drei Tage an, dann Wollkugeln, aber Paralyse des rechten Arms und eines Theils des linken Facialis. Letztere war am Tage der Untersuchung noch nicht völlig beseitigt. Das linke Auge blickt beim Schreien und Weinen nach links geöffnet und der Mund wurde etwas nach rechts gezogen. Der rechte Arm schlief herabhängend. Oberarm gänzlich immittel, Vorderarm im Ellenbogengelenke beweglich, an der Hand nur die Adduction des Daumens möglich. Die linksseitigen Gesichtsmuskeln reagirten gegen den faradischen Strom normal, während an der rechten oberen Extremität nur der Flexor und Abductor pollicis und einzelne Finger sich contrahirten, alle übrigen Muskeln nur sehr schwache oder gar keine Reaction zeigten. Galvanischer Strom wegen Mangels eines Apparats nicht versucht. Sensibilität, Volumen und Temperatur normal. Vom Mai bis Ende October wurde fast täglich der faradische Strom auf die Armamculatur applicirt und schließlich eine bedeutende Besserung erzielt. Die Flexion des Ellenbogen- und Handgelenks, die Bewegung des Daumens, des 4. und 5. Fingers fast normal, dagegen die Erhebung des Arms nach aussen und hinten unmöglich. Deltoideus und Schaltermuskulatur stark atrophisch, und die

¹⁾ L. c. II. p. 555.

ganze rechte Extremität kühler als die linke, der 2. und 3. Finger in starrer Flexion, spontan nicht zu strecken. Der Facialis war ohne elektrische Behandlung schon Mehr Mal wieder vollständig funktionfähig geworden. Erst am 28. April 1879 sah ich das Kind wieder, welches noch beinahe ein Jahr lang elektrolisiert worden war und erhebliche Fortschritte gemacht hatte, so dass namentlich der Arm sich nach hinten und innen bewegt werden konnte. Die Atrophie war noch unverändert und die rechte Hand auffallend kleiner als die linke.

Die Charaktere der spinalen Kinderlähmung sind in diesem Falle sehr deutlich ausgesprochen, und die Theilnahme des Facialis an derselben bildet daher eine bisher noch nicht beschriebene Ausnahme. Ich muss annehmen, dass sich hier von vorn herein gleichzeitig mit dem myelitischen Herde, der wohl im rechten Vorderhorn der Cervicalanschwellung zu suchen ist, auch ein sehr beschränkter encephalitischer Herd im Wurzelgebiete des linken Facialis entwickelt hat. Letzterer bildete sich nach wenigen Wochen gänzlich zurück, während der myelitisische Process weiter fortbestand und zur theilweisen Atrophie der grossen Ganglienzellen führte. Erwägt man, dass andere Medullaraffectionen, z. B. die multiple Sklerose, sich durchaus nicht selten mit analogen Veränderungen des Gehirns combiniren, so ist in der That nicht abzusehen, warum bei der infantilen Spinallähmung nicht dasselbe vorkommen sollte, und das Auftreten von Sopor und Convulsionen in manchen Fällen des febrilen Initialstadiums spricht in der That dafür, dass die Theilnahme des Gehirns öfter stattfinden mag, als man anzunehmen pflegt.

Die Erscheinungen der spinalen Kinderlähmung sind so prägnant und charakteristisch, dass eine Verwechslung mit anderen vom Gehirn oder Rückenmark ausgehenden Paralyseu bei einiger Sorgfalt kaum möglich ist. Das febrile Initialstadium, die plötzlich eintretende Paralyse, die fast nie progressiv, sondern immer regressiv ist und von einer anfangs grösseren Ausdehnung rasch auf ein beschränkteres Gebiet zurückgeht, die fast constante Integrität der sensiblen Sphäre und der Sphinkteren, die schnell verschwindende Reaction der Muskeln gegen den faradischen Strom, die frühzeitige Atrophie und Temperaturabnahme, zuletzt endlich die Deformation — das Alles findet man in diesem Verein bei keiner anderen Krankheit wieder, und ich halte es daher für überflüssig, Ihnen die Krankheiten, mit welchen eine Ver-

¹⁾ Einen an den einzigen zusammenfassenden Fall theilt Salignolle (Jahrb. f. Kinderheilk. XII. 1878, S. 248.) mit; einen anderen Eisenlohr (Arch. f. Psychiatrie und Nervenkrrk. Bd. IX. u. X.), welcher zwar keine eigentlich spinale, sondern eine „kulture“ Lähmung betrifft, wobei aber die Atrophie der Ganglienzellen des linken Vorderen Facialisbarns nachgewiesen wurde.

wechselung möglich wäre, hier einzeln anzuführen. Dennoch drängt sich die Frage auf, ob in der That alle Fälle, welche die klinischen Charaktere der spinalen Kinderlähmung darbieten, durch jene disseminirten myelitischen Herde, wie sie zuvor geschildert wurden, bedingt sind. In der That lässt sich nicht in Abrede stellen, dass periphere Lähmungen einzelner Glieder, eines Arms oder einer unteren Extremität, sich klinisch ganz ähnlich verhalten können, wie die uns beschäftigende centrale Affection. Durch traumatische Einwirkungen, besonders durch Zerrung oder Compression der Nervenstämmen (S. 217), so wie durch rheumatische Anlässe können Paralyse entstehen, welche nach kurzer Zeit mit Atrophie der Maseulatur und Abnahme der Reaction gegen die faradische Elektricität einhergehen, ganz so wie gewisse periphere Lähmungen des Facialis. Eins aber fehlt allen diesen Paralyse, nämlich das febrile und öfters mit cerebralen Symptomen verlaufende Initialstadium. Schon vor vielen Jahren machte Kennedy auf Lähmungen aufmerksam, die bei vollkommen gesunden Kindern urplötzlich ohne alle Vorboten entstehen, namentlich so, dass die Kinder gesund zu Bette gehen und am Morgen mit der Lähmung einer oberen oder unteren Extremität erwachen, die zwar in der Regel nach kürzerer oder längerer Zeit wieder schwindet (sogen. temporäre Paralyse), aber nach demselben Verlauf nehmen kann, wie unsere spinale Kinderlähmung. Man suchte in solchen Fällen nach lokalen Anlässen, ohne sie indess immer zu finden, und nahm dann entweder einen Druck des Kopfes auf die Armeerven während des Schlafes, oder eine Erkältung, oder einen Reflexreiz von der Dentition aus, meistens ohne rechte Begründung, an. Besonders die von den englischen Autoren beschuldigte Zahmung konnte ich in keinem einzigen Falle als Ursache solcher Paralyse constatiren, eher eine Erkältung. So sah ich bei einem 3½-jährigen gesunden Kinde, welches im Walde längere Zeit auf dem feuchten Gras gelegen hatte, eine Paralyse beider unteren Extremitäten entstehen, die von mehreren Aerzten für eine „spinale Kinderlähmung“ erklärt wurde, obwohl die anderen charakteristischen Symptome derselben fehlten. Wärme, Ruhe im Bette und Elektricität bewirkten bald eine vollständige Heilung. Meiner Ansicht nach kann ein Zweifel in der Diagnose wohl nur da aufkommen, wo es sich um eine mit Atrophie der Muskeln und Uempfindlichkeit derselben gegen den elektrischen Strom verbundene Lähmung eines einzelnen Gliedes handelt, denn in Fällen von ausgebreiteter Paralyse ist an der myelitischen Natur derselben nicht zu zweifeln. Die Ansicht aber, nach welcher die myelitischen Herde erst secundär von der Peripherie aus, etwa durch eine an den Nervenstämmen herauf-

kriechende Neuritis ascendens, entstehen sollen, ist bis jetzt durch keine sichere Thatsache bewiesen¹⁾. —

Von den Ursachen der spinalen Kinderlähmung wissen wir so gut wie nichts. Die Krankheit tritt in der Regel ganz plötzlich, inmitten ungeprüfter Gesundheit auf, und es gelingt auch trotz der genauesten Nachforschung fast nie, ein Gelegenheitsmoment nachzuweisen. In einem neueren Falle wurde ein Fall ins Wasser als Ursache angegeben. Bisweilen beobachtet man die Symptome der spinalen Paralyse nach acuten Krankheiten, z. B. nach Scharlach, Masern, Pocken, Typhus oder Pneumonie; in den meisten Fällen erfolgt hier eine Rückbildung, doch kann auch Atrophie im weiteren Verlaufe sich hinzugesellen, und es muss vorläufig noch dahingestellt bleiben, ob die anatomischen Verhältnisse dieser Fälle denen der spinalen Kinderlähmung vollkommen entsprechen. Dass die letztere mit allen ihren Symptomen, wenn auch viel seltener, auch bei Erwachsenen vorkommt, sei hier nur beiläufig erwähnt²⁾. —

In den meisten Fällen wird der Arzt erst dann eilirt, wenn die Krankheit schon einige Wochen gedauert hat. Wird man im acuten Initialstadium hinzugerufen, so weiss man natürlich nie, ob sich aus diesem eine spinale Lähmung entwickeln wird, weil die Symptome nur diejenigen eines mehr oder weniger hohen Fiebers mit oder ohne Cerebralsymptomen sind. Unter diesen Umständen wird man also eine Eisclappe auf den Kopf appliciren, in sehr intensiven Fällen einige Blutegel hinter den Ohren oder an die Schläfen appliciren, und innerlich Purgantia, Calomel (0,03—0,05 3-stündlich) oder Ipecac. Sennae comp. u. s. w. verordnen. Ist aber die Paralyse einmal ausgebildet, so verspreche ich mir von einer internen Therapie keinen Erfolg mehr. Vielmehr lehrt die Erfahrung, dass nur eine möglichst frühzeitige und consequent fortgeführte elektrische Cur die Rückbildung der Paralyse fördern und die Atrophie verhüten kann. Wenn einige, z. B. Heine und Volkmann, behaupten, dass die Elektrizität überhaupt nicht viel leiste, oder dass, wenn sie nach Jahresfrist noch keinen Erfolg gehabt habe, dann überhaupt jede Hoffnung aufzugeben sei, so stehen dieser Ansicht die grossen Erfolge Duchenne's und Andere gegenüber, welche auch nach dieser Zeit durch eine beharrliche Fortsetzung der Cur noch Resultate erzielt haben, und der oben (S. 225) mitgetheilte Fall geht einen neuen Beweis dafür. Man kann daher nur den Rath geben, con-

¹⁾ Leyden, l. c. O. S. 374. ff.

²⁾ Frey, Allg. Wechnach., 1874 I. u. J.

sequent zu sein. Aber gerade an dieser Consequenz fehlt es vielen Eltern und wohl auch vielen Aerzten. Schon einige Wochen nach dem Beginn der Krankheit kann man die elektrische Behandlung beginnen, welche in dieser frühen Periode vielleicht auch auf den myelitischen Process selbst günstig einwirkt. Mit Recht empfiehlt man für das erste Stadium den galvanischen Strom, weil der faradische zu reizend und schmerzhaft für die Kinder ist, und überdies die Reaction gegen den letzteren schon sehr vermindert oder erloschen sein kann, während der galvanische Strom noch deutlich einwirkt. Nach Duchenne's reichen Erfahrungen, die sich allerdings nur auf den faradischen Strom beziehen, soll die Behandlung im Anfang eine sehr vorsichtige sein, mit schwachen Strömen beginnen, nur 3mal wöchentlich stattfinden und jedesmal nicht länger als 5 bis höchstens 10 Minuten dauern. Im späteren Stadium passt der faradische Strom ebenso gut, vielleicht noch besser als der constante, weil es dann darauf ankommt, durch einen kräftigen Reiz die noch nicht entarteten Muskelfasern anzuregen und ihre Nutrition zu fördern. Ich wiederhole, dass die Behandlung in widerstrehenden Fällen Jahre lang fortgesetzt werden muss, bevor man sie als hoffnungslos aufgibt. In Verbindung mit der Elektricität ist besonders die Gymnastik zu empfehlen, welche, in passender Weise angewendet, durch stete Uebung der noch nicht völlig functionsunfähigen Muskeln eben diese Function gleichzeitig mit ihrer Ernährung zu kräftigen vermag. In den späteren Stadien kommt dann noch die Orthopädie als ein wichtiges Hülfsmittel in der Form von Apparaten und Operationen (Tenotomien) in Betracht, welche einerseits die Deformitäten zu verhüten und die atrophischen Muskeln zu stützen, andererseits die Contracturen der Antagonisten aufzuheben trachten. Gerade die veralteten Fälle von Kinderlähmung liefern ein ansehnliches Material an die orthopädischen Institute, und Heine's berühmtes Werk¹⁾, welches so viel für die richtige Anschauung der spinalen Kinderlähmung leistete, ist ja selbst die Frucht seiner orthopädischen Beobachtungen. Die Anfertigung solcher Apparate muss, ebenso wie die Art der Gymnastik, dem vorliegenden einzelnen Fall angepasst werden, und in den meisten Fällen wird hier die Erfahrung eines bewährten Orthopäden und eines geschickten Mechanikers dem behandelnden Arzte mit Rath und That an die Hand gehen müssen. In den niederen Ständen erlebte ich es auch ein paar Mal, dass intelligente Väter aus eigener Initiative Apparate construirten,

¹⁾ Spinalis Kinderlähmung. Monographie. 2. Aufl. Stuttgart 1860.

welche trotz ihrer Einfachheit und Billigkeit doch den Anforderungen so ziemlich entsprechen.

Ist auch die Widerkehr der Reaction gegen den elektrischen Strom stets ein überaus günstiges Zeichen, so lehrt doch die Erfahrung, dass mitunter diese Reaction (gegen beide Stromesarten) noch fehlt, wenn schon die ersten Spuren willkürlicher Bewegung sich bemerkbar machen, und man muss dann mit der Anwendung der Elektricität um so beharrlicher fortfahren. Andere Verfahrungsweisen kann ich Ihnen nicht empfehlen. Von der Anwendung des Jodkals verspreche ich mir weder im Anfang noch später einen Erfolg, und die hier und da empfohlenen Injectionen von Strychnin (0,002–0,003 täglich) blieben wenigstens in meinen Händen bis jetzt ohne Wirkung. Wohl aber empfiehlt es sich, wenn die Verhältnisse günstig sind, solche Kinder die gute Jahreszeit in frischer Wald- und Bergluft zubringen, und Soul- oder Eisenbäder nehmen zu lassen, welche durch starken Kohlensäuregehalt tendenz auf die sensiblen Hautnerven und von diesen aus reflectorisch auf die Motilität einwirken, wenn überhaupt auch normale Musculatur vorhanden ist. Aber weder Rehme und Nauheim, noch Schwalbach, Pyrmont oder Driburg, noch endlich die ebenfalls gerühmten Akrotothermen (Gastein, Wildbad, Ragatz u. a.) werden, abgesehen von der günstigen Allgemeinerwirkung, irgend etwas leisten, wenn der Fall vorliegt, die Ganglianeellen bereits atrophisch geworden und die Musculatur verschmüpft und verfestet ist. Unter diesen Umständen hilft überhaupt nichts mehr, und die Kranken müssen sich mit ihren deformirten Gliedern als Krüppel durch das Leben schleppen. —

Die „spinale Kinderlähmung“ ist die einzige Krankheit des Rückenmarks, welche das Kindesalter mit besonderer Vorliebe und unter gewissen für dasselbe charakteristischen Erscheinungen befällt. Unter den übrigen spinalen Erkrankungen spielt nur noch die in Folge von Spondylitis auftretende Paraplegie wegen ihrer Frequenz im Kindesalter eine Rolle, unterscheidet sich aber in keiner Weise von der gleichen Erkrankung Erwachsener, und ich habe um so weniger Veranlassung, mich weiter mit derselben zu beschäftigen, als die ihr zu Grunde liegende Wirbelkrankheit in allen chirurgischen Werken ausführlich abgehandelt wird und auch ihre Behandlung fast ganz der Chirurgie anheimfällt. Dass nun bei Kindern auch noch andere Krankheiten des Rückenmarks, entzündliche Processen, Hämorrhagien, Tuberkel, seltener Tumoren verschiedener Art vorkommen und Lähmungen veranlassen können, ist sicher, wenn dies auch weit seltener als bei Erwachsenen geschieht. Etwas Eigenthümliches, Charakteristisches aber bieten diese Zustände

bei Kindern niemals dar; ihre Erscheinungen sind dieselben und ihre Diagnose ist in den meisten Fällen ebenso schwierig, ja unmöglich, wie im späteren Alter. Besonders sind es zwei Krankheiten, welche in neuester Zeit auch in Bezug auf das Kindesalter Interesse erregten, die multiple Sklerose und die sogenannte „spastische Spinalparalys.“ Die erstere ist bei Kindern, obwohl nur selten, durch die Section constatirt worden. Die zweite aber ist bekanntlich auch bei Erwachsenen immer noch nicht viel mehr, als ein Symptomencomplex, welchem keine bestimmte anatomische Alteration entspricht. Solche Fälle, die sich durch eine chronische, selbst vom ersten Lebensjahre an bestehende Parese beider unteren Extremitäten, selten der oberen, besonders aber durch Contractur einzelner Muskelgruppen charakterisiren, sind mir selbst wiederholt bei Kindern vorgekommen. Zuvor beim Versuch zu stehen oder zu gehen, erregte das Aufsetzen der Fusssohle auf den Boden sofort eine starre Contractur der Wadenmuskeln mit Pesquinustellung des Fusses, oder es erfolgte auch wohl eine Zusammenziehung der Abductoren der Oberschenkel, wodurch dieselben fast übereinandergeschlagen und jede Bewegung unmöglich gemacht wurde. Auch der Patellarsehnenreflex war meistens gesteigert, die elektromusculäre Contractilität nicht vermindert. Leider entgingen alle diese Fälle meiner ferneren Beobachtung und blieben anatomisch unvollständig. Ebenso wenig sind die von Seligmüller¹⁾, Förster²⁾ und Maydl³⁾ mitgetheilten zahlreichen Fälle dieser Art geeignet, Licht über dies dunkle Gebiet zu verbreiten. Die von diesen Autoren und auch von mir selbst öfters beobachtete Complication mit geringer psychischer Entwicklung, selbst mit Idiotismus, lässt indes darauf schliessen, dass ganz ähnliche Symptome auch vom Gehirn ausgehen können, und ich werde Ihnen in der That bald ein Beispiel anführen haben, in welchem die Section sehr erhebliche Structurveränderungen der cerebralen Rindensubstanz ergab. Ich habe wohl kaum nöthig, Sie daran zu erinnern, dass unter diesen Umständen eine von der kranken Hirnpartie ausgehende secundäre Degeneration der Faserzüge bis ins Rückenmark hinein Platz greifen und mikroskopisch nachgewiesen werden kann. Durch Tenotomie und Orthopädie gelingt es übrigens, wenigstens in einem Theil dieser dunklen Fälle mehr oder weniger erhebliche Besserung des Gehens zu erzielen.

1) Deutsche med. Wochenschr. 1876, No. 26 u. 17. — Jahrb. f. Kinderheilk. XII, 1876.

2) Jahrb. f. Kinderheilk. XV, S. 261.

3) Rupprecht, über angeborene Gliederstarre und spastische Contractur.

X. Die Pseudohypertrophie der Muskeln.

Diese zuerst von Griesinger genau beschriebene Krankheit entwickelt sich constant in den Kinderjahren, kann sich aber bis in das jugendliche oder erwachsene Alter hinausziehen. Im völlig entwickelten Zustande ist das Bild derselben sehr charakteristisch. Während die Muskeln der Waden und der Oberschenkel, besonders die ersteren, ein ungewöhnliches Volumen und auffallende Derbheit darbieten, sind die Brust-, Arm- und Schultermuskeln atrophisch, schlaff, aber nicht durchweg, denn bei näherer Untersuchung findet man am Deltoides und auch wohl am Triceps brachii Lee und da knollige Verdickungen. Auch die Recti abdominis, die Glutaei, die Leisten- und Rückenmuskeln sind oft vergrößert, wenn auch nicht in dem Grade, wie diejenigen der unteren Extremitäten. Sehr eigenthümlich ist dabei der Gang der Kranken. Sie gehen breitbeinig, matschend, und der in Pesquintasstellung befindliche Fuss berührt nur mit der Spitze den Boden, während die Lordose der Lumbalwirbel viel stärker als im Normalzustande hervortritt. Lassen Sie den Kranken sich auf den Boden niederlegen und wieder aufstehen, so bemerken Sie, dass er bei diesem Act, wie man zu sagen pflegt „an sich selbst heraufklettert“. Er bringt sich nämlich zuerst in eine Stellung, welche ihm gestattet, seine Hände als Hebel zum Aufrichten zu gebrauchen, und bewerkstelligt dies schliesslich dadurch, dass er die Hände erst fest auf die Unterschenkel, dann auf die Oberschenkel stützt und damit den Oberkörper in die Höhe richtet. Ich hatte bis jetzt nur in 6 Fällen Gelegenheit, diese seltene Krankheit zu beobachten, aber in keinem einzigen fehlte diese eigenthümliche Art des Aufstehens. Uebrigens sind alle Bewegungen plump, angeschickt, schwerfällig und werden, je mehr die Krankheit fortschreitet, um so kraftloser. Dabei kann das Fettgewebe, namentlich an den unteren Extremitäten, noch gut erhalten sein, schwindet aber beim schliesslichen Eintritt eines marastischen Zustandes. Die atrophischen Muskeln der oberen Körpertheile zeigen öfters fibrilläre Zuckungen, ähnlich wie bei der progressiven Muskelatrophie der Erwachsenen. Die Haut der unteren Extremitäten zeigt nicht selten in Folge von venöser Stauung ein marasirtes Aussehen und eine kühlere Temperatur. Viele dieser Kranken sind geistig schwach und haben eine schwerfällige Sprache, und in vor-

einzelnen Fällen will man auch eine Volumszunahme der Zunge beobachtet haben.

Die Entwicklung dieser Krankheit lässt sich, wie schon bemerkt wurde, immer auf die mittleren Kinderjahre zurückführen, und von einzelnen wird ausdrücklich angegeben, dass sie schon in früher Kindheit durch die Schwerfälligkeit ihrer Bewegungen aufgefallen wären. Die meisten Patienten bekommt man freilich erst in einem entwickelteren Stadium, wenn sie 7–10 Jahre alt geworden sind, manche auch noch viel später zu sehen. Demme beobachtete bei einem 10jährigen Knaben einen langsamen Puls (44–60 Schl.) und einen nicht unbedeutenden, aber inconstanten Zuckergehalt des Harns¹⁾. Bleibt das Wohlbefinden sonst ungestört, so kann sich die Krankheit 10–20 Jahre hinziehen, wobei sie öfters einen Stillstand, niemals aber einen wirklichen Heilungsvorgang zeigt. Unterliegen die Kranken nicht einer zufälligen Complication, so macht in der Regel die zunehmende Atrophie und Schwäche der Respirationsmuskeln oder ein marastischer Zustand dem Leben ein Ende.

Der anatomische Vorgang in den Muskeln ist denjenigen, welchen wir von der spinalen Kinderlähmung und der progressiven Muskelatrophie her kennen, sehr ähnlich. Es handelt sich hier wesentlich um eine Volumverminderung der Muskelfibrillen, welche in den scheinbar hypertrophischen Partien (Waden und Oberschenkel) durch interstitielle Fettbildung und durch Bindegewebe ersetzt werden (*Atrophia musculorum adiposa*). Partielle können diese Compensationen auch in den atrophischen Muskeln der oberen Körpertheile (*Deltoidaeus* u. s. w.) in der Form einzelner Knoten auftreten; nur sparsam finden sich dazwischen auch hypertrophische Primitivbündel. Wodurch nun aber diese Atrophie bedingt wird, ob durch den Druck einer primären Bindegewebsbildung zwischen den Muskelbündeln, was Charcot und Duchenne für wahrscheinlich halten (*Paralyse myosclerosique*), oder auf andere Weise, lässt sich bis jetzt nicht bestimmen. Auch die hier und da beschriebenen Veränderungen der Medulla (Befund einer reichlichen feinkörnigen Substanz und vieler *Corpora amylacea*, besonders in den Seitensträngen) sind keineswegs als etwas Constantes oder Wesentliches zu betrachten. Nur die Störungen der Motilität bestimmen mich daher, diese Affection den Nervenkrankheiten anzuschliessen, welche vom rein anatomischen Standpunkte wahrscheinlich als ein primäres Muskelleiden zu betrachten ist²⁾.

¹⁾ 15. Jahresber. d. Berner Kinderspitals, 1877.

²⁾ Vgl. Krieger, Deutsches Archiv f. klin. Med. Bd. XXII. Heft 2.

Der fortschreitenden Atrophie der Muskelfibrillen, welche schliesslich viele Sarkomerabschnitte ganz leer erscheinen lässt, entspricht die Verminderung der elektrischen Contractilität, die ebenso gut in den geschwundenen wie in den verdickten Muskeln bemerkbar ist. Dagegen bleibt die Sensibilität der Haut intact, ja von Steidel und Wagner wurde sogar ein längeres Halten der Tastindrücke als im Normalzustande constatirt.

Bemerkenswerth ist, dass mit wenigen Ausnahmen, z. B. die von Lutz¹⁾ beschriebenen beiden Mädchen zwischen 20 bis 30 Jahren, alle Fälle bei Knaben vorkamen, mitunter sogar bei mehreren Kindern einer und derselben Familie. Abgesehen von dieser unerklärlichen Disposition sind alle sonst angeführten Ursachen, schlechte Lebensverhältnisse, skrophalöse und rachitische Cachexie, unsicher. Leider kann ich Ihnen auch über den Erfolg der Therapie nur ungünstiges mittheilen. Inneres Medication hilft hier ebenso wenig, wie die Anwendung der Electricität oder die von Griessinger empfohlene Compression der Waden durch Bindenswickelung, welche höchstens die compensatorische Festbildung beeinträchtigen, auf die Muskelatrophie aber kaum günstig einwirken kann.

XL Die hämorrhagische Lähmung.

Ungleich häufiger, als die spinalen, werden Sie bei Kindern die von Gehirn ausgehenden Paralyseu beobachten, deren allgemeine Charakterzüge, die hemiplegische Form und die lange Erhaltung der elektrischen Contractilität in den gelähmten Muskeln, genau dieselben sind, wie bei Erwachsenen. Atrophie der Muskeln kann zwar auch zu diesen Lähmungen sich hinzugesellen; dieselbe bildet sich jedoch äusserst langsam aus, erreicht nie die hohen Grade, wie in der spinalen Kinderlähmung, und scheint nicht von der Unthätigkeit, der langen Nichtübung der Muskeln, als von der Aufhebung des trophischen Nerveninflusses abhängen. Contracturen durch Ueberwiegen der nicht gelähmten Antagonisten, häufiger durch directe centrale Reizungszustände bedingt, Tremor und automatische Bewegungen sind häufige Begleiter.

Das Auftreten einer halbseitigen Lähmung erfolgt in vielen Fällen ganz plötzlich inmitten einer scheinbar ungetrübten Gesundheit, und man ist dann geneigt, die Ursache, wie bei Erwachsenen, in einer Hämorrhagie des Gehirns oder in einem embolischen Vorgange zu suchen. Beide Prozesse kommen aber im Kindesalter verhältnissmässig selten vor, und die plötzlich auftretenden Hemiplegien sind trotz ihrer apoplektischen

¹⁾ Hirsch-Yrskow, Jahrbücher 1866. II. 261; 1867. II. 233.

Erscheinungsform doch weit häufiger der Ausdruck eines schon länger bestehenden Hirnleidens, besonders der Tuberculosis cerebri.

Bleiben wir aber zunächst bei der Hämorrhagie des Gehirns als Ursache einer plötzlichen Hemiplegie stehen, so ist die Seltenheit derselben bei Kindern vorzugsweise darauf zurückzuführen, dass die häufigste Ursache dieser Blutung im späteren Alter, nämlich die fettige Entartung der kleinen Hirnarterien und die Bildung kleiner Aneurysmen an denselben bei Kindern fast nie vorkommt. Die erfahrensten Kinderärzte, denen ein bedeutendes Material zu Gebote stand, Guersant, Bocquereau, Billard, Rilliet und Barthoz, bekennen sämtlich, nur sehr vereinzelt Fälle von Gehirnblutung beobachtet zu haben, wohlverstanden von solchen, welche klinisch erkennbar waren, denn kleine capilläre Apoplexien habe ich oft genug im Gefolge von Gehirnfiebern, von Meningitis tuberculosa, von Thrombosen der Sinus und anderen Krankheiten angetroffen. Diese capillären Blutungen können aber, da sie sich durch gar kein Symptom verräthen, nur ein anatomisches Interesse beanspruchen. Mir selbst fehlt bisher jede durch Sectionen bestätigte Erfahrung über grössere Hirnblutungen bei Kindern, und die wenigen früher¹⁾ von mir mitgetheilten Fälle können, weil sie nicht bis zu Ende beobachtet wurden, auch nicht als vollständige betrachtet werden. Dasselbe gilt auch von den folgenden, wenn auch die Diagnose der Apoplexia sanguinea wahrscheinlich ist.

Knabe von 7 Jahren, der während der Mähzeit unter Fortbestand des Bewusstseins plötzlich von Stuhl und war seufzt auf der rechten Körperhälfte gelähmt. Später progressive Abnahme der Paralyse, welche ich 10 Monate lang verfolgen konnte. Die untere Extremität liess sich rascher und erschöpfbarer als die obere, an welcher die starke Contractura der Fingerflexoren der Hand eine klauenförmige Gestalt verleiht und dieselbe fast hinfängensfähig machte. Einsteichen der Hand in warmes Wasser löste die Contractur, und die Extremitäten agierten dann ziemlich frei. Anfangs war auch Aphasie vorhanden, die sich nach 10 Monaten so weit verlor, dass der Knabe ein paar Worte sprechen konnte. Die herausgestreckte Zunge zeigte deutlich eine Neigung nach der gelähmten Seite. Sensibilität und Intelligenz völlig normal, ebenso die Circulationsorgane, so weit es sich durch die Untersuchung feststellen liess. Ausgang unbekannt.

Während in diesem Falle die Ursache der Krankheit unbekannt blieb, sah ich bei einem 3-jährigen Kinde, welches an einem sehr intensiven Keuchhusten litt, unmittelbar nach einem besonders heftigen Anfall Convulsionen und Sopor auftreten, welche 9 Stunden anhielten und eine Hemiplegie der linken Seite hinterliessen. Dieselbe dauerte

¹⁾ Beiträge zur Kinderheilk. N. F. S. 62.

nach mehrere Wochen fort, Arm und Bein waren schlaff, ganz unbeweglich, der Facialis intact. Auch von anderen Autoren¹⁾ werden ähnliche Beobachtungen mit günstigem Ausgange mitgeteilt, und aus Rücksicht auf die beim Keuchstossen so heftig erfolgenden Blutungen in dem Bindegewebe der Augenlider, der Conjunctiva, aus der Nase, selbst aus den Ohren, kann man fast mit Sicherheit annehmen, dass es sich hier um eine Gehirnhämorrhagie handelte.

Auch durch Purpura hämorrhagica sah man, wenn auch nur selten, eine Apoplexie bei Kindern zu Stande kommen. Mauthner theilt einen solchen Fall mit Section mit; ich selbst verfüge nur über eine Beobachtung, welcher indess die volle Bestätigung durch die Section fehlt.

Kind von 7 Jahren, vor 4 Jahren Schmelz mit nachfolgender Wassersucht. Seit einem Jahre Morbus maculosus mit wiederholten Eruptionen aus Mund, Nase, Ohren, Augen, Darm und Nieren. Dabei grosse Schwäche, Appetitverlust; Milch nicht verdaut. Nach 9 tägiger Behandlung plötzlich heftige Convulsionen und Sopor, bald darauf Hemiplegia sinistra mit Lähmung des Facialis. Abends Tod. Section verweigert.

Ob hier das Extravasat, an dem wohl nicht zu zweifeln ist, in der Hirnsubstanz selbst, wie in dem Fall Mauthner's, oder zwischen den Hirnhäuten stattfand, muss dahingestellt bleiben. Dass auch letzteres der Fall sein kann, lehrt unter anderem eine englische Beobachtung²⁾ in welcher bei einem an Purpura leidenden und im Sopor gestorbenen Knaben ein Bluterguss zwischen Dura mater und Arachnoidea gefunden wurde.

Auch in folgendem Falle, in welchem nur Aphasie bestand, scheint mir die Annahme einer beschränkten Gehirnblutung unzweifelhaft:

Am 28. Mai 1878 wurde ich in der Nähe Berlin bei einem 3 jährigen Knaben consultirt, welcher seit 10 Wochen, eine dreiwöchentliche Pause abgerechnet, an Fieberis intermittens gelitten hatte. Vor 14 Tagen, gerade eines Tag nachdem der Knabe durch einen Fall auf den Kopf eine Gehirnerschütterung erlitten, hatte der letzte Anfall des Wechselfiebers stattgefunden. Um eine beachtliche Uebersiedlung auf Kopf nicht zu verschleiern, musste der Knabe während des Interstadiums die Eisenbahnfahrt antreten und wurde im Wagen von epileptischen Convulsionen befallen, welche fast ohne Unterbrechung 7 Stunden anhielten. Beim Erwachen aus dem soporösen Zustande zeigte sich sofort eine starke Bezin-

¹⁾ Einlayson, Jahrb. f. Kinderheilk. S. 303 — Gesner, Ztschr. 1876. II. 138. — Casin (Gaz. des hôp. 37. 1881) fand unter ähnlichen Verhältnissen 180 Gr. flüssiges Eiter zwischen Knochen und Dura über der linken Fossa occipitalis. (Cephaloemaboma intereum).

²⁾ Journ. f. Kinderkrankh. IV. 318.

Trächtigung der Sprache, welche nach 24 Stunden in eine vollständige Aphasie überging. Anfangs bestand noch Kopfschmerz und erhöhte Temperatur des Kopfes, die sich indes nach Einlenken und Calomelgebrauch bald verloren. Mit Ausnahme der Aphasie vollkommenes Fehlen aller paralytischen Symptome nirgends bemerkbar. Gerade am Tage meines Besuchs hatte der Knabe zum ersten Mal das Wort „auf“ ausgesprochen, doch konnte er auf meine Fragen, obwohl Sinne und Intelligenz durchaus intact waren, keine Antwort geben, sondern nur durch Zeichen andeuten, was er meinte. Die beruhigende Versicherung einer baldigen Besserung, welche ich den Eltern gab, bestätigte sich rasch; schon nach wenigen Tagen stellte sich das Sprachvermögen allmählig wieder her und nach 14 Tagen war die Genesung eine vollständige.

Bedenkt man das Zusammentreffen verschiedener eine Hyperämie des Gehirns begünstigender Umstände in diesem Falle, die vorausgegangene Gehirnerschütterung und die aufregende Fahrt auf der Eisenbahn während des Hitzestadiums eines Intermittensanfalls, so liegt es gewiss nahe, eine in Folge der starken Hyperämie entstandene Blutung anzunehmen, deren Sitz nach jetzigen Begriffen mit Wahrscheinlichkeit in der Gegend der zweiten linken Stirnwindung zu suchen ist. Der Mangel anderer Paralysen lässt sich gegen diese Annahme nicht geltend machen, da es nicht an Beispielen fehlt, in denen kleine, durch die Section bestätigte Blutextravasate im Gehirn sich nur durch ganz partielle Lähmungen, z. B. des Facialis, kund gegeben hatten. Dass die präsumirte Hirnblutung in diesem, wie in einigen anderen eben mitgetheilten Fällen sich zunächst durch heftige convulsivische Erscheinungen manifestirte, kann um so weniger überraschen, als diese letzteren überhaupt bei jungen Kindern weit häufiger als bei Erwachsenen in Verbindung mit Hämorrhagien des Gehirns auftreten. Jene bereits erwähnten kleinen Blutextravasate, die sich in Form dicht beisammen stehender rother Flecken oder auch bis erbsengrosser Herde besonders im Gewebe der Pia mater und in der Hirnrinde, seltener in anderen Theilen des Centralorgans vorfinden, haben während des Lebens oft kein anderes Zeichen als Convulsionen, welche indess zur Stellung einer sicheren Diagnose nicht ausreichen. Es gilt dies sowohl von denjenigen capillären Blutungen des Gehirns oder der Pia mater, welche bei asphyktischen Neugeborenen und in den ersten Wochen des Lebens beobachtet werden, wie von denen, die man in capillärer oder fleckweiser Form bei älteren Kindern im Gefolge schwerer Allgemeinerkrankheiten (Typhus, Diphtherie, Scharlach u. s. w.) oder localer Hirnaffecten, (besonders Tuberkulose des Gehirns und Meningitis tuberculosa) nicht selten findet. Alle diese Hämorrhagien sind nicht sicher zu diagnosticiren, weil ihre Symptome sich von denen der Grundkrankheit nicht loslösen lassen, häufig auch ganz fehlen. Wir-

serblich sind ich namentlich bei Meningitis tuberculosa nicht unbedeutende Extravasate in der Pia, mehrmals auch in der Substanz des Gehirns, z. B. in den Commissuren des dritten Ventrikels, ohne irgend eine entsprechende Veränderung der gewöhnlichen Symptome. Ich halte es daher für nutzlos, bei diesen klinisch nicht zu verwerthenden Befunden länger zu verweilen. Die seltenen Fälle grösserer Herde aber, welche bei älteren Kindern mit plötzlicher Hemiplegie auftreten, bieten weder in anatomischer, noch klinischer Beziehung nennenswerthe Differenzen von der Apoplexie der Erwachsenen dar. Dasselbe gilt von den Blutungen, welche theils plötzl. in Folge traumatischer Einwirkungen in dem Raum zwischen *Dura mater* und *Arachnoidea* zu Stande kommen (*Apoplexia meningea*). Dabei will ich schon hier bemerken, dass diejenige Krankheit, welche die französischen Beobachter (*Legendre, Rilliet und Barthez*) unter dem Namen „*Hémorrhagies dans la cavité de l'arachnoïde*“ beschrieben haben, von uns nicht mehr als reine Blutung, sondern als *Pachymeningitis*, d. h. als eine mit kleinen Hämorrhagien einhergehende Entzündung der inneren Fläche der *Dura mater* betrachtet wird.

Wie bei Erwachsenen, können auch im Kindesalter cerebrale Lähmungen plötzlich durch embolische Vorgänge entstehen. Wenn dies auch weit seltener geschieht, so hat doch die Literatur schon eine Anzahl von Fällen aufzuweisen, in welchen unter den bekannten Symptomen Gerinnsel aus dem linken Herzen oder selbst aus den Lungenvenen durch den Blutstrom in die Carotis und ihre Aeste, zumal in die *Arteria fossae Sylvii* hineingetrieben wurden und mehr oder weniger ausgedehnte Erweichungsherde in der von dieser versorgten Gehirnparte zur Folge hatten. Da in solchen Fällen die Lähmung zunächst in Folge der plötzlichen Anämie, welche in den betreffenden Hirntheilen eintritt, unter apoplektischen Erscheinungen sich geltend macht, so begegnen wir hier denselben diagnostischen Schwierigkeiten, wie im späteren Alter, und die Entscheidung, ob es sich um eine Embolie oder eine Hämorrhagie handelt, ist nur dann annähernd möglich, wenn wir nicht im Stande sind, durch die Untersuchung des Herzens (*Endocarditis, Klappenfehler*) einen Anhalt für die Diagnose zu gewinnen. Findet man am Herzen nichts Abnormes, so ist freilich damit die Möglichkeit einer Embolie noch keineswegs ausgeschlossen, da, wie bereits erwähnt, der Thrombus, welcher den Ausgangspunkt des weggeschwommenen Embolus bildet, auch in den Lungenvenen seinen Sitz haben und aus diesen in das linke Herz und die Aorta hingedrungen kann. Ein solcher Fall wurde im August 1877 in meiner Klinik beobachtet. Derselbe betraf einen an chronischer

Pneumonie und käsiger Entartung der Bronchialdrüsen leidenden 2¹/₂-jährigen Knaben, bei welchem sich plötzlich eine mit Contractur verbundene Hemiplegia dextra einstellte. Nach dem Tode fanden wir eine Embolie der Arteria basalis Sylvii mit ausgedehnter Erweichung der betreffenden Hemisphäre des Gehirns, und als Quelle des Embolus nicht das Herz, welches ganz normal war, sondern einen mit Thromben angefüllten Hauptast der rechten Vena pulmonalis. —

Das plötzliche Auftreten einer Hemiplegie kann endlich auch durch Gehirnkrankheiten bedingt werden, welche schon längere Zeit entweder vollkommen latent bestanden oder sich durch andere cerebrale Erscheinungen, besonders durch convulsivische Anfälle kundgegeben haben. Unter diesen Krankheiten nimmt die folgende entschieden die erste Stelle ein.

XII. Die Tuberkulose des Gehirns.

Von allen chronischen Hirnaffectionen, welche das Kindesalter betreffen, ist diese unzweifelhaft die häufigste, ja so überwiegend, dass man nur selten fehlgehen wird, wenn man beim Vorhandensein chronischer Cerebralsymptome die Diagnose auf Hirntuberkel stellt. Dieselben kommen, wie diejenigen anderer Organe, schon bei Kindern von sehr zartem Alter vor. Die Behauptung von Billiet und Barthez, Hirntuberkel nie vor dem dritten Lebensjahre beobachtet zu haben, erklärt sich wohl daraus, dass diese Autoren in ihrem Krankenhause nur über zwei Jahre alte Kinder zu sehen bekamen. Unter 12 Fällen meiner Beobachtung befinden sich aber 10 im Alter zwischen neun Monaten und zwei Jahren, und Demme fand sogar bei dem erst 23 Tage alten Kinde einer tuberkulösen Mutter einen haselnussgrossen Tuberkel in der einen Hemisphäre des kleinen Gehirns¹⁾.

Die Diagnose der Gehirntuberkel wird durch einen eigenthümlichen Complex von Symptomen und Verhältnissen unterstützt. Zunächst sind die betreffenden Kinder fast niemals völlig gesund, tragen vielmehr meistens die Spuren der Skrophulose oder Tuberkulose an sich; ekzematöse Ausschlüge, Augenzündungen, Oedem, Anschwellungen der Lymphdrüsen, osteomyelitische Auftreibungen der Finger- und Zehengphalangen oder anderer Knochen, besonders die Caries des Felsenbeins habe ich wiederholt im Verein mit Hirntuberkeln angetroffen. Freilich sind diese krankhaften Zustände nicht immer in dem Augenblicke, wo die Cerebralsymptome sich einstellen, noch vorhanden; es genügt aber,

¹⁾ 17. Jahresber. d. Kaiser-Kinderpitals.

dass die Kinder früher an denselben gelitten haben, dass man noch ihre Spuren nachweisen kann, ja selbst dass Geschwister an „Lungen- oder Drüsenkrankheiten“ zu Grunde gegangen sind. Diese anamnesticchen Momente erleichtern die Diagnose in hohem Grade, und daraus ergibt sich, dass diese in einem Hospital, wo man die Kinder oft ohne jede Anamnese in Behandlung bekommt, grössere Schwierigkeiten darbieten kann, als in der Poliklinik oder Privatpraxis. Nur selten wird man bei einer sorgfältigen Ausforschung der Angehörigen die Antwort bekommen, dass das Kind stets vollkommen frei von allen skrophulösen Erscheinungen gewesen sei.

Auf einer solchen Basis kommt es nun in einer Reihe von Fällen plötzlich zu einem epileptiformen Anfall, der sich in unbestimmten Intervallen wiederholen kann. Bei Kindern, die noch im Alter der ersten Dentition stehen oder gar rachitisch sind, ist es kaum möglich, diese Krämpfe von den weit unschuldigeren, welche wir früher (S. 145) besprochen, zu unterscheiden, und man achtet deshalb sorgfältig auf das Befinden in den Intervallen, die ja viele Monate dauern können. Jedes cerebrale Symptom während dieser Intervalle wird für die Diagnose bedeutsam. Schon kleine Kinder, besonders aber ältere, klagen häufig über Kopfschmerz, welcher in Anfällen, ähnlich der Migräne, auftritt, sich nicht selten mit Erbrechen verbindet und die Kinder zwingt, entweder still zu liegen oder den Kopf mit der Hand zu stützen. Bei anderen macht sich ein bis dahin nie beobachteter Strabismus, meistens auf einem Auge bemerkbar, der in der Armenpraxis oft gar nicht beachtet oder auf eine schlechte Angewöhnung geschoben wird. Plötzlich tritt nach einem der erwähnten convulsitischen Anfälle, mitunter auch ohne einen solchen, Paralyse eines einzelnen Gliedes, oder eine Hemiplegie mit oder ohne Theilnahme des Facialis und der Augenerven ein. Wie bei allen centralen Paralysen des Facialis pflegen auch hier nur einzelne Arzte, besonders die der Lippen, gelähmt zu sein, während die Lähmung des N. Oculomotorius sich durch Strabismus divergens und Erweiterung der Pupille, diejenige des Abducens durch Schielen nach innen und Unmöglichkeit, den Augapfel nach aussen zu stellen, kund gibt. Auch diese Lähmungen können nach einigen Tagen oder Wochen vorübergehen, und der Unkundige ist dann sehr geneigt, dieselben nur als Residuen des epileptiformen Anfalls zu betrachten, bis die Scene sich wiederholt und dann leicht einen rasch tödtlichen Verlauf nimmt.

Bartha M.¹⁾, 2 Jahr alt, rachitisch und skrophulös; wiederholte Krampf-

¹⁾ Beitr. zur Kinderheilk. N. F. S. 64.

wählten Falle die Tuberkel der linken Hemisphäre sich durch kein Symptom während des Lebens verrathen, so kann auch eine noch ausgedehntere Gehirntuberkulose während des Lebens völlig latent bleiben, und erst bei der Section zufällig gefunden werden. Ja ich möchte nach meinen Erfahrungen behaupten, dass multiple Tuberkel weit mehr zu dieser Latenz neigen, als solitäre. Als Beispiele mögen folgende, von mir beobachtete Fälle dienen:

Knabe von 4 Jahren mit Phthisis pulmonum. Cerebralsymptome nie beobachtet. Tod an einer schnell verlaufenden Meningitis basilaris. Section: Abscess der letzteren ein taubseingrosser Tuberkel auf der Convexität des rechten Vorderlappens, ein etwas grösser an der Vorderfläche des rechten Corpus striatum, endlich eine pomeranzengrosse, weiche, innen zerklüftete und leicht zerfallene Tuberkelmasse zwischen dem kleinen Gehirn und dem Tentorium cerebelli¹⁾.

Kind von 14 Monaten. Caries des rechten Felsenbeins mit Paralyse des rechten Facialis und vielfachen Drüsenschwellungen. Cerebralsymptome niemals beobachtet. Phthisis. Tod durch Bapteur einer kleinen Spittenscaries und Pneumothorax. Die Section ergab an der Oberfläche des rechten Stirnlappens eine vielfach zerklüftete und erweichte wallnussgrosse Tuberkelmasse, eine noch umfangreichere auf der Oberfläche des Hinterlappens, eine dritte etwas voluminös in der Peripherie des letzteren nahe der Basis. Auch auf der Oberfläche der linken Hemisphäre multiple umfangreiche Tuberkel, in ihrem Innern vielfache mit Detritus und erbsengrossen käsigen Coagulationen gefüllte Höhlen. Der linke Lappen des Cerebellum fast ganz in eine weiche käsige Masse verwandelt²⁾.

Kind von 2 Jahren, aufgenommen in meine Klinik am 17. April 1874 mit Caries an der rechten oberen und unteren Extremität. Anämie und Abmagerung, sonst keine auffallenden Erscheinungen. Vom 29. April an Entwicklung einer Meningitis tuberculosa, Tod am 6. Mai. Section: Im Vermis cerebelli, hineinragend in beide Hemisphären derselben, ein wallnussgrosser tuberkulöser Herd, in seiner Umgebung zahlreiche frische Tuberkel. In beiden Hinterlappen des Gehirns je ein wandst- bis haselnussgrosser Knötchen³⁾.

In diesen und anderen ähnlichen Fällen bestand immer gleichzeitig eine weit vorgeschrittene Tuberkulose und Verkäsung in anderen Organen, und dass gerade unter diesen Verhältnissen die Latenz der Hirntuberkel am häufigsten vorkommt, wurde schon von Rilliet und Barthez hervorgehoben. Ich unterschreibe daher noch heut den Satz, den ich schon 1868⁴⁾ aufstellte, dass bei Kindern, welche an ausgedehnter tuberkulöser Entartung der Lymphdrüsen, der Lungen, der Unterleibsorgane oder der Knochen leiden, und unter den Erscheinungen einer normal, häufiger aber anmal verlaufenden Meningitis tuberculosa zu Grunde

¹⁾ Beiträge, S. F. 67.

²⁾ Jour. f. Kinderkrankh. VIII. 1847. S. 168.

³⁾ Charcot-Arnsch. Jahrg. IV. 498.

⁴⁾ Beiträge, X. F. 69.

gehen, auch eine Tuberkulose des grossen oder kleinen Gehirns mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, sollte sich diese auch niemals durch ein bestimmtes Symptom kundgegeben haben. Diese Wahrscheinlichkeit ist um so grösser, wenn unter den cariösen Knochen sich das Felsenbein befindet.

Das Auftreten der Hirntuberkulose mit wiederholten epileptiformen Anfällen und sich anschliessenden Hemiplegien ist aber nur eine von den Formen, unter welchen die Krankheit sich offenbart. In einer anderen Reihe von Fällen entwickelt sich allmählig eine halbseitige Paralyse, die sich mehr und mehr steigert und oft mit Tremor oder Contractur einer oder beider Extremitäten verbunden. Erst nach vielen Monaten oder selbst Jahren, in welchen der Zustand viele Schwankungen zeigte, bilden heftige Convulsionen oder eine Meningitis tuberculosa den tödtlichen Schluss. Die folgenden in meiner Klinik beobachteten Fälle⁷⁾ werden Ihnen diese Form besser veranschaulichen, als eine detaillierte Beschreibung.

Carl Sch., 3 Jahr alt, aufgenommen am 15. Januar 1873, mager und blaß. Beginn der Krankheit vor 7 Monaten mit einem Tremor der rechten Hand, 2 Monate später Paralyse der ganzen rechten Körperhälfte und des Facialis dexter. Seit November 1872 fast anhaltende Contractur des rechten Arms im Ellenbogengelenk. Bei der Auflehnung stürzte Contracturen aller vier Extremitäten, rechtsseitige Lähmung und Tremor der linken Hand. Entwicklung einer Meningitis tuberculosa. Tod am 21. Section: Knochengrosser tuberculöser Herd am hinteren Umfang der rechten Hemisphäre des Cerebrum. An der Convexität des linken Stirnlappens ein 1 $\frac{1}{2}$ Ctm. im Durchmesser haltender kugliger Herd, welcher den ganzen Gyrus bis in die Marksubstanz hinein durchsetzt. Hydrocephalus internus. Am hinteren Theile der linken Corpora striata dicht unter dem Ependym drei eibergrosse Tuberkel. Beide Sehr Nagel in ihrem oberen Theile in eine lockrige käsige Masse umgewandelt.

Wilhelm J., 2 Jahr alt, seit 6 Monaten hustend und abgemagert, plötzlich aufgenommen am 3. April 1873. Anhaltendes Zittern, öfter auch stärkeres Zucken des rechten Arms und der rechten Gesichtshälfte, wobei der Hand nach oben und rechts gezogen wird. Paralyse nicht bemerkbar. Sensibilität unbeeinträchtigt normal. In den Lungen Verdichtungserscheinungen. Nach einigen Tagen Zunahme des Tremor, in dem auch der Kopf und die rechte Unterextremität Theil nehmen. Auch die Brust- und Bauchmuskeln, sowie der Cremaster der rechten Seite zeigten deutlich in kurzen Intervallen sich wiederholende Zuckungen. Leichter Paralyse des rechten Arms. Am 6. April anhaltende Contractur des rechten Arms, am 7. Nystagmus des rechten Auges. Tod unter heftigen Fieber und Calixia. — Section: Oedem der Pia, besonders auf der Convexität der linken Hemisphäre, wo vielfache miliäre Tuberkeln umgeben sind. Dicht vor der Falschhörnchen Furche in der Mitte ein gelber haselnußgrosser Tuberkel der Rindensubstanz mit milchig erweichter Umgebung. Placenta praevia II. S. W.

⁷⁾ Charité-Annalen. Jahrg. IV. 495 ff.

Schon aus diesen Fällen erschien Sie, dass die Dauer der Krankheit, so weit wir sie überhaupt zu beurtheilen vermögen, eine sehr verschiedene sein kann, dass in einem Theil der Fälle, von dem ersten Auftreten der Symptome an gerechnet, bis zum tödtlichen Ende viele Monate und selbst Jahre vergehen, während in anderen erst verhältnissmässig kurze Zeit vor dem Tode die ersten Symptome beobachtet werden, so dass man hier eine Latenz der Krankheit bis zu ihrem letzten Stadium annehmen muss. Sehr häufig sah ich die erste Manifestation der Hirntuberkel, z. B. convulsivische Anfälle mit oder ohne Hemiplegie, fast unmittelbar in die Symptome der Meningitis tuberculosa, welche dann den letzalten Schluss bildete und sich in der Regel durch einen ungewöhnlich stürmischen Verlauf auszeichnete, übergehen. Seltener gehen die Kranken in einem abnorm langen und heftigen Anfalle von Convulsionen oder auch durch den Fortschritt der gleichseitigen Tuberkulose anderer Organe ohne Meningitis zu Grunde. —

Die mitgetheilten Krankengeschichten gaben Ihnen bereits ein Bild der anatomisch-pathologischen Verhältnisse. Am häufigsten erscheinen die Hirntuberkel in der Form erbsen- bis haselnussgrosser, gran-gelber, käsiger Knoten von meist rundlicher oder auch böckeriger Form, welche vorzugsweise die graue Substanz des Gehirns, daher die Rindenschicht, die grossen Hirn ganglien, den Pons Varoli und das kleine Gehirn zu ihrem Sitze wählen, aber auch die weisse Marksubstanz, die Vierhügel u. s. w. keineswegs verschonen. Die Tuberkel der Rindenschicht, welche unmittelbar unter der Arachnoidea und Pia liegen, lassen sich kaum von denjenigen unterscheiden, die in den Hirnhäuten selbst ihren Ausgangspunkt haben und sich von diesen aus in die Rindensubstanz einsenken, was in klinischer Beziehung auf dasselbe herauskommt. In beiden Fällen findet man die über den Rindentuberkeln liegende Arachnoidea und Dura mater mehr oder minder miteinander verwachsen, so dass beim Abziehen der Dura leicht ein Stück des Tuberkels an derselben hängen bleibt. Mitunter ist das Volumen der Knoten weit beträchtlicher; ich selbst habe wallnuss-grosse und noch grössere beobachtet, welche dann auf dem Durchschnitt in der Regel nicht mehr homogen käsig erschienen, sondern Klüfte und Höhlungen enthielten, die mit einer zollfüllen Flüssigkeit gefüllt waren. Bei einem Kinde fand ich an der äusseren Fläche des rechten Thalamus opticus sogar eine hühnereigrosse, unten zerklüftete Tuberkelmasse, in anderen Fällen eine diffuse käsige Entartung der Rindenschicht, oder käsige Umwandlung einer ganzen Hemisphäre des kleinen Gehirns. Verkalkungen von Hirntuberkeln gehören nicht zu den häufigen Erscheinungen; ich selbst beobachtete so

nur in zwei Fällen, deren einer bereits (S. 242) erwähnt wurde. Im zweiten Fall enthielt ein Tuberkelknoten des kleinen Gehirns sehr harte verkalkte Partien.

An den umfangreichen Tuberkelmassen lässt sich bei genauer Untersuchung in der Regel deutlich erkennen, dass sie aus der Confluenz benachbarter kleiner Knoten hervorgegangen sind. Ihr Inneres ist, abgesehen von den erwähnten Klüften, theils derb und homogen, theils körnig und bröcklig. Die äusserste Schicht desselben bildet oft eine schmale, grauweisse durchscheinende Zone, in welcher man zahlreiche miliare Knötchen nachweisen kann, durch deren Confluenz, zum Theil auch wohl durch eine verkäsende chronische Encephalitis die grösseren Knoten zu Stande zu kommen scheinen. Kleinere Tuberkel sind nicht selten durch eine dünne Bindegewebshülle abgekapselt, während die grösseren sich gewöhnlich mehr diffus verhalten und in einer stark vascularisirten, durchfeuchteten, erweichten Hirnsubstanz eingebettet sind. Die Zahl der Hirntuberkel ist sehr verschieden; am seltensten findet man nur einen (Solitär-tuberkel), meistens mehrere in verschiedenen Hirntheilen zerstreute, mitunter sogar viele (ein Dutzend und mehr), wofür ich oben Beispiele mittheilte. In den meisten Fällen findet man auch die Erscheinungen der lethalen Meningitis tuberculosa in der Pia mater und die Serumansammlung in den Ventrikeln, von denen später die Rede sein wird, nicht selten auch kleine Ektymosen in der Pia oder Hirnsubstanz. Wiederholt beobachtete ich, dass in der unmittelbaren Umgebung käsiger Knoten, namentlich an der Convexität, die Anhäufung miliarer Tuberkel in der Pia am prägnantesten war. Mehr oder minder fortgeschrittene Tuberkulose und Verkäsung anderer Organe begleitet meistens, keineswegs aber constant. In dem schon (S. 241) erwähnten Falle, wo ein Dutzend grosser Tuberkel im Gehirn gefunden wurde, waren nur in der rechten Lunge einzelne miliare Knötchen nachweisbar, alle anderen Organe, selbst die Bronchiadriisen, aber durchaus intact.

Die Frage, ob wir im Stande sind, aus den Symptomen den Sitz der Tuberkel in diesem oder jenem Hirnthelle zu diagnosticiren, gehört streng genommen nicht hierher, da die Verhältnisse hier ebenso liegen, wie bei Erwachsenen. Ich verweise Sie daher auf eine in dem IV. Jahrgange der *Charité-Annalen* von mir veröffentlichte Arbeit, aus welcher hervorgeht, dass trotz der in neuester Zeit gewonnenen experimentellen Erfahrungen die Localdiagnose der Tuberkel noch auf äusserst schwachen Füssen steht, wofür ja schon die oben berührte Latenz desselben den Beweis liefert. Allerdings stehen mir 3 Fälle zu Gebote, in welchen ein Solitär-tuberkel des einen Frontallappens Reizungs- oder Lähmungserschei-

ungen auf der gegenüberliegenden Körperhälfte zur Folge hatte, und man kann daraus mit voller Sicherheit schliessen, dass diese Symptome durch die ausschliessliche Erkrankung der erwähnten Windungen bedingt werden können. Ich sage absichtlich „können“, denn eine Nothwendigkeit liegt nicht vor. Genau dieselben Störungen, Hemiplegie und Contracturen, sah ich oft genug in Fällen, deren Section jene Rindenpartien ganz intact ergab, während die verschiedensten anderen Theile des Gehirns oder des Cerebellum der Sitz der Tuberkel waren. Wenn schon die Multiplicität der letzteren in vielen Fällen alle Bemühungen, zu einer Localdiagnose zu gelangen, zu Schanden machen muss, so bieten doch selbst die Solitär tuberkel oft Erscheinungen dar, welche mit den Resultaten der Hirnexperimente im Widerspruch stehen. Ich rathe Ihnen daher, in der Localdiagnose die grösste Reserve zu beobachten und besonders die „motorischen Rindencentra“, welche jetzt eine so grosse Rolle spielen, nicht zu überschätzen, wenn Sie sich nicht argen Täuschungen am Sectionstische aussetzen wollen. Es wäre eine ganz vergebliche Mühe, wollte ich hier auf einige Fälle von Solitär tuberkeln näher eingehen, welche dazu benutzt worden sind, Schlüsse auf die Functionen dieses oder jenes Hirnthells zu ziehen, da wir hier überall auf bedenkliche Widersprüche stossen würden. Die Lösung derselben kann meiner Ansicht nach nur durch eine exacte Kenntniss des Verlaufs der vom Rückenmark ins Gehirn austrahlenden weissen Faserzüge (Pyramidenbahnen) ermöglicht werden, denn sobald Theile dieser Züge von einem reizenden oder lähmenden Anlass getroffen werden, müssen entsprechende motorische Störungen auftreten, gleichviel ob dieser Anlass auf ihre letzte Ausstrahlung in den Corticalwindungen, oder auf das Marklager, oder auf irgend eine andere Stelle ihres Verlaufs einwirkt. Nicht auf die krankhaften Herde allein kommt es an, sondern ebenso wohl auf den Zustand der zu diesen Herden in Beziehung stehenden Faserzüge, die ja von jenen aus secundär degeneriren können. Wird aber das Mikroskop je im Stande sein, diese Aufgabe ganz befriedigend zu lösen?

Unter allen Hirnthellen schien mir die Partie des Pons und der Corpora quadrigemina diejenige zu sein, welche durch die gleichzeitige oder successive Affection mehrerer Nerven, deren Wurzelgebiet sich bis in diese Region verfolgen lässt, noch am ehesten eine annähernde Localdiagnose zulässt. Die gleichzeitigen Lähmungen eines oder beider Oculomotorii, der Optici, des Facialis, auch des Abducens, welche entweder das Hauptkrankheitsbild darstellen oder wenigstens der Hemiplegie vorausgehen, werfen ein schweres Gewicht zu Gunsten dieser Localdiagnose in die Waagschale, und ich verwehe Sie in dieser Beziehung auf

einige von mir mitgetheilte Beobachtungen über Tuberkulose der Vierzügel resp. des Pons¹⁾, wobei ich auch die aus der Literatur bekannten Fälle dieser Art berücksichtigt habe.

Es bleibt mir noch übrig, einer nicht seltenen Folgekrankheit der Hirntuberkel, nämlich des Hydrocephalus chronicus, mit einigen Worten zu gedenken. Die Erfahrung lehrt, dass besonders Tuberkelknoten, welche im Mittelraum des kleinen Gehirns oder zwischen diesem und dem Tentorium cerebelli gelegen sind, durch Druck auf die Vena magna Galeni und ihre Hauptäste öfters eine Stauung und Ausdehnung in den Ventrikeln herbeiführen. Diese kann sich schon während des Lebens durch Volumszunahme des Kopfes, selbst wenn die Nähte desselben bereits geschlossen waren, kund geben. Der erste Fall dieser Art, welcher mir vorkam, betraf ein 3jähriges Mädchen, bei welchem sich zu den Symptomen der Hirntuberkel später eine Vergrößerung des Kopfes mit Abnahme der Intelligenz und doppelseitiger Blindheit gesellte, als deren Ursache v. Graefe eine Neuroretinitis mit starker Schwellung der Papille und Schlingelung der Venen nachwies. Da infess die Section nicht gemacht wurde, bleibt es dahingestellt, ob es sich hier um Tuberkel oder um irgend einen anderen Tumor handelte, welcher durch Compression der Venen dies Resultat herbeiführte. In zwei anderen Fällen²⁾ war die Tuberkulose des Vermis cerebelli zwar mit einer mässigen serösen Füllung der Ventrikel verbunden, doch kam nur der zweite Fall, in welchem keine Meningitis tuberculosa stattfand, hier als massgebend in Betracht kommen. Bedeutsamer ist die folgende in meiner Klinik gemachte Beobachtung:

Clara B., 3 Jahr alt, früher gesund. Seit einem halben Jahre eine allmählig zunehmende Vergrößerung des Kopfes, zu welcher sich langsam sich steigende rechtsseitige Hemiplegie beimiht. Letztere ist nicht mehr so stark, als früher, so dass namentlich der rechte Arm noch ziemlich brauchbar ist. Seit 7 Wochen besteht Taxis cerebrales. Aufnahme in die Klinik am 4. Januar 1879. Kopf hydrocephalisch, Umfang 54 Cm., Fontanelle weit offen und in der Mitte handgreifend, prall und stark. Augen etwas vorgewölbt. Somnolenz. Starke Krampfanfälle, diffuse Brechschüdelnarrh, rextremes Fieber, welches bis zu dem am 15. erfolgten Tode an Intensität zunahm. Temp. misst 40,6, Puls 160 und etwas unregelmäßig. Section: Sehr bedeutender Hydrocephalus ventriculorum chronicus mit Compression der Hirnsubstanz, Abflachung der Windungen und starke Ausdehnung des Schädels. Die linke Hemisphäre des kleinen Gehirns fast ganz in eine homogene gelbbraune Masse umgewandelt, welche von einem schmalen Saum normaler Hirnschicht umgeben ist. Sonst nichts Wesentliches.

¹⁾ Beitr. z. Kinderheilk. N. F. 8. 72. — Charité-Annalen, Bd. IV.

²⁾ Charité-Annalen. IV. S. 498, 499.

Ohne Zweifel bestand diese Tuberkelmasse schon seit längerer Zeit latent, bevor sie Hemiparese hervorrief und durch den wachsenden Druck auf die venösen Gefäße Stauung erzeugte. Die Mittellage des Knotens in der Richtung der Vena magna ist demnach nicht unbedingt notwendig, denn auch jede rechts oder links von derselben liegende Geschwulst kann durch den vermehrten Seitendruck eine Stauung im Gebiete der benachbarten Venen herbeiführen, die sich ja durch den Augenspiegel bei den verschiedensten Hirntumoren nachweisen lässt. Dennoch wäre zu bedenken, ob die mechanische Auffassung des chronischen Hydrocephalus als eine Folge der Vena-compression für alle solche Fälle die allein berechnigte ist, oder ob nicht auch ein von der überkleidenden Pia ausgehender und durch die Tela choroides auf das Ependyma ventriculorum übertragener Reizzustand als Ursache der serösen Anhäufung mit in Anschlag zu bringen ist.

Von einer wirksamen Behandlung der Hirntuberkel kann selbstverständlich nicht die Rede sein. Weder durch das beliebte Jodkalium, noch durch andere antiskrophulöse Mittel ist man im Stande, die einmal entwickelten käsigen Knoten aus dem Gehirn wegzuschaffen. Wohl aber muss die Möglichkeit einer Naturheilung, namentlich eines Solitär-tuberkels, durch Abkapselung oder Verkalkung angegeben werden, und Sie werden daher, wenn auch nur mit sehr schwacher Aussicht auf Erfolg, immer den Versuch machen müssen, diesen Vorgang durch eine tonisirende Therapie (Jodeisen, Leberthein, Salzwasser, frische Luft, nahrhafte Kost) möglichst zu fördern und störende Schädlichkeiten fern zu halten. Eine temporäre Besserung (Verschwinden der Paralyse, langes Aussetzen der Convulsionen v. s. w.) darf, wie einige der mitgetheilten Fälle zeigen, auch nicht zur Annahme einer schon gelungenen Heilung verleiten, welcher ja schon die meistens begleitende Tuberkulose anderer Organe störend in den Weg tritt. Ganz hoffnungslos wird aber der Fall, sobald sich die ersten sicheren Anzeichen der Meningitis tuberculosa entwickeln. Epileptiforme Anfälle mit oder ohne febrilhafte Erscheinungen, welche sich plötzlich im Verlaufe der Krankheit einstellen und Sopor, auch wohl partielle Lähmungen hinterlassen, sind zwar immer verdächtig, weil die Meningitis gerade unter diesen Umständen nicht selten mit diesen Anzeichen beginnt, doch bedenke man wohl, dass dieselben auch durch eine plötzliche Hyperämie oder eine beschränkte Encephalitis in unmittelbarer Umgebung von Tuberkeln entstehen können, und verfolge daher nicht, einige Blütigel an den Kopf, Eisumschläge und Purgamittel (F. 7) zu verschreiben. Unter dieser Behandlung erfolgt dann bisweilen eine Rückbildung der drohenden Symptome, bis nach einiger Zeit ein neuer

Anfall oder die terminale Meningitis tuberculosa dem Leben ein Ende bereiten.

XIII. Geschwülste des Gehirns.

Ueber die im Gehirn der Kinder vorkommenden Geschwülste habe ich Ihnen nur wenig mitzutheilen, da dieselben in allen Beziehungen denjenigen der späteren Lebensalter gleichen. Am häufigsten werden verschiedene Formen der Sarkome beobachtet, welche entweder inmitten der Substanz des Gehirns, zumal im Pons Varoli und dessen Umgebung, oder von den Schädelknochen aus sich entwickeln und dann durch ihren Druck das Gehirn beeinträchtigen. Mir selbst stehen mehrere Fälle dieser Art mit Section zu Gebote, während andere wegen des Mangels der Leichenöffnung unvollständig blieben.

Alice G., 6 Jahre alt, in die Klinik aufgenommen am 16. Juli 1874¹⁾. Seit einigen Monaten heftige Kopfschmerzen, besonders in der linken Stirngegend, seit 6 Wochen doppelseitige Anamnose, welche binnen wenigen Tagen zu Stupeur kam. Die Untersuchung ergab: Ptosis incompleta links, vollständige Immobilität des linken Auges mit weiter reactionloser Pupille. Rechtes Auge gut beweglich, Pupille ebenfalls erweitert. Neurorhinitis auf beiden Augen. Zitterndes Schmerz in der linken Nasenhöhle, graue eitrige Secretion aus derselben. Rhiphorie bis zur ZL, wo das Kind von schwerem Schindach befallen wurde. Tod am 2. August. Section: Ein Myxosarkom von der Größe einer halben Faust, von den Knochen der mittleren Schädelgrube ausgehend, füllte diese vollständig aus, war nach Durchbrechung der Lamina cribrosa in den vorderen Theil der linken Nasenhöhle hineingewachsen und umfasste das Chama opticum und sämtliche linksseitige Augennerven. Gehirn und Meninges normal, nur wenig nach oben gedrängt.

Die Section erklärt vollständig die Anamnose beider Augen, die Paralyse sämtlicher Muskeln des linken, den Mangel aller paralytischen Symptome an den Extremitäten, und endlich die eitrige Secretion aus der linken Nasenhöhle.

Anton H., 11-jährig, am 26. Juni 1872 in die Klinik gebracht²⁾, früher gesund, nur hin und wieder Kopfschmerz. Vor 6 Jahren Aufregung und Erkältung bei einer Feuersbrunst. Eine Woche später zunehmendes Fieber rechts und schmerzhafter Gang, Zunahme der Kopfschmerzen. Bei der Untersuchung ergab sich Fieber rechts, mäßige Erweiterung beider Pupillen, starker Gesichtsausdruck, große Unruhe, häufige rotatorische Bewegung des Kopfes, besonders nach rechts nach links. Obere Extremitäten gebrauchsfähig, wenn auch schwächer. Gehirn ohne Stütze unmöglich; unter beiden Achseln gehalten, vermag er sich nur in ataktischer Weise fortzuschleppen. Im Liegen werden die unteren Extremitäten gut bewegt. Am rechten Bein stellenweise Verminde- rung der Sensibilität. Sprache lebend, kann

¹⁾ Charité-Analen, Jahrg. I. 561.

²⁾ I. c. 262 und Scheffer, Inauguraldiss. über Hirngeschwülste im Kindesalter, Berlin, 1873.

verständlich, Schlucken erschwert, Schreimengen stark. Sensesum frei. P. 54—84. Nach einigen Tagen Spasme auch unwillkürlicher, Kopfbewegungen stärker, Sensesum benommen. Am 4. Juli plötzlich Bewusstlosigkeit und Asphyxie. Künstliche Respiration und Facialisstimuli hatten, obwohl 2 Stunden lang beharrlich fortgesetzt, immer nur vorübergehenden Erfolg (Hebung des Paltes und Verminderung der Cyanose). Tod am Nachmittage. Section: Dura stark gespannt, Gehirn abgeplatzt. In der Region des Pons Varoli eine grosse unkenntliche Geschwulst vom Umfang eines Bodens, die Brücke und das hintere Crus cerebelli ist p. infiltrierend, rüthlich grau, weich; in ihrem Inneren eine knirschberagende, mit schwammiger schwefelgelber Masse gefüllte Höhle. Hydrocephalus chronicus der Ventrikel. Der Tumor ersiel sich unter dem Mikroskop als granulöses Sarkom, dessen Analogue noch bis in die Glaskirnhöhle verfolgt werden könnten.

Anna D., 11 Jahre alt, am 4. Mai 1876 in die Klinik aufgenommen, immer gesund bis auf eine vor 4 Jahren überstandene Pockenkrankheit. Seit längerer Zeit (?) zunehmende Unsicherheit des Ganges, seit April d. J. Schielen auf dem rechten Auge, Schwindel, Ueblichkeit, rasenden Erbrechen. Bei der Untersuchung erschien der Gang im hohen Grade unsicher, schraubend, besonders bei geschlossenen Augen. Motilität und Sensibilität aller Extremitäten fast intact. Lähmung des linken Abducens mit Strabismus internus und Unmöglichkeit, das Auge nach aussen zu bringen. Pupillen normal. Sensesum frei, aber grosse Apathie und Stumpfheit. Sprache maul, undeutlich; Flüssigkeit beim Trinken binnensinken aus der Nase wieder ausgestossen; Velum schlaff, beim Athmen und Phoniren nur wenig bewegt. In den nächsten Tagen Vomitus, sehr erschwerter Stuhlgang, Retentio urinae (durch Einführung des Catheters geloben), Sprache undeutlicher, Schlucken täglich schwerer. Am 8. auch der rechte Abducens gelähmt. Intelligenz stets abnehmend, Sensesum. P. gewöhnlich 80—100. Hives auf 64 und darunter sinkend und unregelmäßig. Vom 24. an völlige Theilnahmslosigkeit; wegen Unfähigkeit zu schlucken ernährte Klystien; Verfall der Kräfte. Tod den 29. an Oedema pulmonum. Mit Rücksicht auf den vorigen Fall hatte ich auch hier die Diagnose auf einen Tumor des Pons Varoli gestellt. — Section: Pons um das Doppelte, Medulla ob. besonders rechts ebenfalls, aber nur in geringem Grade vergrößert. Pons weich, stellenweise fahlgelblich. Auf dem Durchschnitt mehrere bohnen- bis kirschgrosse Tumoren von markiger Beschaffenheit und graurüthlicher Farbe, diffus in die Umgebung übergreifend. Die Untersuchung ergab die charakteristische Natur derselben. Sonst nirgends Abnormitäten.

Die beiden letzten Fälle dürfen wegen der Uebereinstimmung einer Reihe von Symptomen (doppelseitige Abducenslähmung, Paralyse der Gaumenmuskulatur mit erschwerter Schlucken und undeutlicher Sprache, Ataxie der unteren Extremitäten) eine Bedeutung für die Diagnose der Ponskrankungen in Anspruch nehmen. —

Auch das Vorkommen gummoser Tumoren im Gehirn von Kindern wird hier und da erwähnt, und in der That lässt sich kein Grund absehen, warum gerade diese syphilitische Manifestation das Kindesalter verschonen sollte. Nur möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass die Unterscheidung dieser Geschwülste von Tuberkeln oft sehr schwer ist, und

nach das Mikroskop uns im Stich lassen kann, dass daher mancher Gehirntuberkel als Gumma passiert sein mag und umgekehrt. Selbst die von Koch⁵⁾ entdeckten Tuberkelbacillen können nicht als ganz sichere Kriterien für solche Fälle betrachtet werden, da dieser Forscher selbst zugiebt, dass die Bacillen in veralteten käsigen Heerden zu Grunde gehen und nicht mehr aufzufinden sind. In solchen Fällen entscheidet besonders eine käsige Beschaffenheit anderer Organe, zumal der Lungen und Bronchialdrüsen zu Gunsten der Tuberkel. Wenn nicht gleichzeitig sichere Zeichen von Lues vorhanden sind, und die völlige Abwesenheit von Tuberkeln in anderen Organen durch eine sehr sorgfältige Section constatirt ist, würde ich mich gerade bei Kindern hüten, Gummata im Gehirn anatomisch zu diagnosticiren, weil eben in diesem Alter die Tuberculose so enorm überwiegt. Mir selbst ist bisher nur ein, wie ich glaube, sicherer Fall begegnet, welcher schon oben (S. 99) mitgetheilt wurde.

Andere Geschwulstformen (Gliome, Medullarsarkome, Echinococci, Cysticercen), welche im Gehirn der Kinder vorkommen, bieten ebenso wenig etwas Charakteristisches dar, wie die encephalitischen Herdkrankungen, die mit Erweichung der Hirnsubstanz oder mit Abscessbildung enden. Alle Verhältnisse liegen hier ebenso wie bei Erwachsenen und ich halte es daher für überflüssig, auf diese krankhaften Zustände an dieser Stelle näher einzugehen. Abscess des Gehirns werden bei Kindern nicht ganz selten beobachtet, da ein häufiger Anlass derselben, der traumatische, gerade in diesem Alter mehr, als im späteren Lebensalter einwirkt. Ausserdem kommt hier noch die relativ grössere Frequenz der Caries des Felsenbeins in Betracht, deren Tendenz Abscess im Gehirn zu erzeugen, festgestellt ist. Meine persönlichen Erfahrungen beziehen sich freilich nur auf die schon erwähnte Combination von Gehirntuberkeln mit dem erwähnten Knochenleiden. Dagegen beobachtete ich bei einem 12jährigen skrophulösen Mädchen einen colossalen Hirnabscess, welcher fast den ganzen Vorderlappen der rechten Hemisphäre einnahm, in Verbindung mit einer Caries der Lamina cribrosa des Siebbeins. In diesem Falle hatten viele Wochen lang gewaltige neuralgische Schmerzanfälle in der Region des Nerv. supraorbitalis dexter bestanden, deren Linderung nur durch Morphiuminjectionen möglich war, während die Intervalle fast ganz frei von krankhaften Erscheinungen waren und nur der Druck auf den Orbitalrand, besonders nach der Nasenseite hin, Schmerz erregte. Ganz plötzlich traten heftige epileptiforme Krämpfe, Sopor und Hemiplegie auf, welche nach wenigen

⁵⁾ Berl. klin. Wochenschr., 1882 No. 13.

Tagen mit dem Tode endeten. Sie ersehen daraus, dass die Krankheiten der Nasenhöhle (chronische Rhinitis) bei Kindern, zumal skrophulösen, mit nicht geringerer Sorgfalt behandelt werden sollten, als diejenigen des Ohrs, deren gefährliche Ausgänge längst gewürdigt sind.

XIV. Die atrophische Cerebrallähmung.

Wie die „spinale“ Kinderlähmung kann auch die cerebrale Form sich bis in ein höheres Lebensalter hineinziehen und erst in diesem zur Beobachtung des Arztes gelangen. Weit häufiger aber geschieht dies noch im Kindesalter und zwar schon in den ersten Lebensjahren. Die betreffenden Kinder bieten Ihnen das Bild einer mehr oder weniger vollständigen Hemiplegie mit oder ohne Theilnahme des Facialis und anderer Hirnnerven dar. Die obere Extremität ist in ihren Bewegungen meistens erheblich beeinträchtigt, als die untere, welche oft noch zum Gehen benutzt, aber nachgeschleppt wird. Die Lähmung ist entweder angeboren, macht sich also schon gleich nach der Geburt bemerklich, oder entsteht in der ersten Lebenszeit, etwa im Alter von 2–6 Monaten, in der Regel nach einem fieberhaften septischen Vorstadium und mehr oder minder heftigen Convulsionen, also in ähnlicher Weise, wie auch die allerdings nur selten vorkommende hemiplegische Form der spinalen Kinderlähmung zu Stande kommen kann. Diese Aehnlichkeit tritt mit der Zeit noch mehr hervor, indem sich auch hier allmählig Contracturen und Atrophie der gelähmten Theile anbahnen, welche schliesslich nicht nur magerer und welker als die gesunden, sondern auch kürzer und verkümmert erscheinen. Den Unterschied von der spinalen Kinderlähmung bildet aber zunächst die stets halbseitige Erscheinungsform, dann aber vor allem der lange Fortbestand der elektrischen Contractilität der gelähmten Muskeln, welche erst erlischt, wenn die Atrophie derselben bis zum äussersten Grade fortgeschritten, d. h. überhaupt kein normales Muskelgewebe mehr vorhanden ist. Dieser Fall ist aber ein seltener, vielmehr kommt die Atrophie der Glieder in der cerebralen Form nur sehr langsam, erst nach mehrjähriger Dauer zu Stande, und erreicht fast nie die hohen Grade, welche die spinale Paralyse so häufig darbietet. Dennoch habe ich in einigen Fällen sogar eine deutliche Verkürzung der betreffenden Extremität, und verminderte Dimensionen der Hand beobachtet¹⁾. Sensible Störungen werden auch hier selten beobachtet, gewöhnlich aber leidet mehr oder weniger die Entwicklung der Sprache und der

¹⁾ Vergl. Seeligmüller, *Jahrb. f. Kinderheilk.* N. F. XIII p. 256. — Förster, *ibid.* XV, p. 268.

Intelligenz, welche alle Zwischenstufen von leichtem Stumpfsein bis zum völligen Idiotismus darbieten kann. Sehr häufig gesellen sich auch epileptiforme Anfälle hinzu, welche das Bild der Krankheit vervollständigen. Wie bereits erwähnt, können zwar solche Kinder, die ihren Angehörigen nur eine Last sind, zu einem Alter von 20 und mehr Jahren heranwachsen, die meisten aber sterben früher, sei es in einem convulsischen Anfall, im Sopor oder in Folge einer zufälligen Complication.

Die stete Unheilbarkeit dieses Zustandes ist in seinen anatomischen Verhältnissen begründet. Es handelt sich nämlich hier um eine Atrophie oder um einen vollständigen Mangel einzelner Hirnpartien, z. B. eines Theils der Windungen einer Hemisphäre, eines halben oder ganzen Lappens, der grossen Hirn ganglien u. s. w., welcher dann durch Anhäufung von Serum, oft auch gleichmässig durch Verdickung der Schädelknochen ersetzt wird. Einen der exquisitesten Fälle dieser Art beschrieb ich schon in meiner Inauguraldissertation ¹⁾.

Mädchen von 18 Jahren, gesund geboren, im Alter von 3 Monaten Convulsionen, nach welchen rechtsseitige Hemiplegie zurückblieb. Später Atrophie der betroffenen beiden Extremitäten bis zur Verkümmernng. Sehevermögen normal. Cerebralmotoren frei von Lähmung. Flexionsstellung der Finger. Intelligenz fast auf dem Stande des Hysterus bei einseitigen, doch ungelähmten Extremitäten. Tod an Phthisis. Section: Linke Schädelhälfte ²⁾, Zell schmäler als die rechte, linkes Stirnhirn verdickt. Der mittlere obere Theil der linken Hemisphäre fehlt ganz und ist durch eine mit Serum gefüllte Cyste ersetzt, welche bis an den vorderen Ventrikel reicht. Dieser ist stark erweitert und mit Serum angefüllt. Corpus striatum und Thalamus opticus bis auf die Hälfte des normalen Volumens geschrumpft. Diese Atrophie setzte sich zum Theil in gekreuzter Richtung dergestalt fort, dass der Tractus opticus, die Eminentia mamillaris, das Crus cerebri, der Pons links und die Pyramide der rechten Seite erheblich dünner erschienen, namentlich von der Pyramide kam der vierte Theil übrig war.

In allen diesen Fällen findet man eine durch regressiv Metamorphose (Verfall zu Körnchenzellen) bedingte Atrophie der Pyramidenfasern, die, von der atrophischen Hirnpartie ausgehend, sich in gekreuzter Richtung bis in die gegenüberliegende Hälfte des Rückenmarks verfolgen lässt. Dagegen fehlt uns eine völlig klare Einsicht in das Wesen der eigentlichen Erkrankung. Fälle, wie der eben erwähnte, können auch schon angehören sein, und es muss sich also entweder um einen fötalen oder erst einige Monate nach der Geburt entstandenen encephalitischen oder hämorrhagischen Process handeln, durch welchen der befallene Hirntheil völlig zertrimmert wird. Mit der Zeit kommt es in Folge einer reactiven Entzündung der nächsten Umgebung zu einer cystenartigen

¹⁾ Brauch, De atrophia cerebri. Berlin 1842.

Abkapselung der zertrümmerten Gehirnmasse, welche allmählig verfestet und resorbiert wird, und an deren Stelle schliesslich ein mehr oder weniger klares Serum den Inhalt der Cyste bildet.¹⁾ In anderen Fällen findet man zwar mehr oder weniger von dieser Form abweichende Veränderungen, deren Entwicklung indess auf dieselbe Weise gedeutet werden muss.

Elisabeth K., 12 Jahre alt, in die Klinik aufgenommen am 8. Januar 1879. leidet seit ihrer frühen Kindheit an aussergewöhnlich sich wiederholenden epileptischen Anfällen, mittlerer 3—5 mal an einem Tage, dann wieder Wochen lang pausierend. Dabei besteht, so lange sie denken kann, eine rechtsseitige Lähmung, besonders des Arms. Die Aufnahme erfolgte wegen Phthisis pulmonalis. Bis in der Klinik beobachteten Anfälle waren entschieden epileptischer Art und betrafen vorzugsweise die rechtsseitigen (gelähmten) Extremitäten, den Kopf, die Augen und den rechten Facialis. Der gelähmte rechte Arm war nur in sehr beschränkter Weise bewegbar, mässig atrophisch und im Ellenbogengelenk leicht flexibel. Nach dem am 25. erfolgten Tode ergab die Section folgende Veränderungen im Gehirn: Pia mater an der Convexität beider Hemisphären stark oedematös. Alle Gyri linksseits sehr klein und schmal, Sulci sehr tief. In den Furchen reihen sich der zweiten und dritten Stirnwindung, sowie in der Centralfurcha ist die Pia verdickt und nur sehr schwer abzulösen. Die betroffenen äusseren Gyri zeigen eine Depression und rostbraune Farbe, welche offenbar von früheren Hämorrhagien herrührt. Rechtsseits alles normal. Die erwähnte grubenförmige Depression ist von zerörter Pia ausgefüllt, welche von der Arachnoidea überspannt wird, ausgefüllt.

In diesem Falle scheint sich ein ursprünglicher Bildungsfehler (Kleinheit sämtlicher Gyri der linken Convexität) mit einem später hinzugegetretenen hämorrhagisch-exsudativen Leiden der Meningen an der bezeichneten Stelle combinirt zu haben. Durch den Druck des Exsudats entstand die Atrophie und Depression der Frontalwindungen, welche dann allmählig durch Serum ersetzt wurde. Gleichzeitig liefert dieser wie auch der folgende Fall ein Beweis für die früher (S. 246) erwähnte Thatsache, dass Affectionen der betreffenden Rindenpartie Lähmungs- und Reizungserscheinungen auf der gegenüberliegenden Körperhälfte erzeugen können.

Margarethe G., 5jährig: in die Klinik aufgenommen am 11. Juli 1875, gesund bis zum Alter von 1½ Jahren. Um diese Zeit heftige Erschütterung durch Achenbruch bei einer Spazierfahrt. Einige Tage darauf nach einem langen Ruhe plötzlich linksseitige Hemiplegie. Mit der Zeit Besserung bei ganz geistiger Entwicklung. Erst seit dem Frühjahr 1875 Störung der Sprache, indem Worte, die vorher schon geläufig gesprochen wurden, nicht mehr herauszubringen waren; dabei Veränderung des Charakters, Zerstreuungsucht, grosse Heftigkeit, Gang unsicher und schwankend. Die Hemiplegie bestand jetzt nur noch in einer geringeren Energie der linksseitigen Extremitäten, welche atrophisch sind. Tod am 24. September durch Diphtherie. — Section: Pia mater rechts entsprechend der oberen

¹⁾ Kundrat, die Porrocephalie. Eine anatomische Studie. Graz 1882.

Frontalwindung beträchtlich verdickt, weißlich und undurchsichtig, adhärent an dieser Stelle fester fest an der Hemisphäre, welche atrophisch und sehr dünn erscheint. Die ganze rechte obere Frontalwindung stark atrophisch; etwas weniger, aber immer noch merkbar atrophisch ist auch der übrige Theil des Stirnlappens. Die verkleinerte Windung ist zugleich eigenthümlich durchscheinend und interior betroffen, bis auf das hintere Drittel, welches stark verdickt und weißlich gefärbt erscheint. Sonst alles normal.

Weit seltener, als die bisher beschriebenen Fälle kommen solche mit doppelseitiger Atrophie der Gehirnssubstanz vor, wodurch krankhafte Erscheinungen auf beiden Seiten des Körpers entstehen können.

Ein 6 jähriger Knabe *) aufgenommen am 20. Juli 1874, hatte im 6. Lebensalter die Mäuser überstanden. Bald darauf „Krämpfe“, welche sich acht Tage hintereinander häufig wiederholten, dann immer seltener wurden und zuletzt nur noch sehr selten auftraten. Gleich nach dem ersten Krampfanfall soll sich das jetzige Leiden entwickelt haben. Eine wirkliche Paralyse war nirgends bemerkbar, wohl aber eine weit verbreitete Rigidität der Muskeln. In jeder Stellung erstarren beide obere Extremitäten stark mit geringer Biegung im Kniegelenke, jede Flexion oder Extension wegen der Spannung des Beuge- und Streckmuskels nur schwer zu bewirken. Die oberen Extremitäten, besonders die rechte, im Ellenbogengelenke fixirt. Extension sehr schwer, vom Kranken allein nicht ausführbar. Schlaf des Knaben auf die Füße gestellt und zum Gehen aufgefordert wurde, trat augenblicklich eine starke Contraction der Wadenmuskeln ein mit Per-vascularstellung des Fußes und gleichzeitiger starker Dorsalflexion der Zehen, so dass Stehen und Gehen absolut unmöglich war. Auch in den Hand- und Fingergelenken geringe Contractur; beim Greifen von Gegenständen ungewöhnliche charakteristische Bewegungen bemerkbar. Sprache stotternd, unklar, schwer verständlich, die geringe Energie sehr abgeschwächt, sonst alles normal. Tod durch Diphtherie am 12. — Section: Verkürzung des rechten Armes um 2½ Cms. von der Achsel bis zum Proc. styloid. rechts mit Atrophie der Musculatur. Das Schädeldach zeigt leichte Asymmetrie, indem das rechte Schädelsknochen stärker gewölbt und grösser als das linke, und der schräge Durchmesser (von vom links nach hinten rechts) grösser als der entsprechende der anderen Seite ist. Dura normal. Pia auf dem Frontallappen an beiden Seiten der Incisura magna verdickt, trübe und durch eine klare Flüssigkeit klumpenartig abgehoben, nach deren Entfernung die betreffende Hirnpartie eingesunken erscheint. Die erste und zum Theil auch die zweite Frontalwindung beiderseits atrophisch, Gyri kaum ½ so breit, als die normalen, sehr weich, auf dem Durchschnitt gleichmässig grauweißlich. Auch der vordere Theil des Markes abnorm beschaffen und atrophisch. Die dritte Frontalwindung nur in geringem Masse beteiligt. Insula normal. Corpus callosum, Fornix und Septum pellucid. ebenfalls atrophisch. Seitenventrikel stark erweitert, mit Serum angefüllt, besonders die Vorderhörner, welche einen grösseren Raum einnehmen, als Seitenkammern und Hinterhörner zusammen. Ependym aller Ventrikel stark verdickt, sehr fein körnig. Sonst keine Abnormität.

So mancher Fall von „spastischer Spinalparalyse“, welcher nicht zur Section kam, mag auf solchen doppelseitigen Defecten der Gehirns-

*) Clarck-Annalen. Jahrg. 1. S. 367.

substanz beruhen, besonders solche, die mit einer geschwächten oder ganz liegenderliegenden Intelligenz einhergehen (S. 231).

Die mikroskopische Untersuchung der atrophischen Gyri in diesen Fällen ergibt einen sklerosirenden Process, d. h. eine Zertrümmerung und schliesslich Schwund der eigentlichen Nervelemente, an deren Stelle eine interstitielle Wucherung der Neuroglia, Fettkörnchenzellen und mehr oder minder zahlreiche Corpora amylacea treten. Oft geben auch Hämatoidenkrystalle noch Kunde von ursprünglich stattgehabten hämorrhagischen Vorgängen. Diese sklerotischen Atrophien scheinen also die letzten Ausläufer fötaler oder in frühester Kindheit entwickelter encephalitisch-hämorrhagischer Prozesse darzustellen, zu welchen noch eine exsultative Entzündung der bekleidenden Pia als comprimirendes Element hinzutreten kann. Auch die bei Kindern sehr seltenen Fälle von Sclerosis cerebri, welche nicht die Rindensubstanz, sondern andere Hirnpartien betreffen, gehören wohl in dieselbe Kategorie.¹⁾ Dass unter solchen Verhältnissen die Prognose eine absolut schlechte und die Therapie machtlos sein muss, lehren die mitgetheilten und viele andere Fälle. Will man durchaus etwas thun, um den Ansprüchen der Eltern gerecht zu werden, so bleibt nur die Anwendung der Elektrizität übrig, welche hier vielleicht noch besser als in der spinalen Kinderlähmung die Muskelatrophie aufzuhalten vermag. Auch Frictionsen der Glieder, anregende Bäder, Gymnastik sind hier wie dort am Platze. Die Muthlosigkeit des Arztes tritt aber wegen der gleichzeitigen Beeinträchtigung der Intelligenz, die bis zum Idiotismus steigen kann, hier viel früher ein, und das unglückliche Kind blüht schliesslich als eine Last der Familie seinem Schicksal überlassen.

XV. Der chronische Wasserkopf. Hydrocephalus chronicus.

Das einzig sichere Kennzeichen dieser Krankheit ist die mehr oder weniger schnell zunehmende Volumsvermehrung des Kopfes, welche durch den wachsenden Druck einer die Gehirnentrikel füllenden Flüssigkeit bedingt wird. Geringe Grade des Hydrocephalus, in welchen die Vergrösserung des Kopfes fehlt, sind unserer Diagnose nicht zugänglich. Mehr als 100 Grm. Serum können sich in den erweiterten Gehirnhöhlen von Kindern finden, die an verschiedenen kachektischen, besonders tuberkulösen Krankheiten gestorben sind, ohne dass während des Lebens

¹⁾ Van Golt Hooedemaker, Deutsches Archiv f. Klin. Med. XXIII. p. 443. — Förster, l. c. p. 272.

irgend ein Zeichen diesen Befund vermuthen liess. Von allen diesen Fällen ist hier nicht die Rede.

Andererseits darf aber ein ungewöhnlich grosses Volumen des Kopfes für sich allein nicht sofort zur Annahme eines Hydrocephalus verleiten. Oft genug wurden mir Kinder vorgestellt, welche von Aerzten zum Schrecken der Eltern für hydrocephalisch erklärt worden waren, weil ihr Kopf sehr voluminos, die Fontanellen und Nähte noch nicht geschlossen waren, und doch konnte ich den Eltern bald die beruhigende Versicherung geben, dass ihre Besorgnisse unbegründet seien, dass kein Hydrocephalus, sondern nur ein rachitischer Schädelbau vorlag, welcher die Aerzte irre geleitet hatte. Ich gebe zu, dass die Diagnose mitunter schwer ist, wenn man eben nur die Grösse und die gehemmte Ossification des Schädels in Betracht zieht, aber die sorgfältige Beobachtung der Intelligenz, der Bewegungen, des Blickes wird bald die Entscheidung bringen. Nur in denjenigen Fällen, in welchen eine Combination von Rachitis mit Hydrocephalus stattfindet, wird man eine Zeit lang in der Diagnose schwankend sein können.

Die meisten Kinder mit Hydrocephalus chronicus kommen schon im ersten Halbjahr des Lebens zur ärztlichen Beobachtung, weil die stete Zunahme des Kopfumfanges, welche mit dem Wachstum des übrigen Körpers nicht gleichen Schritt hält, die Aufmerksamkeit der Angehörigen sehr bald erweckt. Die Volumenzunahme ist Anfangs nicht sehr erheblich, so dass man versucht sein kann, sie überhaupt in Abrede zu stellen und eine Täuschung der Mutter durch die im früheren Kindesalter stets vorhandene Präponderanz des Kopfumfanges anzunehmen; bald aber entscheidet die Messung, welche mit einem Centimetermaass in der Art vorgenommen wird, dass man 1) die Circumferenz des Kopfes [Glabella und Tuber occipitale als Mittelpunkte genommen] 2), den Querdurchmesser (von einem Proc. mastoid. über den Scheitel hinweg zum anderen), und 3) den Längsdurchmesser (von der Nasenwurzel über den Scheitel zum Tuber occipitale) bestimmt. Man kann dabei alle 8—14 Tage eine Zunahme der Masse um 1 Ctm. und mehr nachweisen. Die meisten hydrocephalischen Schädel zeichnen sich durch eine starke Prominenz des Stirnbeins und ein seitliches Herausdrängen der Scheitelleine aus, welches besonders deutlich wird, wenn man den Schädel von oben betrachtet; nur ausnahmsweise kam mir eine dolichocephalische

1) Bei Neugeborenen beträgt der Kopfumfang im Durchschnitt 33—40 Ctm., von 6—12 Monaten etwa 40—45 Ctm. und nimmt von allmählig bis 50 Ctm. zu, welche er etwa im 12. Jahre erreicht (Steffen).

Form, d. h. eine Verlängerung des Längsdurchmessers mit seitlicher Abdachung des Schädels in Verbindung mit colossaler Hydrocephalie vor. Fast immer sieht man die subcutanen Venen zu blauen Strängen erweitert. Die Betastung des Schädels ergibt constant ein Stehenbleiben der Ossification; alle Fontanelleu, besonders die grosse, sind weit geöffnet, die Suturen klaffend, so dass man die fibröse zwischen den Knochen ausgespannte Membran durch den Druck des Gehirnwassers vorgetrieben, elastisch und mehr oder weniger deutlich fluctuirend fühlt. Mitunter, aber nur in sehr hochgradigen congenitalen oder sehr früh entstandenen Fällen, wo die Knochenbildung noch äusserst mangelhaft war, konnte ich inmitten dieser fluctuirenden Membran, welche die Schädelknochen mit einander verband, zerstreute Knochenkerne fühlen, und in einem dieser Fälle war die Membran dicht über der Schuppe des Hinterhauptbeins zu einem walnussgrossen runden Divertikel herausgestülpt, welches, wie die Probepunction ergab, mit Flüssigkeit gefüllt war und als eine Art von Meningocele betrachtet werden musste. Die Annahme, dass hier gleichzeitig ein Hydrocephalus externus, d. h. Wasserausammlung unter der Dura mater bestand, wurde durch die Section bestätigt.

In Folge der bedeutenden Volumszunahme wird der Kopf allmählig so schwer, dass die Kinder denselben nicht aufrecht tragen können. Ohne Stütze folgt er nur dem Gesetz der Schwere, schwankt hin und her. Der mächtige Schädelumfang contrastirt mit der Kleinheit des Gesichts, welches durch zunehmende Atrophie noch kleiner und fast dreieckig sich gestaltet. Auffallend ist dabei der eigenthümlich starre Blick, oder die schon von den alten Aerzten hervorgehobene Stellung der Bulbi nach unten, wobei die Iris zur Hälfte vom unteren Augenhilde bedeckt und ein grosser Theil des oberen Skleraabschnittes anhaltend sichtbar sein kann. Die Ansicht, dass diese, übrigens nicht constante Augenstellung durch Abwärtsdrängung der Orbitalplatte des Stirnbeins entstehen soll, ist deshalb unsicher, weil in diesem Falle immer eine Raumbeschränkung der Augenhöhle und dadurch Exophthalmus entstehen muss. In der That findet man einen gewissen Grad des letzteren nicht selten und überzeugt sich dann auch durch die Palpation, dass die knöcherne Decke der Orbita herabgedrückt und pergamentartig verdünnt ist. In einem Falle dieser Art fand ich aber bei der Section zu meiner Ueberraschung die Orbitalplatte des Stirnbeins in normaler Lage und kann daher nur annehmen, dass der während des Lebens herabgedrückte sehr dünne Knochen nach der Entfernung des auf ihn lastenden Gehirns sich wieder gehoben hatte. Die Stellung des Bulbus nach unten wird gewiss weit häufiger durch eine partielle Paralyse des Oculomotorius,

ähnlich desjenigen Zweige bedingt, welche den Rectus superior versorgen, wobei der Rectus inferior das Uebergewicht erhält. Denn häufig kommen auch Lähmungen anderer Zweige desselben Nerven vor, welche statt des Schließens nach unten einen Strabismus divergens oder andere abnorme Augenstellungen, auch mehr oder weniger entwickelte Ptosis zu Stande bringen. Nur sehr selten weicht der Blick auf die Stellung der Bulbi von der normalen in keiner Weise ab. Der Augenspiegel ergiebt meistens eine Druckatrophie der Papilla N. optici und Venenektase der Retina durch die in Folge der Compression entstehende Erschwerung des Blutrückflusses in dem Sinus cavernosus. In den meisten Fällen bleibt die Entwicklung der Intelligenz weit hinter der normalen zurück. Die Kinder sind im hohen Grade apathisch, scheinen weder deutlich zu sehen noch zu hören, kennen ihre Umgebung nicht und bieten nicht selten das Bild eines vollständigen Idiotismus dar, wobei der Speichel aus dem halbgeöffneten Munde rinnt und die Haut der Unterlippe und des Kins macerirt. Dies ist indess keineswegs immer der Fall, ja man ist mitunter erstaunt über den Grad von Intelligenz und Sinnesenergie, welcher selbst in entwickelten Fällen von Hydrocephalus noch erhalten sein kann. So beobachtete ich ein 1 1/2 jähriges Kind mit sehr hochgradigem Wasserkopf, welches seine Umgebung erkannte, „Papa“ und „Mama“ rief und mit den Augen allen vorgelagerten Gegenständen folgte. Selbst noch einige Wochen vor dem Tode, der unter heftigen Convulsionen erfolgte, war das Schreemögen vollkommen erhalten, das Kind sprach wie zuvor und kannte seine Mutter, welche es anlächelte. Ähnliche Fälle sind mir wiederholt vorgekommen und enthalten eine Warnung, bei der Diagnose des chronischen Hydrocephalus nicht zu grossen Werth auf ein gänzlichcs Zurückbleiben der Intelligenz zu legen.

Die Motilität der oberen Extremitäten ist in der Regel nicht wesentlich beeinträchtigt, nur bemerkt man oft, dass die Kinder beim Versuch, einen Gegenstand zu fassen, unangemessene Bewegungen machen, welche mit Chorea entfernte Aehnlichkeit haben. Dagegen ist sehr oft Paraplegie vorhanden; beide Beine sind entweder gänzlich gelähmt oder wenigstens unfähig den Körper zu tragen. Von Stehen, Gehen ist keine Rede, oft nicht einmal von einem angestützten Sitzen, und die meisten Kinder kriechen, wenn man sie auf ihre Füsse stellen will, die schlaff herabhängenden Beine, ohne einen Schritt zu versuchen. Auch von dieser Regel giebt es aber Ausnahmen, und die Literatur hat Fälle aufzuweisen, in welchen die Beweglichkeit der unteren Extremitäten fast vollständig erhalten war. Convulsivische Zufälle verschiedener Art, Spasmus glottidis, Verziehen der Augen, Zusammenzucken des Körpers mit einer

Neigung, vorüber zu fallen, endlich allgemeine epileptiforme Anfälle oder Contracturen gesellen sich häufig hinzu. Dabei können alle animalischen Functionen, Athmung, Circulation und Verdauung, sich Jahre lang durchaus normal verhalten, wobei aber doch die Ernährung beträchtlich leidet, und die Kinder schliesslich in einen atrophischen Zustand verfallen, welcher in Folge des Contrastes das Volumen des Kopfes um so gewaltiger hervortreten lässt. Wenn nun auch die meisten dieser Kinder schon während der ersten Lebensjahre durch Atrophie und Marasmus oder in einem convulsivischen Anfalle zu Grunde gehen, so müssen Sie doch die Prognose der Krankheitsdauer nur vorsichtig stellen. Anscheinend verzweifelte Fälle erreichten nicht selten ein Alter von 5—6 Jahren und darüber, und es fehlt auch nicht an Beispielen, in welchen die Krankheit sich bis in die Jünglingsjahre und noch weit länger hinauszog.

Die Section ergiebt zunächst eine durch den Druck des ausgedehnten Gehirns bewirkte, mehr oder minder starke Verdünnung der Schädelknochen, welche oft schon bei Lebenden durch die Palpation erkennbar sein kann. Bei einem 9 Monate alten Kinde, dessen Intelligenz nicht wesentlich zurückgeblieben war und welches nirgends eine Spur von Paralyse zeigte, fand ich diese Verdünnung und das Schwinden der Diple bis zur Transparenz fortgeschritten, so dass man durch die Knochen hindurch deutlich die Farbe und Blutgefässe der Dura mater sehen konnte. Fontanellen und Nähte erscheinen weit klaffend, die Diastase der letzteren durch fingerbreite oder noch breitere fibröse Membranen, welche eingesprengte Knochenkerne enthalten, geschlossen. Das grosse Gehirn besteht aus zwei mehr oder minder schlaffen schwappenden Säcken, den saum erweiterten, mit seröser Flüssigkeit gefüllten Seitenventrikeln, welche von einer verdichteten, mitunter nur wenige Centimeter dicken Gehirnmasse schalenartig umgeben sind. Die Menge dieser Flüssigkeit beträgt im Durchschnitt 250—300 Gr., kann aber bis auf 1 Liter und mehr steigen. Etwas ist in derselben gar nicht oder nur in sehr geringer Menge enthalten. An der umgebenden Schale, zu welcher die Gehirnmasse der Hemisphären comprimirt ist, sieht man noch deutlich die Grenzen der grauen und weissen Substanz. Sowohl die Gyri wie die grossen Hirnzuglien sind durch den Druck abgeflacht. Auch der 3. und 4. Ventrikel sind häufig erweitert und mit Flüssigkeit gefüllt, ja selbst den Ventr. septi pellucidi sah ich wiederholt an dieser hydrophischen Dilatation Theil nehmen. Fast immer findet man die Centralgebilde (Corpus callosum, Fornix u. s. w.) ungewöhnlich fest, sobald nur das Gehirn möglichst frisch untersucht wird. Das Ependyma ventricu-

lönne hat meistens eine fein granulirte Oberfläche und erscheint wie bestäubt mit äusserst kleinen grau durchscheinenden Körnchen, welche sich mikroskopisch als Hyperplasie des Ependyma ausweisen. Nur selten finden sich Fetzen fibrinösen Exsudats, welche das Foramen Monroi verlegen und dadurch die Communication der Höhlen untereinander verhindern können. Die Grade der beschriebenen Veränderungen sind natürlich sehr verschieden; insbesondere bietet die Erweiterung der Ventrikel und die Dicke der comprimierten Hemisphärenmasse grosse Differenzen dar. Als Beispiel einer selten hochgradigen Entwicklung mag der folgende Fall dienen:

Anna P., 3 Monate alt, aufgenommen am 26. März 1877 mit Hydrocephalus chronicus. Ernährung leidlich. Circumferenz des Kopfes 45, Längsdurchmesser 25, Querdurchmesser 27 Cm. Bulbi abwärts gerichtet. Nervöse Störungen nicht bemerkbar, das Kind sitzt in normaler Weise die Flasche, schreit viel und häufig, und weicht in seinem ganzen Verhalten von dem eines gesunden Kindes nicht ab. Vom 3. April an Collaps, Bruchhämorrhagie. Tod am 7. — Section: Nach Entfernung des sehr dünnen dolichocranialischen Schädeltaches und Einscheiden der Dura mater blüht man in eine mit Wasser vollständig gefüllte Schädelhöhle, in deren unterem Grunde ein länglicher Klumpen als Rest des Gehirns sichtbar ist. Bei näherer Untersuchung ergibt sich, dass die Hemisphären des grossen Gehirns fast gänzlich verschwunden sind. Unter der normal erhaltenen Dura mater zeigen sich nur stellenweise papillöse Platten, Leisten und Streifen mit einem in die Pia eintretenden Gefässzuge, die sinnigen Reste der verschwundenen Hemisphären, deren Kavit. eine den ganzen Schädel füllende klare wässrige Flüssigkeit einnimmt. Dem auf dem Schädelgerüste befindliche verbleibende Klumpen besteht aus dem Rest der grossen Hirnganglien, zu welche sich das Cerebellum und das Rückenmark in normaler Weise anschliessen. Weisse Theile, wie die Hirnnerven und Gefässe sind völlig intact.

Obwohl bei diesem Kinde die Compression der Hemisphärenmasse fast bis zum völligen Schwunde derselben gediehen war, sehen wir doch alle Functionen in normaler Weise vor sich gehen, und das ganze Verhalten von dem eines gesunden Kindes gleichen Alters in keiner Weise abweichen. Von einem „psycho-motorischen Centrum“ war hier gewiss keine Rede mehr, und der Fall liefert daher einen klinischen Beweis für die Ansicht, dass sämtliche Activen der Neugeborenen als unwillkürliche (reflexorische, automatische) aufgefasst werden müssen. —

Ueber die Pathogenese des Hydrocephalus chronicus sind wir nicht durchweg im Klaren. Dass derselbe in einer Reihe von Fällen angeboren ist, also schon im Fötusleben sich entwickelt, steht fest; er kann unter diesen Umständen ein erstes Geburtshinderniss abgeben, welches auf operativen Wege beseitigt werden muss. In diesen Fällen findet man bisweilen gleichzeitig verschiedenartige Hemmungsbildungen, Defecte

des Balkens, des Fornix u. s. w., ferner Spina liffida, Klumpfüße und -Hände u. s. w. Weit häufiger aber kommen die Kinder scheinbar gesund zur Welt, und erst einige Monate nach der Geburt fällt die ungewöhnliche Volumenzunahme des Schädels den Angehörigen auf. Was geht nun hier vor? Die eigenthümlich körnige, hyperplastische Beschaffenheit des Ependyma, welches sich bisweilen sogar in den Streifen von der Ventrikelwand abheben lässt, spricht für einen schleichend verlaufenden entzündlichen Zustand des Ependyma, welcher entweder schon im Fötusleben, oder erst einige Zeit nach der Geburt beginnt, und zwar so unmerklich, dass die Ausdehnung des Kopfes durch den stets zunehmenden Druck der Ventrikelflüssigkeit das erste Zeichen der Krankheit bildet. Diese entzündliche Anschauung passt aber nicht für alle Fälle von chronischem Hydrocephalus, weil auch die granulierte Beschaffenheit des Ependyma und damit jeder Anhalt für einen irritativen Vorgang innerhalb der Ventrikel fehlen kann. Ebenso werden comprimirende Anlässe (Tumoren), von welchen oben (S. 242) die Rede war, nur in dem kleinsten Theil der Fälle, und am seltensten in den congenitalen oder sehr frühzeitig entstehenden angetroffen, und es bleibt dann zur übrig, sich mit der unbefriedigenden Annahme eines „Bildungsfehlers“, einer excessiven „Secretion von Cerebrospinalflüssigkeit“ zu behelfen. Die Anhänger der entzündlichen Theorie pflegen sich auf die immerhin nicht häufigen Fälle von Hydrocephalus zu stützen, welche sich bei älteren Kindern, also etwa von der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres an nach vorausgegangenen meningitischen Erscheinungen entwickeln können. Ich selbst habe einige Fälle dieser Art beobachtet, die aber nur dann Beweiskraft haben, wenn durch die Section der Sitz des Wassers in den Ventrikeln und die Veränderung des Ependyma nachgewiesen ist. Geschieht dies nicht, so bleibt man im Zweifel, ob es sich in der That um einen Hydrops ventriculorum oder um eine Wasseraufhäufung zwischen den Hirnhäuten (Hydrocephalus meningealis, s. externus) handelt, deren klinische Unterscheidung von dem inneren Wasserkopf durchaus keine leichte Aufgabe ist.

Die französischen Autoren (Legendre, Billiet-Barthez u. A.) beschrieben diesen Hydrocephalus meningealis, wie ich schon (S. 238) bemerkte, als das zweite Stadium der Hämorrhagie im „Sack der Arachnoidea“. Nach unserer jetzigen Auffassung handelt es sich hier aber nicht um eine eigentliche Hämorrhagie, sondern um einen mit Blutextravasaten einhergehenden entzündlichen Process auf der inneren Fläche der Dura mater (Pachymeningitis), welche in mässiger Intensität und Ausdehnung, wenn auch nicht so häufig wie bei alten Leuten, doch auch

bei Kindern nicht ganz selten vorkommt. Ich selbst habe mehr oder weniger dicke fibrinöse, blutig gefärbte Auflagerungen auf der inneren Fläche der Dura, mit grösserer oder geringerer Ansammlung röthlichen Serums zwischen dieser und der Arachnoidea, unter verschiedenen Verhältnissen gefunden, ohne dass während des Lebens ein bestimmter Symptomencomplex an einen solchen Befund denken liess, und dass selbst in hochgradigen Fällen alle Symptome fehlen können, ist durch die Erfahrung bewiesen¹⁾. Dagegen ist mir bisher noch kein einziger Fall von Pachymeningitis auf dem Leichentische vorgekommen, welcher den Beobachtungen der französischen Autoren entsprochen, d. h. wo die Masse der Flüssigkeit durch ihren Druck die Schädelkapsel hydrocephalisch ausgedehnt hätte. Ob der folgende Fall, auf den ich hier zurückkommen muss²⁾, als ein solcher „pachymeningitischer“ Hydrocephalus aufzufassen ist, dürfte, da er geheilt wurde, nicht zu entscheiden sein:

Paul W., 3 Jahre und 2 Monate alt, am 14. Februar 1862 zuerst vorgestellt, früher gesund. Seit 8 Wochen Klagen über Kopf- und Nackenschmerzen, Neigung zur Retroversio capitis, abendliches unregelmässiges Fieber, Hämie und Abmagerung. Die Untersuchung ergab: Unmöglichkeit den Kopf aufrecht zu halten, Retroversio desselben, Nackenschmerz bei Druck und Bewegung, Stirnschmerzen. Gehen und Stehen unmöglich, aber keine Paralyse, Anorexie und Obstipation. Nachmittags nässiges Fieber, Puls 96—100, regelmässig. Antiphlogose (Blutegel und Einreibungen von Unguent. mercur. in Hinterhaupt und Nacken) bewirkte bis zum 19. eine bessere Kopfhaltung; aber schon am 20. neue Steigerung mit Erbrechen, heftigem Stirn- und Nackenschmerz und starker Retroversio des Kopfes (Calomet 0,03 3mal täglich). Die Schmerzen verstärkten besonders zwischen 11—3 Uhr Nachmittags, gleichzeitig mit dem Fieber (Vesicator von Thalsegrösse am Hinterhaupte). Geringe Besserung durch Chlorin, während Erbrechen, Zähneknirschen im Schlaf und ein gewisser Grad von Incontinentia urinae neu auftraten. Erst am 22. März waren Fieber und Schmerzanfälle gänzlich verschwunden, und der Kopf konnte besser nach vorn bewegt werden, erschien aber aus stark vergrössert, und die Untersuchung ergab eine Diastase der Scheitelbeine. Diese Erscheinungen nahmen täglich zu, so dass am 26. das Kind gestülpt war, statt seiner Mütter diejenige des Vaters zu tragen. Sutura sagittalis klaffend und leicht eindrückbar, wobei die Mutter bemerkte, dass dieselbe, wie die anderen Nähte, schon im 2. Lebensjahre fest geschlossen war. Schwache Pulsation an der ehemaligen Fontanelle. Intelligenz ganz normal, der rechte Arm schwächer als der linke, welcher fast ausschließlich gebraucht wurde. Puh regelmässig. (Calomet 0,015 2mal täglich und Ung. mercur. 0,6 täglich in die Kopfhaut einzureiben). Nach 21 Tagen (16. April) Durchmesser des Kopfes unverändert, dasselbe wird aber gut aufrecht getragen und nicht mehr retrovertirt. Der rechte Arm wieder gut beweglich. Allgemeinbefinden ungestört. (Behandlung auf dieselbe Weise noch 4 Wochen fortgesetzt, dann Ol. jecoris 2mal tägl. 1 Kinderlöffel). Mitte Mai liess das Kind an zu laufen, und am 11. Juni war bis auf die Vorhaut-

¹⁾ Meyer, Jahrb. f. Kinderheilk. 1873. VI.

²⁾ Beurr. zur Kinderheilk. N. F. S. 28.

zwischen des Kopfes jede Spur der Krankheit verschwinden. Die Suturen zeigten bereits wieder beginnende Verknöcherung. Im Mai 1865, also 2 $\frac{1}{4}$ Jahr nach dem Beginn der Krankheit, sah ich das Kind vollkommen gesund wieder; die Schädelnähte waren sämtlich wieder ossificirt.

Dass hier in Folge eines schreckend auftretenden entzündlichen Processes eine Wasserransammlung in der Schädelhöhle zu Stande kam, ist unzweifelhaft, doch muss ich es dahin gestellt sein lassen, ob dieselbe in den Ventrikeln oder zwischen Dura und Arachnoidea stattfand. Sehr wichtig aber erscheint mir die Thatsache, dass noch im 3. Lebensjahre, bei vollkommener Ossification der Nähte und Fontanellen, ein starker intracraneller Druck im Stande war, diese wieder auseinander zu drängen. Dieselbe Erscheinung, nur beschränkt auf die Sutura coronalis, beobachtete ich noch bei einem 7jährigen Knaben, dessen Hydrocephalus sich mit erheblicher Zunahme des Kopfumfanges nach einem Fall vor zwei Jahren entwickelt hatte, und schon Goëlis, Rilliet und Barthex u. A., sprechen von diesem jedenfalls sehr seltenen Ereigniss. Vielleicht muss gerade dieser Umstand, welcher das Gehirn von einem Theil des Druckes entlastet, günstig aufgefasst werden, insofern der Eintritt schwerer Cerebralsymptome dadurch verhütet werden kann. Immerhin zeigt unser Fall, dass selbst bei massenhafter Wasserranhäufung noch eine Resorption und schliessliche Heilung möglich ist, wenn eben der Ursprung der Krankheit ein „metingitischer“ war. Denn es ist kaum begrifflich, auf welche Weise der leere Raum, welcher nach der Resorption der in den Ventrikeln angehäuften Flüssigkeit entstehen muss, ausgefüllt werden soll, da die zu einer dichten Schale comprimirte Hirnsubstanz sich schwerlich wieder zu dem früheren Volumen ausdehnen dürfte. Schon das Bedenken spricht meiner Ansicht nach im obigen Falle zu Gunsten eines Hydrocephalus externus, nach dessen Resorption die Wiederansdehnung des nur schwach von aussen comprimierten Gehirns keine Schwierigkeiten fand. Die Verknöcherung der ligamentösen Nahtsubstanz erfolgte dann allmählig, theils von den Rändern her, theils durch Schalknochen.

Der mitgetheilte Fall veranschaulicht Ihnen zugleich die Behandlung, welche Sie unter diesen Verhältnissen anzuwenden haben. Im Anfange sind topische Bläutentleerungen durch einige hinter den Ohren oder an die Schläfen applicirte Blästegel, Eiskomentationen des Kopfes und Purgamittel zu empfehlen, am besten Calomel (0.015—0.03 ein paar Mal täglich). Später, wenn das entzündliche Stadium vorüber ist und es darauf ankommt, die Resorption der Flüssigkeit anzubahnen, würde ich die Fortsetzung der Mercurialien in kleinen Dosen, Einreibungen des

linguunt, uicet. in Kopf und Nacken (1,0 pro die), auch wohl ein Vesicator im Nacken, vor dessen Anwendung man jetzt mit Unrecht grosses Selten trägt, empfohlen. Auch Jodkali (F. 13) lange Zeit fortgebraucht, ist hier am Platze. Die antiphlogistische Methode gilt aber nur für solche Fälle, in welchen man das erste entzündliche Stadium entweder selbst noch beobachtet hat oder wenigstens nachweisen konnte, was leider nur selten mit Sicherheit möglich ist. Dagegen halte ich den Hydrocephalus chronicus ventricularis, sobald er eine bedeutende Volumvermehrung des Kopfes bewirkt hat, immer für unheilbar. Die Erfolge, welche Gouliis mit seinen Mercurialsalreibungen erzielt haben will, erscheinen mir nach dem, was ich selbst erfahren, äusserst zweifelhaft und auf Täuschungen beruhend. Man lese nur seinen 4. Fall¹⁾, welcher nach einer 30tägigen Cur völlig geheilt worden sein soll, aber sicherlich gar kein Hydrocephalus, sondern nur eine diphtheritische Lähmung war. Mir wenigstens hat weder die Gouliische Methode, noch Jodkali, noch Beginschung des Kopfes mit Jodtinctur irgend etwas geleistet, und ebensowenig kann ich Ihnen von der Compression des Schädels durch Heftpflasterstreifen oder von der Punction durch die Fontanelle (seitlich von der Mittellinie) einen Erfolg versprechen. Wo diese Verfahrensweisen geholfen haben, und dies sind leider nur höchst vereinzelte Ausnahmefälle, da kann aus den oben erörterten Gründen nur ein Hydrocephalus externus bestanden haben. Wer Neigung zum Operiren hat, der möge diese immer befriedigen, da die Gefahr der Meningitis dabei nicht allzugross und der Fall ja doch einmal ein verlirener ist; aber man wird immer gut thun, von Vorherem auf einen radicalen Erfolg zu verzichten.

Gustav P., 3 Monate alt, ist in die Klinik aufgenommen am 13. Juli 1875. Einige Wochen nach der Geburt Zunahme des Kopfes, Zuckungen der Augenmuskeln. Jetzt deutlicher Hydrocephalus. Kopfumfang 40¹⁾ Ctm., Längsdurchmesser 24 Ctm., Querdurchmesser 23 Ctm. Am 18. Punction des rechten Seitenventrikels mit der Pravazschen Spritze und Entleerung von 30,0 einer schwach albuminhaltigen Flüssigkeit. Gleich darauf Druckverband mit Heftpflasterstreifen. Bis zum 21. keine Folgesymptome. Am diesem Tage die zweite Punction; Einführung einer Probe-Canüle von mittleren Caliber, 2¹⁾ Ctm. von der Mittellinie entfernt am seitlichen Winkel der grossen Fontanelle hin in den linken Seitenventrikel, und Aspiration mit dem Dieulafoy'schen Apparat. Entleerung von 120,0 Flüssigkeit. In der darauf folgenden Nacht Convulsionen. Dem 22. Tod. — Section: Hydrocephalus chronicus internus, auch zwischen Dura und Arachnoidea Flüssigkeit. Vom Narkotikum nichts mehr wahrzunehmen. Keine Beirungin. —

Bei dieser Gelegenheit scheint es mir am passendsten, mit einigen

¹⁾ Puget, Abhandl. über die vorzüglichsten Krankheiten des kindlichen Alters. II. 8, 214.

Worten des acuten Hydrocephalus zu gedenken, welcher früher eine so grosse Rolle in der Pädiatrik spielte. Die weitaus grösste Zahl aller unter diesem Namen beschriebenen Fälle ist entzündlichen Ursprungs und gehört der Meningitis tuberculosa an, bei deren Betrachtung ich auf diese Form näher eingehen werde. Zieht man diese Fälle ab, so bleiben nur wenige, in denen man von einer rapide vor sich gehenden Ausschwitzung in den Ventrikeln oder zwischen den Meningen im klinischen Sinne reden kann. Allerdings findet man bei den Sectionen vieler Kinder seröse Ergüsse mit mässiger Erweiterung der Höhlen, die, wenn man nach den Symptomen urtheilen darf, erst seit kurzer Zeit, binnen wenigen Tagen oder noch rascher zu Stande gekommen sein können, und zwar sind es vorzugsweise Kinder mit acuter Miliartuberkulose, mit Morbus Brightii und Scharlachwassersucht, welche am häufigsten diese acute Hydrocephalie darbieten. Sicher zu diagnosticiren sind aber solche Fälle nicht, weil ganz dieselben Symptome auch ohne Wasserbildung in den Ventrikeln durch ein unter denselben Verhältnissen nicht selten vorkommendes Oedem der Pia oder des Gehirns selbst bedingt werden können. Sopor, Convulsionen, lethaler Ausgang in wenigen Stunden oder Tagen, dies alles ist noch nicht dazu angethan, ein eigenes Krankheitsbild zu begründen, wie es z. B. Goellis mit seinem „Wasserschlag“ (Hydrocephalus acutissimus) versucht hat. Gestehen wir lieber ein, dass hier unserem Können, wenigstens bis jetzt, eine Grenze gezogen ist, dass wir acute seröse Ausschwitzungen im Centralorgan, sei es nun in den Ventrikeln, zwischen den Häuten, in der Pia oder in der Substanz, zwar nach den Verhältnissen, in welchen die Kranken zu Grunde gehen, vermuthen, nie aber aus den eben erwähnten cerebralen Symptomen mit Sicherheit diagnosticiren können.

XVI. Hyperämie des Gehirns. Thrombose der Sinus

Die Sectionen zeigen uns, dass der Blutgehalt des kindlichen Gehirns ein sehr wechselnder ist, dass zwischen einer sehr geringen Füllung der Piagefässe, einer blassen anämischen Farbe der grauen Substanz bis zur feinsten Injection des Gefässnetzes und zahlreichen Blutpunkten der Hirndurchschnitte alle nur denkbaren Nuancen liegen, aber der Versuch, diese verschiedenen Füllungsstände des Gefässystems mit bestimmten Symptomen in Beziehung zu bringen, ist fast immer ein vergeblicher. Man kann nur darüber lächeln, wenn einige Autoren so weit gehen, selbst die Hyperämie der Pia von derjenigen des Gehirns klinisch unterscheiden zu wollen. Auch hat man immer zu bedenken, dass Hyperämien, welche bei der Section gefunden werden, ebenso gut die Folgen, wie die Ur-

sachen tödtlicher Cerebralerscheinungen, z. B. sehr heftiger und in die Länge gezogener Convulsionen sein können. Selbst reine Reflexkrämpfe können durch die begleitenden Respirationshindernisse schliesslich eine Stauungshyperämie in den Cerebralvenen herbeiführen, welche mit Oedem der Pia oder des Gehirns und mit serösem Transsudat in den Ventrikeln oder im Sacke der Arachnoidea abschliessen kann.

Die Hyperämie des Gehirns und seiner Hülle kann nämlich, wie jede andere, entweder durch einen verstärkten Andrang von den Arterien her, oder durch eine Stauung des venösen Blutes zu Stande kommen. Die erste Art dürfen wir erwarten bei Hypertrophie des linken Herzventrikels und als Vorstadium entzündlicher Prozesse (Meningitis), mit denen sie dann in klinischer Beziehung zusammenfällt. Ausserdem scheinen locale Reizungsherde (Tuberkel oder Geschwülste) durch Erregung von Hyperämie in ihrer unmittelbaren Umgebung von Zeit zu Zeit „meningitische“ Symptome (Fieber, Erbrechen, Somnolenz, Convulsionen) erzeugen zu können, welche sich entweder spontan oder unter einer antiphlogistischen Behandlung rasch wieder zurückbilden, bei häufiger Wiederholung aber auch zu entzündlich-hämorrhagischer Erweichung oder zu abkapselnder Bindegewebswucherung führen. So weit stehen wir auf dem festen Boden der pathologischen Anatomie. Nun treffen wir aber in der Praxis gar nicht selten auf Fälle, welche man unter Berücksichtigung aller Verhältnisse kaum anders, als durch eine arterielle Hirnhyperämie erklären kann, wenn auch ihre Entstehungsweise nicht immer klar vorliegt und die anatomische Bestätigung glücklicher Weise ausbleibt. Unter den Anlässen, welche hier in Betracht kommen, nimmt wohl der traumatische in Bezug auf Frequenz die erste Stelle ein. Unmittelbar nach einem Fall auf den Kopf kann das Kind betäubt oder gänzlich bewusstlos sein. Doch ist dies keineswegs constant. In drei früher¹⁾ von mir mitgetheilten Fällen dieser Art befanden sich die Kinder gleich nach dem Fall vollkommen wohl, und erst nach einigen Stunden oder Tagen traten anhaltender Kopfschmerz, Apathie, Somnolenz, Gähnen, Farbenwechsel, nächtliche Unruhe, Anorexie, wiederholtes Erbrechen und Fieber ein, wobei der Puls auf 140–160 in der Minute heraufging, aber regelmässig blieb. Eins dieser Kinder litt gleichzeitig an nächtlichen Angst-Anfällen, so dass es aus dem Bette stieg und nach Licht rief, wahrscheinlich in Folge ängstlicher Träume, welche sich einige Wochen nach der Genesung von Zeit zu Zeit wiederholten. Ich gebe zu, dass der erwähnte Symptomencomplex ebenso gut einer Hyperämie des Gehirns

¹⁾ Beitr. zur Kinderheilk. N. F. S. 2.

als einem föhrlren gastrischen Zustande angehören kann. Aber der rasche Eintritt desselben nach einer traumatischen Einwirkung auf den Schädel und vor allem der überraschend schnelle Erfolg der antiphlogistischen Behandlung sichern meiner Ansicht nach die Diagnose. Schon die Application einiger Blutegel hinter den Ohren, deren Stiche ich aber, um zu grossen Blutverlust zu vermeiden, nicht nachbluten liess, genügte um die Symptome erheblich zu mildern. Die blutscnere Therapie, welche in unserer Zeit Platz gegriffen hat, ist hier nicht am Platze. Man kann durch die Emissaria Santorini das Blut direct aus der Schädelhöhle entziehen und darf damit nicht zögern, weil die Vernachlässigung solcher Prodromalsymptome eine wirkliche Meningitis zur Folge haben kann. Gleichzeitig applicire man anhaltend eine Eiskappe auf den Kopf und gebe innerlich Calomel oder Inf. Scamæ comp. und Syrap. spin. cerv. (F. 7) um reichliche Ausleerungen zu erzielen. Unter dieser Behandlung erfolgte schon nach 36—48 Stunden völlige Genesung.

Erwägt man, dass die Symptome der Hirahyperämie nach einem Fall auf den Kopf nur bei einer relativ geringen Zahl von Kindern eintreten, während die meisten ganz frei bleiben oder mit einer vorübergehenden Betäubung davon kommen, so sollte man annehmen, dass neben der Intensität der Commotion noch eine individuelle Disposition zur Erweiterung der kleinen Gefässe eine Rolle spielt. In der That handelte es sich in meinen Fällen um Kinder, welche kurz vorher Keuchhusten oder eine chronische Pneumonie überstanden hatten, oder aus tuberculöser Familie stammten. Auch die Beschaffenheit des Schädels muss wohl mit in Anschlag gebracht werden, denn kleine Kinder mit noch häufigen Fontanelles und Nähten scheinen im Allgemeinen den schlimmen Folgen einer Commotion eher zu entgehen, als ältere, deren Schädelknochen in ihrer ganzen Ausdehnung bereits verknöchert sind.

In einer kleineren Reihe von Fällen sieht man die Symptome der Hyperämie auch ohne nachweisbare traumatische Einflüsse, welche sogar entschieden in Abrede gestellt werden, auftreten, besonders bei Kindern im Alter der ersten Dentition; Fieber, Somnolenz, abwechselnd mit grosser Unruhe, Verlust der Laune, Apathie, häufiges Zusammenzucken, Unfähigkeit den Kopf aufrecht zu tragen, erhöhte Temperatur desselben, gespannte und lebhaft pulsirende Fontanelle, auch wohl Erbrechen. Ich führe dies nur als Thatsache an, ohne die Abhängigkeit dieser Symptome von der Dentition beweisen zu können, erinnere aber daran, dass gleichzeitig oft starke Hyperämie der Mundschleimhaut, vermehrte Speichelsecretion, Erythema und Papeln der Gesichtshaut und Katarrhe der Conjunctiva und der Bronchien beobachtet werden. Abführmittel (kleine

Dosen Calomel) und kalte Fomentationen des Kopfes genügen hier meistens, um die Erscheinungen binnen wenigen Tagen zu beseitigen. Doch kommt man nicht immer so leicht zum Ziel. Jeder Arzt hat Fälle erlebt, in welchen die Symptome sich allmählig verschlimmerten und durch den Hinzutritt von Zuckungen, Retroversion des Kopfes und Sopor einen meningitischen Charakter annahmen.

Endlich müssen noch übermässige Geistesanstrengungen der Kinder als Quelle von Gehirnhyperämie bezeichnet werden, welche in einer Ueberreizung des in der Entwicklung begriffenen Organs ihre Erklärung findet. Wenn auch unter diesen Verhältnissen die früher betrachteten hysterischen Symptome oder neuralgische Kopfschmerzen häufiger auftreten pflegen, so fehlt es doch nicht an Beispielen, wo nach ungewöhnlicher Geistesanstrengung auch hyperämische Symptome sich geltend machten. Schon früher¹⁾ beschrieb ich den Fall eines 9-jährigen Knaben, der nach einem solchen Anlaß nicht nur heftige Kopfschmerzen und Lichtscheu, sondern auch Schwindel, Anorexie, Uebelkeit, Aufstoßen, Verstopfung, Nackenschmerzen, intermittirenden Puls und Schwanken beim Gehen darbot. Während Brechmittel und China ganz wirkungslos blieben, erfolgte nach der Application von 5 Blutegeln, einer Eiskappe auf den Kopf und nach dem Gebrauche von Abführmitteln schnelle Besserung. —

Die zweite Form der Hirnhyperämie wird durch eine mechanische Stauung im venösen System des Centralorgans bedingt. Herzfehler mit Erweiterung des rechten Ventrikels, Compression der grossen Venenstämme durch angeschwollene Drüsen innerhalb des Thorax oder am Halse, besonders aber Thrombose der Sinus durae matris können allmählig, hochgradige Herzschwäche durch erschöpfende Krankheiten aber in mehr acuter Form diese Hyperämie erzeugen. In den Fällen der letzteren Art wird während des Lebens gewöhnlich eine Anämie des Gehirns als Grund der Krankheitserscheinungen angenommen. In der That ist der geschwächte Herzmuskel zwar nicht im Stande, so viel arterielles Blut, wie im normalen Zustande, in die kleinen Hirnarterien zu treiben, aber die daraus resultirende Verlangsamung der Circulation bewirkt eine venöse Stauung, welche schliesslich zum Oedem der Pia und zu seröser Transsudation in den Ventrikeln führt. Das von Marshall Hall unter dem Namen „Hydrocephaloid“ entworfene Krankheitsbild setzt sich daher aus den Erscheinungen der arteriellen Anämie und der venösen Hyperämie des Gehirns zusammen, und charakterisirt sich vor-

¹⁾ Ditt. S. F. S. 8.

zugweise durch zunehmende Apathie und Somnolenz, halbgeschlossene Augen, Abdachung oder Einsinken der grossen Fontanelle, Trübung der Cornea durch Schleimflocken oder Gewebvertrückung, grosse Schwäche des Pulses und Sinken der Temperatur, besonders an den extremen Körpertheilen, Erscheinungen, welche nur zum Theil von der venösen Hirnhypertämie, zum anderen Theil von der Herzschwäche und dem allgemeinen Collaps abhängen. Besonders gehen anhaltende Diarrhöen oder sehr acut auftretende Brechdurchfälle zur Entwicklung dieses Symptomencomplexes Anlass:

Kind von 6 Monaten, Diarrhöe seit beinahe 3 Monaten, aufgenommen am 3. October 1878 im vorerwähnten Collaps, somnolent, mattablich, mit eingemaskten, starren, zeitweis ausgesprochnen Augen, fadenförmigen Puls; in den nächsten Tagen trotz der stimulirenden Behandlung Sinken der Temperatur auf 36,0, fast gefühlbarer Puls, Trübung beider Hornhäute, Sopor. Tod am 5. October. — Section: Schwellung der Peyer'schen Plaque, Katakth und Verdickung der Dickdarmschleimhaut, besonders im Colon descendens und Rectum mit zahlreichen folliculären Geschwüren. Fettleber und Fettdegeneration der Nierenepithelien. Herz und Lungen normal. Alle venösen Gefässe der Pia mater überfüllt, Pia ödematös. Gehirndurchschnitte mit zahlreichen Blutpunkten. Alle Sinus vollkommen frei.

Die Behandlung solcher Fälle darf natürlich keine schwächende sein, weil diese das Sinken der Herzenergie und damit die venöse Stauung im Gehirn noch steigern würde. Vielmehr muss die Hebung der Herzkraft unser Hauptziel bleiben, um die Circulation möglichst schnell wieder in Gang zu bringen. Wiederholte Gaben von Wein (ein Löffel Ungarwein, Portwein oder Sherry 1 — 2 stündlich), wärmere Bäder (27 — 28° R.) mit kalter Fomentirung des Kopfes oder Begiessung desselben mit kühlem Wasser finden hier ihre Anwendung. Selbstverständlich hat man die etwa noch fortbestehende Quelle des Collapses, d. h. also meistens die Diarrhöe, durch entsprechende Mittel zu behandeln. In vielen Fällen hat dieselbe aber bereits aufgehört, wenn die Cerebralsymptome sich bemerkbar machen, und man kann dann sofort durch stimulirende Mittel die Energie des Herzens zu heben versuchen. Unter diesen Mitteln steht nach meinen Erfahrungen der Kampher in erster Reihe (je nach dem Alter zu 0,03 — 0,2 2 stündlich in Pulver oder Emulsion, F. 14). Gelingt es diesem oder dem Wein nicht, die Herzkraft über Bord zu halten, so verspreche ich mir von anderen Mitteln keinen Erfolg mehr. Insbesondere leisteten mir der Moschus und die gerühmten Ammoniumpräparate so gut wie Nichts. Milch und starke Bouillon, Eigelb in Wein geschlagen, müssen in kurzen Pausen dem Kinde eingeflossen werden. Immerhin bleibt die Prognose in hohem Grade bedenklich, und eine grosse Zahl dieser Kinder geht ungeachtet aller

Benüthungen im Sopor, oft auch unter Convulsionen zu Grunde. Die Verlangsamung des venösen Blutstroms führt unter diesen Umständen nicht selten zur völligen Stagnation und Gerinnung des Blutes in den grossen Sinus der Dura mater, zur „marantischen“ Thrombose. Man findet am häufigsten den Sinus longitudinalis, seltener auch andere Blutleiter mit mehr oder weniger entfarbten derten Thromben gefüllt, welche sich in die einmündenden Venen mehr oder weniger weit verfolgen lassen und die venöse Stauung im Gehira und der Pia, sowie die Gefahr der serösen Transsudation erheblich steigern müssen. Dieselbe Wirkung hat natürlich auch jede andere Sinusthrombose, sei es, dass dieselbe in einer Compression des Sinus oder in einer von den benachbarten Schädelknochen sich fortsetzenden Entzündung begründet ist. Vor allem sind der Sinus petrosus und transversus dem Einflusse des cariösen Felsenbeins, in dessen Nähe sie liegen, ausgesetzt, und ihre Thromben erstrecken sich zuweilen weit in die Jugularvene hinein. Dass dieser Process auch ohne sichtbare Veränderung der freien Fläche der Dura sich bilden kann, beweist der Fall eines am 2. Februar 1877 in die Klinik aufgenommenen

9jährigen Mädchens. Seit dem 1. Lebensjahre Otitis media, Perforation des Trommelfells, durch welche man eine röhre polirte, mit Eiter bedeckte Fläche erblickt. Heftige anhaltende Kopfschmerzen, kein Fieber. Auspölung des Ohrs in der Chloroformarkose. In der Nacht vom 4. zum 5. Februar plötzlich grosse Unruhe, Delirium, Gschrei. Des 5. Sopor. P. 116, regelmässig, T. 38,5. Am nächsten Tage derselbe Zustand fortwährend, Zerkungen der rechten Extremitäten. P. 132, klein; tiefe Coma. T. 38,0. R. 60. Copiose Schweiss. Tod. — Section: Starkes Oedem des Gehirns. Pia normal. Sinus transversus und Sinus petrosus inf. dexter thrombosirt. Das rechte Felsenbein cario. Die Caries dringt bis dicht unter die Dura mater, an welcher Stelle sich ein erbsengrosses Abscess befindet. Dura selbst völlig intact. Nephritis parenchymatosa. Im Harn etwa $\frac{2}{4}$ Meter lange Strecken dunkelroth mit diphteritischem Belag. Leber fettig.

Die Thatsache, dass die Caries eines Schädelknochens, speciell des Felsenbeins, eine grosse Ausdehnung bis dicht an die Dura erreichen kann, ohne diese selbst zu verändern, habe ich wiederholt beobachtet. Sie bleibt lange Zeit intact und silberglänzend, und doch kann der benachbarte Sinus petrosus Sitz einer Thrombose werden, die wahrscheinlich aus der Hineinschwellung oder Hineinwucherung kleiner Thromben von den Knochenvenen her zu erklären ist. In ähnlicher Weise deutet man ja auch die Sinusthrombosen, welche bisweilen in Folge stark eiterader ekzematöser Kopfschläge beobachtet wurden (Fortleitung der Thrombose durch die Emissaria Santorini).

Man hat sich viele Mühe gegeben, die Diagnose der Sinusthrombosen

möglich zu machen. Gerhardt und Huguenin legen für die Thrombose des Sinus transversus oder des Anfangsstückes der Jugularis interna besonderen Werth darauf, dass die äussere Jugularvene, weil sie ihren Inhalt leichter in die leere Jugularis interna ergiesst, auf dieser Seite weniger gefüllt erscheint, als auf der gesunden, während bei Thrombose des Sinus cavernosus die Stauung in der Vena ophtalmica sich durch venöse Hyperämie des Augenhintergrundes, leichten Exophthalmus und Oedem des oberen Augenlids oder der ganzen Gesichtshälfte kundgeben soll. Obwohl ich wiederholt auf die angegebenen Zeichen aufmerksam war, konnte ich mich doch von der Sicherheit derselben nicht überzeugen, schon aus dem Grunde, weil, was Gerhardt selbst zuzieht, die Halsvenen überhaupt nicht immer je nach Grad von Turgescentia besitzen, der zur Wahrnehmung der Differenz nöthig ist. Immerhin scheint mir die genaue Untersuchung der Hals- und Augenvenen, so wie die scharfe Beobachtung eines halbseitigen Gesichtsoedems in Fällen, welche der Sinusthrombose verdächtig sind, für die Diagnose mehr zu versprechen, als die von den Autoren angegebenen Zeichen einer Thrombose der Arteria pulmonalis. Dass diese und ihre Folgen (hämorrhagischer Infarkt) von der Thrombose des Sinus aus durch Embolie zu Stande kommen können, ist ja unzweifelhaft und auch anatomisch wiederholt nachgewiesen, aber die Diagnose dieser Embolie ist bei einem Kinde unter den betreffenden Verhältnissen, d. h. beim Vorhandensein verschloffenartiger Cerebralerstörungen, so schwierig, dass wohl nur ausnahmsweise die Abhängigkeit derselben von einer Sinusthrombose vor der Section festgestellt werden kann. Unter diesen Umständen kann von einer Therapie um so weniger die Rede sein, als selbst im Falle einer sicher gestellten Diagnose wohl niemand daran denken wird, die Thrombose beseitigen zu können.

XVII. Die tuberculöse Meningitis.

Diese Krankheit gehört zu den häufigsten und tödtlichsten, welche das Kindesalter treffen können. Sobald Sie die ersten sicheren Zeichen derselben bemerken, können Sie dreist das Todesurtheil fällen, und wenn der Arzt in zweifelhaften Fällen alles aufbietet, um zu einer festen Diagnose zu gelangen, so denkt er dabei leider nicht an therapeutische Erfolge, sondern nur an die Gewissheit des traurigen Ausganges, auf welchen er die Angehörigen des Kindes vorbereiten hat. Vergleicht man die in den älteren Werken über den „Hydrocephalus acutus“ mitgetheilten, verhältnissmässig zahlreichen Erfolge, deren sich ihre Autoren zu erfreuen hatten, mit den unserigen, so erkennt man sofort, dass die früheren Aerzte unter jenem Collectivnamen eine Reihe ver-

schiedener Krankheitszustände (einfache Hyperämien des Gehirns, Meningitis simplex, Typhus) beschrieben und behandelt haben. Heute aber, wo unsere Diagnose eine weit bestimmtere geworden, und wir den Begriff des acuten Hydrocephalus auf die Meningitis tuberculosa beschränken, können wir nur mit Lächeln auf therapeutische Empfindungen zurückblicken, welche zu ihrer Zeit in hohen Ehren standen. Die Unheilbarkeit dieser Meningitis ist ja schon in dem Zusatz tuberculosa ausgesprochen. Die Meningitis, welche auf diesem Boden wurzelt, tödtet eben durch ihre Combination mit den Tuberkeln der Pia und vieler anderen Organe. Sie ist keine locale, sondern vielmehr eine über viele wichtige Theile ausgebreitete Krankheit, mit einem Wort eine Form der acuten Miliartuberkulose.

Die Schilderung dieser Krankheit ist wegen der vielfachen Abweichungen ihres Verlaufs schwierig, und trotz des grossen Materials, welches mir zu Gebote steht, wage ich kaum zu hoffen, Ihnen ein völlig umfassendes und anschauliches Bild vorführen zu können. Am zweckmässigsten scheint es mir, zunächst die gewöhnliche „klassische“ Form der Krankheit, wie ich sie nennen möchte, zu skizziren, und die Varietäten später anschliessen.

In vielen Fällen geht dem wirklichen Ausbruche der Krankheit eine Art von Prodromalstadium voraus, welches sich auf Wochen und selbst auf Monate erstrecken kann. Die Kinder werden mager und welk, ohne dass die Mütter, welche dies besonders beim Waschen der Kleinen bemerken, eine Erklärung dafür finden. Das Allgemeinbefinden ist dabei oft ungetrübt, während in anderen Fällen verschiedene Störungen vorkommen, ungleicher Appetit, Mattigkeit, wechselnde Laune, unregelmässige Fieberbewegungen, also unbestimmte Symptome, welche der Arzt trotz sorgfältiger Untersuchung nicht sicher zu deuten vermag. Diese Erscheinungen bekunden die langsam vor sich gehende Entwicklung von Tuberkeln in den verschiedenen Organen, und die Anamnese hat daher in allen solchen Fällen eine stehliche Andeutung zur Tuberkulose ins Auge zu fassen, deren Nachweis immer als ein lichter Punkt in dem Dunkel der Erscheinungen gelten kann. Man darf aber nicht vergessen, dass eine solche Familienanlage zur Tuberkulose keineswegs nöthwendig ist, dass vielmehr in Folge langwieriger Katarrhe, des Keuchstussens, der Masern, des Typhus oder wiederholter Diarrhöen Hyperplasien und Verkäsungen der Bronchial- und Mesenterialdrüsen bestehen können, welche schliesslich den Infectionsherd für die Miliartuberkulose abgeben. Auf ähnliche Weise können käsige Prozesse in peripherischen Lymphdrüsen oder in den Knochen (Spondylitis, Osteomyelitis) einflussreich werden.

Wir müssen diese Thatsachen als die Resultate unzähliger sicherer Erfahrungen vom ärztlichen Standpunkte aus festhalten und es weiteren Forschungen überlassen, dieselben mit der Koch'schen Entdeckung der Tuberkelbacillen in Einklang zu bringen. Uebrigens sind die oben erwähnten Prodromalsymptome durchaus nicht constant; trotz genauer Nachforschung erhielt ich von den Müttern oft genug die Antwort, ihre Kinder seien bis zum wirklichen Ausbruch der Krankheit völlig gesund gewesen, und das blühende wohlgenährte Aussehen sprach für die Richtigkeit dieser Aussage.

Der eigentliche Ausbruch der Krankheit erfolgt fast plötzlich mit Klagen über Kopfschmerzen, zumal in der Stirn, und mit Erbrechen, welches sich in den ersten Tagen gewöhnlich mehrfach wiederholt, bisweilen sogar nach jedem Genuss von Getränk und Nahrungsmitteln eintritt. Man hat diesem Erbrechen bestimmte Charaktere zugeschrieben, welche ich nicht bestätigen kann; ich sah dasselbe sowohl in aufrechter wie in horizontaler Stellung, bald sturzweise, bald mit Vermituritionen erfolgen, und kann daher in der Art des cerebralen Erbrechens keinen wesentlichen Unterschied von dem rein gastrischen erkennen. Gerade um diese Diagnose handelt es sich aber zunächst. Die Erscheinungen der ersten halben oder ganzen Woche sind in sehr vielen Fällen denjenigen einer leichten Febris gastrica so ähnlich, dass selbst erfahrens Aerzte, welche schon viele Kinder dieser Art sterben sahen, vor Täuschungen durchaus nicht sicher sind. Die allgemeine Apathie, der Verlust der Spiellust, die Klagen über den Kopf, die Neigung denselben stets anzulehnen, und überhaupt zu liegen, die mehr oder weniger betragte Zunahme des Appetitverlustes mit Erbrechen und Verstopfung, endlich auch unregelmäßige Fieberbewegungen — alle diese Symptome sind so zweideutiger Art, dass man darüber zweifelhaft sein kann, ob eine beginnende Meningitis, oder eine Febris gastrica, oder gar der Anfang eines Heptyphas vorliegt. Selbst die eigenthümliche und unerklärliche Erscheinung, dass die Kinder mit einer auffallenden Belarrlichkeit an den Lippen zupfen, an die Nase bohren oder die Augen reiben, kommt allen diesen Zuständen gemeinsam zu. So lange Sie daher nicht ganz sicher sind, müssen Sie sich hüten, die Eltern mit der Versicherung zu beruhigen, dass die Sache nichts auf sich habe und das Ganze nur von einem „verdorbenen Magen“ herrühre, wozu der Ungestuhnte sich leicht verleiten lässt. Man halte vielmehr die Möglichkeit der Cerebralkrankheit offen, denn die Eltern verzeihen dem Arzte die falsche Prognose niemals, auch wenn er sich später hinter der Ausrufe verschämt, die „Gastruse“ sei schließlich in einen Hydrocephalus übergegangen!

Die Ungewissheit dauert indess, wenigstens für den erfahrenen Arzt, meistens nur einige Tage. Spätestens am Ende der ersten Woche pflegen deutlichere Anzeichen des drohenden Sturmes aufzutreten, auf welche Sie Ihre Aufmerksamkeit um diese Zeit zu richten haben. Dahin rechne ich besonders ein öfter wiederkehrendes tiefes Aufseufzen, welches mich fast nie getäuscht hat, und die charakteristische Veränderung des Pulses. Derselbe wird langsamer und dabei unregelmässig, auch wohl ungleich in der Stärke der einzelnen Schläge. Diese Erscheinung ist für mich unter den geschilderten Verhältnissen entscheidend, selbst wenn sie nur vorübergehend bemerkbar sein sollte. Kaum in einer anderen Krankheit der Kinder löst der Puls eine so wechselnde Beschaffenheit dar, wie in dieser. Im Laufe eines Tages ändert sich die Ziffer häufig und erheblich; geringe Bewegungen genügen, eine Zunahme um 20 und mehr Schläge zu erzeugen, während die schwankende Temperatur, auf welche ich gleich zurückkommen werde, ohne Einfluss auf den Puls bleibt. Die Frequenz schwankt vielfach zwischen 96 und 120, und geht bisweilen auf 80, 72 und tiefer herab. So wichtig aber auch dies Symptom ist, muss man doch immer daran denken, dass dasselbe auch bei unschuldigen gastrischen Affectionen durch reflexorische Vagusreizung zu Stande kommen kann, was ich freilich bis jetzt nur einmal in folgendem Falle beobachtet habe:

Bei einem 9-jährigen Knaben, welchen ich im April 1867 an einer Anfangs fieberhaften Indigestion behandelte, sank der Puls am Tage nach dem Gebrauch eines Brechmittels auch im wachen Zustande und in stehender Stellung von 120 auf 80, in den nächsten Tagen sogar auf 52 bis 48 Schläge, und zeigte dabei erhebliche Intermissionen. Fortdauer der Schläfrigkeit, Schlingigkeit, indessen beunruhigten sich nicht, doch erfolgte beim Gebrauch einer Sol. nux. purior. mit Tinct. cast. nach einer Woche völlige Besserung der Gastro-, wiewohl auch der Puls seine normale Frequenz und Regelmässigkeit wieder annahm.

Meistens fehlt die Verlangsamung und man beobachtet nur Unregelmässigkeit des Pulses, wofür ich schon früher¹⁾ einige Beispiele mittheilte. Immerhin aber sind solche Fälle im Ganzen selten, und wo Unregelmässigkeit mit Retardation vereint auftritt, können Sie sich immer auf die weitere Entwicklung der tuberculösen Meningitis gefasst machen. Die von Rilliet und Barthiez hervorgehobene Schwere und vibrirende Beschaffenheit des Pulses (*Pulsus tardus*) habe ich nicht für charakteristisch, wenn ich sie auch wiederholt und zwar ebenso gut an der noch offenen grossen Fontanelle als an der Radialis beobachten konnte. Die Verlangsamung und Unregelmässigkeit des Pulses pflegt

¹⁾ Beiträge zur Kinderheilk. N. V. S. 51.

sich mehrere Tage, etwa bis zur Mitte der zweiten Woche hinzuziehen und dann einer allmählig zunehmenden Frequenz mit regelmässigem Rhythmus Platz zu machen.

Während dieser Zeit steigert sich allmählig die Intensität der früher beschriebenen Symptome. Der Kopfschmerz ist nur selten so heftig, dass die Kinder laut klagen und die Hände gegen die Stirn pressen; viele klagen fast gar nicht über den Kopf, wohl aber über Schmerz in den Ohren, am Halse, im Unterleibe, oder an anderen Theilen, ohne dass die Untersuchung derselben etwas Abnormes ergibt. Ist Kopfschmerz vorhanden, so wird er durch Husten in der Regel gesteigert. Zuweilen scheint auch ein Gefühl von Schwindel vorzukommen, indem die Kinder selbst im Sitzen und Liegen zu fallen glauben und die Umstehenden bitten, sie fest zu halten. Die Apathie und Somnolenz nimmt langsam zu, zuweilen durch Ueßruhe, lautes Aufschreien, auch wohl durch leichte Delirien unterbrochen. Weckt man die Kinder aus diesem Zustande, was noch leicht gelingt, so findet man das Sensorium klar, so dass sie auf Fragen antworten und auf Verlangen die Zunge zeigen. Das Erlöschen der kindlichen Widerspenstigkeit, die Gleichgültigkeit gegen den sonst mit Geschrei empfangenen Arzt und seine Manipulationen ist immer ein böses Zeichen und kann sogar in zweifelhaften Fällen eine diagnostische Bedeutung gewinnen. Bemerkenswerth ist auch in dieser Zeit der Einfluss auf gewisse secretorische und trophische Vorgänge. Stark eitrige Ekzeme auf dem Kopf oder an anderen Theilen trocknen nicht selten ein, die reichliche Secretion der Nasenschleimhaut versiegt, früher bestandene Diarrhöen hören auf, und in zwei Fällen sah ich nicht unbedeutende, seit längerer Zeit bestehende Anschwellungen von Cervicaldrüsen unter dem Einflusse der Meningitis im Laufe weniger Tage zurückgehen.

Etwa von der Mitte der zweiten Woche an, auch wohl schon etwas früher, machen sich bei vielen, keineswegs aber bei allen Kranken Reizungssymptome einzelner Cerebralnerven, welche von der entzündlichen Irritation an der Basis direct getroffen werden, bemerkbar, am häufigsten Strabismus convergens und Kairischen mit den Zähnen. Ob die am dieselbe Zeit beginnenden Kaubewegungen, die etwas Charakteristisches für die Krankheit haben, auch durch eine Reizung der Portio minor des Trigemini zu deuten sind, scheint mir zweifelhaft, weil man in diesem Falle eher Trismus erwarten sollte. Eine leichte Retroversion des Kopfes wird bisweilen schon jetzt beobachtet. Die Farbe des Gesichts wechselt durch das Aufkommen einer flüchtigen Röthe. Ganz allmählig steigert sich der somnolente Zustand zum Sopor; immer schwerer lässt sich das Kind erwecken, bis es schliesslich in völliger Bewusst-

losigkeit ohne jede Reaction auf Aussen daliegt, mit halbgeschlossenen Augen, das eine Bein in der Regel lang gestreckt, das andere im Knie beugt, die Hände an den Genitalien, von Zeit zu Zeit tief aufseufzend oder auch ein durchdringendes Geschrei ausstossend (der berühmte, aber keineswegs constante „cri hydroméphalique“ von Coindet). Um diese Zeit erweitern sich die Papillen, oft die eine mehr als die andere, und reagieren nur träge oder gar nicht mehr auf den Lichtreiz; auf der Conjunctiva bulbi zeigen sich käseförmige gegen die Cornea hinziehende Gefässinjectionen und Schleimfetzen, allmählig auch Trübungen der Hornhaut, besonders desjenigen Segments, welches von dem halbgeschlossenen Lidern nicht bedeckt und wegen des fehlenden Lidschlags anhaltend der Luft ausgesetzt ist. Wie die Reflexsensibilität der Conjunctiva erlischt auch diejenige der Haut, so dass z. B. leichtes Streichen über die innere Partie des Oberschenkels keine Zusammenziehung des Crurastrichs mehr zur Folge hat. Automatische Bewegungen der Hände nach dem Kopfe, pendelnde Schwingungen einer oberen oder unteren Extremität, starre Contractur der Nacken- und Kammuskeln, welche das Einflüssen von Getränk erschweren, treten hinzu. Bei genauerer Untersuchung findet man auch nicht selten eine Rigidität oder Lähmung der einen oder anderen Körperhälfte; wo letztere vorhanden ist, fällt das aufgehobene Glied wie das einer Leiche ohne Resistenz nieder und liegt bewegungslos, während dasjenige der anderen Seite oft hin- und hergeworfen wird. Die bis jetzt meistens vorhandene, den Abfuhrmitteln schwer nachgebende Stuhlverstopfung macht in diesem letzten Stadium der Krankheit oft unwillkürlicher dünnen Ausleerungen Platz. Der Unterleib sinkt in der Nähegegend immer mehr ein, so dass er schliesslich ein muldenförmiges Aussehen mit vorspringendem Rippenrand und Darmbeinkamm bekommt und die Wirbelsäule leicht durchfühlen lässt. Die Pulsfrequenz nimmt etwa von der Mitte der zweiten Woche an dauernd zu, und der regelmässige Rhythmus stellt sich wieder her; die Frequenz steigt allmählig bis auf 180, 200 Schläge und darüber, die immer kleiner und schwerer fühlbar werden, während die Respiration, welche schon früher durch das erwähnte seufzende Inspirium ihre Theilnahme bekundet hatte, in den letzten 24—48 Stunden fast immer das Cheyne-Stokes'sche Phänomen, entweder in seiner bekannten klassischen, oder in einer etwas abweichenden Form darbietet. So sah ich nach einer Respirationspause von $\frac{1}{4}$ Minute Dauer zuerst eine tiefenfeulende Inspiration eintreten, auf welche 2—3 oberflächliche Athemzüge und dann wieder eine Pause folgte. Daher kann die Zahl der Athemzüge in der Minute nur 7—5 betragen, und diese Seltenheit der Respi-

ration im Verein mit der äussersten Schwäche des Herzens (180–200 kaum fühlbare Pulse) erklärt die um diese Zeit oft eintretende cyanotische Verfärbung der Gesichtshaut, der sichtbaren Schleimhäute, der Finger- und Zehenspitzen. In vielen Fällen erscheint das Gesicht in den letzten Tagen dunkelroth, und ein profuser Schweiß bedeckt Stirn und Wangen in hellen Tropfen; dagegen konnte ich die von anderen Autoren erwähnten Hautausschläge (Erytheme und Papeln) nur selten beobachten, z. B. bei einem 2-jährigen Kinde, welches in den letzten Tagen ein über den ganzen Körper verbreitetes Erythema annulare darbot. Zu diesen den tödtlichen Schluss der Krankheit bezeichnenden Symptomen gesellen sich in den letzten 24–48 Stunden sehr häufig epileptiforme Convulsionen, welche entweder in heftigen Paroxysmen das gesammte Muskelsystem des Körpers befallen, oder nur einseitig auftreten, mitunter auch sich nur auf die Gesichtsmuskeln oder auf schwache Zuckungen der Glieder beschränken. In manchen Fällen kommt es auch nur zu starren Contracturen der Extremitäten und Nackenmuskeln, oder zu einem Tremor, welcher bei den im Sopor noch stattfindenden Bewegungen der Hände am deutlichsten hervortritt. Sie werden immer gut thun, die Eltern auf den Eintritt terminaler Convulsionen vorzubereiten, auch wenn während des ganzen Verlaufs der Krankheit keine spastischen Erscheinungen beobachtet wurden. Nur selten vermiste ich dieselben gänzlich. Immer aber ist, gleichviel ob mit oder ohne Convulsionen, die Agonie eine ungewöhnlich lange, nicht selten auf mehrere Tage ausgelehnte und für die Eltern um so schmerzlicher, als bisweilen mitten in diesem letzten hoffnungslosen Stadium plötzlich überraschende und unerklärliche Zeichen einer scheinbaren Besserung aufleuchten. Das bewusstlose soporöse Kind zeigt plötzlich wieder erwachende Sinnesthätigkeit, wendet den Kopf nach der rufenden Mutter, öffnet die Augen, nimmt wieder Nahrung zu sich, oder vermag sogar sich wieder aufzurichten und nach vorgehaltenem Spielzeug zu greifen. Ich habe mich von der Richtigkeit dieser alten Beobachtung selbst ein paar Mal überzeugt, und warne Sie vor der Ueberschätzung dieser lichten Momente. Nach wenigen Stunden verfällt das Kind wieder in den früheren Zustand und geht unter Convulsionen oder im tiefen Sopor durch zunehmenden Collapse (Hemiparalyse) zu Grunde, in der Regel 14 Tage bis 3 Wochen nach dem Auftreten des ersten Erbrechens.

Es bleibt nur noch übrig, die Fiebertverhältnisse der Meningitis tuberculosa einer kurzen Erörterung zu unterziehen. Die Untersuchungen, welche ich während der letzten Jahre anstellte, und die zum Theil bereits

veröffentlicht sind¹⁾, bestätigen die Thatsache, dass diese Krankheit durchaus keine charakteristische Fiebercurve besitzt, dass vielmehr während des ganzen Verlaufs sehr erhebliche Schwankungen vorkommen, wobei fast immer die abendliche Temperatur diejenige der Morgenstunden mehr oder weniger übersteigt, selten derselben gleich, nur ausnahmsweise etwas niedriger erscheint. Die Temperatur hält sich dabei immer auf einem mittleren Stande, überschreitet nur selten 39,0, ja erreicht diese Höhe in vielen Fällen kaum an einzelnen Tagen. Dagegen erhebt sich die Wärme nach meinen Beobachtungen, wenn auch nicht constant, doch in der Majorität der Fälle, am vorletzten oder letzten Tage der Krankheit rapide zu bedeutender Höhe, bis auf 40 und selbst 42,0, dauert in dieser Höhe fast immer bis zum Tode an und fällt nur selten kurz vor demselben auf 38–39°. Postmortale Messungen habe ich bis jetzt nicht angestellt²⁾. Diese plötzliche prägnante und agonale Temperatursteigerung kann unmöglich als eine einfache Fieberexacerbation aufgefasst werden, weil das Fieber ja während des ganzen Verlaufs nur eine untergeordnete Rolle spielt, und man daher nicht annehmen kann, dass es sich gerade zuletzt, wo die Symptome des Collapses, der Herzlähmung (200 kleine Pulse) auftreten, plötzlich zu einem so hohen Grade steigern sollte. Ebenso wenig dürfte die terminalen Krämpfe oder zufällige Complicationen mit Entzündungen der Respirationsorgane dafür verantwortlich zu machen sein, wofür ich in meiner Arbeit (l. c. S. 510) genügende Beweise beigebracht zu haben glaube. Ein paar Mal beobachtete ich schon einige Tage vor dem Tode

¹⁾ Charité-Annales, Jahrg. IV, S. 305.

²⁾ Ich gebe einige Curves als Beispiele.

Léon S., 1 Jahr alt, aufgenommen am 28. Sept. 1878.			H., 4 Jahre alt, aufgenommen am 6. April 1878.		
	M.	A.		M.	A.
29. Septbr.	38,0	38,5	6. April		38,5
30. -	37,6	38,5	7.	37,5	38,0
1. Oktbr.	37,6	38,2	8.	37,2	36,8
2.	38,0	38,0	9.	38,4	38,5
3.	37,6	37,6	10.	36,8	37,5
4.	38,1	38,0	11.	38,0	38,1
5.	38,1	38,5	12.	38,2	38,6
6.	38,8	39	13.	38,5	39,2
7.	40	41		4	39,8
8.	41,2	Tod.		6	40,5
				9	41,8 Tod.

Diese Beispiele mögen genügen; sehr viele weitere Fälle stellen analoge Verläufe dar.

heftige Convulsionen bei einer Temperatur von 38,2, während dieselben am letzten Tage bei 40,0 und darüber ganz fehlten, und gerade in einigen Fällen, in welchen die Section eine frische Pneumonie nachwies, sah ich die terminale Temperaturerhöhung fehlen, während in allen anderen Fällen acute Affectionen des Respirationsapparates nicht gefunden wurden und dennoch die agonale Steigerung der Körperwärme stattfand. Ich kann diese Erscheinung, welche nicht allein bei der Meningitis tuberculosa, sondern auch bei Erwachsenen, die schliesslich an einer Lähmung der Cerebralfunctionen zu Grunde gehen, vorkommt, nur durch die Annahme einer Paralyse des präsumirten moderirenden Wärmecentrums erklären, welches an der Grenze des Gehirns und Rückenmarks seinen Sitz hat. Wird dasselbe gelähmt, so muss eben die Körperwärme, die aus nicht mehr moderirt wird, eine über das gewohnte Mass hinausgehende Höhe erreichen. Die weiteren Ausführungen dieses Gegenstandes finden Sie in meiner oben citirten Arbeit, wo ich auch die meiner Ansicht zur Stütze dienenden experimentellen Ergebnisse zusammengestellt habe. Weit seltener kommt es schliesslich zu einer abnorm niedrigen Temperatur von 31 bis 28,0°¹⁾, welche dann durch eine Lähmung des Wärme erzeugenden Centrum zu erklären wäre.

Dass ich bei der Schilderung des Krankheitsverlaufs die übliche Eintheilung desselben in gewisse Stadien nicht berücksichtigt habe, geschah aus dem Grunde, weil ich alle Versuche einer solchen Eintheilung, mögen sie nun auf anatomischen oder klinischen Principien beruhen, für vergebliche halte. Allenfalls liesse sich ein Stadium der Reizung und eins der Lähmung unterscheiden. Aber auch diese Eintheilung hat keineswegs eine durchgreifende Berechtigung, denn oft genug treten, wie wir sahen, Reizungsphänomene, z. B. Convulsionen, erst inmitten des letzten Stadiums auf. Erwägt man aber noch die atypisch verlaufenden Fälle, die zahlreichen Varietäten, auf welche ich gleich kommen werde, so sieht man, dass die Stadieneintheilung eine illusorische ist und am besten ganz aufgegeben wird.

Die Abweichungen vom normalen Verlaufe sind in der That bei dieser Krankheit so zahlreich, dass die Sicherheit der Diagnose, falls man eben nur nach der Schablone urtheilen wollte, ernstlich gefährdet werden kann. Selbst Aerzte, welche die Meningitis gründlich zu kennen glauben, begegnen immer wieder neuen Verlaufsweisen und ungewöhnlichen Erscheinungen, welche verwirrend wirken können und sich anato-

¹⁾ Gaildinger, *Jahrb. f. Kinderheilk.* 1880, XV, S. 459. — Taji, *Jahrb. f. Kinderheilk.* XVI, 1880, p. 24.

misch nicht erklären lassen. Bisweilen fand ich 10–12 Tage lang ein dem Kindertypus sehr ähnliches Krankheitsbild, oder die Kleinen stossen Tag und Nacht fast ununterbrochen ein gellendes, die Eltern in Verzweiflung bringendes Geschrei aus, und verfielen dann plötzlich in Sopor. Das mit Recht gefürchtete initiale Erbrechen kam vollständig felles, während es in anderen Fällen mit grösster Heftigkeit 9–10 Tage und länger fortdauert, und zwar mit so unbedeutenden anderweitigen Hirnsymptomen, dass sie dem Arzte, welcher das Kind ein- und höchstens zweimal täglich besucht, völlig entgehen. Ich sah ein solches Kind, so oft ich zu ihm kam, aufrecht im Bette sitzen, anscheinend an Allem theilnehmend und eifrig mit dem Betrachten von Bilderbüchern beschäftigt. Das Auge war klar, keine Neigung zur Sinusdeaz vorhanden, nur das hartnäckige Erbrechen beunruhigte Eltern und Arzt. Aber die ungleiche und unregelmässige Beschaffenheit des Pulses sicherte die Diagnose, welche sich auch bald bestätigte. Bei einer solchen Hartnäckigkeit des Erbrechens klagen die Kinder oft auch über Schmerzen in der Magenregion, welche den Arzt noch mehr in die Irre führen können. Besonders bei kleinen Kindern im ersten und zweiten Lebensjahre schien mir dies ohne anderweitige drohende Zeichen auftretende hartnäckige Erbrechen die vollste Beachtung zu verdienen, weil es hier am leichtesten als dyspeptisches gedeutet wird, bis nach einiger Zeit plötzlich Somnolenz, Strabismus, Ptosis und Convulsionen den Irrthum in sehr unholbarer Weise aufklären. Auch die hartnäckige Stuhlverstopfung, welche man in der Regel zu bekämpfen hat, ist kein zuverlässiges Symptom. Wiederholt kamen mir Fälle vor, welche mit Erbrechen und Diarrhoe begannen und daher für Cholera infantilis gehalten wurden, bis nach 24 bis 36 Stunden Obstructio alvi eintrat, während das Erbrechen noch fortdauerte oder gleichzeitig verschwand. Mitunter sah ich auch eine schon länger bestehende, durch folliculäre oder tuberkulöse Darmgeschwüre bedingte Diarrhoe trotz der Entwicklung der Meningitis fortdauern. Statt der gewöhnlichen Muldenform beobachtete ich zuweilen eine mehr oder weniger starke meteoristische Auftreibung des Unterleibs, welcher meistens eine complicirende Peritonitis chronica tuberculosa zu Grunde lag. Auch die für den Puls geltende Regel (mässige Beschleunigung in den ersten Tagen, darauf Verlangsamung und Unregelmässigkeit, und schliesslich zunehmende Frequenz mit Regelmässigkeit der Schläge) hat nur für die Majorität der Fälle Gültigkeit. Schon oben (S. 275) machte ich Sie auf die wechselnde Beschaffenheit des Pulses aufmerksam und füge noch hinzu, dass ich in drei Fällen gerade im letzten Stadium, wo bereits epileptiforme Con-

vulsions eingetreten waren, doch nur eine Frequenz von 70, 92 und 96 Schlägen constatirte.

Nach Legendre, Rilliet und Barthéz soll das Krankheitsbild eine wesentliche Modification erleiden, je nachdem die Meningitis ein scheinbar gesundes oder ein bereits mit vorgeschrittener Tuberkulose oder Pithisis befallenes Kind befällt. Nur im ersten Falle soll der oben geschilderte „klassische“ Verlauf vorkommen, im zweiten aber die Krankheit weit stürmischer, mit viel rascherer Succession der Symptome, ähnlich der Meningitis simplex auftreten, und in der That hatte ich wiederholt Gelegenheit, diese Angabe zu bestätigen:

Anna H., 5 Jahre alt, am 2. October 1892 vorgestellt; seit August Diarrhoe, Schwäche und Anämie, zunehmende Atrophie, Husten, in der linken Posa ausgespierte Dämpfung mit klingendem Rasseln und Bronchophonie, Fieber, Ödem an vielen Theilen des Körpers. Am 24. Novbr. plötzlich epileptische Convulsionen, Abends Erbrechen, Aufhören der Diarrhoe, frequenter unregelmässiger Puls. Das Ödem verschwand rapide. Schon in den nächsten Tagen Schreien, Sopor, wiederholte Convulsionen. Tod am 28., also schon am 5. Tage nach dem Eintritt der ersten Cerebralsymptome. Section: Meningitis basilaris tuberculosa, Hydrocephalus internus, enorme Tuberkulose beider Lungen, Caverna am linken Oberlappen, folliculäre Eideritis u. s. w.

Am häufigsten aber beobachtete ich diesen stürmischen, durch heftige epileptiforme Convulsionen eingeleiteten Verlauf in denjenigen Fällen, welche mit einer Tuberkulose der Gehirnsubstanz selbst complicirt waren, ja wiederholt konnte ich daraus diese Complication vor der Section diagnostiziren, wenn nur auch der frühere Zustand des Kindes nicht bekannt war. Mehrere Fälle dieser Art finden Sie in meiner Arbeit über Gehirntuberkulose¹⁾ zusammengestellt. Ausnahmen von dieser Regel sind indess nicht selten, indem einerseits bei bedeutender Tuberkulose des Gehirns oder vorgeschrittener Pithisis die Krankheit ihren gewöhnlichen Gang nimmt, andererseits auch bei sehr geringer Entwicklung der allgemeinen Tuberkulose ungewöhnlich stürmisch verläuft²⁾.

Wir sind nicht im Stande, diese Abweichungen des Krankheitsverlaufs durch die pathologische Anatomie genügend zu erklären. Die Sectionsergebnisse bleiben scheinbar immer dieselben, mag die Krankheit normal oder anomal verlaufen, und die Differenzen müssen daher vorzugsweise in schwer nachzuweisenden feineren Structureränderungen bestehen, welche bald diesen, bald jenen Hirntheil betreffen, bis jetzt aber

¹⁾ Charité-Ansalen. IV. S. 489.

²⁾ S. meine Beiträge zur Kinderheilk. N. F. S. 44.

nicht mit Sicherheit constatirt sind. Zum Beweise dieser Auffassung will ich mich nur auf die Beobachtungen von Rendu¹⁾ beziehen, welcher in einer Reihe von Fällen die Arteria fossae Sylvii in Folge der umgebenden tuberkulösen Entzündung thrombosirt, und in ihrem Strömungsbefehle (*Corpus striatum* u. s. w.) kleine Erweichungsherde fand, mit welchen er die im Leben beobachteten Paralysen in Verbindung bringt. Ich selbst fand in mehreren Fällen, welche sich durch einen ungewöhnlich stürmischen, an die einfache Meningitis erinnernden Verlauf auszeichneten, die entzündlichen Producte an der Convexität der Hemisphäre stärker angehäuft, als an der sonst hervorragten Basis, die sogar bei einem dieser Kinder fast ganz verschont blieb. Schon hieraus geht hervor, dass man die Bezeichnungen *Meningitis tuberculosa* und *basilaris* nicht als gleichbedeutend nehmen darf.

In der grossen Mehrzahl der Fälle bildet allerdings die Affection der Basis cerebri das Charakteristische der Krankheit. Hier sieht man, in dem Raum zwischen Chiasma opticum und Medulla oblongata, eine trübe, grünlich graue, salzige Infiltration der Pia, welche die abtretenden Cerebralnerven umgibt und ohne Zweifel directe Reizungs- und Lähmungserscheinungen derselben zur Folge haben kann. In die Umgebung, besonders in die Fossae Sylvii hinein zieht sich eine trübe ödematöse Infiltration, und hier findet man auch vorzugsweise mehr oder minder zahlreiche graue oder graugelbe, etwa stecknadelkopfgrosse oder kleinere Miliartuberkel eingebettet, welche sich am deutlichsten zeigen, wenn man die Pia sorgfältig aus den Furchen herauszieht. Je nachdem diese tuberkulösen Granulationen frischer oder älter sind, erscheinen sie platt und weich, oder härter und prominenter. Aehnliche, oft recht zahlreiche Miliartuberkel der Pia trifft man auch nicht selten in den Plexus chorioidei der Ventrikel, auf der Convexität und der inneren Fläche der Hemisphäre, wobei die Pia durch seröse Infiltration oft stark getrübt erscheint, und längs der grösseren Venen Streifen graugelblichen, puriformen oder mehr bröcklichen Exsudats bemerkbar sind. Nur selten traf ich kleine miliäre Knötchen auch auf der Innenseite der Dura mater. Das Gefässsystem der Pia ist in der Regel mehr oder weniger injicirt, und beim Herausziehen derselben aus den Furchen bleiben leicht kleine Partikel stark adhärenter und erweichter Knochensubstanz an derselben hängen. Hier und da findet man wohl auch streifenartige Adhäsionen zwischen Arachnoidea und Dura, oder Anhäufung von Serum

¹⁾ Recherches clin. et anat. sur les paralysies liées à la méningite tuberculeuse. Paris 1874.

zwischen beiden Händen, und blutige Suffusionen der Pia mater. Die Gehirnsubstanz selbst ist meistens anämisch, selten hyperämisch; die Ventrikel sind durch Ansammlung seröser Flüssigkeit bedeutend ausgedehnt, ihre Wandungen, wie die Centralgebilde des Gehirns (*Corpus callosum*, Balken, Septum) häufig, aber keineswegs immer stark erweicht oder in eine rahmartige, im Ventrikelwasser flottirende Masse zerfließend. In einzelnen Fällen fand ich kleine Ekkymosen, besonders in der Umgebung des dritten Ventrikels. Diese Befunde sind jedoch in sofern nicht constant, als die seröse Ansammlung in den Ventrikeln und die Erweiterung derselben auch fehlen kann, die tuberkulöse Meningitis also nicht nothwendig mit einem „*acuten Hydrocephalus*“ verbunden zu sein braucht. In diesem Falle fehlt auch die rahmartige Erweichung der Ventrikelumgebung, welche überhaupt nur als eine cadaveröse Erscheinung in Folge der Maceration durch das angesammelte Serum zu betrachten sein dürfte.

In einer kleinen Reihe von Fällen findet man zwar entzündliche Erscheinungen in der Pia der Basis und auch wohl der Convexität, diffuse Trübung und Verdickung, Oedem oder sulziges Exsudat mit oder ohne Hydrocephalus der Ventrikel, — aber trotz der sorgfältigsten Untersuchung trifft man nirgends miliare Knötchen der Pia, während diese in anderen Organen, Milz, Leber, Lungen sehr verbreitet sein können. Mir selbst kamen wiederholt solche Fälle vor, und Billiet und Barthéz, welche 11 derselben beobachteten, rechnen dieselben, wie ich glaube mit vollem Recht, dennoch zur tuberkulösen Meningitis, weil die Gegenwart der Miliartuberkeln in anderen Organen und die Eigenthümlichkeit der eitrigen Produkte sie als solche charakterisiren. Daraus geht hervor, dass die letzteren auch spontan, ohne den Reiz miliärer Granulationen zu Stande kommen können, wie es denn auch umgekehrt nicht an Fällen von acuter Tuberkulose fehlt, in welchen trotz zahlreicher Miliartuberkeln doch keine eitrigen Erscheinungen in der Pia wahrzunehmen sind.

Eine Beschränkung der Tuberkel auf die Pia mit Ausschluss aller anderen Organe habe ich selbst nur in einem einzigen Falle beobachtet, und wenn auch solche Beobachtungen von anderen Autoren, z. B. von Boucbat, mitgetheilt werden, so drängt sich uns dabei immer der Verdacht einer nicht ganz erschöpfenden Autopsie auf. Ich will hier nur daran erinnern, dass wir wiederholt Tuberkel im Knochenmark fanden, welche von älteren Beobachtern ohne Zweifel übersehen worden sind. Auch fand ich nur ausnahmsweise die Affection auf eine geringe Ausdehnung beschränkt, z. B. bei einem 2½-jährigen Kinde mit

zahlreichen Hirntuberkeln und Meningitis tuberculosa nur noch sehr vereinzelte miliäre Knötchen in der rechten Lunge, bei einem 2-jährigen Kinde mit tuberkulöser Meningitis der Basis und Convexität nur noch einzelne käsige Herde in den Mesenterialdrüsen, bei einem 9 Monate alten Kinde nur einen haselnussgrossen käsigen Herd in einer Bronchialdrüse, alle anderen Organe aber völlig normal. Ungleich häufiger traf ich in einer ganzen Reihe anderer Körpertheile gleichzeitig tuberkulöse Veränderungen, am constantesten eine mehr oder minder ausgedehnte käsige Degeneration der Bronchialdrüsen, ferner Tuberkulose und käsige Prozesse der Mesenterial- und anderen Lymphdrüsen, im Gehirn, in den Lungen, der Pleura, dem Peritoneum, der Milz, Leber, den Nieren, selbst im Nebenhoden und in den Genitalien kleiner Mädchen. In neuerer Zeit hat besonders die Theilnahme der Chorioidea an der Tuberculose lebhaftes Interesse erweckt, weil man Anfangs, als die Thatsache durch Cohnheim und v. Graefe bekannt wurde, in derselben ein absolut sicheres Kriterium für die Diagnose der Meningitis tuberculosa und der acuten Miliartuberculose überhaupt gefunden zu haben glaubte. Die ophthalmoskopische Untersuchung wurde demnach als der wichtigste klinische Act in dieser Krankheit hingestellt und der Befund einzelner oder mehrerer grauweisser Kürcchen und Fleckchen im Augenhintergrunde in allen diagnostisch zweifelhaften Fällen als ausschlaggebend betrachtet. Das letztere hat nun allerdings seine Richtigkeit, und ich selbst konnte mich selbst öfters von der Wichtigkeit dieser Exploration überzeugen, welche schon längere Zeit vor dem Auftreten ernster Cerebralsymptome, noch in jenem Vorstadium unbestimmten Kränkels Chorioidealtuberkel nachwies und damit den ganzen Ernst der Lage verkündete. Leider ist aber die Chorioidea, wie sich später herausstellte, durchaus nicht constant theilhaftig, wovon ich mich auch bei den Sectionen wiederholt überzeugte, und wir dürfen deshalb einen negativen Befund im Auge noch keineswegs als Beweis gegen eine Meningitis auffassen, während ein positiver Befund allerdings seine volle diagnostische Bedeutung beanspruchen darf. Auch das Rückenmark bleibt nicht untheilhaftig, indem bisweilen die Pia mater desselben Tuberkeleruptionen aufzuweisen hat. Wahrscheinlich würde die Frequenz dieser Complication steigen, wenn man sich die Mühe nehmen wollte, bei jeder Section die Rückgrathshöhle zu öffnen. Die Annahme aber, dass das Auftreten heftiger Convulsionen oder Contracturen hauptsächlich von einer solchen Theilnahme der Rückenmarkshäute abhängt, ist nicht begründet, denn gerade in einem Falle, welcher sich durch das Vorwiegen der erwähnten con-

rubricischen Symptome auszeichnete, fanden wir das Rückenmark bei der Autopsie völlig normal.

In Betreff der Aetiologie der Krankheit habe ich hier nur wenig hinzuzufügen. Sind auch Kinder mit hereditärer Disposition zur Tuberkulose, oder solche, die an skrophalösen Affectionen, an Phthisis, an chronischen Knochenvereiterungen leiden, der Krankheit am meisten unterworfen, so werden Sie doch gar nicht selten blühende, scheinbar gesunde Kinder derselben zum Opfer fallen sehen, und die Entdeckung der Tuberkelbacillen (Koch) eröffnet uns eine Einsicht in das Zustandekommen dieser Fälle durch directe Infection. Bei der Section hat man oft Mühe, in einer Bronchial- oder Mesenterialdrüse einen Käseherd zu entdecken, gerade wie es bisweilen bei der acuten, ohne Meningitis verlaufenden Miliartuberkulose der Fall ist.

Im Mai 1874 behandelte ich mit einem befreundeten Collegen ein 7-jähriges früher gesundes Mädchen, dessen 2 Wochen dauernde Krankheit sich fast nur durch ein heftiges Fieber mit unregelmäßiger Curve kundgab, so dass die bis 41° steigenden Exacerbationen bald Morgens bald Nachmittags eintraten. Die Untersuchung ergab nur einen stets zunehmenden Milzanschwell, und erst in der letzten Woche die Symptome eines diffusen Bronchialkatarrhs. Wiederholt aber klagte das sehr verständige Kind über ein taubes Gefühl am rechten Arm und in der rechten Zungenhälfte, welches mit einer eigenthümlich veränderten Sprache verbunden war und immer nur kurze Zeit andauerte. Auf der Grundlage dieses Symptomencomplexes glaubten wir die Diagnose der acuten Miliartuberkulose mit Betheiligung der Pia stellen zu dürfen, und die Section bestätigte dieselbe. Beide Lungen, die Pleura, die Milz und die Pia mater, sowohl die Basis wie die Convexität, waren der Sitz dicht gedrängter Miliartuberkel, doch fehlten alle Erscheinungen von Meningitis, und die Ventrikel waren frei von Flüssigkeit. Als Ausgangspunkt dieser disseminirten Tuberkulose liess sich nur die Verkrüftung einiger Bronchialdrüsen nachweisen, deren eine bereits centrale Höhlenbildung zeigte, wahrscheinlich das Product eines vor 2 Jahren überstandenen langwierigen Keuchstussens.

Die Annahme einer traumatischen Ursache, besonders eines Falls auf den Kopf, zu welcher die Eltern stets geneigt sind, ist unter diesen Verhältnissen in der Regel eine Täuschung, und beruht meistens nur auf einem zufälligen Zusammentreffen. Insofern lässt sich wohl nicht in Abrede stellen, dass gerade bei Kindern mit tuberkulöser Disposition eine Commotion des Gehirns leichter, als bei anderen, hyperämische Zustände mit ihren Folgen nach sich ziehen kann (S. 288).

Ueber die Erfolge der Therapie kann ich Ihnen leider nur Ungünstiges mittheilen. Alle Aerzte, die es mit der Diagnose Ernst nehmen, werden mir darin beistimmen, dass sie jeden Fall von Meningitis tuberculosa von vornherein verloren geben und sich in dieser Prognose nicht täuschen. Die vereinzelter von den Autoren mitgetheilten Heilungsfälle

sind deshalb nur mit der grössten Reserve zu beurtheilen. Freilich lässt sich die Möglichkeit einer Heilung nicht in Abrede stellen. Bedenkt man, dass bei tuberkulösen Individuen doch nicht jede Pleuritis oder Peritonitis lethal verläuft, dass ferner die Gefahr der Krankheit nicht von den miliaren Granulationen der Pia ausgehen kann, die ja nicht selten ganz latent bestehen, so kann man die enorme Lethalität der Meningitis nur aus zwei Ursachen ableiten, einmal von der gleichzeitigen acuten Tuberkulose vieler anderen Organe, und zweitens von den localen Veränderungen, welche das Gehirn sowohl durch die Erweichung der unter der Pia liegenden grauen Substanz, wie durch den wachsenden Druck von den erweiterten Ventrikeln her erleidet. Ist es einmal so weit gekommen, so kann wohl an eine Wiederherstellung nicht mehr gedacht werden. Dagegen halte ich es nicht für unmöglich, im Beginn von Fällen, in denen die Milirtuberkulose nicht allgemein, sondern nur beschränkt auftritt, bei rechtzeitiger Therapie noch eine Heilung herbeizuführen, da es hier zunächst darauf ankommt, die beginnende Entzündung der Pia zurückzubilden und eine stärkere Infiltration in die graue Hirnschicht dringende Exsudation zu verhüten. Dass dieser Versuch nur in äusserst seltenen Fällen gelingt, ist eine Thatsache, aber ich glaube, dass es sich doch immer verlohnt, ihn zu machen, wenn nicht etwa eine vorgeschrittene Pithisis oder die Zeichen einer Tuberkulose des Gehirns denselben von vorn herein als einen vergeblichen erscheinen lassen.

Ich habe in früheren Arbeiten¹⁾ einige Fälle mitgetheilt, welche alle Erscheinungen der ersten Periode der Meningitis tuberculosa darboten, und durch eine energische Antiphlogose geheilt wurden. Einer dieser Fälle, ein 1²jähriges Kind betreffend, erlosch durch einen Anfall von Meningitis drei Jahre nach der ersten Erkrankung tödtlich, nachdem ein Bruder an derselben Krankheit zu Grunde gegangen war, und gerade dieser Umstand scheint mir für die Richtigkeit der Diagnose zu sprechen. Rilliet und Barthex berichten zwei Fälle, in denen ein paar Jahre nach der Heilung des ersten Anfalls der Tod durch Recidiv herbeigeführt wurde und bei der Section die alte und frische Tuberkeleruption in der Pia deutlich unterschieden werden konnte. Auch beschreibt Politzer²⁾ den Fall eines Kindes, welches drei Jahre zuvor eine Basillarmeningitis überstanden hatte, abgesehen von einer anhaltenden Magerkeit völlig genesen war, und bei der Section neben frischer Basillarmeningitis ein absterbendes schwieliges Exsudat am Pons darbot. Obwohl also auf

¹⁾ Beitr. von Kieferheilk. Berlin 1861. S. 11. u. N. F. 1868. S. 50.

²⁾ Jahrb. f. Kinderheilk. 1863. VI. S. 31.

Grund dieser Ausnahmefälle selbst nach gelungener Heilung immer ein letztales Recidiv früher oder später zu fürchten ist, darf diese Befürchtung den Arzt doch nicht zu einer passiven Haltung veranlassen. Die Scheu vor der Antiphlogose, welche jetzt Mode ist, hat wahrlich keine Erfolge aufzuweisen, während ich früher bei mehr energischem Eingreifen im Anfange wenigstens in einzelnen Fällen Genesung eintreten sah. Ich liess gleich im Beginn je nach dem Alter 3 bis 6 Blatogel hinter den Ohren appliciren, eine Eiskappe auf den Kopf legen, gab Calomel 0.05 2stündlich, bei nicht reichlichen Ausleerungen daneben auch Inf. Senae comp. oder Symp. spinæ cernuæ, und liess Unguent. emen. (0.5—1.0) ein paar Mal täglich in Hals und Nacken einreiben. Darf man auch von dieser Therapie nur ganz ausnahmungsweise einen Erfolg erwarten, so wird sie doch sicher nicht schaden in einer Krankheit, welche, sich selbst überlassen, sicher zum Tode führt. Der Versuch dieser Behandlung ist freilich nur in den ersten Tagen der Krankheit zu machen; späterhin kann weder diese noch irgend eine andere Methode mehr Hülfe bringen. Von den früher dringend empfohlenen äusserst schmerzhaften Einreibungen des Unguent. tartar. stibiat. in den Kopf bin ich ebenso zurückgekommen, wie von den Blasenplastern im Nacken, und das von mir in unzähligen Fällen beharrlich angewendete Jodkali hat auch nicht einen einzigen Erfolg aufzuweisen. Mit der Anführung anderer ebenso nutzloser Mittel will ich Sie nicht weiter belästigen.

XVIII. Die einfache Meningitis.

Die Frequenz der Meningitis simplex, mag dieselbe nun die Häute des Gehirns allein oder zugleich die Spinalmeningen befallen, tritt gegen diejenige der tuberkulösen Form erheblich zurück. Nur jene Aerzte, welche Gelegenheit hatten, die epidemische Meningitis cerebro-spinalis zu beobachten, gebieten über ein umfassendes Krankenmaterial, während unter den gewöhnlichen Verhältnissen die Zahl der Beobachtungen immer nur eine beschränkte bleibt.

Anatomisch charakterisirt sich die Krankheit im Allgemeinen durch das Fehlen aller tuberkulösen Bildungen sowohl im Gehirn und seinen Häuten, wie in den übrigen Organen, was natürlich nicht ausschliesst, dass auch ein tuberkulöses Individuum zufällig, z. B. in Folge einer Schädelfractur, von einer einfachen Meningitis befallen werden kann. Abgesehen von diesen und einigen andern, z. B. durch Pyämie bedingten Fällen, nimmt fast jede Meningitis bei Tuberkulösen immer jene anatomischen und klinischen Charaktere an, welche Sie eben kennen gelernt haben, und selbst das Fehlen der Miliartuberkel in den Pia (bei

dieser Regel keinen Abbruch. Die Meningitis simplex befällt nun zwar die Convexität der Hemisphären weit häufiger und intensiver, als die tuberkulöse Form, oft erstreckt sich aber die Entzündung auch auf die Basis und reicht von dieser aus über die Medulla oblongata mehr oder weniger tief in den Wirbelkanal hinein (Meningitis cerebro-spinalis). Neben einer bedeutenden Hyperämie der Pia, kleineren und grösseren Echymsen und partiellen Verwachsungen der Arachnoidea mit der Dura finden Sie das Gewebe der Pia mit gelbem oder gelblichgrauem Eiter infiltrirt, welcher theils dem Laufe der grösseren Blutgefässe folgt, theils schichtenartig ausgebreitet ist und auch in verschiedener Menge frei zwischen Arachnoidea und Dura enthalten sein kann, während in anderen Fällen das Exsudat eine dichte, mehr fibrinös-eiterige Beschaffenheit darbietet. Die graue Corticalschicht des Gehirns ist häufig an verschiedenen Stellen mit der Pia verwachsen und durch seröse Imbibition peripherisch erweicht. Die Ventrikel sind zwar in der Regel leer, keineswegs aber constant; in zwei Fällen fand ich sie durch ein trübes, von purulenten Streifen durchzogenes Serum stark ausgedehnt, wobei das Ependyma keine entzündlichen Veränderungen darbot, der Plexus chorioideus aber mit purulenten Beschlägen überzogen war. Nimmt das Rückenmark Theil, so findet man ganz ähnliche rein- oder fibrinös-eiterige Infiltrationen der Pia und des lockeren Maschengewebes der Arachnoidea, am stärksten und ausgedehntesten an der hinteren Fläche des Rückenmarks. Auch die innere Fläche der Dura mater, sowohl des Schädels, wie des Spinalkanals zeigt in tiefen Fällen Injection und eitrigen Beschlag. Alle diese Erscheinungen können den epidemischen wie den sporadischen Fällen der Krankheit gleichmässig zu.

Ebenso verhält es sich mit den Symptomen. Mir selbst bot sich bisher keine Gelegenheit dar, die epidemische Form in grösserer Ausdehnung zu beobachten, wenn auch zu manchen Zeiten hier in Berlin die betreffenden Fälle so schnell auf einander folgten, dass ich sie, zusammengestrichen mit den gleichzeitigen Beobachtungen anderer Collegen, immerhin als Beispiele einer Minutepidemie betrachten musste. Jedenfalls kamen mir die sporadischen Fälle, mit denen wir uns vorzugsweise beschäftigen werden, bei weitem häufiger vor. So weit meine Erfahrung reicht, ist das Kriterium eines stürmischen Verlaufs, welches man für die einfache Meningitis im Gegensatz zur tuberkulösen geltend machen will, durchaus kein allgemeingültiges, da es, wie wir sehen werden, nicht an Fällen fehlt, welche ebenso lange, ja noch weit länger dauern, als die tuberkulöse Form. Ueberhaupt scheint es mir hier fast noch schwerer, die vielfachen Varietäten der klinischen Erscheinung in

einen gemeinsamen Rahmen zu fassen, und ich habe es daher für praktischer, ihnen dieselben zu der Hand der Casuistik zu veranschaulichen.

1) Die milde Form. Schon oben, wo von der Hyperämie des Gehirns (S. 268) die Rede war, machte ich Sie darauf aufmerksam, dass bei kleinen, im Alter der ersten Dentition stehenden Kindern Cerebralsymptome auftreten können, welche keine andere Erklärung, als die einer Hyperämie des Gehirns oder der Meningen zulassen, und leicht in wirklich meningitische Symptome übergehen können. Dass solche Fälle nicht selten geheilt werden, spricht wohl nicht gegen die Diagnose der Meningitis, da bekanntlich auch während einer Epidemie von Cerebrospinalmeningitis leichtere mit völliger Genesung endende Fälle vorkommen. Diejenigen Fälle, welche ich im Sinn habe, verliefen etwa in folgender Weise. Inmitten völligen Wohlbefindens wurden die Kleinen plötzlich auffallend still und apathisch, feberten in mässigem Grade (38,2—39,5), hatten einen frequenten (132—160), aber meistens regelmässigen Puls und starke Neigung zur Somnolenz, welche sich allmählig bis zu einem leicht soporösen Zustande steigerte. Der Kopf ist heiss, die Fontanelles gewölbt, lebhaft pulsirend; dabei häufiges Zusammenschrecken, sowohl spontan, wie bei leisen Berührungen und Geräuschen, halbgeschlossene Augen, Starrheit des Blickes oder Strabismus. Von grosser Bedeutung ist immer ein wenn auch nur mässiger Grad von Genickstarre mit Retroversion des Kopfes, welche schon in liegender Stellung bemerkbar, noch stärker beim Aufrichten des Kindes hervortritt und zuweilen mit einer leichten, nicht immer gleichmässigen Rigidität der Extremitäten verbunden ist. Erbrechen kann im Beginn und auch im weiteren Verlauf eintreten, ist aber nicht constant, während der Stuhlgang fast immer verstopft ist. In dieser Weise kann sich die Krankheit zwei bis drei Wochen hinziehen, wobei der Arzt gewöhnlich darüber im Zweifel ist, ob er es mit einer einfachen oder tuberkulösen Meningitis zu thun hat, und ein schlimmes Ende voraussieht, bis zu seiner Ueberraschung die Symptome plötzlich sich bessern, das Kind aus seiner Somnolenz erwacht, zu lacheln beginnt, die Rigidität des Nackens und der Extremitäten schwindet und bald völlige Genesung eintritt. Dies sind die Fälle, in welchen mir nach einer mässigen Antiphlogose der consequente Gebrauch des Jodkali hilfreich zu sein schien, während dasselbe in der tuberkulösen Form ganz unwirksam ist.

2) Die schwere Form. Dieselbe erscheint keineswegs immer unter demselben Bilde. Bei sehr jungen Kindern namentlich, welche noch nicht klagen können, ist die Erkenntniss mitunter schwer. Die Krankheit kann 14 Tage und länger milde, wie in der ersten Form, verlaufen und schliesslich unter

Zunahme der Nackenstarre und Collaps tödlich eaden. In anderen Fällen bildet eine enorm hohe Temperatur die Hauptscheinung und erhält längere Zeit die Diagnose eines Typhus, bis schliesslich unverkennbare Cerebralsymptome auftreten:

Agnes W., das 8 Monate alte gesunde Kind eines Collegen, erkrankte am 8. März 1877 mit einmaligem starken Erbrechen. Das Kind war blass, nahm wenig die Brust und war gegen seine sonstige Gewohnheit sehr still, zeigte jedoch auch am folgenden Tage noch nichts wesentlich Krankhaftes: es lachte und sprang auf dem Arm des Vaters fast so lustig, wie früher. Am 10. und 11. bel wiederum die Apathie des Kindes und erhöhte Wärme auf, und die Messung ergab am Abend 40,8, so dass man den Ausbruch von Schmelz erwartete. In den vier folgenden Tagen bis zum 15. bildete nun das heisse Fieber die einzige scheinliche Krankheitserscheinung. Die Messungen ergaben:

	R.	A.
am 12. März.	40,9	41,0
13.	40,4	41,8
14.	40,6	40,2
15.	40,1	38,8

Das Sinken der Temperatur in den beiden letzten Tagen wurde durch zwei kalte Erweichungen, zwei Dosen Chinin (0,2 und 0,4) und schliesslich durch ein Bad von 20° C. erzielt. Die Diagnose schwankte zwischen Typhus und Meningitis, und bei meinem ersten Besuch am 15. wagte ich auch noch nicht, mich zu entscheiden, aber bereits am 16., also erst 8 Tage nach dem ersten Eintritt des Erbrechens, zeigte sich eine massige Starre der Nackenmuskeln mit Wendung des Kopfes nach links und einer lockeren Contraction des rechten Arms im Ellenbogengelenke. Weder durch anhaltende Einlenkungen des Kopfes, noch durch zweimal täglich wiederholte kalte Röhr- und Klistire von Chininlösung (0,5), gelang es jetzt, die hohe Temperatur herabzusetzen; dieselbe schwankte fast bis zum Tode stets zwischen 40,0—41,4, und ging nur in den beiden letzten Tagen temporär auf 38,5 herab. Puls zwischen 130—200, immer regelmäßig. Als nun am 18. das Gesicht wieder leichter beweglich und die Hals- bei der Palpation stark vergrössert erschien, das Kind auch trotz des andauernden hohen Fiebers auf Aufrufen gut reagierte und nach der vorgelagerten Uhr griff, wurden wir in der Annahme einer Meningitis wieder schwankend, bis am 19. mit erneutem Erbrechen auch die Nackenstarre und die Contraction des rechten Arms wieder eintraten und damit die Diagnose sicherer wurde. Aber erst am 21. Abends kam es zu Zuckungen des ganzen Körpers mit dunkelrothem Gesicht und starkem Schweissausbruch. In der Nacht häufiges Aufschreien und wiederholtes Erbrechen. Am folgenden Tage 3 Uhr Nachmittags ein halbminütiger epileptiformer Anfall, später heftige Kau- und Saugbewegungen, Strabismus convergens, Injection der Augen. Die Convulsionen wiederholten sich am 23. von 3—6 Uhr Nachmittags und traten 10 Uhr Abends von neuem ein, um bis zum 24. 3 Uhr Nachmittags, wo der Tod erfolgte, fortzuwähren. Puls schliesslich 200, fadenförmig. Section. Sehr intensive Meningitis cerebrosptinalis. Etwa 1 Esslöffel festes Eiter auf der Hirnoberfläche, eitriges Exsudat von 1 Cms. Dicke zwischen Arachnoidea und Pia, eitrige, eitrige Erweichung etwa 1 Cms. in die graue Hirnsubstanz hineinreichend. Verdrängt her. Mehr um das Brodcke vergrössert. Alle anderen Organe normal.

Dieser Krankheitsfall hatte durch seine lange Dauer, den Beginn mit Erbrechen, die mässigen am 8. Tage auftretenden spasmodischen Erscheinungen und die terminalen Convulsionen Ähnlichkeit mit der Meningitis tuberculosa, während die enorm hohe Continua einen wesentlichen Unterschied begründete. Hervorzuheben ist der bedeutende palpable Milztumor, welcher in der epidemischen Form der Meningitis nicht selten constatirt wird, hier aber in einem anscheinend sporadischen Falle vorkam. Ähnlich, aber ohne Milztumor, verlief der folgende¹⁾:

Bei einem 9 Monate alten kachectischen, aber von Tuberkeln ganz freien Kinde, fand 14 Tage lang Erbrechen nach jeder Mahlzeit statt, ehe die Genieklatur sich bemerkbar machte. Dabei hohes Fieber, Puls 132, regelmäßig, fast anhaltendes Geschrei, Contracturen der Finger und schliesslich während der 5 letzten Tage anhaltender Sopor und fast ununterbrochene epileptiforme Convulsionen. Auch hier trat das Erbrechen im letzten Stadium von neuem auf, die bis dahin pulsierende und gewölbte Fontanelle sank ein, die Papillen wurden weit und oedematös, der Puls klein und unregelmäßig schnell, das Athmen unregelmässig. Trotz energischer Antiphlogose Tod nach zweifelhaftem Verlaufe. Die Section ergab Meningitis purulenta der Convexität und Basis, welche sich auf die Pia des Cerebralsmarkes fortsetzte. Ventrikel dilatirt, mit trübem Serum und Eiter angefüllt. Sonst alle Organe normal.

Aus diesen Fällen ergibt sich, dass Rilliet und Barthez viel zu weit gehen, wenn sie behaupten, die Meningitis beginne bei ganz jungen Kindern immer mit Convulsionen, die sich Schlag auf Schlag wiederholen. Constant ist diese Art des Beginns keineswegs, wenn auch häufig, und wo sie vorkommt, können die initialen Krämpfe tagelange Pausen machen und erst zuletzt wieder eintreten.

So sah ich bei einem $1\frac{1}{2}$ jährigen Knaben am 19. März 1863 früh plötzlich heftiges Erbrechen und allgemeine Convulsionen auftreten, welche bis 5 Uhr Nachmittags fortaußerten, das 5. volle Tage, welche durch Somnolenz und andere cerebrale Symptome ausgefüllt wurden, dauerten, und schliesslich am Tage vor dem Tode wieder ausbrachen.

Ähnlich war der Verlauf in dem folgenden Falle, welcher zugleich gegen Rilliet und Barthez beweist, dass auch bei Kindern über zwei Jahren Convulsionen die Scene eröffnen können:

Ein 5 jähriges Mädchen wurde (sonst vollige) Gesundheit durch nachweisbare Ursache plötzlich von heftigen Kopfschmerzen und Erbrechen befallen, wem sich schon nach 3 Stunden allgemein epileptiforme Convulsionen und bald auch tiefer Sopor gemischten. Die Krämpfe setzten 12 Stunden lang gänzlich aus, begannen dann von neuem und brachen mit dem Tode, 48 Stunden nach dem Beginne der Krankheit aus. Section. Die ganze oberste Fläche des Hemisphären

¹⁾ Beitr. zur Kinderheilk. N. F. S. 13.

mit einem gelben, in das Frageschilder infiltrirten purulenten Exsudat überzogen, welches auf der Vorderlappen eine zusammenhängende Schicht bildete, nach hinten mehr dem Laufe der Gefäße folgte und tief in alle Sulci eindrang. Ein gleiches Exsudat umgab an der Basis die N. optici und Oculomotorii. Gehirne sonst normal, Ventrikel leer, die übrigen Organe gesund.

Hier sehen wir also ein schon älteres Kind in sehr stürmischer Weise und zwar von vorn herein mit heftigen epileptiformen Convulsionen erkranken und schon nach 48 Stunden zu Grunde gehen. In diesem Alter klagen die Kinder auch meistens heftig über Kopfschmerz und pressen stöhnend oder schreiend beide Hände gegen Stirn und Schläfen, während sehr junge Kinder den Kopfschmerz nur durch Greifen nach dem Kopf und durchdringendes Geschrei zu erkennen geben. Zwischen den beiden beschriebenen Formen liegt nun noch 3) eine mittelschwere Form, welche sich nicht nur durch einen langgezogenen Verlauf, sondern auch durch eine wechselnde Besserung und Exacerbation der Symptome auszeichnet, und dadurch ein stetes Schwanken zwischen Hoffnung und Ueberdruß bedingt. Mit diesem Wechsel der Symptome verbindet sich auch ein entsprechendes Schwanken der Temperatur, welche mitunter merkwürdige Sprünge zeigt. Genesung erfolgt in diesen Fällen, von denen ich Ihnen einige in meiner Klinik beobachtete als Beispiele mittheile, nicht selten.

Ernst P., 7 Jahre alt, aufgenommen im November 1872 mit Beginn der grünen Bräunung und typischen Symptomen. Koma, trockene röhrl. bald braun werdende Zunge, schwärzliche Lippen; Nist- und Lichtrufung normal. Temp. 39—39,5, später 38,8. Vom 6. Tage nach der Aufnahme an Nackensteife und starren Flexion der unteren Extremitäten; Erweiterung der Halspuls, häufiges lautes Aufstöhnen, später Flexion aller Finger und Supinationsstellung der Hände. Temp. von 36,5—38,2 schwankend. Am 12. Tage Besserung, Zunge feuchter, Tremor der Binde, Sensation zurückkehrend, Appetit besser. In den beiden folgenden Tagen wieder Verschlimmerung. Temp. normal. Vom 15. Tage an Sensation ganz klar. Temp. 38,5—39. Vom 22. Tage an verschwinden alle apathischen Erscheinungen. Euphorie, Fieberlosigkeit. Puls während der ganzen Krankheit zwischen 104—112 schwankend, nur einmal (am 28.) Puls 46 bei 36,8 Temp.

Otto K., 7 Jahre alt, aufgenommen im December 1872, mit gastrischen Symptomen, Kopf- und Leibschmerzen und innerer gespannter Bauchdecken. Vom 3.—7. Tage heftige Delirien, Somnolenz, völlige Apathie, Temp. normal. Vom 7. Tage an entschiedene Besserung, Sensation klar bis zum 11., wo wieder Verschlimmerung eintritt und über heftigen Nackenschmerz geklagt wird. Mäßige Gurgelstarrheit und Contractur der Adductoren der Oberschenkel. Temp. 38,5 mit 60—64 Pulsen bis zum 12. Abende. Bei fortwährender Steigerung aller Symptome. beträchtlicher Hyperæsthesie der unteren Extremitäten, wiederholten Erbrechen, starken Rücken- und Kreuzschmerzen steigt sich gleichzeitig die Temperatur auf 39,7—40,4 mit 110—142 Pulsen, bis am 14. alle Erscheinungen abnehmen und gleichzeitig Temp. und Puls allmählig zum Normalstande zurückkehren.

Die Behandlung bestand in beiden Fällen in der wiederholten Application von Blutegeln am Kopf und Halsigen Schröpfköpfen längs der Wirbelsäule, lauen Bädern (im ersten Falle mit kalter Bepflanzung des Kopfes und Rückens), Einreibungen grosser Salben, innerlich Calomel und Abführmittel.

In diesen Fällen, welche schnell auf einander folgten und in Verbindung mit mehreren ähnlichen in der Stadt beobachteten auf eine, wenn auch räumlich sehr beschränkte Epidemie deuteten, konnte man aus den Contractura und (im zweiten) aus der Hyperaesthesia der unteren Extremitäten auf eine Theilnahme der Spinalmeningen schliessen. Auch im Beginn des Sommers 1879 beobachtete ich rasch hintereinander mehrere Fälle dieser Art, unter welchen sich derjenige eines 5-jährigen Knaben durch die ungewöhnliche Dauer von beinahe 7 Wochen auszeichnete. Hier bestanden im Anfange als Hauptsymptom Anfälle von intensivem Kopfschmerz mit Erbrechen und lautem Geschrei, zu welchen sich bald Fieber mit sehr schwankender, zwischen schon Morgens auf 41,0 steigender Temperatur, schmerzhafter Steifigkeit des Halses und Steifung des Kopfes nach links hinüber geseilt. Das Bewusstsein blieb während des ganzen Verlaufs ungetrübt, und auch vielfachen Schwankungen in der Intensität der Symptome wurde das Kind schliesslich vollkommen hergestellt.

Die Genesung ist aber leider nicht immer eine vollständige. Wiederholt sah ich, wie auch viele andere Autoren, nach einer schweren Meningitis Taubheit oder Amaurose, bei jungen Kindern auch Taubstummheit für immer zurückbleiben. Man bezieht diese Sinnesstörungen auf neuritische Veränderungen, welche von der Fortleitung der Meningitis auf den Opticus und Acusticus abhängen sollen. Neuere Beobachtungen machen es wahrscheinlich, dass die Fortpflanzung auch durch die in das Felsenbein eindringenden Stränge der Dura mater zur Spangiosa des Knochens und von hier auf die Bogengänge des Labyrinths stattfinden kann, in welcher es dann zu einer hämorrhagischen Entzündung kommt¹⁾. Kinder, welche in sehr zarten Alter vor der Entwickelung der Sprache in Folge der Meningitis taub werden, bleiben natürlich auch stumm, weil zum Erlernen der Sprache das Gehör unentbehrlich ist. —

Unter den Ursachen der Meningitis spielen nächst dem epidemischen Einfluss, dessen eigentliches Wesen freilich ganz unbekannt ist, Verletzungen und Krankheiten der Schädelknochen eine Hauptrolle. Schon nach einer starken Commotio des Gehirns durch Schlag oder Fall können, wie oben bemerkt wurde (S. 267), Symptome von

¹⁾ Lucas, Virchow's Archiv. Bd. 88. 1882, S. 166.

Hyperämie des Gehirns auftreten und sich bis zu meningitischen steigern. So wurde am 5. April 1876 ein 10-jähriger Knabe in meine Klinik aufgenommen, welcher nach einem Sturz von der Treppe mit Kopfschmerz, Somnolenz, wiederholtem Erbrechen und so hartnäckiger Stuhlverstopfung erkrankt war, dass nur starke Wassereingussungen in den Darm mittelst des Irrigators Oefnung bewirkten. Fieber fehlte vollständig, Puls 68 in der Minute und etwas unregelmässig. Durch Blategel am Kopf, anhaltende Application einer Eishase und Ableitungen auf den Darm erfolgte nach 14 Tagen völlige Heilung. Weit gefährlicher sind aber Fissuren oder Fracturen der Schädelknochen, welche ausser der Meningitis noch mehr oder minder starke Blutungen innerhalb der Schädelhöhle zur Folge haben können:

Max E., 5-jährig, am 1. Juli 1875 aufgenommen, war vor 8 Tagen aus dem Fenster eines hohen Parterrewohnungs mit dem Kopf auf die Strasse gefallen. Sensorium benommen, rechts Papilleenger als die links, Hornhaut des rechten Auges angeblendet. Der Kopf ist nach rechts gewendet und Drehung nach links wird äusserst vermieden und abgewehrt. T. 39,8 P. 120, regelmässig. K. 30, Entleerung der Blase durch den Catheter, Blatigel und Eishase auf den Kopf. Purgantia. Am folgenden Tage lebhaftes Delirium, heftige Schmerzen beim Schlucken trotz der Versauertheit. Bei mässigen Pharynx. Vom 3. Juli an völlige Somnolenz, doch Gähnen beim Aufwachen. Mässige Genickstarre, leichte Zuckungen der Arme, zunehmende Pulsfrequenz bis zur Unzählbarkeit. Am 4. Abends Tod im Sopor.

Temp. den 2. Juli	39,6	39,8
3. -	40,1	40,5
4. -	41,5	40,5

Section. Starke Hyperämie und auf die Cerebraltät ausgebreitete paraloide Infiltration der Pia, besonders links. Feine Sahn vertheilt in der Pia, besonders links, an diesen Stellen grössere eitrige Plaques. In den Knochen des linken Schädelsbasis drei Sprünge, welche das Stirnbein, den grossen und kleinen Keilbeinfügel und das Schläfenbein durchziehen. Zwischen Dura und Knochen, diesen Fracturen entsprechend, Blutstauungen.

Bemerkenswerth ist hier das Fehlen aller wichtigeren Motilitätsstörungen, bis auf die leichten Zuckungen der Arme und die geringe Contractur der Nackenmuskeln. Die Schmerzen bei jeder Bewegung des Kopfes und beim Schlucken können wohl nur durch die dabei unvermeidliche Locomotion der fracturirten Knochenstücke erklärt werden, besonders die Schmerzen beim Schlucken durch die Action des Mus. pterygopharyngeus und stylopharyngeus, welche einen Zug auf die zerbrochene Schädelbasis ausüben mussten. Auch in diesem Falle finden wir eine unahstend sehr hohe bis 41,5 steigende Temperatur.

Auch als Folge chronischer Krankheiten der Schädelknochen kann die Meningitis sich entwickeln, doch ist mir selbst trotz der vielen Fälle von Caries des Felsenbeins, welche ich beobachtete, niemals

eine purulente Meningitis bei der Section vorgekommen, wohl aber die (S. 271) erwähnte Thrombose des angrenzenden Sinus mit eiterigem Zerfall und pyämischen Erscheinungen, oder die unter dem Namen Pachymeningitis bekannte hämorrhagische Entzündung der inneren Fläche der *Dura mater*, von welcher bereits (S. 262) die Rede war.

Secundär entwickelt sich Meningitis bisweilen im Verlaufe verschiedener acuter Krankheiten, z. B. der Pneumonie, des Scharlachfiebers, der Pyämie und Septicämie, zumal der Neugeborenen. In der Regel sind aber die Symptome unter diesen Verhältnissen mit denjenigen der Grundkrankheit derartig complicirt, dass eine bestimmte Diagnose sehr schwierig oder gar unmöglich ist. Jedenfalls muss die Complication einer Scarlatina oder Pneumonie mit wirklicher Meningitis eine seltene sein, da sie mir persönlich trotz des grossen Krankematerials noch nie vorgekommen ist, wenigstens nicht bei der Section, denn die cerebralen Symptome, welche bei diesen Krankheiten oft mit grosser Intensität auftreten, sind, wie wir später sehen werden, meistens auf ganz andere Weise zu deuten.

Dasselbe gilt von den Hirnerscheinungen (Sonnolenz, Apathie, Kopfschmerz, häufiges Zusammenzucken), welche bei allen stark fieberhaften Krankheiten der Kinder, zumal im Anfangsstadium, auftreten können und entweder nur als Folgen des Fiebers, d. h. der beträchtlichen Wärmehöhung, oder auch der Virulenz der Krankheit (bei Scharlach, Typhus, Diphtherie u. s. w.) betrachtet werden müssen. Von einer Meningitis, mit welcher Bezeichnung man früher sehr freigebig war, ist dabei keine Rede. Besonders mache ich Sie noch darauf aufmerksam, dass durch eine Otitis media oder selbst externa der Kinder heftige cerebrale Symptome entstehen können, welche zur falschen Diagnose einer Meningitis verleiten, bis plötzlich ein starker Eiterausfluss aus dem Ohr erfolgt und damit alle gefährlichen Symptome rasch verschwinden. Man wird daher in allen Fällen, wo Kopferscheinungen vorhanden sind, diese Möglichkeit im Auge behalten und wenigstens den äusseren Gehörgang genau zu untersuchen haben. Ein stärkerer Druck auf den Tragus reicht dazu oft schon hin, das Kind zum Schreien zu bringen. Nach meinen bisherigen Erfahrungen muss ich aber die Fälle, in welchen die Symptome einer Otitis in der That eine Meningitis vortäuschen, für selten halten, noch seltener diejenigen, in welchen meningitische Symptome durch eine Rhinitis veranlasst werden. Zweimal, bei einem 3jährigen Knaben und einem 4jährigen Mädchen, beobachtete ich nach einem Fall auf die Nase neben den localen Erscheinungen (Anschwellung, Empfindlichkeit der äusseren Nase, verschworres Athem-

hohen) häufige Stirnschmerzen, lebhaftes Fieber und Unruhe, nächtliche Delirien, welche mit der Ruptur des Abscesses und Ausfluss von Blut und Eiter aus der Nase schnell der Erde erreichen.

Schliesslich sei noch der sehr häufig gesteigerten Frequenz der Respiration gedacht, welche die Meningitis bisweilen begleitet und Anlass zur Verwechslung mit Krankheiten der Athmungsorgane geben kann. Allerdings ist diese Respiration in der Regel gleichzeitig unregelmässig, indem sehr frequente oberflächliche Athembewegungen mit langsamen, von Seufzern unterbrochenen alterniren, aber dieser Charakter ist nicht ganz constant, und die Frequenz bisweilen nur permanent.

Im Jahr 1864 beobachtete ich mit einem unserer erfahrensten Collegen ein 11 Monate altes Kind, welches früher völlig gesund, seit circa 8 Tagen an meningitischen Symptomen litt: Fieber, Somnolenz mit halbgeschlossenen Augen, leichte Nackenstarre, häufiges Zusammenzucken, starke Wüthung und Pulsation der Fontanelle. Dabei war die Respiration immer 20—30 in der Minute, sehr oberflächlich, aber vollkommen gleichmässig, von Husten. Untersuchung des Thorax immer durchaus negativ. Durch Application von Blutegeln am Kopf, kalte Fomentationen, Calomel rüffte Wiederherstellung, wemal auch die Athmefrequenz selbst wieder normal wurde.

In der Behandlung der Meningitis spielt die Antiphlogose die Hauptrolle. Wenn selbst hier manche Autoren vor Blutentleerungen Schreie tragen, so ist eine solche Enthaltung nur als eine sich schwer rühende Unterlassungssünde zu bezeichnen. Man hat dabei selbstverständlich den Allgemeinzustand der betreffenden Individuen zu berücksichtigen. Bei kleinen, leicht gefährdeten, anämischen oder durch Krankheit herabgekommenen Kindern werden nur mässige Blutentleerungen in Anwendung kommen, je nach dem Alter 2—4 Blutegel, deren Stiche man niemals nachbluten lässt, während ältere Kinder, zumal kräftige, 6—10 Blutegel oder eine gleiche Zahl blattiger Schöpfköpfe im Nacken oder auch am Rücken erfordern. Unter diesen Verhältnissen habe ich die Blutentleerung sogar wiederholt, wenn neue Exacerbationen eintraten und die Kräfte es erlaubten, und sah davon entschiedene Erfolge. Ich warne Sie nochmals dringend vor der jetzt so verbreiteten Energielosigkeit, welche lieber die Hände in den Schooss legt, als einen Blutegel ansetzt. Gleichzeitig applicire man daumel, so lange keine Collaps-symptome vorhanden sind, eine Eiskappe auf den Kopf, lasse Ung. mercur. (3stündlich 0,4—1,0) in Nacken, Rücken, Arm- und Schenkel einreiben und gebe innerlich Calomel 0,015—0,03 2stündlich. Die heftigsten Antipyretica, Chinin, salicylsäures Natrium, kalte Bäder, kalte Einwickelungen leisten hier gar nichts, und setzen, wie der S. 291 mitgetheilte Fall lehrt, nicht einmal die hohe Temperatur herab. Bei sehr

lethaler Umrde oder heftigen Convulsionen kann man Morphininjektionen (zu 0,002—0,005) oder Chloralhydrat (F. 9), sowie auch laue Bäder (25—26°) mit kalter Bespülung des Kopfes versuchen. Die S. 293 geschilderte milde Form, zumal die im Säuglingsalter auftretende, erfordert die Antipilogese nicht in dem eben empfohlenen vollen Umfange. Die Eiskappe, fortgesetzte kleine Calomellösen (0,01—0,015 2stündlich) und Mercurialeinreibung (1,0 Ung. conr. 2mal täglich) können im acuten Stadium ausreichen, doch braucht man sich auch hier vor der Application von 1—4 Blutegeln am Kopf nicht zu fürchten, wenn die Kinder sonst gesund und kräftig sind. Unter allen Umständen empfehle ich Ihnen nach dem Abklingen der acuten Periode das Jodkalium (F. 13). Während des fortgesetzten Gebrauchs dieses Mittels sah ich wiederholt die Kinder aus dem soporösen Zustande allmählig erwachen, die Contracturen verschwinden und schließlich völlige Genesung zu Stande kommen. Dagegen widerstanden die zurückbleibenden Sinnesstörungen (Taubheit, Verlust der Sprache, Amaurose) immer jeder Behandlungsweise.

XIX. Neuralgische Zustände.

Weit seltener als bei Erwachsenen werden Ihnen im Kindesalter auffallende Störungen der Sensibilität begegnet. Anästhesien, Hyperästhesien, Neuralgien gehören hier immer zu den Ausnahmefällen und stimmen in allen Beziehungen mit den im späteren Lebensalter auftretenden so überein, dass ich auf ein näheres Eingehen hier verzichten kann. Anästhesien zumal sind selbst bei älteren Kindern nur äusserst schwer zu beurtheilen, weil die Furcht vor der Nachuntersuchung, auch bei verbundenen Augen, die Resultate der Exploration in hohem Grade trübt. Selbst bei wichtigen chronischen Krankheiten der Centralorgane (Tumoren, Tuberkeln, Sklerosen) war es mir nie möglich, zu so sicheren Abgrenzungen anästhetischer Gebiete zu gelangen, wie bei Erwachsenen, und die genaue Beobachtung der motorischen und intellektuellen Störungen musste zur Diagnose ausreichen. Unter den Neuralgien verdient im Kindesalter nur die Colik, welche entweder als „fatulenta“ oder in Verbindung mit Diarrhoe auftritt (S. 113), und die Hemikranie (Migräne) eine besondere Erwähnung.

Die Migräne kommt bei Kindern, was nur der Unerfahrene bezweifeln kann, nicht viel seltener und mit nahezu denselben Symptomen vor, wie bei Erwachsenen. Auf Grund (vielhähriger Erfahrungen möchte ich indess behaupten, dass besonders seit etwa 12—15 Jahren die Frequenz dieser Fälle sich erheblich gesteigert hat und die Ursache dieser Zunahme in den übermässigen Anforderungen, welche die jetzige Pädagogik an

das kindliche Gehirn stellt, zu suchen ist. Die stets wachsende Ausdehnung unserer Stadt, welche den Genuss der Landschaft immer mehr erschwert, die geistige Anstrengung in den häufig überfüllten Schulräumen und die karg zugemessenen Mussestunden, welche noch durch hässliche Arbeiten und Musikunterricht verkümmert werden — das alles in Verbindung mit einer oft ererbten oder durch unzweckmässige Erziehung erworbenen Nervosität erscheint mir als die Hauptursache jener Kopfschmerzen, welche wir bei Kindern beiderlei Geschlechts etwa vom 7. Jahre an so häufig beobachten.

Neben dieser Ursache kommt aber noch eine erbliche Anlage in Betracht. Nicht selten bekam ich Kinder wegen Migräne in Behandlung, bei welchen sich die Heredität, sei es von väterlicher oder mütterlicher Seite her, bestimmt nachweisen liess. Unter diesen Umständen können mehrere Kinder derselben Familie mit diesem Leiden befallen sein.

Zwei Geschwister von 10 und 8 Jahren litten schon seit einigen Jahren an ausgebildeten Anfällen von Migräne, Stirnschmerz mit Uebelkeit und Erbrechen, Photophobie, Aufstehen dunkler starrer Bläue. In dem einen Falle während der Schmerzen vollständige Aufregung und grosse Empfindlichkeit der Haare beim Kämmen, die auch in den Intervallen nicht ganz verschwand. Anfälle alle paar Monate eintretend, Dauer 2—4 Tage. Vater stark an Migräne leidend.

Auch die Anämie, welche schon bei Kindern von 5—6 Jahren oft vorkommt, noch häufiger sich erst nach dem Alter der zweiten Dentition einstellt, begünstigt die Entwicklung der Migräne, die hier meistens mit Schwindel verbunden auftritt, und ebenso wird bei den hysterischen Zuständen, welche ich ihnen früher (S. 193.) schilderte, häufig über heftigen Kopfschmerz geklagt. In einzelnen Fällen blieben auch nach dem Verschwinden solcher Zustände (Anfälle von Halluzinationen, Zuckungen u. s. w.) noch längere Zeit Kopfschmerzen mit dem Charakter der Migräne zurück. Dagegen kommt das weibliche Genitalsystem, dessen Krankheiten im späteren Alter so häufig zu Kopfschmerzen Anlass geben, bei Kindern kaum in Betracht, und deshalb erscheint nur der folgende Fall, allerdings der einzige, den ich beobachtet habe, um so bemerkenswerther:

Ein 7 jähriges Mädchen, in der Poliklinik am 2. Januar 1872 vorgestellt, seit mit dem Mai 1871 in Anfällen von Migräne. Heftige Schmerzen in Stirn und Schläfe, Uebelkeit, enorme Abspannung, Lichtscheu. Dauer derselben ein paar Stunden. Wiederkehr unregelmässig. Dabei unruhiger Schlaf mit häufigen Zusammenzucken des Körpers. Seit dem Mai 1872 besteht Fluor albus, Istrieitus vaginae stark getrieben. Hygien normal. Ther. Fomentationen mit Bismut, Injectionen von Zink. sulphur. (0.5 auf 200.0) in die Vagina. Innerlich Chinin, später Breuchali. Nach verschiedenen Schwankungen schwanden alle krankhaften Erscheinungen.

zungen bis zum Decubitus, wo der Faser altus und mit ihm die Migraineanfälle wieder auftraten. Weiterer Verlauf unbekannt.

In Fällen dieser Art muss man daran denken, dass sowohl der Vaginalkatarth wie die Kopfschmerzen von einer Geistesreizung durch Omales oder Ascariden herrühren können, und hat nach dieser Richtung hin zu untersuchen.

Im Allgemeinen fand ich den Sitz der Migraine bei Kindern nicht so streng halbseitig, wie bei Erwachsenen, vielmehr meistens in der Mitte der Stirn. Die Dauer der Anfälle schwankte zwischen wenigen Stunden und zwei Tagen, wobei dann die zwischenliegenden Nächte nicht selten durch Unruhe, Hitzegefühl und Sprechen aus dem Schlafe gestört waren. Erbrechen, Schen vor hellem Licht und Geräusch waren häufig, zuweilen auch allgemeines Zittern und rasche Respirationsbewegungen, wie in den beschriebenen hysterischen Anfällen. Die Intervalle waren ganz unregelmässig, betrug einmahl nur wenige Tage, in anderen Fällen mehrere Wochen. Unter den Gelegenheitsanlässen war keiner häufiger, als die Atmosphäre und die geistige Anstrengung der Schule, so dass viele Kinder aus denselben nach Hause geschickt werden mussten. Auch Gemüthsaffecte jeder Art, Furcht vor Strafe, Scheltreden sah ich sofort den Anfall hervorrufen. Aus den gewohnten Verhältnissen herausgenommen, auf dem Lande, in Badeorten blieben sie meistens von den Anfällen ganz verschont, welche nach der Rückkehr in die Heimath sich bald wieder einzustellen pflegten.

Selbst bei der sorgfältigsten Untersuchung und Beobachtung bleibt der wissenschaftliche Arzt hier nicht selten im Zweifel, ob er es mit einer Migraine oder mit einem durch eine Gehirnkrankheit (Tuberkel, Tumor) bedingten Kopfschmerz zu thun hat. Dass solche Affectionen sich längere Zeit nur durch Kopfschmerzen kund geben können, welche alle Charaktere der Migraine an sich tragen, erwähnte ich bereits früher (S. 240), und die Diagnose kann daher nur durch eine längere Zeit fortgesetzte Beobachtung der Intervalle und durch die genau Erforschung der oben geschilderten ätiologischen Verhältnisse festgestellt werden.

Nach der Natur dieser letzteren wird sich auch die Behandlung zu richten haben. Während wir gegen die erbliche Anlage machtlos sind, können wir uns so entschieden gegen den Einfluss der geistigen Ueberanstrengung ankämpfen. Ich verkenne nicht die Schwierigkeiten, welche sich uns hier entgegenstellen. Nur unter sehr günstigen Verhältnissen können wir die Kinder gänzlich aus der Schule nehmen und durch Privatlehrer unterrichten lassen, um dadurch mehr Zeit für körper-

liche Uebungen und für den Genuß frischer Luft zu gewinnen. Wiederholt sah ich auch gute Erfolge, wenn ich die Kinder aus den Städtgymnasien herausnehmen und in Pensionaten auf dem Lande weiter ausbilden liess. Aber die Majorität der kleinen Patienten klebt leider an der Schule und die Behandlung ist dann um so schwieriger, als nicht bloss die Lehrer, sondern auch viele ehrsüchtige Väter des ärztlichen Rathschlages ihr Veto entgegenzusetzen. Es bleibt dann nur übrig, die häuslichen Arbeiten einzuschränken, für regelmässige Müssesunden zu sorgen und die Ferien möglichst zu verlängern. Die in neuester Zeit erlassenen Ministerialrescripte, welche eine Beschränkung der kindlichen Geistesarbeit erstreben, sind daher mit Dank anzuerkennen; von der Befolgung derselben seitens des Lehrpersonals dürfen wir weit mehr erwarten, als von der ärztlichen Therapie. Die zur Kräftigung des Nervensystems viel empfohlenen, fast traditionellen kalten Abreibungen nach dem Aufstehen aus dem Bett leisteten mir hier wenig oder gar nichts, mehr noch kalte Bäder und Schwimmübungen. Bei Anämischen empfiehlt sich das Eisen. Specifische Mittel kenne ich nicht. Das gerühmte Chinin und das Kali bromatum, welche ich in zahlreichen Fällen versuchte, gaben sehr wechselnde Resultate (Chinin, sulphur, oder muriat, 3mal täglich zu 0,05, Kali bromatum zu 0,5—1,0 ebenso oft). Aufenthalt an der See, im Bergwalde, und geistige Ruhe wirken besser als alle Medicamente, wenn auch meistens nur temporär. Immer hat man auch daran zu denken, dass Simulation im Spiel sein kann und die Schmerzen erheblich übertrieben werden, um aus der Schule heraus zu kommen. Bei Verdacht oder Gewissheit der Dummheit wirkt meiner Erfahrung nach eine ernste Vorstellung der Gefahren, welche man absichtlich übertribt, auf herangeschossene Kinder weit mehr als Strafe.

Vierter Abschnitt.

Krankheiten der Respirationsorgane.

1. Die Entzündung der Nasenschleimhaut. Rhinitis.¹⁾

Die Schleimhaut der Nasenhöhle, des Kehlkopfes und der Luftröhre ist besonders bei Kindern der niederen Volksklassen, welche sich ohne

¹⁾ Vgl. die Schilderung der *Turges neonatorum* und *syphilitica* S. 127 und S. 84.

Aufsicht allen Uebeln des Winters aussetzen pflegen, ungewöhnlich häufig katarrhalischen Affectionen unterworfen. In ihrer Erscheinung sind diese denen der Erwachsenen sehr ähnlich: Anschwellung und Verstopfung der Nase, später vermehrte Secretion purulenten Schleims, Niesen, katarrhalische Theilnahme der Conjunctiva, Heiserkeit, rauher oder bellender koller Husten mit oder ohne Fieberbewegungen. Ausser den atmosphärischen Einflüssen sind es besonders die Masern, zu deren constanten Prodromen jene Katarrhe gehören, und zur Zeit einer Masern-epidemie können Sie in der That aus dem Auftreten dieses Katarrhs bei einem bis dahin verschont gebliebenen Kinde mit grösser Wahrscheinlichkeit auf den bevorstehenden Ausbruch des Exanthems schliessen. Unter allen Umständen ist ein wenn auch nur leichter Katarrh des obersten Abschnittes der Respirationsschleimhaut bei kleinen Kindern immer viel ernster zu nehmen, als im späteren Lebensalter, weil die Erfahrung lehrt, dass schon ein einfacher Schnupfen in sehr kurzer Zeit zu stenotischen Erscheinungen im Larynxeingange Anlass geben oder auch sich rapide bis in die tieferen Bronchialverzweigungen ausbreiten kann. Säuglinge mit Schnupfen oder leichtem Larynx- und Trachealkatarrh sollen deshalb nicht ins Freie gebracht, sondern vor rauher Luft sorgfältig geschützt werden.

Seltener als die Masern, aber immer noch häufig genug sehen wir das Scharlachfieber und die Diphtherie zu eintzindlichen Erscheinungen auf der Nasenschleimhaut Anlass geben, die sich in beiden Fällen meistens secundär zu einer bereits bestehenden diphtheritischen Affection des Pharynx hinzugesellen. Aus der mehr oder minder geschwollenen Nase fliesst ein jauchig-eitriges Secret über die Oberlippe, welche ebenso wie die Nasenlöcher durch den Contact geröthet und excoriirt wird. Die Umgehung der Nase ist in schweren Fällen oedematös geschwollen, die Conjunctiva injicirt, das Auge durch Obstruction des Ductus naso-larynalis stark thranend. Es gelang mir aber nur selten, die diphtheritischen Auflagerungen der Nasenschleimhaut selbst zu sehen, weil dieselben fast immer so hoch sitzen, dass sie sich selbst beim Auseinanderbiegen der Nasenflügel dem Blick entziehen. Weit seltener reichen die Auflagerungen so weit abwärts, dass sie dem Blicke zugänglich sind, worauf ich an einer späteren Stelle zurückkommen werde. Noch weit schwieriger, meistens sogar unmöglich ist in diesem Alter die Untersuchung des Nasenrachtraums mittelst des Spiegels. Die Anschwellung der Schleimhaut ist in diesen Fällen so bedeutend, dass das Athemholen mehr oder weniger beeinträchtigt, und ein schnarchender Ton, besonders während des Schlafes, erzeugt wird. Im Allgemeinen

ist diese Rhinitis, sowohl bei Scharlach wie bei Diphtherie, ein böses Omen, doch kommt sie auch in den leichteren Graden beider Krankheiten bisweilen vor, ohne eine schlimme Wirkung auszuüben. Dass die Diphtherie auch mit einer Affection der Nasenhöhlen beginnen kann, werden wir später sehen; aber nur sehr selten kommt eine pseudomembranöse Rhinitis für sich allein vor, ein Fall, den ich nur ein einziges Mal bei der Tochter meines unvergesslichen Traube beobachtete. Durch die sorgfältige Beobachtung des Vaters gewinnt derselbe noch an Interesse:

Das 8-jährige, sonst gesunde Mädchen erkrankte an der Erscheinung eines von mässigen Fieber begleiteten Schnupfens. Ein auffallendes Schnarchen im Schlaf und häufige Klagen über ein das Athmen erschwerendes Hindernis in der Gegend der Nasenwurzel deuteten auf eine erhebliche Stenose des Nasenkanals, ob sie sonst bei einfacher Coryza croupulosaem pflegt. Die von Traube selbst vorgenommene Spiegelinspektion ergab im Pharynx und an der Epiglottis nur eine katarrhalische Rötze. Nach Ablauf einiger Tage schmauchte das Kind mit grosser Anstrengung eine zähe weisse Masse von der Länge eines Fingergliedes aus, welche bei der Behandlung mit Essigsäure aufspritz und dadurch ihre bläuliche Farbe verlor. Nach einigen Tagen erfolgte aümals die Ausstossung einer bedeutend kleineren Masse, worauf alle Beschwerden sofort nachliessen. Die Behandlung war fast rein expectator gewesen (Belladonna und ein paar Dosen Calomel).

Handelte es sich in diesem Falle um eine wahre, auf die Nasenhöhle beschränkte Diphtherie oder nur um eine einfache croupöse Rhinitis? —

Eine chronische Form von Rhinitis findet sich sehr häufig bei skrophulösen Kindern in Verbindung mit mehr oder weniger ausgesprochenen Symptomen dieser Cachexie, Kopfschlägen, Augenentzündungen, Otorrhoe, Ekzemen im Gesicht und Hyperplasien der Cervicaldrüsen. Anschwellung der äusseren Nase, schnüffelnder und schnarchender Athem, Ausströmen eines serös-purulenten Secrets aus den exstirirten Nasenlöchern, Rötung und Schwellung der Oberlippe gehören hier zu den häufigsten Erscheinungen. Nicht selten giebt diese chronische Rhinitis auch zu wiederholten Anfällen von Erysipelas Anlass, welches aus den Nasenlöchern herauswachsend sich in flügel förmiger Gestalt über die beiden Wangen oder noch weiter verbreitet (S. 44). Aber auch ohne skrophulöse Anlage kann eine chronische Rhinitis nach den Masern, dem Scharlach, oder selbst nach einem sehr heftig auftretenden Schnupfen zurückbleiben. Abgesehen von der Anwendung der antiskrophulösen Mittel, auf welche ich später zurückkommen werde, liess ich in allen solchen Fällen die Nase täglich mit einer Lösung von Argent. nitricum

(1 : 10) auszuseln und sah davon meistens gute Erfolge. Unter die jetzt gerühmten Eingussungen von Jodform fehlt nur eigene Erfahrung.

Bei einer grossen Zahl von Kindern besteht eine ausgesprochene und unerklärliche Neigung zu katarrhalischen Affectionen des Kehlkopfswinganges, welche besonders schnell sich entwickeln, wenn die Kinder von einem Schnupfen befallen werden. Unter diesen Umständen muss man beim Eintritt auch der leichtesten Koryza auf die gleich zu beschreibenden Zufälle gefasst sein, die in ihrer Erscheinung eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Croup haben und deshalb auch mit dem Namen

II. Der Pseudocroup

bezeichnet werden. Wenn Sie erfahren, ein Kind habe schon 4—5 Mal die „Brüme“ überstanden, so können Sie immer sicher sein, dass es sich um diese Affection und nicht um den wirklichen Croup handelt. Obwohl meistens ohne jede Gefahr, gehört doch der Pseudocroup zu den am meisten beunruhigenden und für den Arzt unbequemsten Krankheiten, weil er die zuckelnde Ruhe desselben besonders häufig zu stören liebt.

Die Krankheit beginnt immer plötzlich, meistens nach einer kurz zuvor entstandenen leichten Koryza (Schneifeln, Niesen), und zwar fast immer in der Nacht, oft schon bald nach dem ersten Einschlafen. Mit einem heftigen oder rauhen, dem croupösen ganz ähnlichen Husten-anfall fähren die Kinder aus dem Schlafe empor und setzen sofort die Familie in Schrecken. Nicht bloss der Husten, sondern fast noch mehr die denselben unterbrechenden tiefen Inspirationen sind von einem verschiedenen croupösen sägeartigen Geräusch begleitet, und dasselbe regt sich auch zwischen dem Weinen und Schreien, welches sich bei kleinen Kindern in diesem Zustande einzustellen pflegt. Das Geschrei selbst kann dabei ganz normal oder etwas heiser klingen. Während dieses Anfalls sitzen viele Kinder mit ängstlichem Ausdruck und gerötheten Wangen aufrecht im Bette, athmen mühsam und geräuschvoll, sind äusserst unruhig, greifen auch wohl wiederholt nach dem Halse. Die Haut ist heiss, oft mit Sch weiss bedeckt, der Puls beschleunigt. Ein solcher Anfall dauert in der Regel nur einige Minuten, aber auch nach demselben bleibt der Athem oft etwas geräuschvoll und frequenter, als im Normzustande. Der schnell hinzugerufene Arzt findet das Kind gewöhnlich wieder in einem verhältnissmässig ruhigen Zustande, oder gar schlafend, die respiratorischen Rallismuskeln beim Athmen wenig oder gar nicht thatig, höchstens die Nasenflügel sich leise heftend und senkend,

und kann schon hieraus den beruhigenden Schluss ziehen, dass das Athemungs Hinderniss kein ernstliches und der echte Croup für den Augenblick wenigstens nicht vorhanden ist. Wer einige Zeit am Bette des Kindes wartet, kann aber leicht die Wiederholung des geschilderten Anfalls erleben; jedenfalls pflegen die aus dem Schlafe erwachenden Kinder wieder mit croupalem Klänge zu husten und beim Weinen oder Schluchzen langgezogene rauhe Inspirationen hören zu lassen. Auch ein Druck auf Larynx und Trachea vermag sofort einen solchen Hustenstoss hervorzuführen. Am nächsten Tage befinden sich viele Kinder in der Regel wieder ganz wohl, und nur ein hin und wieder vortretender rauher oder bellender Husten erinnert noch an den nächtlichen Sturm. Des andern aber wiederholt sich dieselbe Scene in der folgenden Nacht, und ich pflege daher die Eltern immer auf diese Möglichkeit vorbereiten. Damit ist aber in den meisten Fällen die Sache zu Ende, und es bleibt nun noch ein gewöhnlicher loser Husten zurück, der sich 8–14 Tage lang hinziehen kann. Wie Sie sehen, ist eine Gefahr bei diesem Verlaufe gar nicht zu besorgen, und das Lästige des Zustandes liegt nur darin, dass er sich so häufig wiederholt. Trotz der Gewohnheit bleibt aber der Croupston des Anfalls immer so schreckensvoll für die Eltern, dass nur Wenige so besonnen sind, die Nachruhe ihres Arztes nicht immer wieder zu stören.

Die Untersuchung der Rachenhöhle ergibt beim Pseudocroup höchstens eine leichte katarrhalische Rötthe und Schwellung, und auch mittelst des Kehlkopfspiegels konnte man im Larynx, besonders in seinem Eingange, nichts weiter nachweisen. Es handelt sich hier also um einen gewöhnlich von der Nasenhöhle aus in den Larynxeingang hinaufsteigenden Katarrh, bei welchem, wie bei jedem Schnupfen, besonders während des Schlafes eine vermehrte Schwellung der Mucosa stattfindet und das jähe Erwachen mit Athemnoth, Angstgefühl und rauhem Husten zur Folge hat. Durch warmes Getränk (Zuckerwasser, Milch) pflegt die Trockenheit des Hustens und Athems vermindert zu werden, und mit dem Eintritt einer reichlicheren katarrhalischen Secretion verschwindet der beunruhigende Charakter vollständig. Der Arzt thut daher gewiss gut, in solchen Fällen nicht sofort eine zu grosse Energie zu entwickeln, sondern mehr expectativ zu verfahren. Ich lasse fleissig warmes Wasser oder Milch trinken, hydropathische Umschläge, auch wohl warme Kataplasmen um den Hals appliciren, unter allen Umständen aber die Kinder ein paar Tage im Bette halten, bis der nachfolgende lose Katarrh sich entwickelt hat. Empfehlenswerth ist auch die anhaltende Application einer Speckschmelze auf die vordere Halspartie, wodurch ein leichtes

Erythem oder kleine Pusteln erzeugt zu werden pflegen. In der grossen Majorität der Fälle kam ich mit dieser Therapie sehr gut aus, und halbe daher die Gewohnheit, in jedem solcher Fälle gleich ein Brechmittel zu verordnen, für verwerflich. In Familien, wo der Pseudocroup so zu sagen endemisch ist, ein Fall, der nicht selten vorkommt, pflegen die Mütter Brechmittel vorräthig zu halten, um sie nach der Ankunft des Arztes anzuwenden zu können. Ich muss mich entschieden gegen diesen Missbrauch erklären, welcher die Kinder ganz unnützer Weise schwächt. Die Wiederholung der Anfälle zu verhindern, giebt es kein Mittel. Abkürzung hilft gar nichts, weit mehr sorgfältiges Behüten vor Erkältung. Viele Kinder leiden schon seit ihrem 9. oder 10. Lebensmonat an diesen Anfällen von „Bräune“, welche mit den Jahren seltener und milder werden und gegen das 6. oder 7. Lebensjahr von selbst zu verschwinden pflegen. Solche Kinder müssen, besonders wenn sie einen Schnupfen bekommen, vor rauher Luft sorgfältig geschützt und im Zimmer gehalten werden, was freilich den Pseudocroup nicht immer verhindert.

Ganz ähnliche Zufälle eröffnen bisweilen die Scene bei der Entwicklung der Masern und des Keuchhustens. Beide Krankheiten, besonders die Masern, können mit einem solchen Anfall beginnen, welcher dann in einen gewöhnlichen Katarrh übergeht und im ersten Falle nach einigen Tagen, im zweiten nach einer bis zwei Wochen seine Masern- oder Keuchhustennatur bekundet.

Nach der Schilderung, die ich Ihnen gab, könnten Sie aus den Pseudocroup constant für eine leichte ungefährliche Affection halten. Wenn aber auch die grosse Majorität der Fälle auf diese Weise verläuft, so dürfen Sie sich doch nie in Sicherheit wiegen lassen und nicht versäumen, das Kind noch in den nächsten Tagen nach dem ersten nächtlichen Anfall zu beobachten. Obwohl nur selten, sah ich doch hin und wieder einen ächten, durch Auswurf von Pseudomembranen und durch die Section constatirten Croup 36—48 Stunden nach einem solchen Anfall von Pseudocroup sich entwickeln, und diese Möglichkeit legt Ihnen in jedem Falle des letzteren die Pflicht auf, die Kinder bis zum Eintritt des leeren Katarrhs, d. h. so lange der Husten noch einen leicht copulalen Beiklang hat, oder so lange bei forcirten Inspirationen ein rauhes Geräusch hörbar ist, consequent im Zimmer zu halten.

III. Die Atelektase der Lunge.

Für alle respiratorischen Krankheiten der Kinder ist die vorwiegende Tendenz der kindlichen Lunge zum „Collapse“ von einschneidender Be-

deutung. Diese unter dem Namen der „Atelektase“ bekannte Eigenschaft besteht darin, dass die Lungenalveolen die überaus grosse Neigung zeigen, luftleer zu werden und derartig zusammenzufallen, dass ihre Wandungen sich berühren. Bei den Sectionen der meisten an Krankheiten der Respirationorgane gestorbenen Kinder, aber auch nach vielen anderen mit Erschöpfung einhergehenden Zuständen, und zwar um so häufiger, je jünger die Kinder waren, finden Sie an der Aussenfläche der Lungen, besonders an den vorderen Blättern, am unteren und inneren Rande des Unterlappens und an der über dem Pericardium lagernden Lingula scharf umschriebene Marmorirung oder stahlblaue, etwas unter dem Niveau deprimirte Partien von sehr verschiedener Grösse, bald nur vereinzelt und klein, bald ausgebreiteter und zu langen Streifen, oder thalergrossen und noch umfangreicheren Herden zusammengeflossen. Auf dem Durchschnitte erscheinen dieselben dorb, nicht knisternd, lassen keine Luftbläsken, sondern nur etwas blutige Flüssigkeit austreten und sinken im Wasser zu Boden. Die Schnittfläche ist glatt und lässt deutlich die bindegewebigen Septa der Lobuli in Form weisser Streifen erkennen. Lange Zeit hielt man diese atelektatischen Lungenpartien für pneumonische Herde, mit welchen sie doch nichts weiter als eben die „Verdichtung“ des Parenchyms gemein habe. Erst durch das einfache von Legendre und Bailly angegebene Verfahren, durch einen Tubus Luft in den zuführenden Bronchus einzublasen, erkannte man die Natur der in Rede stehenden Veränderung. Denn während das Lufteinblasen auf wirklich pneumonische Verdichtungen ohne Einfluss bleibt, blähen sich die nur collabirten atelektatischen Partien auf und nehmen dabei eine hellrothe Farbe an.

Als Ursachen der Atelektase kann man mit Bestimmtheit zwei Momente bezeichnen, in erster Reihe eine Herabsetzung der Inspirationskraft, welche die Luft nicht bis in die Alveolen hineinzutreiben vermag, und zweitens die Aufkantung der Bronchien mit Schleim, welcher den Durchtritt der Luft erschwert. Sobald diese nicht mehr in die Alveolen eingedrungen sind, wird nach den Ergebnissen der Experimentalpathologie¹⁾ die in den letzteren noch enthaltene Luft durch das circulirende Blut absorbirt, worauf die Alveolen collabiren. Am häufigsten und am ausgebreitetsten werden Sie also die Atelektase in denjenigen Fällen finden, in welchen die beiden vorher genannten Momente vereint wirken, daher in allen erschöpfenden und mit Bronchialkatarrhen einhergehenden Krankheiten. Aus diesem Grunde trifft man die Atelektase unter ähn-

¹⁾ Liechke, *Archiv. f. exper. Path.* X. S. 54.

lichen Verhältnissen auch bei Erwachsenen, z. B. beim Typhus, im Allgemeinen aber weit seltener und minder ausgebreitet als bei kleinen Kindern, deren inspiratorische Energie schon im normalen Zustande eine verhältnissmässig viel geringere ist. Besonders sind die rachitischen Kinder mit verengtem Thorax der Atelektase ausgesetzt, weil hier zu den bereits erwähnten Ursachen (Schwäche der Inspiration und Bronchialkatarrh) noch eine dritte, nämlich die Raumbegrenzung des Thorax, welche mechanisch die volle Ausdehnung der Lunge erschwert, hinzukommt. Aber auch bei den Stenosen des Larynx, der Luftröhre, der grossen und kleinen Bronchien, sei es durch entzündliche Prozesse oder durch hineingelangte fremde Körper entwickeln sich multiple Atelektasen der Lunge in Folge der erschweren Luftzufuhr zu den Alveolen und der im weiteren Verlaufe der Krankheit immer mehr sinkenden inspiratorischen Energie.

So oft man nun auch die Lungenatelektase in den Leichen der Kinder findet, ebenso selten ist man im Stande, dieselbe bei Lebzeiten zu diagnostizieren. Diese Schwierigkeit ist um so mehr zu beklagen, als das Hinzutreten der Atelektase zu den Krankheiten, in deren Gefolge sie auftritt, keineswegs gleichgültig ist. Wenn auch die Annahme, nach welcher in den atelektatischen Partien in Folge des mangelnden Luftdruckes auf die Gefässe leicht Hyperämie des Gewebes mit ihren Folgen, und schliesslich Bronchopneumonie sich entwickeln soll, nicht bewiesen ist, vielmehr durch einige experimentelle Thatsachen zweifelhaft gemacht wird¹⁾, so wird man doch immer die durch multiple Atelektasen erhöhte Ineffizienz der Lunge als ein die Prognose wesentlich trübendes Moment betrachten müssen. Die Schwierigkeit der Diagnose liegt aber darin, dass die im Parenchym zerstreuten kleinen Atelektasen durchaus keine physikalischen Symptome hervorrufen, vielmehr durch die lufthaltigen Partien und die lebhaften Geräusche gänzlich maskirt werden, und dass selbst ausgebreitete, einen grossen Theil des Unterlappens befallende Atelektase eben nur Verdichtungserscheinungen (matten Schall, Bronchialathmen u. s. w.) bedingen, welche sich in keiner Weise von denjenigen der pneumonischen Verdichtung unterscheiden. Nur der Mangel des Fiebers würde entscheidend für die Atelektase sein, wenn man nicht wüsste, dass bei kleinen sehr herabgekommenen Kindern auch Pneumonien ohne Temperaturerhöhung vorkommen, und dass andererseits Atelektasen auch sehr häufig im Gefolge fieberhafter Krankheiten

¹⁾ Traube, Beitr. zur experiment. Pathologie u. Physiologie. Heft I. 1886. Experiment 65.

(Bronchitis, Croup, Typhus) sich ausbilden. Aus diesen Gründen kann, wie ich glaube, von einer sicheren Diagnose der Atelektase fast nie die Rede sein, höchstens von einer Wahrscheinlichkeitsdiagnose, deren Motive aus der anatomischen Erfahrung, d. h. aus dem häufigen Befunde der Affection bei gewissen Krankheiten und bei Erschöpfungszuständen der Kinder entnommen werden.

Anders verhält es sich mit jener Form von Atelektase, welche als angeborene auftritt und durch die Arbeit von Jörg früher bekannt war, als diejenige, mit welcher wir uns eben beschäftigten. Es handelt sich hier um das Verharren eines grösseren oder kleineren Theils der Lungen in dem fötalen Zustande. Die betreffenden Theile haben überhaupt noch nicht geathmet, und sind daher wie in der Fötushöhle dicht, stahlblau, schwerer als Wasser, also in demselben Zustande, welchen wir bereits als einen durch Schwäche der Inspiration oder durch Abschneidung der Luftzufuhr zu den Alveolen erworbenen kennen lernten. Aus diesem Grunde pflegt man auch diese Form der Atelektase als eine Rückkehr des Lungengewebes zum „fötalen Zustande“ zu bezeichnen. Im Allgemeinen gelten für die angeborene Atelektase ganz ähnliche Ursachen wie für die erste Form, besonders eine stockende oder sehr schwache Athmung, wie sie den asphyktischen oder den zu früh geborenen, lebensschwachen Kindern zukommt, und deshalb haben die Geburtshelfer am häufigsten Gelegenheit, diese Affection zu beobachten, welche den Ärzten und selbst in Kinderhospitälern immer nur selten vorkommt. In der Regel ist die angeborene Atelektase weit ausgedehneter als die später entstandene, und giebt dann nicht allein zu deutlichen Verlichtungssymptomen bei der physikalischen Untersuchung, sondern auch durch die erhebliche Störung des kleinen Kreislaufs zu Stauungen in der Lungenarterie und im gesammten Venensystem mit cyanotischer Verfärbung Anlass. Aus demselben Grunde kommt auch bei diesen Kindern die Schliessung der fötalen Circulationswege, namentlich des Foramen ovale, nicht immer in der normalen Weise zu Stande. Viele Neugeborene dieser Art gehen in Folge der Atelektase und der ihr zu Grunde liegenden Lebensschwäche rasch zu Grunde, während es in einem Theil der Fälle, in welchen die Verlichtung nicht beide Lungen in zu grosser Ausdehnung betrifft und die Verhältnisse sonst günstig liegen (ausreichende Pflege, Wahl einer guten Amme) gelingen kann, unter Hebung des allgemeinen Kräftezustandes auch die atelektatischen Lungenpartien allmählig der Luft zugänglich zu machen:

So wurde mir im Mai 1880 ein 3 Wochen altes, zu früh geborenes, äusserst schwach zur Welt gekommenes Kind vorgestellt, welches in der ersten Woche cyano-

nach grossen und meistens heftigen dyspnoeischen Anfällen abstanden hatte. Das rechte Rückgrüthle war fast von oben bis unten in dem Raum zwischen Wirbelsäule und Scapula gefüllt; das normale Athemgeräusch daarbij fehlte, und dafür waren Rasselgeräusche hörbar, während links alles normal erschien. Fieber war nie vorhanden gewesen. Bei guter Ernährung durch eine passende Nahrung, Wein und den Gebrauch von Kamillenabködem hatte sich das Kind auffallend gut entwickelt; der Percussionsschall war zur Zeit unserer Untersuchung nur noch wenig von dem der anderen Seite verschlucken, das vesiculäre Athmen noch schwach, aber deutlich hörbar, und im October konnte nur noch ein leichter Bronchialkatarrh bei dem gut genährten Kinde nachgewiesen werden.

Ich glaube, dass dieser Fall kaum anders als congenitale Atelektase eines grossen Theils des rechten Unterlappens aufgefasst werden kann, da die Erscheinungen von der Geburt an bestanden, niemals Fieber vorhanden war und eine gute Nahrung und Pflege ausreichte, um die drohenden Erscheinungen allmählig zu bannen. Dagegen sehen wir in dem folgenden Fall unter der Einwirkung äusserst ungünstiger Lebensverhältnisse den tödtlichen Ausgang eintreten:

Kind von 6 Wochen, von einer unbekanten Mutter bei starrer Winterkälte auf einem Haufen ausgegesetzt, am 8. Januar 1873 in die Klinik aufgenommen. Sehr kleines und mageres Kind, cyanotische Färbung der Lippen und Augenlider, Turgescenz der Kopf- und Gesichtsröthe, Athembewegungen äusserst schwach und oberflächlich, statt des Geräusches nur klingendes Wiszern. Percussionsschall überall etwas dümpler als im Normalzustande, aber nirgends entziffen matt. Athemgeräusch sehr schwach hörbar, ohne Rassel. Percussion normal. Saugen aus der Flasche wegen Schwäche unmöglich, so dass das Kind mit dem Löffel gefüttert werden muss. Secret im Munde und Rachen. Temperatur subnormal 36,2. Trotz guter Milch, Wein und bester Pflege nur geringe Besserung; mit zunehmender Kraft der Inspiration schwindet die Cyanose, kehrt aber immer zurück, wenn die Athembewegungen wieder erlahmen. Tod am 16. Februar im Collaps.

Section. Herz normal, alle Führgänge geschlossen. Secret des Oesophagus. Hämorrhagischer Niereninfarct. Sonst alles normal bis auf die Lungen. Beide untere Lappen grösstentheils atelektatisch, doch so, dass immer noch lufthaltige Partien zwischen den verdichteten sichthe waren. Auch in den anderen Lappen verstreute atelektatische Herde. Bronchien normal.

IV. Die entzündlichen Affectionen des Kehlkopfes und der Luftröhre.

Der acute Katarrh der obersten Respirationewege entwickelt sich entweder aus einem pseudocroupösen Anfall, oder allmählig mit zunehmender Heiserkeit und raschem oder bellendem Husten. Es giebt Kinder und Erwachsene, bei welchen jeder Husten, auch wenn er Wochenlang dauert, einen hohlen metallischen Klang hat, wobei aber alle anderen Anzeichen einer Larynxaffection, insbesondere Veränderungen

der Stimme fehlen können. Diese Eigenthümlichkeit muss bei der Beurtheilung des einzelnen Falls mit in Anschlag gebracht werden, weil sie leicht zu unbegründeter Beunruhigung Anlass geben kann. Ueberhaupt ist der hohle metallische Hustenklang bei weitem weniger zu fürchten, als der rauhe, heisere, welcher in Verbindung mit einer mehr oder weniger belegten Stimme immer besorgniserregend ist. Uebe man unter diesen Umständen einen mässigen Druck mit dem Finger auf die Trachea oder den Larynx aus, so verzucken die Kinder nicht nur schmerzhaft das Gesicht, sondern husten auch gewöhnlich mit jenem rauhen heiseren Klange, den wir als *crispös* zu bezeichnen pflegen. Die Inspiration wird besonders während des Weinsens und Schreiens, also bei verstärktem Athembedürfniss, von einem sägsartigen Geräusch begleitet, wobei indess die Respiration vollkommen ruhig, ohne Spur von Dyspnoe sein kann. In den ersten Tagen nach einem überstandenen Pseudocroup wurde ich öfters schnell wieder geholt, weil plötzlich von neuem heftige laryngeale Symptome aufgetreten seien, und ich fand dann fast immer, dass eine ähle Laune des Kindes, Schreien und Toben daran Schuld war. Sobald die Agitation aufhörte, beruhigten sich auch schnell die drohenden Erscheinungen, und es ist daher rathsam, die Eltern auf den Eintritt und das Unerwartete dieser Exacerbationen vorzubereiten, welche nur insofern bedeutsam sind, als sie aus den Fortbestand eines wenn auch in der Rückbildung begriffenen katarrhalischen Zustandes im Kehlkopf anzeigen. Zu diesen lokalen Symptomen gesellt sich oft Appetitmangel, schleimiger Zungenbelag und wohl auch ein mässiges Fieber mit abendlicher Exacerbation. Immer erfordern solche Fälle die volle Aufmerksamkeit des Arztes, weil man nie voraussetzen kann, ob nicht schon die nächsten Stunden das Krankheitsbild in einem weit drohenderen Charakter erscheinen lassen werden.

Unter diesen Umständen kommt am das Brechmittel (F. 6), vor dessen Missbrauch in den einfachen Fällen des Pseudocroup ich Sie ohn warnte, zu seinem Rechte. Nachdem dasselbe seine Schuldigkeit gethan, mögen Sie eine Mixture salivæ (F. 15) und hydropathische Umschläge am Hals verordnen. Das Kind muss natürlich im Bette bleiben, bis der Husten jede Spur von *crispösem* Beiklang verliert, und die Inspirationen absolut geräuschlos geworden sind. Bei dieser Behandlung pflegt der Catarrh binnen wenigen Tagen sich zu lösen; der Husten wird locker, raschelnd, die Heiserkeit schwindet, und nach 8–14 Tagen ist in der Regel Alles vorüber. Dennoch sei man immer auf die Möglichkeit einer Steigerung gefasst, welche trotz der aufmerksamsten Pflege eintreten kann, meistens aber nur die Folge einer Vernachlässigung ist

und daher vorzugsweise häufig in der Armenpraxis beobachtet wird. Hier können die bis dahin nur dem Eingeweihten bedenklich erscheinenden Symptome binnen wenigen Stunden eine Höhe erreichen, welche das Leben erheblich gefährdet. Diese gewaltige Steigerung der Erscheinungen beruht entweder auf einer rasch zunehmenden katarrhalischen Schwellung, oder auf einer fibrinösen Ausschüttung der entzündeten Schleimhaut, oder endlich auf einer serös-purulenten Infiltration der Ligamenta aryepiglottica und der nächsten Umgebung. Alle diese anatomischen Abnormalitäten bringen nahezu das gleiche klinische Bild, die acute Larynxstenose hervor, mit welcher wir uns zunächst zu beschäftigen haben.

Zu den bisher geschilderten Symptomen, Heiserkeit, rauhem Husten, Empfindlichkeit des Larynx und der Trachea gegen Druck, geräuschvoller In- und Expiration, tritt nun plötzlich Dyspnoe, Action der Nasenflügel, Mühebewegung des Kopfes beim Athmen, zunehmende Einziehung des Jugulum, des Epigastrium und der ganzen unteren Thoraxpartie während der Inspiration. Dabei ist aber die Frequenz der Athembewegungen kaum erhöht und überschreitet selbst in schweren Fällen nur selten die Zahl von 24—28 in der Minute. Die einzelnen In- und Expirationen, welche von einem unheimlichen sägeartigen Geräusch begleitet werden, sind dagegen ungewöhnlich verlängert¹⁾. Bei alledem kann die allgemeine Euphorie des Kindes ziemlich ungestört bleiben. Ein 4-jähriges Mädchen erkrankte am 30. März 1879 mit Pseudocrup. Trotz eines Brechmittels steigerten sich die Symptome, und als sie am 1. April in die Poliklinik kam, war die hochgradigste Dyspnoe, der Cruphusten und das sägeartige Geräusch beim Athmen vollkommen ausgebildet, wobei aber das Kind immer noch im Zimmer umherging und spielte. Der Auswurf dichter, weißer Pseudomembranen und die Section bestätigten bald, dass es sich hier um einen wirklichen Crup handelte. Der raue Beiklang, welcher in allen solchen Fällen die Inspiration, oft auch die Expiration begleitet, lässt sich am besten mit dem Doppelgeräusch einer holzscharrenden Säge vergleichen. Seine Intensität ist nicht zu allen Zeiten dieselbe, milder stark oder wohl auf kurze Zeit ganz schwindend nach dem Erbrechen, am stärksten während des Schlafes, wo er schon dem ins Zimmer tretenden Arzte unheilverkündend entgegenläuft.

Im weiteren Verlaufe der Krankheit nehmen, wenn die Behandlung

¹⁾ Ueber die Deutung dieser Erscheinung vergl. Cohnheim, Vorlesungen über allgemeine Pathologie II, Berlin 1880, S. 168.

erfolglos bleibt, die Symptome der Stenose fast von Stunde zu Stunde zu. Als wollte es das Hinderniss des Athmens entfernen, greift das Kind oft nach dem Halse und liegt den Kopf gewaltsam nach hinten. Die bisher noch gute Gesichtsfarbe wird bleich und cyanotisch, die Augen sind ängstlich, kühlflehend auf die Umstehenden gerichtet, auf Stirn und Wangen stehen oft helle Schweisstropfen, wobei aber die Haut nicht mehr warm, vielmehr an der Nasenspitze und den Wangen meistens kühler erscheint. Mit der Dyspnoe nimmt auch die Heiserkeit der Stimme rasch zu und steigert sich bis zur völligen Aphonie, wobei dann auch der bisher rank klagende Husten immer tonloser wird und schliesslich fast ganz erlischt, wenigstens mehr sichtbar als hörbar ist. Das Fieber spielt im Verlaufe dieser Krankheiten keine erhebliche Rolle. Wenn es auch niemals ganz fehlt, so erreicht doch die Temperatur nur selten einen sehr hohen Grad, schwankt meistens zwischen 38,5 und 40,0 mit Remission in den Morgenstunden, während die Pulsfrequenz durch die stete Unruhe des Kindes nicht selten auf 144 und mehr erhöht wird.

Der geschilderte Symptomencomplex gestattet, wie ich schon bemerkte, nur die Diagnose einer acuten Laryngstenose. Wedurch dieselbe bedingt wird, lässt sich nicht sofort entscheiden. Vor Allem müssen Sie die Rachenhöhle genau untersuchen, um sich von der Gegenwart oder Abwesenheit diphtheritischer Auflagerungen auf der Schleimhaut zu überzeugen. Finden Sie dieselben, — ist die diphtheritische Natur der Stenose damit sichergestellt; finden Sie aber keine Auflagerungen, so dürfen Sie deshalb nicht gleich die Möglichkeit eines diphtheritischen Croup zu Abrede stellen, weil, wie wir später sehen werden, die Auflagerungen in der Rachenhöhle sich während des Lebens unseres Blicken entziehen können, vielleicht auch schon abgestossen sind. Wo es gelingt, den Kehlkopfspiegel anzuwenden, da werden wir allerdings eine klare Einsicht in das Wesen der Krankheit gewinnen, aber bei den Schwierigkeiten dieser Untersuchung im Kindesalter (8. 9) dürfen Sie von derselben nur in einer kleinen Zahl von Fällen etwas erwarten. Kann man mit Sicherheit einen diphtheritischen Process ausschliessen, so handelt es sich entweder um eine einfache oder eine pseudomembranöse (fibrinöse) Laryngitis (Croup), denn es ist thatsächlich bewiesen, dass die hochgradige Dyspnoe, überhaupt fast alle Symptome des Croup auch durch eine acute, nur mit starker Anschwellung der Kehlkopf Schleimhaut ohne irgend eine croupöse Exsudation einhergehende Laryngitis erzeugt werden können. Solche Fälle sind natürlich durch eine antiphlogistische Behandlung weit eher zu besiegen, als die pseudomembranöse Form.

Maria F., 55jährig, gewöhlt, bekam in der Nacht zum 7. December (zur Zeit einer Metastase) einen heftigen Anfall von Pseudocroup. Am folgenden Tage Eupnoe bis 1 Uhr Mittags, wo plötzlich ein so drohender Symptomencomplex auftrat, dass ich schleunigst gerufen wurde. Significantes Geräusch beim Athmen, cyanothiches mit Schweiss bedecktes Gesicht, zerflügelte Kopf, gewaltiges Anstrengen aller inspiratorischen Hilfmuskeln, Emporreißen der Bulci zwischen den halbgeöffneten Lippen, kurzer, rauher, von einem pfeifenden Geräusch begleiteter Husten, welcher durch Druck auf den Larynx sofort gemacht wurde, Heiserkeit der Stimme, Im Rachen nichts Abnormes; Trinken ohne Beschränkung möglich. Das vesiculäre Athmen durch den lauten aus dem Larynx herausschöpfenden Stridor völlig verdeckt, nur an der Lungenbasis am Rhonchus sonorus wahrnehmbar. Puls 120, Haut heiss und schweißend. Ich reichte 6 Blutegel oberhalb des Manubrium sterni einer Nachblutung, zweifelh. Tartar. stibiāt. ℞ ʒi auf ʒj. dest. 100.0 2 stündlich 1 Kinderloffel). In der 5 Uhr Nachmittags noch kein Erbrechen erfolgt, gab ich ein Brechmittel aus Pulv. zell. ipomee. und Tart. emet. in starker Dosis, worauf wiederholtes Erbrechen eintrat. Um 8 Uhr fand ich das Kind etwas ruhiger auf dem Schoosse der Mutter sitzend, den Stridor vermindert, die Stimme reiner, die Haut reichlich schweißend. Ich liess die Lösung des Reschadinatins weiter nehmen und ein Vesicator auf den Kehlkopf appliciren. Nach einer ruhigen Nacht fand ich am 9. den Stridor beim Athmen beinahe ganz verschwunden, die Respiration ruhig, den Husten vermindert. Nach jedem Löffel der Arznei war Erbrechen, aber kein Stuhlgang erfolgt; die Venicator hatte eine grosse Blase gezogen, welche geöffnet und mit Unguent. cinereum verbunden wurde. Gegen 2 Uhr Nachmittags erfolgte bei der Application eines Klysters, gegen welche sich das Kind heftig sträubte, eine neue Exacerbation der Larynxsymptome, die sich indess in der Ruhe bald wieder verlor. Von nun an rasche Besserung, Uebergang in einen leisen Husten, welcher etwa bis zum 15. unter dem Gebrauche einer Mucina salivata verschwand.

Sie haben hier ein Beispiel für die Entwicklung einer sehr schweren Laryngitis aus einem pseudocroupösen Anfange und zugleich für die Wirksamkeit einer energischen Antiphlogose, welche ich in so heftigen Fällen nicht dringend genug empfehlen kann. Lassen Sie unverzüglich 2—6 Blutegel je nach dem Alter auf die vordere Halspartie appliciren, am besten dicht über dem Manubrium sterni, um einerseits die Gegend des Larynx für anderweitige wässere Mittel frei zu halten, andererseits um im Falle starker Blutung eine kühnere Unterlage behufs der Compression der Blutegelstiche zu gewinnen. Die Anwendung kalter Compressen oder eines Eiseuteils auf den Kehlkopf halte ich hier nicht für ausreichend. Wiederholt war ich Zeuge, dass schon während der Blutentleerung die heftigsten Athembeschwerden erheblich nachliessen. Die nach sehr reichlicher Blutung vielleicht zurückbleibende Schwäche und temporäre Anämie darf Sie nicht zureckschrecken, denn Sie werden weit eher mit diesen Folgezuständen fertig, als mit der drohenden entzündlichen Stenose. Nach der Blutentleerung gebe ich ein Brechmittel oder den Tartarus emeticus in dost. refr. (F. 18), welche, wie die eben mit-

geheilte Krankengeschichte lehrt, keineswegs immer Erbrechen oder Durchfälle bewirkt. Bei sorgfältiger Beobachtung, wenn der Brech Weinstein, sobald Diarrhoe oder zu starkes Erbrechen eintritt, sofort ausgesetzt wird, habe ich niemals üble Folgen gesehen, während in der Armenpraxis, wo man das Mittel oft unvorsichtigen Händen anvertrauen muss, allerdings hiezuweilen bedenkliche Collapserscheinungen hervorgerufen wurden. Hier ist es also immer vorzuziehen, statt des fortgesetzten Gebrauchs des Tartar, stilbistius lieber ein volles Emeticum zu geben, dessen Wirkung sich leichter berechnen und beschränken lässt. Einreihungen der grauen Quecksilberalbe (1,0 2—3mal täglich) in die Seitentheile des Halses, schliesslich ein Vesicator auf den Kehlkopf, dessen Wundfläche ich in der Regel mit Unguent. vanc. verbinden lasse, vervollständigen den für diese höchsten Grade des acuten Larynxkatarrhs zu empfehlenden Heilapparat. Das auffallend schnelle Verschwinden der drohenden Symptome in Fällen, wie der oben mitgetheilte und der folgende, beweist, dass es sich in der That nur um eine acute katarrhalische Wulstung der Schleimhaut gehandelt haben kann:

Paul B., 2 Jahre alt, am 17. October Abends mit heftiger Dyspnoe aufgenommen. Gesicht cyanotisch, Augen hervorgetrieben, unstillbar; Inspirationen heftiggezogen und ängstlich, Acten aller respiratorischen Hilfsbewegungen, besonders stark in der Nacht. Tussiven geschwollen, ohne Auflagerungen, starke Heiserkeit der Stimme. Epiglottis dem Gefühl nach normal. Puls 100, Temp. 39,2. Dauer der Symptome seit zwei Tagen. Brechmittel. Schon am folgenden Tage waren Cyanose und Athembeschwerden nahezu verschwunden, Patient nun spielend im Bett, Reizen und Inspiration noch eingeengt. Temp. 38,8. Tartar. stilbist. (0,1 auf 120,0) 3mal, 2,5 grs die Stunde. Am nächsten Tage beherstet. Wegen der noch bestehenden Heiserkeit und des rauhen Gefühls bei forcirter Inspiration Vesicator auf den Larynx. Entlassung am 24. October.

Man denke nur an die listige Verengung der Nasenhöhle, welche bei jedem starken Schnupfen plötzlich durch verstärkte Schwellung der Mucosa, insbesondere während der Nacht, zu Stande kommen kann, und man wird es begreiflich finden, wie in gleicher Weise, nur mit bedeutend drohenderen Symptomen, bei einem Katarrh des Larynx und der Trachea sehr acute Anschwellungen der Schleimhaut entstehen könnten, welche sich unter einer zweckmässigen Behandlung fast ebenso schnell wieder zurückbilden. Dasselbe können aber auch trotz aller Bemühungen ein tödtliches Ende nehmen, indem eine starke oedematöse oder serö-punkente Infiltration der Stimmbänder, der Epiglottis und ihrer Falten, (das sogenannte Oedema glottidis, besser Laryngitis submucosa) zu allen entzündlichen Processen in der Nähe des Larynxeingangs sich leicht hinzugesellt und plötzliche Erstickungsgefahr herbeiführt. Des-

hält sich nicht allein die Fälle von acutem Larynxkatarrh, Croup oder Geschwüren des Kehlkopfes mit dieser Gefahr bedroht, sondern auch bei intensiver Pharyngitis, bei Mandelabscessen und tief dringenden Phlegmonen des Halszellgewebes kann dieselbe sich geltend machen. In England wurde besonders eine Verbrühung des Schlundes und des Larynxeinganges mit kochendem Wasser, welches die Kinder durch Saugen an der Augensonde des Thekessels aspirirten, häufig als Ursache dieser submissen Laryngitis beobachtet, wovon ich selbst noch kein Beispiel gesehen habe. In allen diesen Fällen erreichen mit dem Eintritt des „Glottisödem“ die acute geschülterten dyspnoischen und stenotischen Erscheinungen einen so hohen Grad, dass Erstickung in jedem Augenblicke zu besorgen ist. Bisweilen kann man auch mit dem tief eingeführten Finger die stark geschwollene Epiglottis fühlen oder sogar hinter der Zunge aufragend sehen. Zur Rettung des Lebens bleibt hier die schleunige Ausführung der Tracheotomie das einzige Mittel.

Die Gefahr der acuten Laryngitis bei Kindern liegt aber seltener in den eben erwähnten Verhältnissen, als vielmehr in der Tendenz zur fibrinösen Exsudation auf der entzündeten Schleimhaut. Während in der bisher betrachteten Form die Autopsie nur eine mehr oder weniger dunkle Rötze und Wulstung der Schleimhaut, höchstens auch oberflächliche Erosionen derselben und eine serös-purulente Infiltration der geschwollenen Epiglottis und ihrer Nachbarschaft, zumal der Ligam. aryepiglottica und der Stimmbänder ergiebt, finden wir hier auf der Schleimhaut des Kehlkopfes und der Luftröhre inselförmig aufsteigende Fetzen, oder grössere zusammenhängende Pseudomembranen von grau- oder gelblich weisser Farbe, entweder von florantiger Zartheit oder bis zu 1^{cm} und darüber dick, und dann aus mehreren übereinander gelagerten Schichten bestehend, deren äusserste, d. h. der Schleimhaut zunächst anliegende als die jüngste am wenigsten consistent zu sein pflegt. Diese Membran, welche mikroskopisch aus einem äusserst feinen Fibrinnetz und zahlreichen jungen Zellen (Epithelien, Eiterkörperchen) besteht, reicht häufig bis weit in die Trachea hinein, bis an die Bifurcation derselben oder gar über dieselbe hinaus bis in die grossen und mittleren Bronchien, und stellt dann cylindrische Abgüsse dieser Röhren dar, welche mah, da sie nicht adhärent sind, sondern ganz locker aufliegen, leicht aus den letzteren herausziehen kann. Nach der Entfernung der Pseudomembran findet man die Schleimhaut mehr oder weniger geröthet und gewulstet, nur selten blass, ohne Spur von Vascularisation. Bronchitis und Bronchopneumonie sind fast stete Begleiter,

ebenso Emphysem der oberen und vielfache Atelektasen zumal der unteren Lappen.

Indem ich nun den Croup als die höchste Entwicklung der acuten Laryngitis ansehe, befinde ich mich im Widerspruche mit der Ansicht derjenigen Aerzte, welche den Croup unter allen Umständen als einen diphtheritischen betrachten und jede andere Entstehung desselben entschieden leugnen. Ich gebe zu, dass seit der epi- und epidemischen Verbreitung der Diphtherie bei uns der Croup viel häufiger geworden ist, sehe aber darin noch keinen Grund, jede andere Entstehungsweise desselben in Abrede zu stellen. Wir wissen aus Experimenten, dass man bei Kaninchen und Hunden durch verschiedene auf die Trachealschleimhaut applicirte Caustica, so wie durch Einathmen heisser Wasserdünste mittelst einer in die geöffnete Luftröhre eingebrachten Canüle den exquisitesten Trachealcroup erzeugen kann. Es liegt daher die Annahme sehr nahe, dass auch bei Menschen ein so starker Reiz, wie derjenige der eingeathmeten kalten Luft, welcher in geringerem Grade nur Katarrh erzeugt, bei stärkerer Einwirkung Croup hervorbringen kann. Es bleibt dahingestellt, ob die Ansicht von Weigert und Cohnheim richtig ist, welche meinen, dass wenn das Epithel, welches beim Katarrh immer noch intact bleibt, erodirt und durch Secret weggeschwemmt wird, das von der entzündeten Schleimhaut abgesonderte fibrinöse Exsudat gerinnt und damit die Croupmembran bildet. Der Reiz des diphtheritischen Infektionsstoffes, wahrscheinlich die Aspiration desselben von der Rachenhöhle her, ist gewiss der häufigste, aber keineswegs der einzige Anlass des Croup. Vielmehr kann sich jeder intensive Larynxkatarrh zu demselben steigern, und daher sehen wir gerade bei den Masern, einer Krankheit, welche von Anfang an immer einen Katarrh des Larynx und der Trachea im Gefolge hat, hie und da schon sehr frühzeitig diese Steigerung zum Croup eintreten, ohne dass von Diphtherie irgendwo die Rede ist:

Knabe von 3 Jahren, aufgenommen am 28. Mai 1873 mit ausstehenden Masern. Exanthem im Gesicht entwickelt; Puls 150, Temp. Ng. 39,5, Ax. 40,5; starker Katarrh des Larynx; rauher (mit aphonen) Husten. Secret keine. Bei der sorgfältigsten Untersuchung liess sich nichts weiter nachweisen, als eine flockige Rötze des Gaumens und eine einfache Angina. Therapie: Eisegel über dem Munde, sterc. Tartar. sublat. Am folgenden Tage bedeutende Besserung. Puls 116, Temp. 38,4, Resp. 32. Nur die Heiserkeit war noch unverändert, und beim Husten noch ein laryngealer Klang hörbar. So vergingen 4 (halb)freie Tage, während welcher die erwähnten Larynxsymptome fortbestanden. Plötzlich am Abend des 5. Juni Temp. wieder 38,5, am nächsten Morgen 39,5. Seit der Nacht am 12. Uhr vollständig entwickelter Croup, so dass Mittags während der Klinik die Tracheotomie ge-

nacht werden musste. Aus der größten Leutostre kommt wie einen langen bis in die Epiglottis hinreichenden Essigstängelchen heraus. Auch später wurden noch Fäden ausgehohlet. Am 10. Tage Entfernung der Canüle. Vollständige Heilung.

Schon früher theilte ich ein paar Fälle mit, welche die Existenz eines primären estrindlichen, von der Diphtherie unabhängigen Croup zu beweisen geeignet waren. Dieselben betrafen Kinder von resp. 7 und 15 Monaten, und zeigten bei der Section Larynx- und Trachealcroup ohne die geringste Veränderung der Rachenhöhle. Seit jener Zeit hatte ich nun wiederholte Gelegenheit zu ähnlichen Beobachtungen, ganz abgesehen von den noch zahlreicheren Fällen, in denen die Section nicht gemacht werden konnte, und die ich deshalb nicht als vollständige Beweise betrachten kann, weil ja die Möglichkeit vorliegt, dass die Diphtherie in der Tiefe des Pharynx ihren Sitz gehabt und sich daher unseren Blicken entzogen haben konnte. Dagegen wird man wohl die folgenden Fälle als beweisende anerkennen müssen:

Max B., 1½ Jahre alt, aufgenommen am 4. April 1877 mit Rachitis und heftigen Bronchialkatarrh. In den nächsten Tagen weitere Verbreitung des letzteren, hieser und vorn beiderseits Rhonchi marcescentes. In der Nacht vom 9.—10. plötzlich cessante Respiration und leiserer (saher) Husten. Am 11. Vormittags vollständiger Croup. Im Pharynx keine Spur von Diphtheritis sichtbar. Unter den Lungen hört man das von oben fortgesetzene vesiculäre Geräusch, daneben noch sehr starkes Athemen und hieser Rhonchi sibilans. Temp. 39,8, Puls 144, Resp. 42. Trotz starker Brechmittel steigern sich die Ercheinungen bis zum folgenden Tage. Temp. darauf 40,4—40,9, Resp. 48, grosse Mattigkeit und Somnolenz. Tod am 12. Section: Pharynx frei. Croup des Larynx und der Trachea, Oedem glottidis. Bronchopneumonia duplex; Rachitis.

Solche Fälle, welche mit einem Bronchialkatarrh beginnen und plötzlich in Tracheo-Laryngitis fibrinosa übergehen, werden unter dem Namen „des aufsteigenden Croup“ beschrieben. Die Ausführung der Tracheotomie, welche projectirt war, wurde durch den überaus rapiden Verlauf vereitelt, würde auch bei der Ausdehnung der doppelseitigen Bronchopneumonie erfolglos geblieben sein.

Ernst G., 4 Jahre alt, aufgenommen am 21. März 1877, soll vor 8 Tagen mit einem Pseudocroupfall erkrankt und seitdem noch nicht ganz gesund gewesen sein. Gestern Mittag plötzlich Dyspnoe, die sich rasch steigert. Bei der Aufnahme bereits Cyanose und collabirtes Aussehen, alle Symptome des Croup ausgeprägt, im Pharynx nur Rötze und geringe Schwellung. Sofort Tracheotomie und Kalkwasserinhalationen, wovon nach einigen Stunden Pseudomembranen ausgehohlet wurden. Unter diesen behnd sich die Cylindri, welchen einen vollständigen Abguss der Trachea und des Anfangstheils beider Bronchien darstellte. Darauf Abnahme der Dyspnoe, aber Steigerung des Collapses und Fortbestehen der Cyanose. Am 24. Puls 168.

Besp. 54. Tod in der Nacht. Section: Pharynx frei. Group des Larynx und der Trachea bis in die grössten Bronchien hinein. Bronchopneumonia duplex. Endocarditis chronica fibrina aortica, Hypertrophie ventriculi sinistrae.

Elise W., 3¹/₂ Jahre alt, aufgenommen am 6 November 1876 mit Lues hereditaria rediviva. Heilung durch Salznatrium Injectionen bis zum 1. December. Am 6. December, rascher Husten, Rölle des Pharynx, heft. Fieber. Trotz Eucodol, Brechmittel und Mercursublimatungen steigern sich die Erscheinungen so rapide, dass schon am 7. die Tracheotomie ausgeführt werden muss. Nach derselben Inhalationen von Kalkwasserdämpfen. In den nächsten Tagen unter intermittirenden Fieberbewegungen (Abends bis 38,6) und Steigerung der Respirationsfrequenz bis auf 60, schliesslich 72 in der Minute, Entwicklung einer doppelseitigen Bronchopneumonie mit starken Rasselgeräuschen, wechselnden Einatmungen des Peritonschall, Tod am 18., also 11 Tage nach der Tracheotomie. Section: Pharynx vollständig normal, Group des Larynx und des obersten Theils der Trachea, in Heilung begriffen. Angebliebene Bronchitis und Bronchopneumonie.

Anna S., 2 jährig, am 28. Februar 1879 mit Laryngitis aufgenommen. Dauer 2–3 Tage. Pharynx ganz normal. Wegen nachresidualer diffuser Bronchitis keine Tracheotomie. Tod am 2. März. Section: Diffuse Bronchitis, Bronchopneumonie. Pharynx nur leicht geröthet, völlig glatt und rein. Group des Larynx und der Trachea bis zur Theilung der letzteren.

Elis S., 6 Monate alt, seit einigen Monaten an Trachealkatarrh leidend, aufgenommen am 15. März 1879 mit beginnendem Croup. Steigerung der Symptome, Tracheotomie am 19. Vorher (40°) und Dyspnoe nach derselben beobachtet. Tod am folgenden Tage. Section: Pharynx ganz normal. Group des Kehlkopfs, Bronchitis und multiple bronchopneumonische Herde. Köstige Degeneration der Bronchialhöhlen und eines Theils des linken Oberlappens. —

Soll man sich in solchen Fällen, wie Manche wollen, hinter der Annahme einer Diphtherie verschleiern, die sich mit Uebergriffung des Pharynx von vorn herein im Larynx und der Trachea entwickelt hat? Diese Annahme halte ich für ganz willkürlich. Der unbefangene Beobachter, welcher neben dem anatomischen Befunde auch die klinische Entwicklung der Krankheit aufmerksam verfolgt, wird hier immer nur ein entzündliches Localleiden annehmen können, welches mit der infectiösen Diphtherie nichts zu thun hat. Der Beginn mit den Erscheinungen eines einfachen Tracheal- und Bronchialkatarrhs, das Fehlen der Pharyngitis und aller prodromalen Infectionssymptome, sowie des Drüsenanschwellungen unter dem Kiefer sind bezeichnend genug. —

Die klinischen Erscheinungen des Croup stellen den höchsten Grad der oben geschilderten acuten Larynxstenose dar, welche von Stunde zu Stunde an Intensität zunimmt, und in lethalen Fällen eine Dauer von 24 Stunden bis zu 3 oder 4 Tagen zu haben pflegt. Mögen auch während dieser Zeit kurze Remissionen, gewöhnlich in Folge eines künstlich erregten Erbrechens eintreten, so sind diese doch fast immer trügerisch; der Sturm beginnt bald von neuem, und eine stete Progression

zum Schlimmeren ist unverkennbar. In vielen Fällen wird der stetig fortschreitende Verlauf von Zeit zu Zeit noch durch Anfälle äusserster Erstickensth unterbrochen: das keuchende Kind wirft sich gewaltsam hinten über, der Athem stockt gänzlich, das Gesicht ist cyanotisch, die kleinen Hände ballen sich convulsivisch und der Tod scheint nahe, aber nach einigen Secunden dringt die Luft mühsam mit pfeifendem Ton wieder in den Larynx ein und das frühere Bild stellt sich wieder her, bis ein neuer ähnlicher Anfall erfolgt. Wahrscheinlich handelt es sich hier um Anfälle von Spasmus glottidis, welche reflexorisch von der entzündeten Schleimhaut her ausgelöst werden. In diesem Stadium ist der Stridor beim Athmen oft schon vor der Thür des Krankenzimmers hörbar, während der Croupkusten mit der zunehmenden Aphonie immer seltener und klangloser wird. Die Unruhe der Kinder steigert sich enorm; sie verlangen aus dem Bett auf den Arm, dann wieder zurück ins Bett, ihr ängstliches Auge sucht flehend Hilfe bei der Umgebung und nur kurze Schlummerperioden, in welchen das sägeartige pfeifende Larynxgeräusch seinen höchsten Grad erreicht, unterbrechen den qualvollen Zustand. Die Untersuchung der Lungen ergibt wegen des von oben her Alles übertönenden Sägegeräusches meistens kein Resultat, höchstens trockene oder feuchte Rhauchi an verschiedenen Stellen, selten Dämpfung des Pericostalsschalls, welche eine Theilnahme des Lungengewebes verrathen. Wo das letztere der Fall ist, da nimmt auch die Zahl der Athembewegungen, die beim nicht complicirten Croup, wie wir oben sahen, die normale bleibt oder kaum gesteigert ist, erheblich zu, steigt auf 30 bis 70 und mehr in der Minute, und schon diese Erscheinung genügt, um eine complicirte diffuse Bronchitis oder Bronchopneumonie zu diagnosticiren, sollte auch die locale Untersuchung ohne Resultat bleiben.

Während dieses stürmischen Verlaufs kommt es nun in einer Reihe von Fällen unter grossen Qualen zum Auskusten oder Auswürgen pseudomembranöser Fetzen und Röhren, welche als das einzig zuverlässige diagnostische Kriterium des wahren Croup zu betrachten sind, denn alle anderen Symptome können, wie ich schon sagte, auch durch die höchsten Grade der einfachen Laryngitis, namentlich durch das „Glottisödem“ hervorgebracht werden. Man erkennt die Natur dieser Auswurfstoffe am besten, wenn man sie im Wasser kochen lässt, wo man dann entweder kleine oder grössere weisse an den Rändern oft ausgezackte Fetzen, oder vollständige Cylinder entdeckt, welche nicht selten in eine fächerförmige Verästelung, oder selbst in mehrfache dendritische Verzweigungen auslaufen und dadurch bekunden, dass sie

nicht bloss einen Abguss der Trachea, sondern auch der grossen und mittleren Bronchien darstellen. Die mikroskopische Untersuchung dieser Membranen ergiebt eine fein faserige oder netzförmige Grundsubstanz nebst vielem amorphem körnigem Exsudat, Eiterkörperchen und veränderten Epithelien. Der Auswurf dieser Fetzen oder Cylinder kommt aber nur etwa in der Hälfte aller Fälle vor. Nicht selten werden sie von den besorgten Müttern aus der Mundhöhle des der Erstickung nahen Kindes mit den Fingern herausgezogen. Unmittelbar nach dem Auswurf, zumal grösserer röhriger Stücke, macht sich immer eine grosse Erleichterung bemerkbar. Man traue indes diesen Remissionen nicht, denn mit wenigen Ausnahmen enden solche Fälle sämmtlich lethäl. Namentlich beweist der Auswurf cylindrischer Exsudate, dass der Process tief in die Trachea und die grossen Bronchien hinabsteigt, und die kleinen dichotomisch verzweigten Cylinder lassen auch keinen Zweifel an dem Bestehen eines selbst die mittleren und kleineren Zweige betreffenden Bronchialcroup, haben also unter allen Umständen eine prognostisch ungünstige Bedeutung; denn je tiefer der Croup in die Luftröhrenäste hinabsteigt, um so sicherer ist sein lethaler Verlauf. Ausserdem hat man die sehr schnelle Wiederverzeugung der ausgeworfenen Exsudate zu bedenken, welche schon binnen wenigen Stunden erfolgen kann und die Orthopnoe sofort wieder hervorruft:

Anna B., 7jährig, wurde am 6. Nov. 1872 plötzlich krank, bekam Schnupfen, etwas Husten und leichtes Fieber. Am folgenden Tage heftiger stertorischer Geräusch beim Athmen, Brechmittel ohne Wirkung. Am 8. vollständig entwickelter Croup mit heftigem stertorischer Beschaffenheit des Pharynx. Anwendung von Blasenpfl. und Brechweinstein. Am 8. mit Anschwellen eines über 2 $\frac{1}{2}$ Zoll langen unter sich zwei kleinen dichotomisch verzweigten Fetzen versehenen Cylinders, worauf Erleichterung eintritt. Das Stertorogeräusch bedeutend schwächer, Husten und Stimme klingen. Resp. 28, Puls 132, Temperatur einer 2.0 Zündlinde einwirktes, Vesicular auf dem Larynx. Trotzdem bereits von Mittag an enorme Steigerung der Croupsymptome, Dyspnoe, Erstickungsnoth. Schon um 6 Uhr Abends, also nach kaum 10 Stunden, wiederum Anschwellen eines Cylinders von der Länge der Trachea mit darauf folgender grosser Erleichterung. Nacht ruhiger, auch am folgenden Tage schwächere Besserung. Resp. 24, Puls 132. Nachmittags neue Exacerbation, Tod in der Nacht. Die Tracheostomie war durch die tiefe Umkreißung des Processes, welches aus der Länge und Beschaffenheit der ausgeworfenen Cylinder hervorzog, contraindicirt.

Die Fieberverhältnisse beim Croup haben nichts Charakteristisches. In der Regel hält sich das Fieber auf einem mittleren Grade mit abendlichen Exacerbationen bis 38.5, während die Morgentemperatur 38—38.6 beträgt. Doch fehlt es nicht an Fällen (z. B. der oben S. 318 mitgetheilte) mit weit höherer, bis 40° und darüber steigender Tempe-

natur. Die entzündliche Theilnahme des Lungengewebes schien mir in dieser Beziehung besonders einflussreich zu sein. Der anfangs kräftige Puls wird im weiteren Verlaufe immer schwächer, im letzten Stadium sehr oft unregelmässig und aussetzend, besonders während der Inspiration, wobei die Cyanose den höchsten Grad erreicht, Gesicht, Hände und Füsse sich mit kühlem Schweisse bedecken. Schliesslich verfällt das Kind in Folge der gehemmten Respiration und der daraus folgenden Kohlensäurevergiftung in einen somnolenten Zustand mit halbgeschlossenen Augenlidern, die Athembewegungen werden immer oberflächlicher, das Stenotisationsgeräusch schwächer, und das Kind stirbt im Collaps, bisweilen unter convulsitischen Zuckungen der Gesichts- oder anderer Muskeln. Die von Bouchut hervorgehobene Anästhesie ist meiner Ansicht nach nichts Charakteristisches; sie erklärt sich einfach durch den in der letzten Zeit eintretenden Sopor.

Die Annahme, dass der Croup ohne Tracheotomie absolut unheilbar sei, ist keineswegs richtig. Wenn auch nicht gerade oft, kommen doch dem Arzte hin und wieder Fälle vor, in welchen die drohendsten Croup-symptome ohne jeden operativen Eingriff unter einer zweckmässigen Behandlung sich allmählig zurückbilden und schliesslich heilen, nachdem der Auswurf pseudomembranöser Fetzen jeden Zweifel an der wirklich croupösen Natur des Leidens beseitigt hatte. Aber selbst nach dem Verschwinden der drohenden Symptome stosse man nicht gleich in die Siegestrompete. Durch die lange Störung des Respirationsprocesses und die dadurch beeinträchtigte Oxydation des Blutes können auch nach der Heilung noch bedenkliche Störungen der Gehirnthätigkeit zurückbleiben, sei es, dass das Blut die zur Ernährung des Gehirns erforderliche Beschaffenheit nicht schnell genug wiedergewinnt, sei es, dass eine venöse Stauung in den Hirnvenen, und weiterhin Oedem der Pia oder seröse Transsudation in den Ventrikeln die Folge war.

Ein 8jähriger Knabe, welcher einen heftigen 5 Tage dauernden Croup, während dessen pseudomembranöse Fetzen ausgehustet wurden, überstanden und nur noch eine vollständige Aphonie zurückgeblieben hatte, blieb trotz des wiederkehrenden Appetits feieberartig blass und warm anfühlend. Am 14. Tage nach dem Beginn der Erkrankung wurde der immer noch sehr schwache Knabe somnolent, allmählig soporös, und ging nach 26 Stunden in diesem Zustande zu Grunde. Bei der Section fand ich den Larynx bis auf eine leichte Injection und Wulstung der Schleimhaut gesund, das Gehirn äusserst anämisch und viel Serum in den Ventrikeln und in den Maschen der Pia.

Es handelte sich hier nicht etwa um einen diphtheritischen Collaps, den wir später kennen lernen werden, sondern um den Folgezustand eines primären Croup. Man kann nicht leugnen, dass die kräftige

Antiphlogose, mit welcher man dieser gefährlichen Krankheit, besonders früher, zu Leibe ging (Blutegel, wiederholte Brechmittel, Mercurialien) in Verbindung mit der Anorexie und dem dadurch bedingten Nahrungsmangel das Ihnige dazu beitragen kann, eine solche Schwäche und Anämie zu erzeugen.

Ich selbst war Zeuge, wie bei einem 3-jährigen Knaben, welcher durch eine sehr sorgfältige Behandlung zwar bedeutend gebessert worden, aber im höchsten Grade erschöpft war, unmittelbar nach der Anwendung eines Brechmittels, welches am Abend des 4. Tages wegen eines plötzlichen Suffocationsanfalls gegeben wurde, tiefer Schlaf eintrat, der von den Eltern mit Freude begrüßt wurde. Bei meinem Besuche fand ich das Kind zwar noch sehr unruhig und sehrartig schreie Kinde erregbar in seinem Bettchen; der Athem war fast unmerkbar, ungewöhnlich langsam. Aber ein Griff an den Puls liess mich erkennen, dass hier kein gesunder Schlaf, sondern vielmehr Sopor stattfand. Der Puls war fadenförmig, kaum fühlbar, unregelmässig und ungleich, alle extremen Körpertheile kühl, die Augäpfel halb geschlossen. Selbst starke Geräusche dicht vor den Ohren des Kindes waren nicht im Stande, dasselbe zum Bewusstsein zu bringen, und es bedurfte der von 7–11 Uhr Nachts unangenehmsten Anwendung störender Mittel, um diesen gefährlichen Inanitätszustand des Gehirns zu beenden. Seilings im Nacken, Rücken und an den Waden, Fomentationen der Hände und Füße mit Seifenlauge, Aromen, kaltes, 0,15 Zäpfchen, Einflüssen von Wein, schliesslich Knüttelschläge über den Kopf, die ich nur einige Secunden liegen liess, aber oft wiederholte, hatten schliesslich einen unerwarteten Erfolg, und mit der Wiederkehr der Bithätigkeit waren merkwürdiger Weise auch alle Croupsymptome bis auf geringe Heiserkeit dauernd verschwunden.

Für die Behandlung des Croup gelten zunächst dieselben Regeln, welche ich bereits in Betreff des wahren Larynxkatarrhs aufstellte, und welche auch durch die mitgetheilten Krankengeschichten veranschaulicht werden. Wenn die örtliche Blutentleerung, die Brechmittel, der Tartar. stibiatus in reft. dosi, die energische Anwendung der Mercurialien und die Application eines Vesicators auf die Larynxgegend nicht schnelle Besserung herbeiführen, die Symptome vielmehr anhaltend zunehmen, und der Eintritt von Orthopnoeanfällen den höchsten Grad der Krankheit bekundet, so hat man von pharmaceutischen Mitteln überhaupt nichts mehr zu erwarten. Je mehr Vertrauen man dem Brechmittel in dieser Krankheit zu schenken pflegt, um so unangenehmer ist es, dass dasselbe nicht selten seine Wirkung versagt. Unter andern gab ich einem mit Masencroup behafteten Kinde an einem Tage früh und Abends ein volles Brechmittel (Ipecacuanh. 2,0, Tartar. emet. 0,03, Aq. dest. 30,0, Oxymel. scillit. 15,0), ohne auch nur ein einziges Mal Erbrechen zu bewirken. In solchen Fällen wirkt bisweilen noch das Cuprum sulphuricum (zu 0,03–0,1 alle 10 Minuten), welchem, abgesehen von diesem nussösen Effect, kein specifischer Einfluss auf den Croup zukommt. Ich muss jedoch die häufige Wiederholung der Emetica bei

einem ohnehin schon erschöpften Kinde, gerade weil die stete Wiederkehr der Erstickungsanfälle leicht dazu verführt, entschieden widerrathen, weil sie, ohne zu nützen, die Inanition aufs Aeusserste steigern und, wie in dem (S. 323) mitgetheilten Falle, schwere Hirnsymptome zur Folge haben kann. Auch empfehle ich Ihnen, croupkranken Kinder nicht anhaltend im Bette liegen, vielmehr öfters auf dem Arm umhertragen zu lassen, was temporär erleichternd wirkt. Dabei lasse man recht oft Brühe, Milch oder Wein ein, um dem Sinken der Kräfte möglichst entgegen zu arbeiten, sei aber dabei vorsichtig, weil die croupkranken Kinder sich beim Trinken leicht verschlucken und dann sofort heftige Stickenfälle bekommen.

Der Eintritt des ersten drohenden Stickenfalls, oder auch schon die gewaltsame Action aller inspiratorischen Hilfsmuskeln (starke Einziehung der unteren Thoraxpartie beim Inspiriren) ist für mich das Signal zur Tracheotomie. Die letztgenannte Erscheinung, welche in Folge der Luftverhinderung in den Lungen und des dadurch aufgehobenen Gleichgewichts zwischen dem intra- und extrathoracischen Druck eintritt, fehlt hier niemals. Ein zu lauges Warten mit der Operation steigert nur die Erschöpfung, die Gefahr der Kohlensäurevergiftung und der sich entwickelnden Bronchopneumonie. Wir operirten daher je nach den Umständen nicht selten schon am 2. oder 3. Tage der Krankheit, worauf ich bei der Diphtherie zurückkommen werde. Nach meiner Erfahrung sind die Aussichten für den Erfolg der Tracheotomie beim einfachen primären Croup weit günstiger, als beim diphtheritischen, weil man es bei jenem nur mit einer localen fibrinösen Entzündung, hier aber mit einer allgemeinen Infectiouskrankheit zu thun hat. Selbst der Nachweis einer Bronchitis oder Pneumonie bedingt für mich keine Gegenanzeige, seitdem ich mehrere trotz dieser Complication operirte Kinder glücklich durchkommen sah. Weil aber die Operation nur den Zweck erfüllt, der Luft den Eintritt in die Lungen zu eröffnen, so wird man immer wohl thun, auch nach derselben noch die Mercuralbehandlung in mässigen Grade fortzusetzen, und durch Einathmung warmer Wasserdämpfe mittelst der Canüle die Abstossung etwa noch auf der Schleimhaut liegender Pseudomembranen zu befördern. Andere viel empfohlene Methoden, Kauterisation durch concentrirte Höllensteinalösung, sei es mittelst eines Pinsels oder einer Spritze, ferner die Einführung einer Röhre in den Larynx (Tubage) habe ich nicht versucht. Immer bleibt die Tracheotomie das von den meisten Erfolgen gekrönte Verfahren, und ich fühle mich daher nicht bewogen, sie mit anderen Manipulationen zu vertauschen.

IV. Die Bronchitis und die katarrhalische oder Bronchopneumonie.

Zu den häufigsten Erkrankungen des Kindesalters, und zwar nicht nur in der Armenpraxis, wo Kalte und Feuchtigkeit eine ätiologisch bedeutsame Rolle spielen, sondern auch unter günstigen Lebensverhältnissen, gehören die Katarrhe, welche sich von der Bifurcation der Trachea aus über die Schleimhaut der grossen und mittleren Bronchien verbreiten. Das Alter der ersten Dentition wird am häufigsten befallen, und diese selbst von vielen Aerzten als eine Ursache des Katarrhs betrachtet. Dass dieser Einfluss sehr überschätzt wird, bemerkte ich bereits an einer früheren Stelle (S. 139), kann aber dabei nicht in Abrede stellen, dass bei manchen Kindern der Durchbruch jeder Zahngruppe von einem Katarrh begleitet wird. Vielleicht spielt auch die vorwiegende Frequenz der Rachitis in diesem Alter eine Rolle: denn gerade rachitische Kinder zeigen eine ungewöhnliche Tendenz zu Bronchialkatarrhen und sollten aus später zu erörternden Gründen mit besonderer Sorgfalt vor demselben behütet werden.

Schon bei ganz jungen Kindern in den ersten Monaten des Lebens begegnen wir häufig einer eigenthümlichen Form des Tracheal- und Bronchialkatarrhs. Dieselben leiden nämlich entweder an einem häufigen hackenden Husten, welcher durch einen Druck auf die Bifurcationsstelle der Luftröhre sofort geweckt wird, oder noch häufiger an einem die In- und Expiration fast stetig begleitenden Stertor, der von den Müttern gewöhnlich als „Vollsein“ oder „Röcheln auf der Brust“ bezeichnet wird. Das Geräusch ist bisweilen so stark, dass es die Eltern lebhaft beunruhigt, und es kommt auf die Menge des Schleimhautsecrets an, ob der Stertor rasselnd oder mehr trocken, dem croupalen Geräusch ähnlich erscheint. Nach einem Hustenstosse wird derselbe jedesmal schwächer, verschwindet auch wohl ganz, kehrt aber bald wieder. Die physikalische Untersuchung ergibt nur grossblasiges Schleimrasseln oder Schnurren, besonders zwischen den Schulterblättern, unmittelbar nach dem Husten aber gewöhnlich nur rauhes Athmen, welches nach einiger Zeit wieder dem Rasseln Platz macht. Dabei können sich die kleinen Patienten ganz wohl befinden, wenn auch die meisten der von mir beobachteten Kinder dieser Art etwas blass und welk erschienen. Fieber ist nie vorhanden, der Appetit gut, und die Eltern werden eben nur durch den steten Husten beunruhigt. Aetiologisch konnte ich mitunter feststellen, dass eine Erkältung unmittelbar oder bald nach der Geburt, sei es durch ein zu kühles Bad oder ein kaltes Zimmer oder durch

Austragen bei schlechtem Wetter, den ersten Grund zu dem Katarrh legte, welcher sich in allen von mir beobachteten Fällen durch eine grosse Hartnäckigkeit auszeichnete. Viele Wochen, ja Monate vergingen bis zur Heilung, und diese entschiedene Tendenz zum chronischen Verlaufe wird noch dadurch bedenklich, dass jede neue Erkältung eine Steigerung, selbst unter Hinzutritt von Fieber, hervorruft. Mit wenigen Ausnahmen kamen alle Fälle in der poliklinischen Praxis vor, und die geringere Sorgfalt der Mütter in diesen Verhältnissen erklärt wohl die Hartnäckigkeit des Katarrhs. Denn bei der Behandlung kommt es hauptsächlich darauf an, die Kinder vor dem Einflusse der Kälte und Feuchtigkeit zu schützen und gleichzeitig eine reine Luft einathmen zu lassen, Bedingungen, die eben nur in gut situierten Familien zu erfüllen sind. Von Arzneimitteln sah ich kaum einen Erfolg, eher noch von wiederholten kleinen Vesicantien über dem Manubrium sterni, welche ich indess gleich nach der Blasenbildung abzuheilen Hess. Wer innere Mittel nicht entbehren kann, mag kleine Dosen Sulpdur. aurat. (0.01 4—5mal täglich) versuchen.

Der Tracheal- und Bronchialkatarrh der Kinder bis etwa zum fünften Lebensjahre weicht von demjenigen der Erwachsenen nur darin ab, dass in jener Periode die Tendenz dasselben zu einer raschen und gefährlichen Verbreitung bis in die kleineren Bronchien viel grösser ist, und jeder Katarrh daher eine bei weitem sorgfältigere Pflege erfordert. Das sonst so lobenswerthe Streben vieler Mütter, ihren Kindern möglichst viel frische Luft zu verschaffen, verleitet sie sehr oft, auch kranke Kinder bei schlechtem Wetter ins Freie zu bringen, und kann nicht ernst genug zurückgewiesen werden. In der Regel bieten dann die Kinder Tage oder gar Wochen lang nur die Erscheinungen eines einfachen Katarrhs dar, bis eine neue Erkältung entweder die eben beschriebenen laryngitischen Zustände oder noch häufiger eine Steigerung zur wirklichen Bronchitis hervorruft. Man erfährt dann gewöhnlich, der Husten sei plötzlich stärker, der Athem kürzer, die Expiration stöhnend, die Haut heiss geworden, und kann meistens schon vor der localen Untersuchung die Diagnose auf Bronchitis oder Bronchopneumonie stellen.

So verschieden die Grade dieser Krankheiten und so mannigfach die Uebergänge des einen in den andern sein mögen, immer bildet der Husten eins der am meisten sich aufdrängenden Symptome. Vielen Kindern scheint derselbe schmerzhaft zu sein, was sie durch Würgen und schmerzliches Vorziehen des Gesichts beim Husten bekunden. Dieser ist meistens häufig, kurz und trocken, wird durch Schreien ver-

stärkt und hervorgerufen. Kinder, welche längere Zeit ohne zu husten schreien können, leiden sicher nicht an Bronchitis. In den höheren Graden kommt es mitunter zu heftigen Hustenanfällen mit dunkler Gesichtsröthe, welche an Tussis convulsiva erinnern. Sputa werden von jüngeren Kindern fast nie ausgeworfen, vielmehr selbst bei reichlicher Secretion im Stadium der Lösung heruntergeschluckt. Dasselbe fesselt nun die Art der Respiration die Aufmerksamkeit des Arztes. Die Zahl der Athemzüge überschreitet die normale in verschiedenen Graden, je nachdem die Entzündung mehr oder minder tief in die Bronchialverzweigungen herabsteigt. Eine Zahl von 40—50 Athemzügen ist für junge Kinder immer noch eine mässige und bekundet den Sitz der Krankheit in den grossen und mittleren Bronchien, während die Theilnahme der kleinsten und feinsten Aeste sofort 60—80, ja noch mehr Athemzüge in der Minute hervorruft. Wenn also ein an Katarrh leidendes Kind, wie das so häufig geschieht, während des Auscultirens den Athem anhält und den Arzt warten lässt, so ist dies immer ein günstiges Zeichen. Je schneller die Athmung, um so kürzer und oberflächlicher wird auch die auscultären Inspirationsmuskeln (Nasenflügel, Scalen) arbeiten sichtbar, bei jedem Athemzuge bewegt sich auch der Kopf, und sowohl im Jugulum, wie an der unteren Thoraxpartie und im Epigastrium zeigt sich eine deutliche inspiratorische Einziehung. Dabei wird jede Expiration von einem Stöhnen begleitet (vergl. S. 8), welches ich immer als eins der werthvollsten Symptome für die Diagnose ersterer respiratorischer Erkrankungen betrachte. Nicht selten hört man schon in einiger Entfernung vom Thorax gleitende Geräusche beim Athmen, fast immer aber bei der Auscultation Pfeifen, Schnurren oder Rascheln, gross-, mittel- und kleinblasige Rasselgeräusche, welche entweder nur auf die Rückenfäche, zumeist die antere Partie derselben beschränkt oder auch über die vordere und seitliche Fläche verbreitet sind. Auf die Verbreitung allein kommt es dabei weniger an, als auf die Art der Geräusche. Man kann z. B. fast im ganzen Umfange des Thorax Rhonchus sibilans oder Schnurren hören, ohne dass erhebliche Athemnoth stattfindet, weil eben nur die grossen oder mittleren Bronchien ergriffen sind, während ein fein- oder selbst mittelblasiges Rassel, welches nicht nur hinten, sondern auch vorn in grösserer Ausdehnung gehört wird, ernstliche Bedenken hervorruft. Mitunter wird nur die In- oder die Expiration von Rasselgeräuschen begleitet, während in anderen Fällen beide Actionen diese Erscheinungen darbieten. Der Percussionsschall bleibt zunächst normal. Mit den localen Symptomen verbindet sich immer ein Fieber von verschiedener Intensität, wobei die Temperatur meistens

zwischen 38,5 und 39,5 schwankt und in den Abendstunden auch wohl 40,0 erreicht. Nicht selten fand ich sogar die Morgentemperatur annähernd normal (37,8—38), während Abends Steigerungen auf 40,0 vorkamen. Auch da, wo eine genaue thermometrische Untersuchung nicht möglich ist, wie in den meisten Fällen der poliklinischen Praxis, lassen sich die Angaben der Mütter, die gerade das „Brennen der Haut“ bei ihren Kindern genau zu beobachten pflegen, meistens gut verwerthen. Auf die Pulsfrequenz, welche zwischen 120—180 schwankt, lege ich keinen besonderen Werth, weit mehr auf die Qualität des Pulses, welche aber bei günstigem Verlauf der Krankheit keine Abnormität darbieten pflegt. Von grösster Bedeutung ist immer das verschobene Verhältniss zwischen Puls- und Respirationsfrequenz, indem nicht mehr 3—4 Pulsschläge auf einen Athemzug, wie im Normalzustande, kommen, sondern die Zahl der letzteren sich unverhältnissmässig steigert, z. B. 60—70 Respirationen bei 144 Pulsschlägen (S. 8). Die übrigen Functionen des Körpers können in den leichteren Graden intact bleiben; doch beobachtete ich häufig eine Complication mit Diarrhoe, besonders zur Zeit epidemisch herrschender Darmkatarrhe. Bei steigender Intensität leidet natürlich auch der Appetit, und die Säuglinge werden durch die Dyspnoe beim Saugen gestört, indem sie nach wenigen Zügen die Warze wieder loslassen müssen, um Luft zu schöpfen. Dieser Umstand erschien mir als ein so charakteristisches Zeichen für die höhere Intensität der Krankheit, dass ich Ihnen rathe, das Kind in Ihrer Gegenwart an die Brust legen zu lassen, um sich von der Art des Saugens zu überzeugen.

Aus den eben geschilderten Symptomen, zumal den physikalischen, können Sie mit Sicherheit immer nur auf eine acute mehr oder weniger diffuse Bronchitis schliessen. Ob dabei auch eine Affection des Lungengewebes selbst, d. h. eine Bronchopneumonie stattfindet, können Sie nicht mit Bestimmtheit diagnostizieren, ebenso wenig aber in Abrede stellen. Die Erklärung dafür liegt in den anatomischen Verhältnissen, deren Hauptzüge etwa folgende sind.

Die Schleimhaut der Bronchien erscheint in verschiedener Ausdehnung: oft bis in die kleinen Verästelungen hinein, gleichmässig oder streifig geröthet, aufgelockert, verdickt, mitunter auch hier und da credit das Lumen besonders in den unteren Lungenlappen mit einem zähen, gelblichweissen, schleimigen Secret angefüllt, bei längerem Bestehen der Krankheit auch wohl bis in die peripherischen Verästelungen hinein mässig erweitert. Bei der ausgesprochenen Tendenz der Affection, tiefer herabzudringen, kommt es in einer Reihe von Fällen zu einer

mehr oder weniger extensiven Entzündung der feinsten Aeste (Bronchitis capillaris), wobei aus der Schnittfläche der betreffenden Lungenlappen an vielen Punkten, welche die Durchschnittsflächen feinsten Bronchialröhren bezeichnen, eitriger Schleim wie aus einem Schwamm herausquillt. Unter diesen Umständen geht die Entzündung an vielen Stellen auf die letzten Endigungen der feinsten Bronchiolen und auf die Lungenalveolen über, welche zuweilen als hirsckongresse weissgelbliche Granulationen tuberkelähnlich unter der Pulmonalpleura sichtbar sind, und beim Einstich einen Tropfen eitriger Flüssigkeit aussickern lassen (Bronchite vésiculaire des Françaisen). Weit häufiger aber kommt es in Folge von Bronchitis zur Entwicklung bronchopneumonischer Herde, welche zunächst immer, entsprechend dem Gebiete der einzulastenden kleinen Bronchien, eine lobuläre Form annehmen. Nach der Ausdehnung der Bronchitis richtet sich daher auch die Zahl dieser Herde, welche am häufigsten in den beiden unteren Lungenlappen ihren Sitz haben und in Form von derb anzufühlenden, erbsen- bis bohnen- und haselnussgrossen Verdichtungen von rothbrauner oder mehr ins Graue spielender Farbe erscheinen. Anfangs durch Zwischenräume lufthaltigen und hyperämischen Parenchyms von einander getrennt, rücken sie bei sehr grosser Zahl immer mehr an einander und coaguliren schliesslich zu ausgehöhlten Hepatisationen. Dieselben erstrecken sich mit Vorliebe in keilförmiger Gestalt von der Basis beider Unterlappen aufwärts, können aber auch oft genug in den oberen Lappen und besonders in der das Pericardium überlagernden Lingula des linken Oberlappens vor, können auch schliesslich einen ganzen Lappen, ja den grössten Theil einer Lunge befallen (Pneumonie lobulaire généralisée). Die Durchschnittsfläche dieser Herde oder ausgehöhlten Verdichtungen, welche hienusgeschnitten im Wasser unterinken, lässt beim Druck nur eine äusserst geringe Menge Flüssigkeit aussickern, und die mikroskopische Untersuchung ergiebt, dass die Alveolen mit einer aus verfetteten Epithelien und zahlreichen grösseren und kleineren lymphoiden Zellen bestehenden Masse angefüllt sind, welche ebenfalls der Verfettung anheimfallen und dann eine graugelbliche Färbung der verdichteten Partie bedingen kann. Nach neueren Untersuchungen (Charcot, Cadet¹⁾) ist auch fibrinöses Exsudat fast immer darin nachweisbar. Hyperämie der umspinnenden Capillaren und Verdichtungen des interstitiellen Bindegewebes fehlen niemals. Emphysem der Lungentränder oder anderer intact

¹⁾ Cadet de Gassicourt, Traité clinique des maladies de l'adulte. I. Paris 1880. S. 152.

gebliebener Partien und Abscesskapseln finden sich gewöhnlich, nicht selten auch eine mehr oder minder verbreitete Pleunitis, so wie Hyperplasie der Tracheal- und Bronchialdrüsen.

Aus diesen Verhältnissen ergibt sich nun, dass die aus der Bronchitis sich entwickelnde „katarthallische“ oder Bronchopneumonie physikalisch nur dann diagnostizirt werden kann, wenn die beschriebenen Herde so zahlreich oder confluirend sind, dass das intermediäre lufthaltige Parenchym nicht mehr im Stande ist, die Symptome der Verdichtung zu maskiren. So lange die Herde noch inselartig im Parenchym verstreut liegen, werden Sie immer nur die Erscheinungen der Bronchitis wahrnehmen, d. h. also ein mehr oder weniger verbreitetes mittel- oder kleinblasiges Rasseln, welches in den Fällen von Bronchitis capillaris fast überall hörbar ist, wo man nur das Ohr an die Brust legen. Sobald aber die Verdichtung sich über eine grössere Lungenpartie verbreitet, bekommen Sie auch eine derselben entsprechende Dämpfung des Percussionsschalls, kleinblasiges klingendes Rasseln, Bronchialathmen und Bronchophonie, Erscheinungen, welche zunächst gewöhnlich an beiden Seiten der Wirbelsäule von der Lungenbasis bis gegen die Spina scapularis hinauf sich bemerkbar machen, nicht selten aber auch in der Gegend der Lungenspitzen, und vorzugsweise in der Lingula des linken Oberlappens. Wiederholt konnte ich über dem Herzen feines klingendes Rasseln früher wahrnehmen, als an anderen Stellen des Thorax. Bemerkenswerth ist der Umstand, dass klingendes Rasseln und diffuse Bronchophonie in diesen Fällen auch ohne deutliche Dämpfung des Percussionsschalls bestehen kann; derselbe bleibt vielmehr normal oder bekommt einen tympanitischen Beiklang, was sich nur daraus erklären lässt, dass an der Peripherie der Lunge noch immer lufthaltiges Parenchym in hinreichender Menge vorhanden ist, während die Auscultation bereits die aus grösserer Tiefe klingenden Verdichtungsphänomene wahrnehmen kann. Unter diesen Verhältnissen empfiehlt ich Ihnen vorzugsweise recht leise zu percutiren (S. 6), weil bei starkem Anklopfen eine schon vorhandene leichte Dämpfung durch den überwiegenden Schall der lufthaltigen Schichten ganz verdeckt werden kann. Da nun aus zahlreichen Sectionen sich ergibt, dass bei jeder ausgebreiteten Bronchitis während der ersten Kinderjahre auch mehr oder minder zahlreiche bronchopneumonische Herde vorhanden sind, so darf man annehmen, dass selbst der Mangel aller physikalischen Verdichtungssymptome das Vorhandensein der in lobulären Herden auftretenden Bronchopneumonie in solchen Fällen nicht ausschliesst, während da, wo jene Symptome, seien es auch nur

die auscultatorischen, wahrnehmbar sind, immer ausgedehnte confluirende Verdicthungen diagnosticirt werden können.

In manchen Fällen kann man aber trotz sehr intensiver dyspnoischer Erscheinungen gar kein oder nur äusserst spärliche Rasselgeräusche wahrnehmen; bei normaler Percussion hört man vielmehr im ganzen Umfange des Thorax nur ein äusserst rauhes verschärftes Athmungsgeräusch oder dasselbe fehlt im ganzen Umfange des Thorax und man hört an dessen Stelle überall nur Rhonchus sibilans. Diese Erscheinungen können allmählig fruchten Rasselgeräuschen, die eine reichlichere Secretion bekunden, Platz machen, oder sie dauern bis zu dem gewöhnlich schon nach einigen Tagen erfolgenden Tode fort:

Das auffallendste Beispiel der ersten Art bot mir ein 11 Monate altes Kind, welches bei 72 dyspnoischen Athemzügen, 160 sehr kleinen Pulsen und normaler Percussion überall ein sehr rauhes Athmungsgeräusch hören liess; nur rechts hinten an der Basis bestand spärliches feintlautes Rassel. Dieser Zustand dauerte trotz einer durch hochste Einkwickelungen des Thorax erzeugten negativen Diaphoresis volle 3 Tage, worauf die Resp. auf 56, der Puls auf 130 sank, der Husten häufiger und heftiger wurde, und bald darauf nach Stürze und vermehrtem Schleimasseln sich einstellte. Ein schnell tödtlicher Fall dieser Art betraf ebenfalls ein 11 Monate altes Kind, welches mit Husten erkrankt war, zwei Tage darauf alle Erscheinungen eines hochgradigen acuten Lungenleidens darbot, und am ganzen Thorax ein ungewöhnlich scharfes Athmungsgeräusch, nur hier und da etwas spärliches Rassel hören liess. Nach dem Tode fand ich in beiden Lungen beträchtliche, leicht aufblasende obeliskartige Herde, und die in denselben eintretenden kleinen Bronchien mit gelblichen Schleim angefüllt. Sogar waren alle Luftröhren völlig des von Secret, aber die Schleimhaut derselben von der Epithelien bis in die kleinsten Aeste herab stark geröthet und aufgelockert.

Kind von 5 Wochen (Nov. 1881), seit 8 Tagen sehr rascher oberflächlicher Athem, Action ohne Hülfenschneln, wenig Husten. Anfälle von völliger Apyrexie mit Cyanosis und Entzündungsgeruch. Percussion im ganzen Umfange des Thorax etwas matter als im Normalzustand. Nirgends Athmungsgeräusch, dafür nur Rh. sibilans. Saugen wegen Dyspnoe unmöglich. Tod nach 3 Tagen. Section nicht gemacht.

Auch ohne schleimig-purulente Secretion kann also die Bronchitis nur durch die rapide hyperämische Wulstung der Schleimhaut und die davon abhängende Verengung des Bronchiallumens das Leben ernstlich bedrohen (der sogen. „Catarrh sec.“). Billiet und Barthez (l. c. I. 454) machen mit Recht auf analoge Zustände anderer Schleimhäute, der Nase, des Larynx und der Trachea aufmerksam, deren rasche katarthale Schwellung die bekannten Erscheinungen der acuten Koryza und des Pseudocrup (S. 204) erzeugen, und theilen dabei den Fall eines 1jährigen Kindes mit, bei welchem während des Lebens auch nur ein beträchtlich gesteigertes puriles Athmungsgeräusch im ganzen Umfange des Thorax gehört, bei der Section zwar eine lebhaftere Röthe und

Schwellung der Bronchialschleimhaut, aber gar kein flüssiges Secret gefunden wurde.

Je tiefer die Entzündung in die feineren Bronchialverzweigungen dringt, je mehr lobuläre bronchopneumonische Herde oder je ausgedehntere Verdichtungen sich bilden, um so mehr wird natürlich der Athmungsprocess und die von demselben abhängige Oxydation des Blutes beeinträchtigt. Alle Anstrengungen der Inspirationsmuskeln reichen nicht aus, um die Luft durch die mit purulentem Schleim angefüllten kleinen Bronchien bis in die Alveolen zu treiben, woraus sich der anatomische Befund vielfacher atelektatischer Lungentheile in solchen Fällen erklärt. Die Insufficienz der Lunge für die Respiration muss dadurch noch erheblich zunehmen, und auch die grosse Frequenz der Athembewegungen (ich konnte hierweilen über 100 in der Minute zählen) ist wegen ihrer Oberflächlichkeit nicht im Stande, die mangelnde Tiefe derselben zu ersetzen. Häufig wird die Athmung auch insofern unregelmässig, dass z. B. 10–15 Respirationen äusserst rasch aufeinander folgen, und dann immer eine kleine Pause eintritt, welche an das Cheyne-Stokes'sche Phänomen erinnert. Die venöse Stauung, eine natürliche Folge der Lungenverdichtung und der daraus resultirenden Ueberfüllung des rechten Herzens, bewirkt bald eine cyanotische Verfärbung des leichenblauen Gesichts und der sichtbaren Schleimhäute, Anschwellung peripherer Venen, zuweilen auch leichte Ödeme der Augenlider, der Hand- und Fussrücken, und die stete Abnahme der Herzenergie verkündet sich durch die Kleinheit des überaus frequenten, unter dem Finger schwindenden Pulses, sowie durch Abnahme der Temperatur an den extremen Körpertheilen. Um diese Zeit erlahmt auch die Kraft zum Husten, und ich sehe es immer als ein höchst ungünstiges Symptom an, wenn die bis dahin noch immer qualenden Hustenanfälle schwächer werden oder ganz erlöschen, während die Auscultation weit verbreitete morose klingende Rasselgeräusche hören lässt. Ist es einmal so weit gekommen, so pflegt auch die Kohlensäurevergiftung, eine notwendige Folge der Lungeninsufficienz, nicht lange ausbleiben. Somnolenz mit halbtgeschlossenen Lidern und emporgerollten Augäpfeln, zuweilen auch partielle oder allgemeine Zuckungen machen dem qualvollen Zustande ein Ende.

Ich komme noch einmal darauf zurück, dass während des ganzen Verlaufs der Bronchitis und der Bronchopneumonie das Fieber einen in keiner Weise charakteristischen remittirenden Typus, dessen Exacerbationen in die Abendstunden fallen und nicht selten 40° erreichen, und vielfache Schwankungen darbietet, so dass ein erhebliches Sinken

der Temperatur an einzelnen Tagen mit plötzlichen, scheinbar unerklärlichen Steigungen abwechselt. Diese Schwankungen hängen davon ab, dass der entzündliche Process von den Bronchien aus sich auf immer neue, noch intact gebliebene Lobi ausdehnt, während er sich an anderen Stellen schon wieder zurückbilden kann, und dass alle diese successiven Schübe von einem verstärkten Fiebersturm begleitet werden. Bei kleinen, zumal geschwächten Kindern ist das Fieber oft nur von ganz untergeordneter Bedeutung; bei einem mit *Lues hereditaria* behafteten 10 Tage alten Kinde fand ich die Temperatur sogar meistens subnormal (Maximum 37,3), ein neuer Beweis für die Thatsache, dass unter diesen Verhältnissen die Neigung zum Collaps prävalirt und selbst bedeutende Entzündungen ohne Fieber, ja mit subnormaler Temperatur verlaufen können (S. 16). Das Verhältniss ändert sich aber schon gegen die Mitte des ersten Lebensjahres. Bei einem 5 Monate alten Kinde (aufgenommen am 5. Mai 1874 mit doppelseitiger Bronchopneumonie) stieg z. B. bei einer Pulsfrequenz von 216 die Temperatur wiederholt auf 40° bis 40,4.

So schlimm nun auch die Aussichten bei einer ausgedehnten Bronchitis und Bronchopneumonie sind, soht man doch nicht selten noch unter anscheinend recht ungünstigen Verhältnissen eine Rückbildung und Genesung erfolgen. Die Abnahme der Frequenz und das Fieberwerden der Athembewegungen ist das erste günstige Zeichen. Immerhin aber gehört die Krankheit zu denen, welche auch bei günstigem Ausgange eine längere Dauer zu zeigen pflegen, insbesondere niemals mit einer eigentlichen Krise enden. Auch Fälle mit sehr rapidem tödtlichen Verlaufe kommen nur ausnahmsweise vor, und selbst dann lässt sich fast immer nachweisen, dass ein Bronchialkatarrh schon längere Zeit der plötzlichen lethalen Steigerung zur Capillärbronchitis und katarhalischen Pneumonie vorausging. Im Durchschnitt dauert die Krankheit 2—3 Wochen, häufig noch viel länger. Eine Neigung zu einem subacuten oder gar chronischen Verlaufe ist unverkennbar, so dass viele Wochen, ja ein paar Monate vergehen können, bis eine entschiedene Wendung zum Guten eintritt. Man sieht dann das Fieber bedeutend abnehmen, oder bis auf eine kleine Temperaturerhöhung in den Mittags- oder Abendstunden gänzlich schwinden, die Dämpfungen des Percussionsschalls sich mehr oder weniger zurückbilden und fast völlige Euphorie eintreten, aber der Husten, die weit verbreiteten, hier und da noch klingenden kleinblasigen Rasselgeräusche und die noch immer frequente Respiration bekünden das Fortbestehen der Krankheit. Ja, in einem dieser Fälle, welcher einen 1jährigen Kraben betraf und sich Monate lang hin-

zog, waren die schleimig eiterigen Sputa, welche der intelligentste Knabe ausstoss, zum Schrecken der Eltern nicht selten mit Blutstreifen oder Blutpunkten vermischt. Dennoch erfolgte auch hier nach vollständiger Genesung. Weit häufiger ist jedoch der Ausgang bei chronischem Verlaufe schliesslich ein lethaler, nachdem Wochen- und Monatslang das Befinden vielfache Schwankungen gezeigt hat. In verschiedenen Fällen dieser Art beobachtete ich während dieses Verlaufs absolut fieberfreie Intervalle, welche Wochenlang dauerten, und in denen sich das schon aufgegebene Kind wieder erhobte, eine bessere Farbe bekam, weniger hustete und der Genesung entgegenzugehen schien. Aber das Fortbestehen einer ganz abnormen Respirationsfrequenz (von 50—70 in der Minute), welche sich mit dem scheinbar befriedigenden Allgemeinbefinden nicht vereinbaren liess, war hier immer ein böses Zeichen. Man lasse sich also durch diese besseren Intervalle nicht dazu verleiten, eine gute Prognose zu stellen; die fortbestehenden feinen klingenden Rasselgeräusche, besonders an der Rückenfläche, und die zunehmende Magerkeit der Kinder mahnen zur Vorsicht. In mehreren dieser chronisch sich hinziehenden und schliesslich nach 2—3 Monaten mit dem Tode endenden Fälle fand ich bei der Section neben den Erscheinungen der chronischen Bronchitis und Bronchopneumonie eine Verfettung der Herzmusculatur mit Erweiterung der rechten Hälfte, und zwar besonders da, wo eine *Tassa contrivosa* mit der Krankheit complicirt gewesen war. Die starken Widerstände, welche die Leistung des rechten Ventrikels durch die anhaltende Verdichtung des Lungengewebes und die häufigen Keuchlastenanfälle zu überwinden hatte, müssen wohl als Grund dieser Degeneration angesehen werden, welche mitunter synkopale Todesfälle herbeiführt.

Bei Bronchopneumonien von Wochen- oder gar Monatslanger Dauer findet man das interstitielle, die Alveolen umgirmende und die einzelnen Lappchen von einander absetzende Bindegewebe in der Regel sklerotisch, die kleinsten Bronchien, welche das verdichtete Parenchym durchziehen, vielfach erweitert, und zuweilen auch kleine Lungenabscesse, welche dadurch entstehen, dass die von jungen Zellen und Epithelien zu stark ausgedehnten Alveolen zerreißen und zu grösseren mit einer puriformen Flüssigkeit angefüllten Hohlräumen coaguliren. Diese im Ganzen seltene Erscheinung lässt sich wegen der Kleinheit der Abscesse während des Lebens nicht diagnostiziren, zumal auch Fieber in diesen Fällen gänzlich fehlen kann. So fand ich bei einem am 23. März 1874 in die Klinik aufgenommenen Knaben, welcher an Bronchopneumonie von unbestimmter Dauer litt, bis zum 1. April, dem Todestage, zur

zweimal eine Temperatur von 38—38,9. Sonst war dieselbe immer normal oder sogar subnormal. Die Section ergab Bronchopneumonie beider Unterlappen, besonders ausgedehnt im rechten, welcher fast durchweg dörb und luftleer war. In beiden Lappen befanden sich mehrere haselnuss-grosse mit gelbem Eiter gefüllte Abscesse. Unter ungünstigen Verhältnissen nimmt die chronische Bronchopneumonie auch nicht selten den Ausgang in käsige Entartung des Infiltrats, worauf ich bei der Betrachtung der *Pneumonia chronica* zurückkommen werde. —

Alle Einflüsse, welche einen Reizzustand der respiratorischen Schleimhaut überhaupt hervorbringen im Stande sind, spielen auch in der Aetiologie der Bronchitis und Bronchopneumonie eine wichtige Rolle. In erster Reihe ist hier der Reiz der Kälte, des scharfen Ost- und Nordwindes zu nennen, welcher veranlaßt, dass die Krankheit gleichzeitig mit Schnupfen, Larynxkatarrhen, Croup und Anginen zu manchen Zeiten eine fast epidemische Verbreitung gewinnt. In der Armen- und poliklinischen Praxis hat man oft Gelegenheit sich davon zu überzeugen. Ferner kommen gewisse Infectiouskrankheiten, in deren Gefolge sich die Krankheit sehr häufig entwickelt, in Betracht. Vor allem die Masern und der Keuchhusten, demnächst die Diphtherie, zumal wenn sie bis in den Kehlkopf und die Trachea sich ausbreitet. Mag dabei die Tracheotomie gemacht werden oder nicht, immer bildet die Bronchopneumonie hier eine der bösesten Complicationen, an welche man sofort denken muss, wenn die bis dahin normale Frequenz der Athembewegungen plötzlich bis auf 50—60 in der Minute in die Höhe geht. Ich glaube, dass es sich in solchen Fällen nicht nur um eine einfache Fortleitung der Entzündung von der Trachea aus nach unten handelt, sondern dass auch die Aspiration diphtherischer Producte aus den oberen Luftwegen dabei eine Rolle spielt, worauf ich bei der Diphtherie zurückkommen werde. Bei den Masern kann die Bronchopneumonie schon im Eruptions- und Blüthestadium eintreten, noch häufiger aber und schwerer entwickelt sie sich nach dem Verschwinden des Exanthems und dem Abfall des Fiebers, und bildet dann immer eine der bedenklichsten Complicationen. Dasselbe gilt vom Keuchhusten, welchem sie sich in jeder Periode seines Verlaufs beigesellen kann. Weit seltener tritt die Krankheit im Gefolge des Scharlachfiebers und der Pocken auf, während beim Abdominaltypus, welcher fast immer mit Bronchialkatarrh einhergeht, auch die Complication mit Bronchopneumonie nicht selten beobachtet wird. Gerade diese in Verbindung mit den genannten Infectiouskrankheiten auftretenden Fälle sind es, welche oft einen ungewöhnlich protrahirten Verlauf nehmen und durch die

bestehende Schwäche und Abmagerung, wie durch das fortdauernde remittirende Fieber den Verdacht einer tuberkulösen oder käsigen Erkrankung der Lunge erwecken. Wochenlang traten die Frequenz der Athembewegungen, der quälende Husten, die katarrhalischen und klingenden Rasselgeräusche jeder Behandlung, während Dämpfungen des Percussionsschalls entweder ganz fehlen, oder an den ursprünglich befallenen Stellen verschwinden und an anderen bis dahin verschont gebliebenen Partien des Thorax auftreten können, ein Wechsel, der wie die Schwankungen des Fiebers (S. 333) sich nur aus der Zurückbildung früherer Infiltrationen und dem Befallenwerden anderer bisher intacter Partien erklären lässt. So schwankt denn die Diagnose und mit ihr die Prognose je nach dem täglichen Wechsel des Befindens, bis endlich nach einer Dauer von vielen Wochen, selbst Monaten entweder ganz unerwartet das Fieber aufhört und alle Symptome sich zurückbilden, oder in der That durch Verkäsung und Zerfall der Infiltrate unter phthisischen Erscheinungen der Tod eintritt:

Alice N., 12jährig, in den ersten Tagen des December 1873 an einem schweren Abdominaltyphus erkrankt. Von Anfang an starker Husten und Athembeganz. Am 24. Tage drohende Collapsosymptome unter profusem Schwessen (Kälte der Extremitäten, Schwächen des Pulses), nach deren Beseitigung durch ununterbrochene Anwendung abführender Mittel der Typhus gelassen scheint, aber der Husten fort dauert. Rechts hinten von oben bis unterhalb der Spina scapularis matter Percussionsschall, Bronchialathmen und Bronchophonie, fröhliches klingendes Rassel. Links hinten mässiges Rassel. Fieber in den Abendstunden fortdauernd, Puls 120–132, lebhafte Wangenröthe, Macies. Unter dem Gebrauch einer kleinen Expectorantis (Salinik, Sulphur. acid.), später des Lebertheins und einer kräftigen Diät allmähliche Schwindens der drohenden Symptome. Percussion tritt am 19. Januar 1874 beinahe normal; Mitte Februar völlige Genesung, welche auch gesichert blieb.

Pauline S., 6jährig, an einem milttschweren Eostyphus mit bronchopneumonischer Verdrichtung des rechten Unterlappens erkrankt. Bekannt in der 5. Woche der Krankheit während der bereits eingetretenen Reconvalescenz von neuem Fieber (Abendtemperatur 39,5), diffusen Katarrh in beiden Lungen und wiederum Dämpfung und klingendes Rassel an der ursprünglich befallenen Partie. Dabei enorme Macies, elendes Aussehen, Anorexie, braune Zunge. Dauer dieses Zustandes 3 Wochen, dann allmähliche Rückbildung unter dem Gebrauch des Chinins, und schliesslich völlige Genesung.

Drei andere Fälle, in welchen die Bronchopneumonie im Gefolge der Masern aufgetreten war und Monate lang unter dem Bilde fortschreitender Phthisis bestanden hatte, schliesslich aber vollständig heilte, so dass die nach langer Zeit nur wieder eingeführten blühenden Kinder kaum wieder zu erkennen waren. theilte ich bereits früher mit¹⁾. In allen

¹⁾ Beiträge zur Kinderheilk. N. F. S. 142.

diesen Fällen hatte die roborative Methode (kräftige Diät, Wein und Lebertheer) einen entschiedenen Erfolg.

Ausser den genannten Infectiouskrankheiten müssen auch viele andere schwere, die Kräfte erschöpfende Zustände als begünstigende Anlässe der Bronchopneumonie bezeichnet werden. Langwierige Darmkatarrhe, Tuberkulose, Meningitis basilaris, brandige Affectionen, zumal Noma, sind hier in erster Reihe zu nennen. In meiner klinischen Abtheilung stirbt fast kein Kind, bei dessen Section nicht eine mehr oder weniger verbreitete Bronchopneumonie gefunden wird; besonders atrophische und schwache rachitische Subjecte sind dieser Krankheit ausgesetzt, und oft konnte ich mich des Gedankens nicht erwehren, dass hier eine mit der Hospitalluft eingeathmete infectiöse Ursache mit im Spiele ist. Der Verlauf und der Ausgang der Krankheit war dabei meistens weit langwieriger und anheftiger, als in der Privat- ja selbst in der poliklinischen Praxis. Die allmählig fortschreitende Ausbreitung des Processes über grosse Portionen der Lunge, die abwechselnden Besserungen und Verschlimmerungen, die stets sich erneuernden Recidive trotz der besten Pflege, alle diese Erfahrungen, die mit denen anderer Hospital-ärzte übereinstimmen, sind wohl geeignet, der Luft der Krankenzimmer einen ungünstigen Einfluss einzuwirken. Man darf dabei freilich nicht übersehen, dass der erbärmliche Ernährungszustand der meisten Säuglinge, welche meiner Abtheilung zugehen, zu den Misserfolgen der Therapie Vieles beiträgt, weil die Schwäche der inspiratorischen Muskeln das Zustandekommen ausgedehnter Atelektasen begünstigt und damit die Insuffizienz der bronchopneumonischen Lunge noch beträchtlich steigert. Auch die unhaltende Rückenlage, welche unter diesen Verhältnissen kaum zu ändern ist, muss durch die Begünstigung von hypostatischen Hyperämien in den hinteren und unteren Lungenpartien mit in Anschlag gebracht werden. Von besonders übler prognostischer Bedeutung ist, abgesehen von einer tuberkulösen Anlage, jede erhebliche rachitische Formveränderung des Thorax, welche den Raum desselben beschränkt. Scheinbar geringfügige Katarrhe, noch mehr aber Bronchitis und Bronchopneumonie können hier ebenso unerwartet Todesfälle zur Folge haben, wie organische Krankheiten des Herzens.

Schliesslich kommt in ätiologischer Beziehung noch ein die Bronchien und die Alveolen direct treffender Reiz in Betracht, nämlich das Hineingelangen von Milch oder anderen Nahrungsfüssigkeiten in die Respiationsorgane. Durch Aspiration derselben aus der Saugflasche, so wie durch häufiges „Verschlucken“ bei verhalten mit Separ einbezogenen Krankheiten, besonders aber nach der Tracheotomie, kommt

nicht selten die mit dem Namen „Schluckpneumonie“ bezeichnete Form zu Stande, welche auch durch Experimente an Thieren (Durchschneidung des Vagus oder Recurrens von Traube, Friedländer u. A.) constatirt ist und die Einsicht in die feineren Vorgänge bei der Bronchopneumonie wesentlich gefördert hat. Man sei indess mit der Annahme dieser Form nicht zu rasch bei der Hand; nur der wirkliche Befund von Nahrungsstoffen oder anderen Fremdkörpern in den Luftwegen setzt diese Entstehungsweise außer Zweifel. —

Bei vielen Kindern besteht eine sehr ausgesprochene individuelle Disposition zum acuten Katarth der Bronchien, so dass sie schon nach einer leichten Erkältung, oft auch ohne jede erkennbare Ursache von demselben befallen werden. Es findet hier also ein ähnliches Verhältniss statt, wie beim Pseudocroup (S. 305). Solche Kinder bekommen alljährlich mindestens einen, oft auch mehrere Anfälle, die, wie schon Rilliet und Barthez¹⁾ bemerkten, „durch ihre kurze Dauer, ihre häufige Wiederkehr, die Intensität der Dyspnoe, zugleich aber auch durch den geringen Fiebergrad und den asthmatischen Anfallen Erwachsener nähern.“ Mir selbst sind Fälle dieser Art schon bei kleinen Kindern wiederholt begegnet, häufiger noch in der zweiten Periode der Kindheit, wobei ich in der Regel erfuhr, dass die Kinder schon Jahre lang an diesen Anfällen litten, welche man als „recidive Bronchitis“ bezeichnen könnte. Die Ursache dieser Disposition ist uns oben so wenig bekannt, wie diejenige, welche den Pseudocroup so häufig hervorruft. Nur in einem Theil der Fälle liess sich das Fortbestehen eines chronischen Bronchialkatarths nachweisen, aus welchem sich die acuten Anfälle zeitweise herausbildeten; weit häufiger waren die Intervalle vollkommen frei, und die Untersuchung ergab überall ein ganz normales vesiculäres Athemgeräusch.

2jähriger Knabe, vom 8. Monat bis zum Ende des 2. Jahres 6 heftige Anfälle, die mit einem Schnupfen begannen und binnen 24 Stunden ihren höchsten Grad erreichten. Resp. 70 in der Wärme, stertorös, Mitarbeit aller Hilfsmuskeln, am ganzen Thorax lautes Schüttelnaseln bei normaler Percussion, leuchtendrothe Farbe, Stichenfäule in der Nacht. Fieber und Husten sehr mässig. Ein paar Mal Beginn des Anfalls mit Pseudocroup. Brechmittel immer von ausgezeichnetster Wirkung. Erlegung in einem gewöhnlichen 1—2 Wochen dauernden Katarth.

Kind von 8 Monaten, Beginn des Anfalls mit Schnupfen und Husten, am nächsten Morgen rapide Steigerung der Symptome, Abends Leichenblässe, Orthopnoe, Resp. 60—70 mit eigentümlichem Stertor. Husten unbedeutend, kaum Fieber. Puls klein, aussetzend, erarmt schnell. Am Thorax überall verschärftes Athmen, kein Rasseln. Percussion normal. Brechmittel, feuchtwarme Einwickelung des Thorax,

¹⁾ l. p. 451.

Vermuth: Heilung binnen 4 Tagen. Fast alle 4 Wochen ein ähnlicher, aber nicht immer so heftiger Anfall. Beim tiefsten Entzündung einer Bruchkoppenmasie mit deskandten Centralerscheinungen, aber schliesslich Heilung.

Knabe von 4 Jahren, am 8. April 1878 vorgestellt. Schon vom 6. Monat an Anfälle von Bronchitis, alle paar Monate wiederkehrend, mit starker Dyspnoe und Fieber. Dauer 3—4 Tage. Resp. im beobachteten Anfall 80, sehr oberflächlich. Percussion normal, überall rauhes Athmen und Rk. sibilans. Heilung durch Tartar. emet.

Mädchen von 6 Jahren (16. April 1878). Seit 2 Jahren häufige Anfälle fast allmonatlich, von 3—4 tägiger Dauer. In den Intervallen einfacher chronischer Katarrh der grossen Bronchien. Lungen normal.

Mädchen von 5 Jahren (5. Dec. 1880), sonst gesund. Vom Ende des ersten Lebensjahres an bronchitische Anfälle, aus einem Jahre etwa alle 5—6 Wochen wiederkehrend und 8 Tage dauernd. Beginn mit Fieber; enorme Dyspnoe, R. 36, P. 144. Dabei auffallend ruhiger Gesichtsausdruck und Heiterkeit. Husten heftig, Percussion normal, überall rauhes abgeartetes Athmegeräusch. Mit öfters und hydropathische Uebersätze.

Wie im ersten Fall habe ich wiederholt den Beginn mit einem Pseudocroup beobachtet, welcher schnell in den bronchitischen Anfall überging. Der croupöse Ton beim Athmen macht dann bald einem mehr pfeifenden oder rasselnden Platz, und die Auscultation ergibt entweder nur rauhes unbestimmtes Athmen, oder Rhonchus sibilans und mucosus. Die Dyspnoe ist enorm, die Athemfrequenz 60—80, der Puls jagend, die Farbe bleich oder cyanotisch, und das ganze Bild so drohend, dass besonders der Unerfahrene das Kind verloren geht. Auch kann das Fieber, obwohl im Allgemeinen mässig, doch in manchen Fällen höhere Grade erreichen. Eine wirkliche Befruchtung ist aber nur dann gerechtfertigt, wenn die physikalische Untersuchung mit Sicherheit ausgehaltene bruchkoppenmasienische Verdichtungen erkennen lassen sollte. Gerade diesen Befund habe ich jedoch in solchen Fällen immer vermist, und die Beobachtung, dass trotz der drohenden Symptome der Anfall meistens ungewöhnlich rasch, binnen wenigen Tagen sein Ende erreichte und ein einfacher loser Katarrh aus demselben hervorging, bestimmt mich zu der Annahme, dass es sich auch hier, wie beim Pseudocroup, um eine rapide entstandene katarrhalische Wulstung der Schleimhaut handelt, die weit in die mittleren Bronchien hinabreichend das Caliber derselben stenosirt.

Für diese Annahme spricht unter anderem auch der Fall eines 1½-jährigen Knaben, bei welchem ein solcher Anfall am Tage nach einem leichten Pseudocroup sich rapide entwickelte, unter drohenden Symptomen innerhalb Tage abhielt, dann schnell abnahm und in einen leichten Katarrh überging. Nach 14 Tagen bekam das Kind abnormen Schnupfen, und sofort begann auch wieder der stenotische

Athen, die schnelle Respiration, das Pfeifen im Thorax, um nach zwei Tagen ebenfalls wieder zu verschwinden.

Dennoch halte ich es für möglich, dass eine spastische Contraction der Bronchialmuskulatur, wie beim Asthma bronchiale, auch hier eine Rolle spielen kann. Ich habe wiederholt Kinder beobachtet, welche niemals ganz frei von Bronchialkatarth waren, vielmehr immer pfeifende Rhonchi hier und da, besonders an der Rückenfläche hören liessen. Von Zeit zu Zeit, zumal unter dem Einflusse eines Schnupfens, entstand un- plötzlich ein gewaltiger asthmatischer Anfall bis zu leichter Cyanose des Gesichts, aber ohne jede Betheiligung des Larynx, d. h. ohne Heiserkeit und ohne croupöse Inspiration. Man hörte nur im ganzen Umfange des Thorax pfeifende Geräusche und sehr schwaches Atmen. Dieser drohende aber ganz akute Anfall dauerte bisweilen kaum eine halbe oder ganze Stunde und verschwand dann wie mit einem Zauberschlage, um dem früheren Katarth Platz zu machen, und gerade diese kurze Dauer, so wie der plötzliche Eintritt und das eben so schnelle Verschwinden des Anfalls spricht für einen reflectorischen Bronchialkrampf, welcher in den Asthma-Anfällen, die bei Erwachsenen in Folge von Reizenständen der Nasenschleimhaut auftreten können, sein Analogon findet.

Behandlung. Der einfache Katarth heilt, wie im späteren Lebensalter, von selbst, sobald das Kind nur im Zimmer gepflegt wird, doch vergehen fast immer 2–3 Wochen, bevor derselbe, zumal wenn er anfangs febril auftrat, vollständig verschwunden ist. Unter den Medicamenten zählt besonders das Infus. rad. ipecacuanhae (F. 16), bei heftigem Hustenreiz mit *Aq. laurocerasi* (1.0–2.0) verbunden, viele Anhänger. Ich glaube kaum, dass dies Mittel den Verlauf des Katarths wesentlich abkürzt, will aber seine hustenmildernde Wirkung nicht in Abrede stellen. Am besten passt es, wenn gleichzeitig Diarrhoe besteht. Bei Verstopfung und Fieber gebe ich die Ipecacuanha gern in Verbindung mit Calomel (F. 17), welche mir in einer sehr grossen Zahl febriler Katarthe und leichter Bronchopneumonien gute Dienste leistete.

Tritt aber die Krankheit intensiver, mit grosser Dyspnoe und heftigem Fieber auf, so fühlt man sich natürlich zu einer energischen Therapie aufgefordert. Die früher übliche Antiphlogose durch Ansetzen von Blutegeln an den Thorax oder an die Epiphysen der Vorderarmknochen ist in unserer Zeit fast gänzlich aufgegeben worden, weil man in dieser zu und für sich schon zum Collaps neigenden Krankheit den Blutverlust als gefährlich betrachtet. Für die grosse Mehrzahl der Fälle, zumal die in den Krankenhäusern und in der Armenpraxis

sich um dübicierten unden Kinder, ist diese Anschauung gewiss berechtigt, und ich selbst bin seit 20 Jahren derselben gefolgt. Anders aber liegt die Sache, wenn man es mit zuvor gesunden blutreichen Kindern zu thun hat. Frühere Erfahrungen¹⁾ hatten mir gezeigt, dass mit Maass angestellte örtliche Blutentleerungen durchaus nicht die schlimmen Folgen (Anämie, Collapse) haben, welche die neue schwächterne Therapie ihnen zur Last legt, und ich kann nicht behaupten, dass meine Erfolge bei der Bronchopneumonie glücklicher geworden sind, seitdem ich die Blutentleerungen aus meiner Therapie gänzlich verbannt habe. Die von mir in den letzten Jahren mit Vorsicht wieder angestellten Versuche einer antiphlogistischen Behandlung ergaben dagegen wiederholt überraschende Erfolge, natürlich nur bei kräftigen, früher gesunden Kindern und im Anfange der Krankheit, möchte dieselbe nun aus einem gewöhnlichen Katarrh hervorgegangen oder im Eruptionsstadium der Masern aufgetreten sein. Ich werde jetzt aber statt der Blutegel blutige und noch lieber trockene Schröpfköpfe an (4–8, je nach dem Alter), weil diese gleichzeitig eine resorberische Wirkung haben und keine Nachblutung befürchten lassen, und da die Blutentleerung überhaupt nur bei kräftigen Kindern vorgenommen wird, so ist auch das Fettpolster der Haut immer für die Application der Schröpfköpfe geeignet. Ich wiederhole aber, dass diese Methode nur mit Vorsicht Anwendung finden darf; weitaus die meisten sind elende, rachitische, durch andere Krankheiten geschwächte Kinder, bei welchen jede Blutentleerung verwerflich sein würde, und höchstens trockene Schröpfköpfe anzuwenden sind.

Um so mehr empfehle ich Ihnen von Anfang an hydropathische Einwickelungen des Thorax vom Hals bis etwa zur Nabelhöhe machen zu lassen. Man taucht eine Serviette oder Windel in zimmerwarmes Wasser und legt sie gut ausgerungen sanft, ohne eine Compression auszuüben, rund um den Thorax, so dass die Arme frei bleiben, über dieselbe zunächst eine Tafel Watte, und umgibt das Ganze mit einer Hülle von Wachstaffet oder Guttaperchapapier. Bei hoher Fiebertemperatur lasse ich diese Einwickelungen mindestens halbstündlich erneuern, später aber eine, auch wohl zwei Stunden liegen und fahre damit einige Tage und Nächte ununterbrochen fort; ja ich habe mitunter diese Behandlung eine volle Woche fortgesetzt, wobei in der Regel das anfangs kühle Wasser später mit einem stöchen von 26–27° R. vertauscht wurde. Die Einwickelung scheint mir auf dreifache Weise

¹⁾ Beitr. zur Kinderheilk. N. F. S. 173.

günstig zu wirken: 1) durch die unmittelbar nach der kühlen Application erfolgenden tiefen Inspirationen, welche die Luft energisch in die Alveolen treiben und Atelektasen verhüten können; 2) durch die derivatorische Hautreizung, welche sich schliesslich durch Röthe, Papeln und Abschülfung der Epidermis kundgibt; 3) endlich durch die Wasserverdunstung, welche die das Kind umgebende Atmosphäre feucht erhält und noch dadurch unterstützt werden kann, dass man in unmittelbarer Nähe des Bettes Wasserdämpfe aus einem Theekessel ausströmen lässt. Oft, aber nicht immer, bewirken die Einwickelungen auch einen günstig wirkenden Schweissausbruch, der aber nicht zu copios werden darf. Bei einem 11 Monate alten Kinde sah ich in Folge dieser colossalen anlaufenden Diaphoresis drohende Collapssymptome (Todesblässe, Schwanden des Pulses, leichte Cyanose) entstehen, welche nach der Entfernung der Fomentationen und dem Aufhören des Schweisses unter Gebrauch von Wein sich bald wieder verloren. Während des ganzen Verlaufs der Krankheit ist es übrigens zweckmässig, das Kind nicht anhaltend auf dem Rücken liegen zu lassen, vielmehr abwechselnd auf die eine oder andere Seite zu legen und von Zeit zu Zeit auf dem Arm herumtragen zu lassen, um hypostatische Prozesse möglichst zu verhüten.

Unter den Arzneimitteln wurden von jeher die Emetica am meisten gerühmt, und ich muss dieser Ansicht beipflichten, insofern es sich um sonst gesunde Kinder handelt. Hier ist der Beginn der Krankheit immer noch am besten mit dem Brechmittel zu bekämpfen, und wo eine sorgfältige Pflege und Beobachtung möglich ist, empfehle ich trotz aller Abmahnungen vor allem den *Tartarus stibiatus* *in reft. diss.* (F. 18). Ich lasse von der Lösung stündlich einen Kinderlöffel nehmen, bis einmal Erbrechen eintritt, dann aber nur zweistündlich. Sollte sich nach jeder Dosis Erbrechen oder gar Diarrhoe einstellen, so muss man das Mittel sofort aussetzen. Auch lasse ich, wenn nach den drei ersten Löffeln kein Erbrechen erfolgt sein sollte, die Intervalle auf 2 Stunden verlängern, um nicht eine cumulative Wirkung zu bekommen, welche dann schwer zu beschränken ist. Unpassend ist diese Methode aber durchweg bei schwächlichen Kindern, bei vorhandener Diarrhoe und in einem vorgerückten Stadium der Krankheit, zimal in der Armen- und poliklinischen Praxis, wo die Mütter sich allein überlassen sind und durch unvorsichtigen, zu anhaltenden Gebrauch des Mittels leicht erschöpfende Durchfälle und Collaps herbeiführen. Wo es unter diesen Umständen darauf ankommt, die mit Schleim überfüllten Bronchien zu entleeren und die Atmung freier zu machen, da mögen Sie lieber ein volles Emeticon aus *Ipecacuanha* versuchen (F. 6), das Brechweinstein

aber gänzlich vermeiden. Bei kräftigen Säuglingen bediente ich mich im Anfange der Krankheit oft eines Brechmittels aus Vinum stibiatum und Oxydul scillit. (F. 19) mit gutem Erfolg¹⁾. Jedenfalls aber hüte man sich vor der Anwendung aller Brechmittel, wenn bereits die Erscheinungen der Kohlensäurevergiftung und der Prostration vorhanden sind. Die Mittel versagen dann nicht bloss ihre Wirkung, sondern können durch Erregung von Durchfall und Depression der Herzthätigkeit die Schwäche in bedenklichem Grade steigern. Die beiden Hauptwirkungen des Brechmittels, das Auspressen von Schleim aus den Bronchien und die Erzielung ausgiebiger Inspirationen werden durch die depotenzierende Wirkung desselben illusorisch gemacht.

Sobald zahlreiche Rasselgeräusche das Vorhandensein eines reichlichen Secrets in den Bronchien anzeigen, gleichzeitig aber der sinkende Kräftezustand die Anwendung voller Brechmittel verbietet, gebe man ein starkes Infus. rad. Ipecacuanhae (0,3 bis 0,5 : 120), ein Decoct. rad. Senogae oder Polygalae amarae (F. 20), welches man, um den Hustenreiz und damit die Expectoration zu steigern, Liq. ammoniacat. (0,5 bis 1,5) mischen mag. Seufzteige auf das Brustbein oder den Rücken, kleine fliegende Vesicantien auf den Thorax appliziert sind gleichzeitig zu empfehlen. Milch, Brühe, Wein (Sherry, Tokayer, Portwein) müssen abwechselnd eingegeben werden, um die Kräfte möglichst zu erhalten. Bleiben diese Mittel unwirksam und nimmt der Kräfteverfall zu, so ist auch der Versuch mit einer Verbindung von Kampfer und Acid. benzoic. (F. 21) anzustellen, obwohl, wenn es einmal so weit gekommen, auch diese Mittel häufig ihren Dienst versagen und die Kohlensäureintoxication nicht aufzuhalten vermögen. Unter diesen Umständen haben bisweilen noch lauwarme Bäder mit kalten Affusionen, ein paar Mal täglich wiederholt, überraschenden Erfolg und sollten deshalb nie versäumt werden. In der letzten Zeit habe ich auch in den früheren Stadien heftiger Bronchitis und Bronchopneumonie täglich warm (37–38° R.) baden und darauf stundenlange Einwickelungen in wollene Decken machen lassen; die dadurch erzeugte Diaphoresis leistete entschieden gute Dienste, doch sind die bisherigen Versuche noch nicht zahlreich genug, um ein definitives Urtheil zu gestatten.

Schließlich noch einige Worte über die Behandlung der Bron-

¹⁾ Meine Erfahrungen über das Apomorphin, welches von einigen Seiten empfohlen wird, sind nicht zahlreich genug, um ein entscheidendes Urtheil abzugeben. Die wenigen Versuche, welche ich anstellte, und welche nicht befriedigend ausfielen, betrafen freilich sehr schwere Fälle von Bronchopneumonie.

hinkommen näher einzugehen brauche. Sie wissen, dass bei der fibrinösen Pneumonie die Alveolen der Lunge mit einem festen, grösstentheils aus geronnenem Fibrin bestehenden Exsudat gefüllt sind, während bei der katarrhalischen Pneumonie der Inhalt der Lungenbläschen aus einem Gemisch von grösstentheils verfetteten Epithelien und jungen Zellen besteht, dass ferner die letztere anfangs immer in lobulären, der eintzündeten Bronchialverästelung entsprechenden Herden auftritt und erst nach und nach durch immer neu hinzutretende Herde eine diffuse Verbreitung erlangt, während die fibrinöse Form von vorn herein einen grösseren Theil der Lunge, selbst einen ganzen Lappen so zu sagen mit einem Schlage befällt und mit starrem Exsudat infiltrirt. Diesen anatomischen Verschiedenheiten entspricht nun auch im Allgemeinen das klinische Bild. Statt des von einem Bronchialkatarrh eingeleiteten, allmählig an Intensität und Ausdehnung gewinnenden Verlaufs der Bronchopneumonie finden wir bei der fibrinösen Form eine rasche, fast plötzliche Entwicklung unter stürmischen Fieberbewegungen, etwa in der Art, wie acute Infektionskrankheiten sich einzuführen pflegen. Auch die Doppelseitigkeit der ersteren, welche eben von der diffusen Bronchitis abhängt, unterscheidet dieselbe von der meistens einseitig auftretenden fibrinösen Pneumonie. Was die Localisation der letzteren in den oberen oder unteren Lappen betrifft, so betrafen unter 77 von mir beobachteten Fällen

2	die ganze rechte Lunge,
2	beide Unterlappen,
4	den linken Oberlappen,
21	— rechten —
27	den linken Unterlappen,
21	— rechten —
77	

woraus sich auch für das Kindesalter die Vorliebe der Krankheit für die Unterlappen ergibt.

Die oben erwähnten Unterschiede dürfen indess nur im Allgemeinen auf Gültigkeit Anspruch machen. Schon in anatomischer Beziehung kommen Mischformen vor, welche wohl geeignet sind, den von Rilliet und Barthex beschriebenen „lobulären Hepatizationen“ eine Existenzberechtigung zusprechen. Im Gegensatz zu Bartels und Zirmann hält auch Steffen¹⁾ die Möglichkeit aufrecht, dass das Product der

¹⁾ Klinik der Kinderkrankh. I. S. 140.

lobulären Pneumonie auch trübende Natur sein könne; Steiner, sowie Damaschew¹⁾ beschreiben geradezu solche Herde, welche zugleich mit den bronchopneumonischen in einer und derselben Lunge gefunden wurden, und Virchow gab bereits früher an, dass neben der Zellwucherung in den Alveolen in Folge eines höheren Reizungsgrades auch fibrinöse Exsudation in denselben auftreten könne. Analoge Fälle sind mir selbst vorgekommen, unter denen besonders derjenige eines Kindes mit Pleuropneumonie des ganzen linken Unterlappens, während gleichzeitig Bronchitis und in der rechten Lunge kleine bronchopneumonische Herde bestanden, hervorzuheben ist (vergl. oben S. 329). Aber auch das klinische Bild ist nicht immer so prägnant, wie man nach den Schilderungen der Autoren vermuthen sollte. Besonders in der Hospital- und poliklinischen Praxis, wo die Kinder schon mit der völlig ausgebildeten Krankheit in Behandlung kommen und der Entwicklungsgang unbeobachtet blieb, kann man in Zweifel darüber sein, mit welcher Form von Pneumonie man es eigentlich zu thun hat. Stellen Sie sich z. B. einen Fall vor, in welchem sich physikalisch eine ausgedehnte pneumonische Verdichtung des rechten Unterlappens, dabei aber auch ein Katarrh der linken Lunge nachweisen lässt, so müssen Sie immer daran denken, dass bei der Bronchopneumonie nicht selten nur in der einen Lunge ein ausgedehntes, zu wirklichen Verdichtungserscheinungen führendes Confluenz der Herde stattfindet, während dieselben in der anderen Lunge inselartig von einander getrennt bleiben können, so dass hier nur katarrhalische Geräusche wahrgenommen werden. Andererseits ist auch der begleitende Katarrh für die Bronchopneumonie nicht durchaus charakteristisch, denn gerade bei Kindern hatte ich nicht selten fibrinöse Pneumonien, welche mit Bronchialkatarrh compléirt waren, zu beobachten Gelegenheit.

Für diese zweifelhaften Fälle bleibt nun freilich der Fiebercharakter immer ein nothwendiges Symptom. Ich unterschreibe ohne Bedenken die Schlüsse, welche Ziemssen²⁾ aus seinen Untersuchungen zog, den gesetzmässigen Verlauf des Fiebers bei der fibrinösen Pneumonie und die Beziehung desselben zu den kritischen Tagen, während „gerade der protrahierte Verlauf mit den späteren bedeutenden Schwankungen in der Fiebertiefe, mit den immer wiederkehrenden Steigerungen des Fiebers, denen jedesmal ein Fortschritt des örtlichen Processes

¹⁾ Des différences formes de la pneumonie aiguë chez les enfants. Paris 1867, p. 28.

²⁾ Derritis und Pneumonie im Kindesalter. 1862. S. 316.

entspricht, mit dem langsamen durch kleine Exacerbationen verzögerten Abfälle des Fiebers, mit der zögernden Resolution der gesetzten Verdichtung¹⁾ der katarrhalischen Form eigenthümlich ist. Das alles hat für die Majorität der Fälle ungewißhaft seine Richtigkeit, aber doch keineswegs für alle. Nicht jede fibrinöse Pneumonie endet mit einer Krise, vielmehr kann auch hier ein mehr „schleppender“ Verlauf, ein Uebergang in den chronischen Zustand vorkommen, und andererseits beobachtete ich zuweilen Pneumonien, welche vollkommen das Bild der katarrhalischen darbieten, dennoch aber eben unerwartet schnellen und günstigen Verlauf nehmen, so dass binnen 5–8 Tagen alles vorüber war. Wer sich dafür interessiert, möge die früher²⁾ von mir beschriebenen Fälle dieser Art vergleichen. Wiederholte seitdem gemachte Beobachtungen lassen mich auch heute noch den damals eingenommenen Standpunkt festhalten. Zwischen den wohl charakterisirten Fällen der fibrinösen-löbären Form einerseits und der Bronchopneumonie andererseits liegt eine Zwischenform, welche sich klinisch nicht mit völliger Sicherheit feststellen lässt³⁾. Die Frage, ob es möglich sei, die beiden Formen der Lungentzündung in jedem einzelnen Falle während des Lebens von einander zu unterscheiden, muss daher meiner Ansicht nach verneint werden. Dass man deshalb aber die einmal übliche Unterscheidung in eine fibrinöse und katarrhalische Form durch andere Benennungen (circumscripte und diffuse nach Steffen, primäre und sekundäre nach Rautenberg) ersetzen soll, halte ich nicht für rathsam, weil in der grossen Majorität der Fälle die alten Bezeichnungen sich sowohl anatomisch wie klinisch rechtfertigen.

Besondres halte ich die von Rautenberg vorgeschlagene Einteilung deshalb für nicht zutreffend, weil sowohl primäre, d. h. idiopathisch entstandene Pneumonien, wie sekundäre, welche im Laufe einer anderen acuten oder chronischen Krankheit auftreten, den fibrinösen Charakter darbieten können. So fand ich nicht selten bei Kindern mit Tuberkulose und Verkäsung innerer Drüsen oder anderer Organe wohl charakterisirte lobäre Hepatisationen der Lunge, welchen auch im Leben das bekannte Bild der fibrinösen Pneumonie entsprochen hatte. Dasselbe kommt zuweilen bei den acuten Infectiouskrankheiten, besonders bei den Masern vor, wenn auch gerade hier die Frequenz der Bronchopneumonie bedeutend prävallet. Am meisten aber überraschte mich der Fall eines an einem schweren Diphtheria erkrankten 12jährigen Mädchens, dessen

¹⁾ Beitr. zur Kinderheilk. N. F. S. 161.

²⁾ Vgl. mit Steiner, Prager Vierteljahrsschr. 1862. HL. S. 12.

hohe Fiebertemperaturen durch kein antipyretisches Verfahren herabzubringen waren, vielmehr bis zuletzt einen «statutarischen» Typus von 40° und darüber darbieten. Bei der Section fanden wir die ganze linke Lunge fast von oben bis unten hepatitisirt, und mitten darin an der unteren Grenze des Oberlappens zwei inselförmige, resp. höhlen- und ausgegrube, segmentirte, mit einer Demarcationslinie umgebene Herde (disseminirte Pneumonie).

Ich bemerkte bereits, dass auch die fibrinöse Pneumonie sich bisweilen aus einem Katarrh, sei es nun ein acuter oder chronischer, entwickeln könne, in welchem Falle während der ganzen Dauer katarrhalische Geräusche in der kranken oder auch in der gesunden Lunge gehört werden. In der grossen Mehrzahl der Fälle beginnt aber die Pneumonie, wie bei Erwachsenen, ganz plötzlich. Selbst den das heftige Fieber einleitenden Fröstaufall habe ich bei Kindern, welche das 5. Lebensjahr überschritten hatten, bisweilen beobachtet, auch häufiger wiederholtes Erbrechen. Dieser Beginn und die stürmisch bis 40° aufsteigende Temperatur (in einem Falle beobachtete ich schon am ersten Abend 41,2) kann um so eher zu Irrthümern verleiten, als die respiratorischen Symptome in diesem Entwicklungsstadium noch völlig latent bleiben können, und an ihrer Stelle häufig Erscheinungen auftreten, welche auf ein Ergriffensein des Gehirns hinweisen, besonders Somnolenz, Delirien, dunkle Gesichtsröthe, glänzende Augen. Auch heftige Halsschmerzen mit Hyperämie des Pharynx und des Zahnefleisches sind öfters im Anfange vorhanden, und eine leichte Rötze der Haut, welche gewöhnlich nur partiell auftritt (schon Billiet und Barthez beobachteten dieselbe), wirkt dann um so verwirrender auf den Arzt. Man denkt zunächst an den bevorstehenden Ausbruch des Scharlachfiebers, an eine *Febriß gastrica* oder an eine sich entwickelnde Meningitis. Unter diesen Umständen achtet man besonders auf die Art des Athmens. Dem aufmerksamen Beobachter fällt schon um diese Zeit die kurze, im Verhältniss zum Pulse sehr beschleunigte Respiration und die stöhnende Expiration auf, wenn auch Husten und wirkliche Dyspnoe auch vermisst werden. Die Untersuchung des Thorax ergibt entweder gar keine Abnormitäten, oder höchstens, wenn man sehr aufmerksam auscultirt, eine Abschwächung des vesiculären Athmens in der erkrankten Partie, z. B. am unteren Theil der rechten Rückenfläche, während der Percussionsschall vorn oben einem tympanitischen Beiklang hat:

Emil A., 5jährig, am 10. Juni 1879 in die Poliklinik gebracht, sehr kräftig. Vor 4 Tagen plötzlich starke Hitze, Klage über Schmerzen in allen Gliedern,

Apathie, Appetitverlust, dick belegte Zunge. Puls 132, Resp. 44, kurz. Die Untersuchung ergibt nur rechts hinten und unten etwas abgeschwächtes Athmen, vorn oben rechts Percussionsschall höher und tympanitisch. Der von mir in der Klinik ausgesprochene Verdacht einer sich entwickelnden Pneumonie bestätigte sich schon in den folgenden Tagen. Am 12. Fieber geringer, starker Husten. Vorn oben rechts Percussion wie am 10., aber hinten von der Spina scapulae abwärts und in der Axillargegend intensive Dämpfung und bronchiales Athmen. Am 16. nach einem kritischen Fieberanfall alle Erscheinungen in voller Rückbildung.

Diese Latenz der physikalischen Erscheinungen, welche 4–6 Tage dauern kann, führt im Verein mit den prävalirenden cerebralen oder gastrischen Symptomen leicht zur irrigen Annahme einer Meningitis oder eines beginnenden Typhus. Wahrscheinlich entwickelt sich in solchen Fällen die Pneumonie allmählig aus dem Centrum der Lunge nach der Peripherie, und erst dann, wenn sie diese erreicht hat, treten die Verdichtungserscheinungen deutlich zu Tage. Solange dies geschieht, pflegen die bis dahin im Vordergrund stehenden gastrischen oder cerebralen Symptome sich zurückzuziehen, und die Diagnose wird dann mit einem Mal klar, bisweilen erst zu einer Zeit, wo das Fieber bereits erschloffen im Abnehmen ist. Die Meinung einiger Autoren, dass besonders die Pneumonie der Oberlappen zu diesen Täuschungen verleiten könne, theile ich nicht, da ich auch die Entzündung der Unterlappen häufig auf diese Weise verlaufen sah. Die solche Fälle einleitenden Birnsymptome (Pneumonie cérébrale von Rilliot und Barthéz) zeigen sich nach meiner Erfahrung am häufigsten in typhöser Form, als Apathie, Somnolenz, Schwindel, Delirien, trübe Zunge, weit seltener als Anfälle epileptiformer Convulsionen:

Pauline S., 4jährig, am 7. Juli 1864 vorgestellt. Seit vorgestern continuirlicher Fieber und Husten. Am 8. früh wiederholte Epilepsieanfälle. Puls 132, Resp. 64, Percussion überall normal, rechts vorn spärliches Rassel. Stetiger Kopfschmerz. Erst am 8. (also am 4. Tage der Krankheit) Dämpfung rechts hinten oben mit unbedeutendem Aethen, weiches Bronchialathmen. Keine am 7. Tage.

Augusta B., 4jährig, aufgenommen am 11. Mai 1877, seit vorgestern mässige Kopfschmerzen und Appetitangel. Gestern Nachmittag plötzlich allgemeine Convulsionen von solcher Heftigkeit, dass das Kind aus dem Bette geschleudert wurde. In der Nacht Delirien, grosse Apathie, halbgeschlossene Augen, etwas erweiterte Pupillen, Temp. 40.1, Puls 132, Resp. 42, sehr oberflächlich und etwas dyspnoisch. Husten kaum bemerkbar. Erst am 12. bei zunehmender Frostzeit des Stomatums wird eine starke Dämpfung rechts hinten unten mit kleinklaugigen Mässigen Rassen constatirt. Am 15. vollständige Keise; am 18. Dämpfung schon erheblich vermindert, mittelklaugiges Rassel und Schramm, heftiger Husten. Am 23. alles normal.

Helene S., 6jährig, aufgenommen am 4. Februar 1878 wegen Fluor albus. Am 23. plötzlich rechts Angina bei 38.0 T., Ab. 41.2 mit 150 P. Gleichzeitig tritt ein klonischer Zustand mit häufigen Zuckungen der Augen-, Gesichts- und Extremitätenmuskeln ein. Nach 20 Minuten langer Dauer Nachlass. Am Morgen des 24.

Temp. 40,9. Angina fortbestehend. R. 60, oberflächlich und schnell, Katarrh lufte, rechts in der Fossa supracardica Dämpfung, unbestimmtes Athemen und klagendes Rasseln, weißes Bronchialatemen, kontinuierliches hohes Fieber, wobei aber das Sensorium völlig klar ist; Convulsionen nicht wiederkehrend. Keine zwischen dem 6. und 7. Tage.

Otto S., 7jährig, in der Nacht vom 16.—17. Januar 1874 plötzlich mit starker Hitze und Vomitus erkrankt. Am 17. zunehmende Somnolenz, Apathie, aus welcher der Knabe indess leicht zu erwecken ist und dann richtig antwortet. Temp. immer 40 und darüber, Mittags sogar 41,5 erreichend. Chills 0,5 und zweiäder von 25^{te} ohne allen Erfolg. Am 19., wo ich den Kranken zuerst sah, fortwährendes Fieber (41,8). Apathie, Gesichtsröthe und Injection der Conjunctiva, borkige Lippen, trockene Zunge, Resp. 40, nicht dyspnoisch. Keine Stühle, etwas Blasen. Links klatet, besonders von der Spize abwärts, und seitlich Dämpfung, Bronchialathemen und Bronchophonie. Am 20., also zwischen dem 3. und 4. Tage Sinken des Fiebers auf 38,5 mit allgemeiner Besserung, am 21. Wiederanstiegen auf 40,0 mit stärkerer Dyspnoe, Resp. 60. Keine im 7. Tage.

Ueber die Ursachen dieser initialen Hämorrhagien sind die Ansichten getheilt. Ich glaube, dass die mehr typhösen Symptome (Erbrechen, Schwindel, Kopfschmerz, Apathie, Somnolenz) ohne Bedenken allem von der rapiden Steigerung und kontinuierlichen Höhe der Temperatur abzuleiten sind, und dass bei einer besonderen Disposition auch Convulsionen auf diese Weise entstehen können. Beziehungen zu einer complicirenden Otitis, auf welche Steiner aufmerksam macht, konnte ich bisher nicht constatiren, und eine Meningitis kann wohl nur da angenommen werden, wo die cerebralen Symptome nicht bloss als initiale auftreten, sondern auch im weiteren Verlaufe der Krankheit bis zum Tode fortdauern. Dass die Meningitis cerebri-spinalis sich mit Pneumonie verbinden kann, ist bekannt. Die Erscheinungen der erstern bleiben dann aber immer die prävalirenden und die Pneumonie erscheint nur als zufällige Complication. —

An die allmähliche Entwicklung der Pneumonie aus dem Centrum nach der Peripherie hin, welche die mehrtägige Latenz der physikalischen Symptome bedingt, schliesst sich die unter dem Namen „Pneumonia migrans“ beschriebene Form, welche ich auch bei Kindern wiederholt beobachtete. Die fibrinöse Verdichtung schiebt sich hier, ähnlich wie beim Erysipelas, von dem primär ergriffenen Lungentheile aus schubweise weiter vorwärts und kann auf diese Weise nach und nach einen ganzen Lungenflügel befallen:

Anna S., 7 Jahre alt, aufgenommen am 8. Februar 1874 mit Pneumonie des linken Unterlappens und sehr hohem Fieber (40,5—40,9). Am folgenden Tage mischte sich Harpung und klingende Rasselgeräusche schon an der linken Seitenfläche und bestanden hier ununterbrochen bei zunehmend hoher Temperatur, 36—34 R., 144

bis 150 P. und ausgesprochener gastrischer Complication (dick belegter Zunge, Erbrechen, Fäulnis, Diarrhoe). Am 11. (dem 10. Tage der Krankheit) waren die Verdichtungssymptome hinten bereits in voller Entwicklung (Temp. 38,8—39,4), während vorn Dämpfung, Brustschmerzen und klagendes Einathmen bis an die Clavicula hinaufreichten. Krise am 11. Tage. Am 19. Febr. völlige Wiederherstellung.

Man konnte in diesem Falle (und in mehreren ähnlichen) mittelst der physikalischen Untersuchung die in Schüben vor sich gehende Wanderung der Pneumonie vom unteren Theile des Unterlappens über die Seitenfläche nach vorn bis zur Lungenspitze verfolgen. Dieser Process dauerte 5—6 Tage. Am 12. Abends stieg die schon sinkende Temperatur plötzlich wieder auf 40,1, offenbar in Folge des letzten pneumonischen Nachschubs in der Lungenspitze, mit welchem die Krankheit ihr Ende erreichte. Bei einem 6jährigen Knaben sah ich die bis dahin auf den hinteren Theil des rechten Lungenlappens beschränkte, aber aufsteigende Pneumonie erst am 10. Tage die Linea axillaris überschreiten und die vordere Lungenpartie befallen, während neben der Wirbelsäule die Verdichtungssymptome wieder schwanden. Erst am 18. Tage erfolgte eine vollständige Krise.

Bei dieser Gelegenheit muss ich sie daran erinnern, dass bei Pneumonie eines Oberlappens sehr bald auch eine Dämpfung an der Basis auftreten kann, welche nicht etwa durch eine sprunghafte Wanderung der Pneumonie, sondern durch ein von der Spitze herabgeflissenes pleuritiches Exsudat bedingt wird (Traube). Die Complication mit Pleuritis kommt nämlich hier ebenso häufig vor wie bei Erwachsenen, und verräth sich bei älteren Kindern durch Klagen über Schmerz beim Husten, beim Liegen auf der kranken Seite, bei der Percussion und Palpation der Intercostalräume. In der Regel erreicht die begleitende Pleuritis und das von ihr gesetzte Exsudat keinen erheblichen Grad, wenn auch die durch letzteres bedingte Dämpfung und Abschwächung des Athengeräusches am unteren Theil der Rückenfläche sich nach weit in die Convalescenz hineinzieht. Wenig seltener sah ich aus einer Pneumonie allmählig eine exsudative purulente Pleuritis sich herausbilden, welche wegen des andauernden heftigen Fiebers schliesslich die Radicaloperation des Empyems erforderte und glücklich geheilt wurde. Bei einem Kranken, einem 11jährigen Mädchen, war die Pneumonie primär, bei einem anderen (einem 9jährigen Knaben) im Verlauf einer scarlatinösen Nephritis entstanden. Die Unterscheidung der Pneumonie von einem pleuritischen Exsudate wird bei kleinen, noch nicht sprechenden Kindern besonders dadurch erschwert, dass zwei wichtige Symptome, der Pectoralfremitus und die rothfarbigen Sputa hier fehlen. Der

erstere ist fast niemals deutlich nachzuweisen, wenn man überhaupt zur die Momente des starken Schreies benutzen kann; erst nach zurückgelegtem 3. Lebensjahr gelang es mir, die Verstärkung oder Abschwächung des Stimmfremitus so bestimmt nachzuweisen, dass diagnostische Schlüsse daraus gezogen werden konnten. Rostfarbige Sputa beobachtete ich aber fast nur bei älteren Kindern von 8—12 Jahren; nur einmal sah ich blutgestreiften Auswurf bei einem 4½-jährigen Knaben.

Ebenso wenig, wie die Symptome, zeigen der Verlauf und die Ausgänge dieser Pneumonie wesentliche Verschiedenheiten von derjenigen der Erwachsenen. Weitans der grösste Theil der Fälle endet mit einer vollständigen Krise glücklich (unter 45 klinischen Fällen 37mal), seltener (8mal) allmählig unter den Erscheinungen der Lysis. Das Eintreten der Krise wurde am häufigsten (29mal) zwischen dem 6. und 7. Tage, 5mal am 11., ebenso oft am 8., 3mal am 5., und 2mal am 3. Tage beobachtet. Ganz ähnlich war das Verhältniss in den früher von mir zusammengestellten 30 Fällen¹⁾. Den tödtlichen Abfall der Temperatur begleitete gewöhnlich, keineswegs aber immer, ein copioser Schweissausbruch, womit bisweilen Symptome des Collapses, wenigstens grosser Schwäche zusammenfielen, anhaltende Unruhe, kühle Extremitäten, verfallenes bleiches Gesicht, sehr frequenter kleiner Puls, so dass ich zur Anwendung excitirender Mittel (Wein in grösseren Gaben) genöthigt wurde. Uebrigens liess sich fast in allen meinen Fällen der Zeitpunkt des Eintrittes der Krise nicht mit absoluter Sicherheit bestimmen, weil dieselbe häufig während der Nacht erfolgte, und um diese Zeit nur annäherungsweise thermometrische Messungen in der Klinik vorgenommen werden. Es blieb daher oft ungewiss, ob das plötzliche Sinken der Temperatur am Ende eines geraden oder am Anfange eines ungeraden Tages stattfand. Wiederholt beobachtete ich auch, dass im Verlaufe der Pneumonie das sehr hohe continuirliche Fieber zwischen dem 3. und 5. Tage temporär sank, z. B. von 40,0 auf 38,8, nach 12—24 Stunden wieder seinen hohen Stand erreichte und erst nach einigen Tagen kritisch abfiel, wobei es unentschieden blieb, ob die Erscheinung dieses „dies adex“ und die darauf folgende neue Steigerung auf einem neuen pneumonischen Schube beruhte. Durch die physikalische Untersuchung liess sich ein solcher wenigstens nicht sicher nachweisen.

Nicht immer war die Krise sofort eine vollständige, wobei die Temperatur, welche Abends noch 40° oder darüber betrug, am folgenden

¹⁾ Beitr. zur Kinderheilk. N. F. S. 168.

Morgen auf 37—37,5 sank und nun anhaltend normal oder subnormal (38,5) blieb; vielmehr beobachtete ich wiederholt, dass die Krise sich längere Zeit, etwa 24 Stunden, hinzog, z. B. in folgender Weise:

Anna B., 7jährig, aufgenommen am 8. März 1875 mit Pyramie des linken Unterlappens.

	M.	A.
am 8. März		40,5
9.	40,5	40,9
10.	40,3	40,6
11.	39,4	39,6
12.	39,3	40,1
13.	38,8	39,4
14.	38,0	36,1 Entfieberung.

Auch kam es bisweilen in den ersten Tagen nach der Krise noch einmal zu einer plötzlichen, nicht bedeutenden und ganz ephemeren Temperaturerhöhung (38—40), deren Grund sich nicht nachweisen liess, die sich auch nicht wiederholte und den weiteren günstigen Ablauf in keiner Weise beeinflusste. So erfolgte bei einem Knaben die Krise zwischen dem 6. und 7. Tage, an welchem die Temperatur Morgens 36,5, Mittags 37,3 betrug. Abends aber wieder auf 40,2 stieg, um erst vom 8. Tage an ganz fieberlos zu bleiben. Während der Reconvalescenz beobachtete ich, wie die meisten Autoren, zumal in der ersten Zeit und beim Aufrechtsetzen häufig einen unregelmässigen Puls. Vielleicht sind die moleculären Veränderungen des Herzmuskels, die bei intensiv fieberhaften Krankheiten erfolgen und sich später wieder ausgleichen, an dieser Erscheinung Schuld.

Durch einen fulminanten Verlauf zeichnete sich ein tödtlicher Fall aus. Derselbe dauerte kaum 9 Stunden und betraf einen

4jährigen Knaben, welcher in den letzten Tagen des Jahres 1873 in der Klinik an den Erscheinungen einer *epithemischen Nephritis* mit Erfolg behandelt worden war. Schon seit 14 Tagen war der Knabe convalescent, und am 7. Decbr. Mittags betrug die Temp. noch 36,9. Abends plötzlich Krankheitsgefühl, T. 38,1; P. 128. Anhaltender starker Husten, zunehmende Dyspnoe; nach einigen Stunden reichs geröthete der Spina scapularis mütter Percussionsschall, unbestimmtes Athmen, klingendes Rasseln. Morgens 3 Uhr Tod unter enormer Dyspnoe. Die Section ergab Hepatisation des ganzen rechten Unterlappens. Naturb. in der linken Lunge. Nieren normal, Harn steas (vergrössert), klars. Leider wurde die mikroskopische Untersuchung des letzteren vernachlässigt, da es mir aus anderen Beobachtungen wahrscheinlich ist, dass hier eine Verletzung des Herzmuskels in Folge der Epithemie vorlag, welche der nach üblichen Verlauf der Pyramie bedingt ist.

Einen Fall, welcher nach einer nur 3tägigen Dauer mit vollständiger Krise glücklich endete, theilte ich schon früher mit¹⁾.

Die Pneumonie begann hier am 8. April früh 5 Uhr mit starken Fieber, nachdem der an einem Katarrh leidende 10jährige Knabe Tage zuvor sich dem scharfen Outwinde ausgesetzt hatte. Am Abend des 9. liess sich die Infiltration des rechten Unterlappens schon deutlich nachweisen; am 10. Abends war die Temp. noch 40,0, von 8 Uhr an aber trat ein die ganze Nacht hindurch anhaltender warmer Schweiß ein; Temp. am 11. (fieberlos); alle Erscheinungen so nach verschwindend, dass am 12. nur noch eine geringe Dämpfung nachweisbar war.

Ähnlich verlief der folgende Fall, nur erfolgte die Krise hier schon in der Nacht vom zweiten zum dritten Tage:

Max S., 11 $\frac{1}{2}$ Jahr alt, aufgenommen am 27. Juni 1876 mit fieberhaftem Katarrh. Am 30. Morgens plötzlich hohes Fieber (40,5); R. 40; P. 136. Husten und Schmerz links beim Atmen; unterhalb der Scapula unbestimmtes Athmen. Am 1. ausserst Dämpfung. Brachialathmen und klingendes Rasseln. T. 40—40,4, R. 48. Abends grösste Schwäche. Spalten exquisit rothfarbig. Am folgenden Morgen (Beginn des dritten Krankheitstages) nach reichlichem Schweiß und gutem Schlaf Euphorie. T. 37,0, R. 26; P. 80. Am 4. war die Dämpfung bereits ganz verschwunden, und nur noch mässiges Athmen mit vereinzelten Rasselfläuschen hörbar.

In der Literatur fehlt es auch nicht an einzelnen Beispielen eines noch kürzeren, selbst eintägigen Verlaufs (Leube, Weil), welche bei Erwachsenen beobachtet wurden. Alle diese sogenannten „Abortispneumonien“ veranlassten die französischen Aerzte, besonders Andet²⁾, ein eigenes Krankheitsbild, die „Congestion pulmonaire aiguë“, aufzustellen, womit ich mich nicht einverstanden erklären kann, weil anatomische Beweise für eine solche Annahme fehlen. Wie schnell, binnen wenigen Tagen nach der Krise, auch die physikalischen Erscheinungen der Pneumonie sich zurückbilden können, zeigt Ihnen der letzte Fall. Freilich geschieht dies nicht immer, aber abgesehen von den seltenen Fällen eines chronischen Verlaufs sah ich in der Mehrzahl nach einer, spätestens nach 1 $\frac{1}{2}$ —2 Wochen den vollen Percussionsschall und das normale Athmen sich wiederherstellen, wenn nicht etwa ein reichlicheres pleuritiches Exsudat die Dämpfung am untersten Theil der Rückenfläche noch längere Zeit unterhielt. Von dieser Regel wich nur ein einziger Fall durch die merkwürdige Erscheinung ab, dass die physikalischen Symptome noch vor dem Eintritt der Krise sich zurückbildeten:

Heinrich S., 9jährig, aufgenommen am 11. Mai 1877, gesund. In der Nacht vom 7. zum 8. lebhaftes Klagen über Kopf- und Leibesmerzen, Durst und Hitze,

¹⁾ Beiträge zur Kinderheilk. N. F. S. 167.

²⁾ L. c. p. 1.

wiederholten Erbrechen, Störm Anorexie, Drost, Fieber, nichtflüssige Stühle, leichter Husten. T. bei der Aufnahme 40.4. Gesichtsausdruck leidend, Wangen geröthet, Augen meist geschlossen, Somnolenz. P. 120, stark gespannt. R. oberflächlich, 60. Empfindlichkeit des Unterarms gegen Druck. Percussion hinten links von oben bis unten gedämpft, dabei kleinfingiges klingendes Rasseln; sonst nichts Abnormes. T. Abends 40.6. Der folgende Tag brachte keine Veränderung, dagegen stiegen wir am 12. bei fortdauernd hohem Fieber (40.6. 120 P. und 60 R. die Dämpfung fast ganz geschwunden und statt des klingenden kleinfingigen nur noch mucöses Rasseln hörbar. Die hohen Temperaturen (zwischen 40 und 40.5 schwandelnd) bestanden noch bis zum 16. früh, wo plötzlich Euphorie und ein kritischer Abfall auf 36.5 constatirt wurde. Von nun an rasche Genesung.

Die Angabe von Grisolle¹⁾, dass bei 26 an Pneumonie Erkrankten die Symptome der Auscultation sich noch während der Fieberhöhe auffallend gebessert hätten, wurden von anderen Autoren, z. B. Fox, durch das Bedenken zu entkräften versucht, dass Grisolle das Fieber nur nach dem unzuverlässigen Pulse, nicht nach dem Thermometer beurtheilt habe. Der eben mitgetheilte Fall, sowie die Bemerkung von Silló²⁾, dass in 37.5 pCt. der Fälle der physikalisch nachweisbare Localprocess durchschnittlich 41 Stunden vor dem Kriseneintritt sistirte, scheint für Grisolle's Behauptung zu sprechen.

Die fibrinöse Pneumonie gehört, wenn sie nicht gerade in sehr ungünstigen Verhältnissen (Nephritis, Typhus, Tuberkulose) auftritt, zu den prognostisch günstigsten Krankheiten der Kinder, wie der Erwachsenen. Unter 41 Fällen starben wir nur zwei, von denen einer bei der Section eine Hepatisation der ganzen rechten Lunge, ein anderer Pleuropneumonia duplex und Pericarditis purulenta ergab. Je grösser die Ausdehnung, um so grösser die Gefahr der Athmungsinsufficienz, wovon sich schon die weit günstigere Prognose der meist partiell auftretenden fibrinösen Pneumonie im Gegensatz zu der diffusen katarrhalischen Form erklärt. Aus diesem Grunde gewährt es auch immer eine Beruhigung, wenn die Pneumonie einseitig auftritt, und die Symptome der Hepatisation sich auf die Rücken- oder Vorderfläche beschränken, also nicht die ganze Dicke eines Lappens betreffen. Das gleichzeitige Bestehen eines Catarrhs oder eines reichlichen pleuritischen Exsudats trübt die Prognose, während die fast nie fehlende geringe Pleuritis nicht beunruhigen darf. Auch der seltener vorkommende lytische Fieberabfall, welcher sich Tage lang hinziehen kann, ist nicht zu fürchten, wenn dabei noch die Möglichkeit einer längeren Persistenz der Verdichtung

¹⁾ Traité de la pneumonie. p. 307.

²⁾ Deutscher Archiv f. klin. Med. Bd. XIV. S. 348.

und des Uebergangs in den chronischen Zustand nicht ausgeschlossen werden kann. Nur zweimal hatte ich Gelegenheit, den Ausgang in Abscessbildung, und zwar mit schliesslicher Heilung, zu beobachten.

Im April 1875 wurde ich bei einem 7jährigen früher ganz gesunden Mädchen consultirt, welches an einer doppelseitigen fibrinösen Pneumonie litt. Neben einer Hyperämie des ganzen rechten Unterlappens bestand auch Dämpfung und Bronchialrâles am untersten Theile der linken Rückenfliche. Am 7. Tage erfolgte die Krise: erstes caputres Schweissen und Symptomen des drohenden Collapses sank die Temperatur auf 35,2, aber nur auf einige Tage. Während die Verflüssigungserscheinungen links unten schnell verschwanden, blieben die der rechten Lunge unverändert, und das wieder auffliessende Fieber nahm bald den Charakter der *Febris hectica* mit wechselnden Temperaturhöhen an; dabei fortdauernder Husten mit schelmigen spärlichen Sputis, zunehmender Verfall der Kräfte und enorme Abmagerung, welche das Aeusserste befechten liessen. Dabei konnte man nirgends eine Höhle physikalisch nachweisen; Dämpfung und Bronchialrâles bestanden hiesig rechts von der Spina scapular abwärts unverändert fort, während von oben nur verlängertes *Respirum* hörbar war. Am 26. Mai, also etwa 5–6 Wochen nach dem Beginn der Pneumonie, erfolgte plötzlich unter aufkeimenden Hustenanfällen ein enormer Auswurf reinen Eiters, dessen Menge leider nicht bestimmt wurde, und von nun an besetzten sich sehr allwüthig alle krankhaften Erscheinungen, so dass am 14. Juli das Kind als vollkommen gesund aus der Cur entlassen werden konnte. Nur unbestimmtes Athmen und eine leichte Dämpfung an der Basis der rechten Rückenfliche gaben noch Kunde von der überstandenen Krankheit. Seit dem Beginn der *Febris hectica* hatte das Kind nur ein Chinadessert, Weiss und kräftige Nahrung bekommen; nach der Reizar des Ataccases in die Bronchien brachte es den grössten Theil des Tages im Garten zu. Wie ich später erfuhr, erfreute sich das Kind einer ungetrübten Gesundheit. Ganz ähnlich verlief der zweite Fall. —

Die im Allgemeinen expectative Behandlung, welche in neuerer Zeit gegen die Pneumonie der Erwachsenen empfohlen wird, gilt auch für das Kindesalter. Blätige Schröpfköpfe werde ich höchstens bei enormer Dyspnoe und grosser Ausdehnung der Pneumonie, sowie bei einer Complication mit intensiver Pleuritis an, wenn heftige Schmerzen beim Athmen und Husten dazu auffordern. Bei milder kräftigen Kindern kommt man auch mit trockenen Schröpfköpfen aus. Wo aber die Pneumonie räumlich beschränkt ist, die pleuritische Complication fehlt oder wenigstens nicht in den Vordergrund tritt, unterlasse man die Blutentziehung gänzlich und wende lieber kalte Einwickelungen oder Fomentationen des Thorax an (S. 341), welche, so lange die hohe Temperatur anhält, halbstündlich, später ein- bis zweistündlich erneuert werden. Auch eine auf den Kopf oder Unterleib applicirte Eisblase ist zu empfehlen, während sie auf der Brust ihrer Schwere wegen minder gut vertragen wird. Der Anwendung Kältler oder kalter Bäder, wie sie besonders von Jörgensen empfohlen wird, kann ich bei Kindern nicht

das Weist reden, einmal weil ich eine deprimirende Wirkung auf das Herz, welche gerade bei der Pneumonie zu vermeiden ist, befürchte, besonders aber deshalb, weil ich die Bäder nicht für notwendig erachte. Der Grundsatz „ne quid nimis“ gilt hier in seinem vollen Umfange. Die ungeheure Mehrzahl der Fälle verläuft erfahrungsgemäss ohne jede eingreifende Behandlung, und es ist also gar kein Grund vorhanden, die Kinder der Gefahr eines Collapses auszusetzen, welche ich von der kalten Behandlung des Kindertyphus her kenne. Dazu kommt, dass ich während der Akme der Temperatur von kühlen (20—22° R.) Bädern ebenso wenig einen nachhaltigen Erfolg beobachtet habe, wie von der Anwendung grosser Dosen Chinin (0,5—1,0). Drückt man auch die Temperatur in den nächsten Stunden um $\frac{1}{2}$ —1° herab, so ist diese Abnahme doch immer nur ganz vorübergehend, und man müsste, um die Wirkung zu unterhalten, das Bad oder die Chinindosis alle paar Stunden wiederholen, was bei Kindern dringend zu widerrathen ist. Curven, wie die folgende, könnte ich Ihnen mehrfach vorlegen:

Temp. M.		A.
Am 11. Mai		40,6
Bad von 20° R.		
12.	9 Uhr 39,6	
	12 40,3	
	5 40,5	Chinin 0,5
13.	39,6	40,6 Chinin 0,5
14.	39,6	40,5 Chinin 1,0
15.	40,0	40,1
Bad von 22°		
16.	Krise.	

Ich bin daher auch von der Anwendung des Chinins und anderer Astringentia ganz zurückgekommen und beschränke mich auf die locale Anwendung der Kälte, besonders kühle, später hydropathische Einwickelungen der Brust und des Unterleibes. Innerlich empfehle ich Ihnen ein Infus. hb. Digitalis mit Kali nitricum (F. 22), welches indess durch eine gastrische Complication (wiederholtes bilöses Erbrechen, dick belegte Zunge, Uebelkeit) contraindicirt wird. Sie mögen dann lieber das Avidum muriaticum (F. 3) oder ein Infus. rad. ipecacuanhae (F. 16) verwenden. Den Tartarus stibiatus in der früher (S. 324) angegebenen Weise zieh ich nur selten bei sehr prävalirenden gastrisch-bilösen Erscheinungen (anhaltendem Stuhlschmerz, Vomituritionen, foetor oris) in Gebrauch, dann aber mit unterschiedenem Erfolg. Dabei lasse man eine mässig nährnde Diät (Milch, Beurren, etwas Wein) beobachten. Der mit der Krise zuweilen eintretende Collaps wird durch grossen

Gaben Wein am erfolgreichsten bekämpft, doch gehört auch diese Livonialität nicht zu den häufig vorkommenden. —

VI. Die chronische Pneumonie.

Die acute Pneumonie, mag sie nun mit einer Krise oder lytisch enden, bildet sich nicht immer so schnell zurück, wie man es in den meisten Fällen zu sehen gewohnt ist. Die physikalischen Symptome der Lungenentzündung können vielmehr viele Wochen, ja Monate lang fortbestehen und erregen dann immer die Befürchtung, dass es zu weiteren, das Leben ernstlich bedrohenden Veränderungen der Lunge, zu käsiger Entartung, nekrotischem Zerfall und phthisischer Höhlenbildung kommen kann. Dieser Ausgang kommt indess weit häufiger bei der Bronchopneumonie als bei der fibrinösen Form vor, sobald die Umstände (erbliche Anlage, schlechte Lebensverhältnisse) einer solchen Umwandlung des Infiltrats günstig sind. Sie werden sich indess daran erinnern (S. 336), dass selbst ein sehr schleppender Verlauf der Bronchopneumonie mit anscheinend trostlosen Symptomen (Macies, Fieber, Diarrhoe) immer noch zu einem unerwartet guten Ende führen kann, und ich glaube aus einigen Beobachtungen schliessen zu dürfen, dass auch die fibrinöse Pneumonie einen ähnlichen Verlauf nehmen kann:

Max K., 6jährig, am 17. März 1873 mit Ekzema capitis und Brechschlafattacken in die Klinik aufgenommen. Am 19. plötzlich Entwicklung einer fibrinösen Pneumonie des rechten Unterlappens. T. 40,5, P. 100, R. 44. In den nächsten Tagen Temp. zwischen 39,8 und 41,0 schwankend. Dämpfung, klingendes Rasseln und Pseudobulles über der rechten Rückenflechte bis über die Spina scapulae hinauf, mit der Axillaris abnehmend. Dabei Sonnenstich, Delirien, Unruhe. Blasse Schripfköpfe (wegen pleuritischen Schmerzes appliziert), kalte Füße, Urin ohne nennliches Einfließen. Am 25., also am 9. Tage der Krankheit, Sinken der Temperatur auf 37,8—38,2, welches 4 Tage (Lysis) anhält, unter starken Schweißes und mit Ausbruch von Herpes labialis. Vom 31. (dem 14. Tage) an völlige Entfieberung, während der Husten noch fort dauert und die physikalischen Symptome im rechten Unterlappen sich langsam bessern, die Dämpfung sich etwas auflöst und das Athmegeräusch merklich und von feinem Rasseln begleitet bleibt. Schon nach wenigen Tagen aber beginnt eine abendliche, geringe Fiebererregung, welche nurmehr nach Morgens bemerkbar wird, so dass die Temperatur 14 Tage lang bis zum 21. April immer zwischen 37,8 und 38,4 schwankt. Bei wenig gesteigerter Respirationszahl (26—30), die nur selten auf 40 steigt, starkem Husten, grosser Neigung zum Schwitzen verliert sich die Dämpfung erst in den letzten Tagen des April vollständig, während unbestimmtes Athmen und Rasseln noch zurückbleiben und um dieselbe Zeit wieder ein paar Tage lang (vom 26.—28. April) ein remittirendes Fieber beobachtet wird. Dasselbe geschieht vom 4.—27. Mai (T. immer 38,2—38,5). Zunehmende Blässe und Abmagerung trotz heftigen Appetits, und das noch immer körnige mit Rasseln und verlängelter Expiration verbundene unbestimmte Athmen an der Kran-

ten Stöße sind um so verdächtiger, als die sparsamen schleimigen Sputa namentlich häufig blutgestreift erscheinen und allmählig eine purulente Beschaffenheit annehmen. Mikroskopisch konnten aber in denselben nur Eiterkörperchen und Epithelien, niemals Gewebsbestandtheile nachgewiesen werden. Erst vom 27. Mai an, also über zwei Monate nach Beginn der Pneumonie, ist alles zum Normalzustande zurückgekehrt, und das Kind konnte als geheilt angesehen werden.

Mir scheint dieser langsame, zum chronischen neigende Verlauf der fibrinösen Pneumonie bei Kindern häufiger vorzukommen als bei Erwachsenen. In dem eben mitgetheilten Falle kann nicht daran gezweifelt werden, dass es sich ursprünglich um die fibrinöse Form gehandelt hat; in andern, wo man erst das Residuum der Krankheit zu sehen bekommt, also die erste Entwicklung nicht selbst beobachtet hat, bleibt es freilich unentschieden, ob eine fibrinöse oder katarthale Form als Ausgangspunkt zu betrachten ist. Zu diesen zweifelhaften Fällen gehören zum Theil diejenigen, welche ich früher¹⁾ als Beispiele „chronischer Pneumonie“ mittheilte, während bei andern der bronchopneumonische Charakter sicher gestellt ist. Im Ganzen hatte ich eine nicht geringe Zahl solcher Fälle, welche schließlich mit Heilung endeten, zu beobachten Gelegenheit, und ich bedaure, dass ein Theil derselben nur erst in einem späteren Stadium eingeführt wurde, in welchem über die Art der Entstehung keine sichere Auskunft mehr erhalten werden konnte.

Die betreffenden Kinder befanden sich in dem Alter zwischen 1½ und 4 Jahren, doch zweifle ich nicht, dass auch ältere Individuen ebenso erkranken können. Blass, mehr oder weniger abgemagert und welk, mit trübenden Zügen, bieten sie schon im äusseren Ansehen das Bild einer ersten Krankheit dar. Vor Wochen oder Monaten, so lautet gewöhnlich die Anamnese, soll eine „Lungenentzündung“, entweder eine primäre, oder eine im Gefolge des Keuchstosses, der Masern, des Typhus entstandene, die Scene eröffnet haben. Seitdem sei ein hartnäckiger Husten, Kurzatmigkeit, stöhnende Expiration und ein mässiges Fieber zurückgeblieben. Dazu kommt nicht selten Anorexie, Zungenbelag, Diarrhoe, in welchem Falle das Bild der „Atrophie“ noch schneller in die Erscheinung zu treten pflegt. In den meisten Fällen fand ich die Symptome der Verdichtung in einem Oberlappen, seltener in dem unteren, Dämpfung des Percussionsschalles, schwaches oder unbestimmtes Athengeräusch, Bronchialathmen und Bronchophonie, sparsames oder reichlicheres klingendes Rasseln. Das begleitende Fieber hat fast immer den remittirenden Typus, kann aber auch unter der Maske einer Inter-

¹⁾ Beiträge zur Kinderheilk. N. F. S. 180.

mittens täuschen; ich werde mich stets des Kindes eines Gutesitzers erinnern, welches mir mit der Diagnose eines Weichelfiebers überwiesen wurde, aber schon beim ersten Anblick durch die Absonderung, den kurzen Athem und Husten den Eindruck eines Lungenkranken machte. Die Untersuchung ergab eine Verdichtung des linken Oberlappens in Folge einer vor einigen Monaten überstandenen Pneumonie, und ein zweimal wiederholter Winteranfecht in Säfen hatte hier einen vollständigen Erfolg. In solchen Fällen habe ich auch wiederholt blutige Sputa beobachtet, d. h. fast immer nur punkt- oder streifenförmige Blutbeimischungen in den schleimig-eitrigen Sputis, welche diese Kinder während des chronischen Verlaufs der Krankheit auswerfen lernen. Röntgen ergab die Untersuchung auch in der anderen Lunge katarrhalische Gerusche, und zu dem chronischen Leiden gesellte sich von Zeit zu Zeit ein acuter Katarrh, welcher mit grosser Sorgfalt behandelt werden muss. Der Verdacht einer Lungenphthisis ist unter solchen Umständen immer gerechtfertigt, und in der That nimmt ja auch ein Theil dieser Fälle durch käsige Umwandlung und Zerfall der Entzündungsproducte diesen traurigen Ausgang; aber die Erfahrung lehrte mich, dass ausserordentlich verzweifelte Fälle dieser Art dennoch vollständig geheilt werden können. Allerdings kann darüber eine geraume Zeit vergehen; nach einem vollen Jahre, öfter auch 6—9 Monaten konnte ich noch Residuen der Verdichtung nachweisen, während sich die anderen respiratorischen Symptome schon gänzlich verloren, Wohlbefinden und Körperfülle vollständig wiederhergestellt hatten.

Dass namentlich bronchopneumonische Verdichtungen viele Wochen und selbst Monate lang bestehen können, ohne käsig zu degeneriren, davon habe ich mich wiederholt bei Sectionen von Kindern überzeugt, welche nur die klinischen Zeichen der Bronchopneumonie während einer so langen Zeit dargeboten hatten, und man muss daher die Möglichkeit einer völligen Resorption des verflüssigten Alveoleninhaltes auch nach so langer Frist zugeben. Andererseits kann es durch Hyperplasie des interstitiellen Bindegewebes zu einer Induration des Lungengewebes kommen, mit welcher dann der kranke Process abschliesst¹⁾. Das widerstands interstitielle Bindegewebe verschmälert allmählig unter Verhärtung und grauvioletter oder bläulicher Farbe des Parenchyms. Nament-

¹⁾ Stollén (Klinik der Kinderkrankh. I. S. 422) beschreibt diese Vorgänge unter dem Namen „interstitielle Pneumonie“ und meint, dass sie sowohl bei der katarrhalischen wie bei der „diffus respirator.“ Form vorkommen können, wenn dieselben einem protractirten Verlauf nehmen.

lich bei jüngeren Kindern kann eine ganze Lunge oder ein Lappen derselben, und zwar besonders der Oberlappen, auf diese Weise in eine feste, beim Durchschneiden knirschende Masse umgewandelt werden, in welcher die weissen Stränge der obliterirten Bronchien deutlich erkennbar sind. Bei diesem Ausgange müssen natürlich die Symptome der Verdichtung das ganze Leben hindurch bestehen bleiben, wenn sie nicht durch die vorhandene emphysematöse Aufblähung der Nachbarpartie maskirt werden. Sie finden daher meistens, wenn der Oberlappen der Sitz dieser Schrumpfung ist, die betreffende Subclaviculargegend etwas abgeflacht und beim Inspiren weniger beweglich als diejenige der gesunden Seite.

Manmer kommt es aber hier, wie bei Erwachsenen, gleichzeitig zu Bronchiektasien in der geschrumpften Lungenpartie, und die wenigen von mir bisher beobachteten Fälle dieser Art boten genau dasselbe Bild, wie man es im späteren Lebensalter zu sehen gewohnt ist. Dämpfung des Percussionsschalles, reichliche grossblasige, hier und da klingende Rasselgeräusche, Abflachung der betreffenden Vorderfläche, Hochstand des Zwerchfelles u. s. w., besonders auch den starken in Anfällen auftretenden Husten, welcher copiose eitrige, in der Regel fötide, auch wohl mit Blut vermischte Sputa herausföhrte.

Ueber die Behandlung der chronischen Pneumonie habe ich Ihnen nur wenig zu sagen. Die Förderung der Resorption des Entzündungsproductes und die Behütung der kleinen Patienten vor allen Schädlichkeiten, welche neue Katarthe oder Entzündungen erregen und den oben erwähnten Schrumpfungsprozess, wenn derselbe unvermeidlich geworden ist, stören könnten, ist unsere Hauptaufgabe. Schutz vor Erkältung und eine tonisirende Behandlung durch Leberthran und China stehen in erster Reihe. Während das Chinin mir auch gegen die abendlichen Fieberanfälle wenig oder nichts leistete, sah ich von dem Monate lang fortgesetzten Gebrauch eines Decoct. cort. Chinac (F. 23) oder vom Extr. Chinac frigide par. (F. 24) gute Erfolge. Vom Leberthran lasse ich höchstens 2 Kinderlöffel voll täglich nehmen, um nicht Dyspepsie zu erzeugen. Ueberhaupt ist für die Anwendung beider Mittel die Integrität der Digestionsorgane Bedingung. Bei günstigen Lebensverhältnissen ist der Aufenthalt in windstiller, reiner und milder Luft dringend zu empfehlen, und mehrere der Privatpraxis angehörige Fälle, welche anfangs eine recht trübe Prognose stellen liessen, wurden durch einen wiederholten Winteraufenthalt in Montreux oder Meran, oder nach besser an der Riviera völlig wiederhergestellt. Nahrhafte Kost ist dabei eine Hauptbedingung und um so wichtiger die sorgfältige Behandlung

jeder Dyspepsie oder Diarrhoe, welche den Erfolg der Cur in Frage stellen kann.

In den Fällen von ausgedehnter Lungenschrumpfung mit Bröncchiektasen wendete ich wiederholt die vielfach empfohlenen Einathmungen von Ol. terabinthinae an, sah indess von denselben entweder nur einen geringen, ganz vorübergehenden Erfolg, oder sogar Nachtheil, indem sie eine neue, selbst mit Fieber einhergehende katarrhalische Reizung hervorbrachten. Ueber die Anwendung anderer Inhalationen oder des pneumatischen Cabinets fehlen mir ausreichende eigene Erfahrungen.

VII. Die Pleuritis.

Ebenso wenig, wie die fibrinöse Pneumonie, bietet die Pleuritis der Kinder wesentliche Abweichungen von derjenigen des späteren Lebensalters dar. Die alte Ansicht von der Seltenheit dieser Krankheit bei Kindern ist längst als eine falsche erkannt. Nicht nur latente chronische Pleuritiden, als deren Residuen mehr oder weniger feste und ausgedehnte Adhäsionen der beiden Pleurahäuter zurückbleiben, habe ich bei Sectionen von Kindern, welche noch in den ersten Lebensjahren standen und keineswegs tuberkulös waren, überraschend häufig gefunden, sondern auch die exsudative Pleuritis mit deutlich nachweisbaren Symptomen konnte ich oft schon bei Kindern von 5–9 Monaten, häufiger allerdings erst nach vollendetem ersten Lebensjahre constatiren.

Die acute Pleuritis mit ihren stechenden Schmerzen, dem kurzen Husten, dem raschen oberflächlichen Athem und dem mehr oder minder hohen Fieber ist derjenigen der Erwachsenen in jeder Beziehung analog. Ältere Individuen localisiren die Schmerzempfindungen sehr genau, während jüngere, erst 3–4 Jahre alte Kinder den wahren Sitz des pleuritischen Schmerzes verkennen und nicht selten über den „Bauch“ klagen, während die physikalische Untersuchung schon alle Zeichen der Pleuritis deutlich ergibt. Unter diesen Umständen ist die Percussion auch insofern ein diagnostisches Hülfsmittel, als sie, ebenso wie die Palpation der Intercostalräume, meistens den Schmerz weckt und die Aufmerksamkeit des Arztes auf den wahren Sitz desselben lenkt. Kleine Kinder, welche noch nicht über Schmerzen klagen können, scheinen zwar beim Husten und vorziehen schmerzhaft das Gesicht, aber dieses Symptom ist unsicher, und nur die physikalische Untersuchung kann uns in diesem zarten Alter verlässliche Kriterien an die Hand geben. Uebrigens sah ich zuweilen bei älteren Kindern den Schmerz gänzlich fehlen, z. B. bei einem 7jährigen Mädchen, welches an einer stark

febrhaften Pleuritis exsuffativa (die ganze linke Brusthälfte war mit Flüssigkeit angefüllt) erkrankt war und nicht ein einziges Mal über schmerzhaftes Empfindungen geklagt hatte.

Seltener als die fibrinöse Pneumonie wird die acute Pleuritis bei Kindern durch cerebrale Symptome (Erbrechen, epileptiforme Convulsionen) eingeleitet, welche die Aufmerksamkeit des Arztes von dem eigentlichen Herde der Krankheit ablenken. Diese Erscheinung finden wir nur bei Kindern von 1–5 Jahren¹⁾:

OTTO N., 3 $\frac{1}{2}$ Jahr alt. Ende October 1846 Fall auf die Seite mit nachfolgender Elektrisation. Am 30. Oct. Abends plötzlich starkes Fieber, welches bis Nacht über andauert und am 31. früh 10 Uhr in einen epileptiformen Anfall überging. Nach einer halben Stunde Erwachen aus der Somnolenz. Kopfschmerz, Unmöglichkeit aufrecht zu stehen, Ablagen des Kopfes. Fieber fortwährend, P. 160, Somnolenz. Um 2 Uhr ein zweiter Erläuterungsanfall. Um 6 Uhr Erbrechen, Spülen. In der Nacht wechselndes Fieber, einmal Erbrechen. Am 1. Nov. 15. Nov. ziemlich dasselbe Bild. Vormittags Remission, Abends Exacerbation des Fiebers mit unruhigerer Rülpe der linken Wange. Schreien sticht. Husten. Erst am 15. erstellte ich mich zu einer Untersuchung des Thorax, welche ich in meiner Unersahrenheit als ganz jungen Arzt, befangen von der Idee einer Meningitis, bisher vermisst hatte. Ich entdeckte sofort ein bedauerndes pleuritiches Exsudat in der rechten Brusthöhle. Percussion seitlich und hinten in den beiden unteren Dritttheilen matt, Athmegeräusch und Stimmvibrations in diesem Umfange gänzlich fehlend, die Interkostalräume verstrichen, Athembewegungen 60, rechts kaum bemerkbar, P. 124. Husten unbedeutend, meist nur Abends. Klagen über Schmerzen „im Bauch“. Leber nach unten gedrückt; Lage innere auf der linken Seite. Urin reichlich, klar, Vom. 15. – 27. hektischer Pleurocharacter, Abmagerung, viel Schweiss in der Nacht. Unter heftigenem Ditt und Behandlung (Doct. China) allmähliche Besserung. Am 22. Doct. Pleuritis seitlich fast normal, Husten noch störend, Athem hörbarer, Zunahme der Kräfte und Körpergröße, innere Farbe, Fieber abnehmend. Vom 25. Doct. an keine Nachschüsse mehr. Neben der China noch 01. je nach tagl. 2 Kinderlöfel. 10. Januar 1847 völlige Euphorie, Lebensgrenzen normal, Husten außerhalb der Scapula noch Dämpfung. Am 14. Februar Entlassung aus der Cur ohne wesentliches Defizit des Thorax.

Dieser Fall, welcher im zweiten Jahre meiner Praxis vorkam, hatte für mich die Folge, dass ich von nun an in keiner febrhaften Krankheit, auch wenn kein Symptom mich dazu aufforderte, die Untersuchung des Thorax verabsäumte. Ich kann Ihnen dies nicht dringend genug empfehlen, weil ich nur auf diesem Wege dahin kam, in einigen anderen ähnlich verlaufenden Fällen²⁾ den begangenen Irrthum zu vermeiden. Am wenigsten dürfen Sie den Angaben der Mütter trauen, dass die Symptome plötzlich nach einem Fall auf den Kopf entstanden

¹⁾ Journ. f. Kinderkrankh. Bd. XIII. S. 2. 1849.

²⁾ Beitr. zur Kinderheilk. N. F. S. 179.

weisen, da gerade diese Angabe eine der gewöhnlichsten ist, und in so fern nichts Auffallendes hat, als kleine Kinder überhaupt sehr häufig fallen.

Knabe von 4 Jahren. Vor 14 Tagen Fall auf den Kopf. Seit einigen Tagen Sorensen; starkes Fieber mit abendlichen Exacerbationen. Puls regelmäßig, frequent. Oft spontanes Erbrechen. Obstruction. Unmöglichkeit den Kopf aufrecht zu halten. Am 20. Jan. 1875 zuerst untersucht. Thoraxorgane normal. Nach 5 Tagen Nachlass der verdächtigen Cerebralsymptome, leichter Husten. Links hinten und unten pleuritisches Exsudat. Resorption nach 2 Wochen.

Otto K., 9jährig, am 17. März 1873 in die Poliklinik gebracht. Gestern Nachmittag Fall auf den Kopf. Seitdem Kopfschmerz, Erbrechen, besonders bei Veränderung der Lage, Apathie, Aufschreien im Schlaf. Pupillen normal. Fieber: P. 126, regelmäßig. Unterhalb der linken Scapula bis zur Linea axillaris schwache Dämpfung mit vesiculärem Athmen. Lebhaftes Klagen über Schmerz an dieser Stelle, besonders beim Husten und tiefen Inspirationen. Percussion empfindlich. Digital mit Nitron, 5 maliges Schöpfköpfen. Am 18. Schmerz bedeutend vermindert. Am 21. Dämpfung noch fortwährend, deutliches Reibungsgeräusch. Am 21. April alles normal.

Die initialen Hirnsymptome treten also in solchen Fällen entweder unter der Form von Kopfschmerz, Erbrechen und Obstruction, Somnolenz und Delirien auf, oder bei kleinen Kindern als *epileptiforme Convulsionen*, ähnlich wie bei der fibrinösen Pneumonie. Auch hier scheint das Fieber die Ursache dieser Erscheinungen zu sein, da mit dem Nachlasse desselben und dem deutlicheren Hervortreten der exsudativen Symptome das Gehirn frei zu werden pflegt. Noch häufiger beginnt die Krankheit mit gastrischen Erscheinungen, welche tagelang den Arzt irre führen können, Uebelkeit, Anorexie, dick belegte Zunge, abendliche Hitze, Klagen über Schmerz im Leibe, wozu sich bei zwei Kindern, von denen das eine sogar an linksseitiger Pleuritis litt, Icterus gesellte. Ein 3jähriger, am 6. November 1873 in der Poliklinik vorgestellter Knabe, welcher vor einer Woche erkrankt war, klagte nur über Schmerzen in der linken Regio inguinalis, während die linke Thoraxhälfte vollständig mit Exsudat angefüllt war. In allen diesen Fällen bestehen aber doch wenigstens gewisse krankhafte Erscheinungen, welche die Eltern des Kindes beunruhigen und ärztliche Hülfe nachsuchen lassen. Um so schwieriger sind diejenigen zu beurtheilen, welche sich subacut oder ganz allmählig entwickeln, und anfangs ohne jedes auffallende Symptom, später aber mit Symptomen verlaufen, welche den Laien und bisweilen auch den Arzt gar nicht daran denken lassen, dass es sich um eine ernsthafte Affection der Respirationsorgane handelt. Diese Fälle von latenter Pleuritis kommen nach meiner Erfahrung bei Kindern noch häufiger vor, als bei Erwachsenen, wahrscheinlich aus dem Grunde, weil die letzteren selbst sich krank fühlen und untersuchen

lassen, während die scheinbar geringfügigen Erscheinungen der ersten von minder sorgsamem Eltern sehr häufig vernachlässigt werden.

Elise K., 7 Jahre alt, überwand im Herbst 1873 die Masern, welche vollkommen regelmäßig verliefen. Mitte Januar 1874 lag das bis dahin ganz gesunde Kind an, allmählich zu fielen, die Nächte vergingen unter starker Hitze. Darin, Unruhe, wobei der Athem kurz war, während das Bekleidn bei Tage ziemlich ungenützt blieb. Allmählig ging auch der Appetit verloren und die Faule wurde heftig. Erst am 5. Febr. wurde ich hinzugerufen. Links von der 5. Rippe abwärts, besonders mittig und hinten ganz matter Percussionsschall, Fehlen des Athemgeräusches und des Stimmvibratus, weiter oben ganz normales Athmen. Respirationsbewegungen normal, kein Husten, kein Schmerz, doch erinnerte sich das Kind auf meine Befragen, im Januar öfter leichte Stiche in der linken Seite empfunden zu haben. Verordneter Ruhe im Bette, warme Kataplasmen auf die kranke Seite, Inf. lb. digital. mit Kali acet. wegen sparsamer Urinsecretion. Am 10. mäßige Diarrhoe, kein Fieber mehr, Percussion heller. Bis zum 1. März alles normal, Expector.

In diesem und in ähnlichen Fällen lag also die Schuld an der Vernachlässigung bei den Eltern. Zumal bei kleinen Kindern werden die unschuldigen „Zahne“ auch hier für das Unwohlsein verantwortlich gemacht, bis nach Wochen zunehmende Abmagerung, Kurzatmigkeit und Husten endlich Ursache erregen und der Arzt befragt wird. Leider muss ich aber hinzufügen, dass trotz aller warnenden Beispiele, von denen ich mehrere mitgeteilt habe¹⁾, auch von Seiten der Aerzte noch immer unbegreifliche Irrthümer bei dieser schleichenden Pleuritis vorkommen. Nicht Unwissenheit ist es, welche man hier anklagen hat, nur Bequemlichkeit, Scheu vor genauer Untersuchung und die Idee, dass bei der Geringfügigkeit respiratorischer Symptome kein ernstliches Leiden in dieser Sphäre bestehen könne. Die „Latenz“ der Pleuritis hat ihren Grund nicht in dem Wesen der Krankheit, sondern in der Nachlässigkeit des Arztes. Besonders häufig kamen mir solche Fälle aus der Armenpraxis oder aus Polikliniken zu, wo die grosse Frequenz der Patienten leicht zu summarischen Verordnungen ohne genaue Exploration verleitet. Aber auch die Privatärzte machen sich solcher Unterlassungssünden schuldig.

Am 6. Novbr. 1875 wurde z. B. ein 3jähriger blässer Knabe in meine Poliklinik gebracht, welcher vor 8 Tagen von Fieber erkrankt war und von seinem mir als sehr gewissenhaft bekannten Arzte an die Klinik gezogen wurde, „weil er aus der Krankheit nicht klag wieder“. Derselbe bekannte mir später selbst, dem Thesen nicht ein richtiges Mal anwesend zu haben, weil kein Symptom ihn dazu aufforderte. Allerdings (und gar kein Schmerz und nur ein ganz anhaltender Husten statt, aber die Respiration war etwas beschleunigt, und zweimal täglich, früh von 9–10 und Abends

¹⁾ Journ. f. Kinderkrankh. Bd. XIII, S. 1; 1869. — Beitr. zur Kinderheilk. 5, 1, S. 197.

zwischen 5—6 Uhr fanden Fieberanfälle statt. Die Untersuchung ergab ein ödematöses linke Pleuralhöhle überlades Exsudat mit Verschiebung des Herzens nach rechts, von welchem noch am 27. Febr. 1874 ein Keil an der Basis der Rückenfläche nachweisbar war. Noch weit mehr Tadel verdient der Arzt eines 4-jährigen Kindes, welcher die Hervorwölbung der mit pleuräischem Exsudat gefüllten Brusthöhle ganz falsch gedeutet und erklärt hatte, das Kind müsse einer orthopädischen Behandlung unterworfen werden. —

So viel über die Eigenthümlichkeiten des allgemeinen Bildes. In Betreff der physikalischen Symptome, welche mit denen der Erwachsenen übereinstimmen, mache ich Sie nur auf die Häufigkeit des Bronchialathmens in der Pleuritis der Kinder aufmerksam, welches, wie die Autopsie lehrt, ohne jede pneumonische Complication vorkommt und lediglich durch das die Lunge comprimirende Exsudat bedingt wird. Wer sich für Erklärungen interessiert, möge dieselben bei Billiet-Barthez¹⁾ und Ziemssen²⁾ nachlesen. Ich halte mich hier nur an die Thatsache, dass besonders in frischen Fällen Bronchialathmen fast constant über den geläufigen Thoraxpartien gehört wird, und erst allmählig mit der Zunahme des Exsudats der Abschwächung und schliesslich dem gänzlichen Fehlen des Athmungsgeräusches Platz macht. Bei kleinen Kindern wird daher der Mangel der Sputa und die Schwierigkeit, den Stimmfremitus als diagnostisches Mittel zu benutzen, immer Zweifel übrig lassen, ob man eine Pleuritis oder Pneumonie als Hauptkrankheit vor sich hat, während man bei älteren Individuen durch die eben genannten Kriterien meistens im Stande ist, die Diagnose zu stellen. Ist nun in einem solchen frischen Falle von Pleuritis noch zufällig ein Bronchialkatarrh vorhanden, so nehmen die mucösen Rasselgeräusche desselben durch die Compression des Lungengewebes mitunter einen klingenden Charakter an und können, zumal bei heruntergekommenen febrilen Kindern, den Verdacht einer phthisischen Höhlenbildung erregen, welcher sich später als ungerechtfertigt herausstellt. Dass bei eitriger Pleuritis der Kinder besonders der erste und zweite laterocostalraum vorn neben dem Sternum, wo sie am breitesten und nachgiebigsten sind, oft abnorm vorgewölbt erscheinen, wird von französischen Autoren (Rivet³⁾) behauptet und durch Experimente (Injection von Wasser in den Thorax) gestützt. Die Thatsache, dass die bezeichnete Region am häufigsten die Durchbruchsstelle wird, stimmt mit dieser Beobachtung überein, die mir selbst noch nicht aufgefallen ist.

¹⁾ l. c. I. p. 355.

²⁾ l. c. p. 71.

³⁾ De la vessie sous-élevée dans les épanchements pleuraux chez l'enfant. Thèse. Paris 1880.

Die meisten Kinder mit pleuritischen Exsudat liegen, wie die Erwachsenen, auf der kranken Seite. Man sieht dies schon bei kleinen Kindern im ersten Lebensjahr, und daraus erklärt sich auch die Vorliebe pleuritischer Säuglinge für diejenige Mamma der Mutter, welche ihnen beim Saugen die Lage auf der kranken Seite gestattet. Ich beobachtete wiederholt, dass Kinder mit einem Exsudat in der rechten Pleuralhöhle nur an der linken Mamma saugen wollten und umgekehrt, wosie andernfalls heftige das Saugen unterbrechende Dyspnoe bekamen. In einem Falle dieser Art hatte sogar die Mutter diese Vorliebe des Säuglings für ihre linke Mamma fälschlich auf einen Fehler der rechten bezogen.

Unter den Complicationen der Pleuritis schien nur die Pericarditis, besonders bei sehr jungen Kindern, häufiger als bei Erwachsenen vorzukommen. Ich erwähnte bereits eines 5 Monate alten Kindes, welches neben doppelseitiger fibrinös-purulenter Pleuritis ein bedeutendes ebenso beschaffenes Exsudat im Pericardium darbot; bei einem anderen 8 Monate alten Kinde fand ich neben Bronchopneumonie, besonders der rechten Lunge, ein bedeutendes purulentes Exsudat im linken Pleurasack und im Pericardium, dessen Viseralblatt, zumal auf der Vorderfläche des Herzens, mit zottigen Fibrinbeschlägen bedeckt war. Dass hier ein Uebergang der Entzündung von der linken Pleura her auf das Pericardium stattgefunden hatte, wurde durch die starke Verwachsung der linken Lunge mit der Aussenfläche des Herzsackels bewiesen. In dem folgenden Fall aber fand sich ein altes abgesacktes Exsudat in der rechten Pleuralhöhle complicirt mit einer chronischen Peri- und Endocarditis:

Eisenrote P., 3 Jahre alt, am 18. Sept. 1872 in die Klinik aufgenommen, dürrig genährt, blass. Anamnese ganz unklar. Der rechte Thorax bei der Percussion fast im ganzen Umfange matt, mit Ausnahme der oberen Partie der Vorderfläche, welche einen etwas belleren Schall gibt. Stimm- und linke Brusthülfe normal. Rechts hinten und mittlich das Athemgeräusch ganz fehlend, vorn oben unbestimmt, mit bronchialer Expiration. Rechte Brusthülfe 1 Cm. enger als die linke, beim Athmen kaum geloben. Links hinten etwas Schurren. Herztöne ganz rechts etwas vergrößert, Spitzenstoss im 5. Intercostalraum und in der Mamillarlähne, lautes systolisches Blasen an der Spitze. Kein Fieber. Diagnose: Insufficienz der Mitrals, Erweiterung des rechten Ventrikels, alte rechtsseitige Pleuritis chronica mit Verwachsung der Thoraxhöhle. — Das Kind wurde im Laufe der nächsten Monate in Folge wiederholter Darmcatarrhe immer elender; auch der Bronchialcatarrh steigerte sich von Zeit zu Zeit unter leichten Fieberbewegungen. Vom 25. Januar 1873 an wurden Hiera eckige mit hellrothem Blut vermischte Sputa expectorirt, und gleichmäßig hörte man rechts oben, neben dem Sternum, wie auch oberhalb der Clavicula, wo der Percussionsschall etwas heller war, sehr deutliches klingendes Ras-

sen, lautes Brachialathmen und Brachyphosie. In den letzten Tagen des Januar entwickelte sich ein Dystypus, welcher am 7. Februar den Tod herbeiführte.

Section: Zwischen Pericardium und linker Lunge starke Verwachsung. Erstere verdickt, beide Blätter fest mit einander verwachsen. Mitralklappe verdickt, star und insuffizient, beide Ventrikel hypertrophisch, der rechte auch dilatirt. Alter schwartiger Herd unter dem Endocardium, 1 Ctm. unterhalb des Orifics, aortae. Linke Lunge meist durchgängig, blutroth, braunroth. Rechte Lunge sehr oedemirt, ganz nach vorn und oben gedüngt und hier mit dem Pericardium verwachsen. An ihrem seitlichen und hinteren Umfange ein colossaler Sack mit ausserst dicker und fester Wandung, welcher auf seiner inneren Seite der Lunge, nach aussen überall dem Thorax so fest adhärirt, dass seine Ablösung nur mittels des Messers möglich ist. In seinem Innern befindet sich ein reichliches, coagulirtes, grauweißes Exsudat. Die linke Lunge ganz dicht canalicirt. Katarrh der grossen Bronchien. Typhus abdominalis.

Während in diesem ätiologisch ganz dunklen Falle die Complication der Pleuritis mit Pericarditis und Endocarditis bedingt wurde, lässt sich nicht sagen, wir finden nur die Folgen dieser sehr chronisch abgelaufenen Krankheiten, die feste Verwachsung des Herzostels mit dem Herza, die Insufficienz der Mitrals mit Dilatation des rechten Ventrikels, und ein bedeutendes, sackartig von derben Schwarten umschlossenes Exsudat. Die Retraction der ganzen rechten Lunge nach vorn und oben, welche durch alte Adhäsionen derselben mit dem Pericardium bedingt zu sein schien, war hier die Ursache eines zeitweiligen diagnostischen Irrthums. Ich glaubte nämlich das vom 25. Januar an vorn und oben hörbare Brachialathmen und klingende Rassel, in Verbindung mit dem blutigen Auswurf, auf eine Höhlenbildung im Overlappen beziehen zu müssen, während die Section ergab, dass diese Phänomene nur durch einen Katarrh des rechten Hauptbronchus und die unmittelbar auf diesem ruhende derbe canalicirte Lunge bedingt wurden.

Häufiger als bei Erwachsenen wird die Caries der Rippen bei Kindern die Ursache von Pleuritis, wofür der folgende Fall ein interessantes Beispiel bietet¹⁾:

Margarethe M., 5jährig, am 15. April aufgenommen. Schon von Geburt an vielfache Abnormen des Blutesystems, Anämie und Atrophie. Bei der Aufnahme reichlicher atonischer Defect der Kopfschwarte, apfelgrosser Abscess dicht über dem Kreuzbein, multiple Dörschwellungen am Hals und in den Inguinalgegenden. Beginn des Abscesses, Heilung bis zum 3. Mai. Der Defect am Kopf vernarbt allmählig; das Kind ist heberlos, aber sehr bleich und häftig. Bis zum 6. Juni neue Abscess am Hals, welche geöffnet wurden. Am 7. Juni dicht neben der rechten Mamilla eine runde etwa 3 Ctm. im Durchmesser betragende, nicht geröthete, aber hartwändige Geschwulst, welche allmählig bis zur Apfelgrösse wuchs und am 20.

¹⁾ Charité-Annalen. I. Jahrg. S. 586.

unter Spray geöffnet wurde. Von nun an Fieber (Abends 38,5—39,4), welches indes Tage lang ansetzt. Neben dem rechten Schulterblatt bildet sich ein neuer eitriger Abscess; Oeffnung am 22. Juli, die eingeführte Sonde stösst auf eine cariöse Rippe. Um dieselbe Zeit ergab die Untersuchung, so weit sie bei der Anschwellung und Schmerzhaftigkeit der betreffenden Gegend ausführbar war, am rechten Thorax rien wie hieses eine nach der Basis zunehmende Dämpfung, reichliche zum Theil klingende Rasselgeräusche und unbestimmtes Atmen. Am 10. bemerkt man zuerst, dass bei starken Expirationen, besonders beim Schreien, aus der Abscesswunde auf der Brust ein mit Laufflasen stark vermischter Eiter Massenartig hervorsquillt. Diese Erscheinung dauerte bis zum Tode am 18. August fort.

Section: Die 2., 6. und 7. Rippe der rechten Seite cariiert; zwischen ihnen, also innerhalb der Intercostalräume, gelangt man durch einige erbsengrosse Oeffnungen der Costalpleura in einen Hohlraum. Berstetel mit dem Breien vollständig verwachsen, ebenso die rechtsseitige Lunge mit dem Pericardium. Die rechte Lunge sehr dick anzu fühlen, in ihrem ganzen Umfange an der Brustwand adhärenz; Pleura costalis und pulmonalis bilden dichte schwellige Schichten. Nur in der nächsten Umgebung der Abscesswunde am Thorax besteht zwischen den beiden Pleurahälften der schon erwähnte Hohlraum, der mit etwa 8 Kistellen purulenten pleuritischen Exsudats gefüllt ist. Die an den Hohlraum grenzende Pulmonalpleura defect, so dass man mit der Sonde direct in kleine Bronchien gelangen konnte. Fast die ganze rechte Lunge erstirbt.

Offenbar bildete hier die Rippencarries den Ausgangspunkt der Abscess neben der Mamma und dem Schulterblatt, wie auch der chronischen Pleuritis. Neben ausgedehnten Adhäsionen und Schichten bildete dieselbe den mit Eiter gefüllten Hohlraum, welcher nach aussen mit dem Abscess der Thoraxwand communicirte und schliesslich auch nach innen die Lungenpleura sekretisirte. So konnte Luft aus der Lunge in den Hohlraum und mit dem Abscessiter nach aussen gelangen. Die rings umgebenden festen Adhäsionen verhinderten das Zustandekommen eines Pneumothorax. Auch hier ging die Entzündung von der Pleura auf das Pericardium über und bedingte die totale Synochie des letzteren und die Verwachsung desselben mit der rechten Lunge.

Unter den aetiologischen Momenten spielt auch bei Kindern die Tuberkulose und Pneumonie, und zwar die fibrinöse mehr als die katarrhalische, eine wichtige Rolle. Bei der so häufigen Combination beider Krankheiten erscheint zwar die Pleuritis in der Regel als die untergeordnete, welche höchstens durch den Schmerz und durch ein geringes Exsudat an der Basis ihre Existenz bekundet (S. 351); doch kommen auch Fälle vor, in welchen die Pneumonie, welche Anfangs im Vordergrund steht, das Feld räumt, während die Pleuritis sich weiter entwickelt und zu mehr oder minder beträchtlichen Exsudaten führt. (Pneumopleuritis). Bei der Bronchopneumonie finden wir, dem Sitze derselben entsprechend, auch die Pleuritis nicht selten doppelseitig.

beide Lungen mit eiterig-fibrinösen Auflagerungen bedeckt, auch wohl eiteriges Exsudat in beiden Pleurahöhlen. Puridie Pleuritis beobachtete ich bei Kindern (abgesehen von den erst nach der Operation purid gewordenen Fällen) nur ausnahmsweise, z. B. bei

Anna O., 11jährig, im Mai 1878 an Pleuropneumonie der linken Seite in der Klinik behandelt, entlassen am 26. Mai. Wiederaufnahme am 4. Juni. Vor 5 Tagen Schindelfrost, seitdem andauernde Hitze, Husten, Schmerz in der linken Seite, in welcher ein beträchtliches Exsudat nachweisbar ist. T. 39,5, R. 44, P. 124. Die linke Thoraxhälfte wird beim Atmen kaum gehoben, Interkostalräume verstrichen, percussorische Dämpfung fast im ganzen Umfange, Bronchialathmung, kein Stimmfremitus, Sternum gedämpft, Bestreife am deutlichsten neben dem rechten Sternumrande hörbar. Umn sparsam, zerset normal, blättrige Schreppföpfe, hydropathische Einwickelung des Thorax, Digitalis leistete so gut wie nichts. Wegen zunehmender Dyspnoe wurde am 10. die Function mit dem Potain'schen Apparat vorgenommen und dabei 380,0 Gr. eisergrünlich-gelbes, purid riechendes Eiter entleert, welcher zahlreiche Fibrinfäden enthielt. Zwar erfolgte nun eine partielle Wiederausdehnung der Lunge, zerset über oberen Partie, und die Respiration sank auf 32, aber das Fieber dauerte unverändert fort, und es wurde deshalb am 13. sofort die Radicaloperation des Empyems gemacht, nach der Entleerung von 500,0 stinkenden Eiters eine silberne Canüle eingelegt, und die Brusthöhle mit Carbolwasser ausgepült. Das Fieber verschwand von selbst (37° bis 37,5°) und der ausfällende Pleuraneinhalt war schon nach zwei Tagen geruchlos; dagegen nahm der Husten beträchtlich zu, und das reichlich-grasgrünliche, dicker, süßlich riechende Sputum enthielt deutliche elastische Fasern. Wegen der schmerzhaften Fäulung des Harns wurde von 12. ab statt des Carbolwassers eine Lösung von Salicylsäure (3:1000) zur Ausspülung benutzt, und die Thoraxwunde streng antiseptisch behandelt. Während der nächsten Wochen wurden noch ein paar Mal Fiebererregungen beobachtet, für welche kein Grund ersichtlich war, z. B. am 3. Juli noch 40,5, aber seit diesem Anfall blieb das Kind bis zu seiner Entlassung, welche erst am 1. Mai 1879, also etwa ein Jahr nach seiner Aufnahme erfolgte, völlig fieberfrei. Die Wunde im Thorax, welche immer spärlichen Secernate, schloß sich im August, Ernährung und Wohlbefinden stellten sich mehr und mehr wieder ein, und die Athemleistung betrug bald nur noch 20 in der Minute bei 108 P. Während an der Vorderfläche und im oberen Theil der Seiten- und Rückenfäche die physikalischen Symptome normal wurden, blieb die untere Partie der Aftersfläche und der Rücken von der Spina scapulae abwärts noch stark gedämpft und bot bronchiales Athmen, klingendes Rauschen und Keitlen dar. Auch bestand der Husten in wechselnder Intensität fort und der Auswurf, der bald mehr, bald weniger reichlich erfolgte, enthielt von Zeit zu Zeit Blut, welches jedesmal Veranlassung wurde, das Kind für einige Tage ins Bett zu legen. Elastische Fasern wurden indess nicht mehr gefunden, und am 1. Mai 1879 konnte Patientin in Mähenden Zustande, ohne Husten, aber noch mit Tämpfung und Bronchialathmen im Bereich des linken Unterlappens entlassen werden. Die Behandlung in den letzten Monaten bestand in Inhalationen einer (1%) Carbollösung, Öl. jecoris, und Pomb. weid. beim Eintritt der Hämoptysis.

In diesem Falle handelte es sich offenbar um eine circumscripte Nekrose des Gewebes an der Peripherie der pneumonisch infiltrirten

Langenpartie, aus welcher dann Fäulniserreger in das Pleuraexsudat eingedrungen waren und dasselbe in einen putriden Zustand versetzt hatten. Der Umstand, dass sich weder bei der Untersuchung noch bei der Punction ein Pneumothorax nachweisen liess, spricht gegen eine weite Communication der Pleurahöhle mit dem Brustherde, während die Annahme seiner Oeffnung in der betreffenden Lungenpleura, die bald wieder verklebten, eher statthaft ist¹⁾. Nach der Heilung der putriden Pleuritis durch Punction und Incision bestand der nekrotische Herd in der Lunge noch viele Monate lang fort und gab sich durch wiederholte Fieberschübe, pariente mit Blut und elastischem Gewebe vermischte Sputa zu erkennen. Schliesslich erfolgte Heilung, und es blieben nur noch physikalische Erscheinungen zurück, welche sich auf eine dicke pleuritische Schwarte im unteren Theil des linken Thorax beziehen liessen. Wie ich später erfuhr, soll das Kind nach einem Jahre an einer neuen eitrigen Brustaffection zu Grunde gegangen sein.

Wiederholt beobachtete ich die Pleuritis auch bei Kindern im Gefolge des acuten Gelenkrheumatismus, des Scharlachfiebers und der Masern. Der eine dieser Fälle, in welchem die Diagnose erst 4 Wochen nach Ablauf der Masern gestellt wurde, zeichnete sich durch den völligen Mangel des Fiebers aus (Temp. nie über 37.5), obwohl durch zwei Punctionen im Ganzen 435 Ccm. grünlich gelben Eiters entleert wurden.

Ueber die Ausgänge der Krankheit, Resorption, Eiterung, Durchbruch des Empyems nach aussen oder innen, so wie über die nachfolgende Deformität des Thorax habe ich nichts hinzuzufügen. Es war ein Irrthum, wenn man früher glaubte, die Missbildung des Thorax käme bei Kindern seltener zu Stande, als im späteren Lebensalter; vielmehr sieht man nach verschluckten eitrigen Exsudaten, welche schliesslich nach aussen zerbrachen und Jahre lang eiternde Fisteln bildeten, so wie bei dicker Schwartenbildung zwischen Lunge und Brustwand nicht selten sehr bedeutende Schrumpfungen der betreffenden Brusthälfte sich entwickeln. Bei einem 14jährigen Knaben, welcher in seinem 3. Lebensjahre an Pleuritis gelitten hatte, konnte ich die ganze rechte Pleurahöhle mit meiner Faust ausfüllen. —

Schliesslich noch einige Worte über die Behandlung. Im Anfange der Krankheit, wenn heftige Schmerzen vorhanden sind, halfte ich die Application einer dem Alter entsprechenden Zahl blutiger, bei schwachen Kindern trockener Schröpfköpfe für notwendig. Demnach sind hydropathische Einwickelungen, wie ich sie für die Pneumonie

¹⁾ Vögl, A. Präsenkel, *Die putridPleuritis*. *Charité-Analen* IV, 1879, p. 256.

empfehl, auch hier consequent anzuwenden, während innerlich ein Inf. lib. digitalis (F. 22) mit Nitrum gereicht wird. Auch Calomel mit lib. digital. (F. 25) leistete, besonders bei vorhandener Stuhlverstopfung, gute Dienste. Mit der Zunahme des Exsudats tritt die diuretische Behandlung in den Vordergrund, Infus. digitalis mit Kali aceticum, Biliner oder Wildunger Wasser (3—4 Weinläser täglich) zum Getränk. In den schlechtend verlaufenden Fällen empföhlte ich ihnen ein Decoct. Chinae (F. 23) mit Kali aceticum (20), Leberthran, Molken, frische Land- oder Bergluft, während des Winters Aufenthalt im Süden, besonders an der Riviera.

Der regere Stoffwechsel der Kinder findert die Resorption seröser pleuritischer Exsudate im Allgemeinen mehr, als es bei Erwachsenen der Fall ist. Ich verfüge in der That über eine recht anschauliche Zahl von Fällen, welche ohne chirurgische Hülfe, unter einer diuretischen und tonisirenden Behandlung innerhalb mehrerer Wochen oder Monate vortreflich heilten, und man sollte deshalb nicht zu rasch mit der Operation vorgehen. Für mich giebt es nur zwei Indicationen, welche die operative Entleerung des Exsudats dringend erfordern:

1) Eine stürmische Zunahme desselben mit rascher Verdrängung des Mediastinum und beträchtlicher Steigerung der Dyspnoe, so dass die Kinder nicht mehr horizontal liegen können, sondern häufig eine sitzende Stellung einnehmen müssen. Unter diesen Umständen, zumal wenn das Exsudat doppelseitig ist, oder bei einer Complication mit Bronchitis oder Pneumonie, rathe ich zu einer frühzeitigen Ausführung der Punction, um die Lunge schnell von dem Drucke des Exsudats zu entlasten. In der Regel läuft sich zwar die Flüssigkeit bald wieder an; man kann aber dann im Nothfalle die Operation wiederholen, oder wenn die Einschränkungen mässig sind, die Resorption in Ruhe abwarten.

Mädchen von 7 Jahren. Am 6. Juli 1879 zuerst untersucht. Seit etwa 1½ Wochen Pleuritis acuta der linken Seite, die von Anfang an ohne jeden Schmerz verlaufen war. Der linke Thorax mit Flüssigkeit gefüllt, Sternum matt schallend, das Herz nach rechts, die linke Lunge nach hinten und oben gedrängt. Vorn Bronchialathemen, seitlich und hinten kaum gar kein Athemen hörbar. Fieber remittirend. Mg. 38,7. Ab. 38,7 und darüber. Anfangs der 3. Krankheitswoche Zunahme der Dyspnoe, häufiges Aufstehen um Athem zu schöpfen. Puls klein. Am 11. Punction unter Antiseptis und Aspiration mit der Saugspitze, welche 4mal gefüllt wurde und ein klares grüßliches Serum entleerte. In den nächsten Tagen bis zum 17. immer noch Temperaturcurve von 38—39,2, während das Exsudat wieder bedeutend zunahm. Dann aber rasche Resorption, Eupnoe, Schwinden des Fiebers. Vom 22. an heftiges Husten. Die mangelnde Diuresis war durch ein Infus. lib. digital. und Wildunger Wasser stark vermehrt worden.

In diesem Falle genügte also die einmalige Punction und Aspi-

ration zur Heilung. Bemerkenswerth ist noch, dass während der Operation trotz aller Vorsicht etwas Luft in den Pleuraraum gelangt war, welche sich durch die Percussion, zumal den Schallwechsel bei Veränderungen der Lage, deutlich nachweisen liess, aber keinen schlimmen Einfluss auf das Exsudat ausübte, vielmehr nach wenigen Tagen vollständig resorbiert war. Die künstliche Entleerung ist ferner erforderlich, wenn

2) das Exsudat nicht serös, sondern purulent ist (Empyem). Die Kriterien, welche man früher als entscheidend für die Diagnose dieses Zustandes betrachtete, namentlich das sogenannte „Oedema laterale“ des Thorax sind fast alle werthlos; zumal das letztere fehlt sehr häufig und macht sich erst dann bemerkbar, wenn der Eiter sich bereits einen Weg nach aussen zu bahnen anfängt und eine partielle Hervorwölbung am Thorax bildet, welche ich öfters von blauen Venensträngen umgeben sah (Empyema necessitatis). Wo dieser Durchbruch nach aussen nicht stattfindet, hat man das grösste Gewicht auf den Charakter des Fiebers zu legen, dessen wochenlange Fortdauer mit hohen Mittags- oder Abendtemperaturen, mit Abmagerung und Kräfteverfall, für die purulente Beschaffenheit des Exsudats spricht. Aber auch dies Zeichen ist nicht constant; vielmehr kann, wie der eben (S. 372) mitgetheilte Fall bestimmt lehrt, das Fieber mindestens 2¹/₂ Wochen lang mit hoher Mittags- oder Abendtemperatur bestehen, und das Exsudat dabei noch vollkommen serös sein, andererseits aber das Fieber bei purulentem Exsudat auch vollständig fehlen, wie in dem S. 371 mitgetheilten Fall von Empyem nach den Maseen. Das einzige sichere Mittel, um die Beschaffenheit des Exsudats zu erkennen, bleibt daher immer die Probeponction, die unter antiseptischen Kautelen zu jeder Zeit ohne Gefahr auszuführen ist, entweder mit der Pravaz'schen Spritze, oder noch besser mit dem Dieulafoy'schen Apparat oder dem Fraentzel'schen Troicart. Sobald die aspirirte Flüssigkeit purulent erscheint, hat man das expectative Verfahren aufzugeben und die künstliche Entleerung vorzunehmen. Weiteres Abwarten würde einen Durchbruch des Eiters durch die Brustwand oder die Lunge zur Folge haben können, das Kind durch anhaltendes hektisches Fieber erschöpfen, oder im günstigsten Falle zur Eindrückung des Eiters und zu käsigen Residuen im Thoraxraum führen, welche später der Ausgangspunkt einer Miliartuberkulose werden können. Ueber die Methode der Entleerung wird noch immer gestritten. Alljährlich nehmen sich die Beispiele einer völligen Heilung nach ein- oder mehrmaliger einfacher Punction mit oder ohne Aspiration. So wie in dem eben mitgetheilten Falle bei serösem Erguss eine einmalige Punction zur

Heilung ausreichte, sah ich auch in zwei Fällen von purulentem Exsudat (wovon eins nach Scharlach) von dieser einfachen Methode denselben glücklichen Erfolg, und zwar ohne die vielfach empfohlene Ausspülung des Thorax. Man sollte daher diesen Versuch bei Kindern immer zuerst machen und dabei, wenn auch einige andere Autoren rathen, keine Ausspülungen vornehmen. Wir bedienten uns in der Regel des Potain'schen Aspirationsapparats, und ich kann denselben gerade für die Kinderpraxis empfehlen. Dennoch wird man nur in den wenigsten Fällen von Empyem auf diese Weise auskommen, und nach 1—2maliger Wiederholung sich schliesslich zu der Radicaloperation, d. h. zur Eröffnung des Thorax durch den Schnitt mit oder ohne Resection eines Rippenstücks genöthigt sehen. Durch die Anlegung der Wunde an der Basis der Rückenfalte erzielt man wohl am besten den freien Abfluss der Secrete, welchen man durch die Einführung eines Drainirchres oder einer breiten silbernen Canüle unterstützt. Ein antiseptischer Verband ist dringend anzuordnen, um das Hineingelangen infectiöser Elemente in die Thoraxhöhle möglichst zu verhüten, dagegen sind die eine Zeitlang beliebten Ausspülungen der letzteren mit Carbolsäurelösung durch Beobachtungen von Carbollintoxication in Abscedata gekommen. Einige wollen gar nicht ausspülen, andere empfehlen zu diesem Zwecke, zumal wenn Sepsis vorhanden ist, Lösungen von Thymol, Bor- oder Salicylsäure, Chlorzink, essigsaurer Thonerde. Jedenfalls ist der Erfolg der Operation gerade bei Kindern durch zahlreiche Fälle bewiesen, und ich halte es daher für überflüssig, Ihnen hier meine eigenen Erfahrungen, die selbst in anscheinend verzweifelten Fällen für die Operation sprechen, ausführlich mitzutheilen. Ich kann es Ihnen nicht dringend genug ans Herz legen, die Operation unverweilt zu machen, sobald die eitrige Beschaffenheit des Exsudats sicher gestellt ist und eine höchstens zweimalige Function sich als ungenügend herausgestellt hat.

IX. Die Tuberkulose der Lunge.

Der Streit der Anatomen über die Auffassung der Tuberkulose, zumal über ihre Beziehung zu den käsigen Processen, war bis vor kurzem noch nicht völlig geschlichtet. Während die Einen, gestützt auf Virchow, die Verschiedenheit beider Zustände scharf betonten, nehmen die Andern, besonders neuere französische Autoren (Charcot, Grancher u. A.) einen mehr vermittelnden Standpunkt ein, der, wie ich glaube, durch die klinischen Verhältnisse gerechtfertigt ist. Dem vorurtheillosen Beobachter, und zwar gerade dem Praktiker, kann es nicht entgehen, dass in dem so häufigen gleichzeitigen Vorkommen miliärer Tuberkel und käsiger

Degenerationen, » wie in der auch experimentell bewiesenen Entwicklung der ersten aus käsigen Herden, welche irgendwo im Körper vorhanden sind, ein klinischer Beweis für die innige Verwandtschaft, wenn nicht selbst für die Identität beider Vorgänge liegt, der schwerer wiegt, als alle mikroskopischen Befunde. Gerade Kinder in den ersten Lebensjahren bieten diesen Beweis weit häufiger dar, als das vorgerückte Lebensalter. Wenn ich an die zahllosen Fälle denke, in welchen ich nicht selten käsigen Entzündungen des Lungengparenchyms miliäre Tuberkeln in der Lunge oder Pleura fand, oder in welchen die unmittelbare Umgebung käsiger Knoten im Gekröse miliäre Tuberkeln des Peritoneums aufwies, während gleichzeitig noch in vielen anderen Organen beide Zustände neben einander angetroffen wurden, so kam ich zu einer wesentlichen Differenz derselben nicht glauben und halte mich um so mehr für berechtigt, in der folgenden Schilderung beide in ein gemeinsames Bild zusammenzufassen, als die grosse Entdeckung der Tuberkelbacillen durch R. Koch das Vorkommen dieser pathogenen Elemente in beiden krankhaften Producten nachwies und damit die Identität derselben ausser Zweifel stellte.

Die Erscheinungen der Lungentuberkulose bei Kindern, welche das 6. oder 7. Jahr überschritten haben, stimmen mit denen des späteren Lebensalters so überein, dass sie hier keiner Beschreibung bedürfen. Wir beschäftigen uns daher hauptsächlich mit dem Auftreten der Krankheit in den ersten Lebensjahren, wo man, namentlich in der Armen- und Hospitalpraxis, recht häufig Gelegenheit hat, sie zu beobachten. Je jünger die Kinder sind, um so weniger pflegt das Krankheitsbild demjenigen der Phthisis pulmonum älterer Individuen zu entsprechen, vielmehr tritt das Localleiden mehr oder weniger zurück vor der allgemeinen Ernährungsstörung, die sich unter dem S. 65 geschilderten Bilde der Atrophie darstellt. Sehr häufig fand ich in den Leichen kleiner atrophischer Kinder eine Menge von Tuberkeln und käsigen Infiltraten der Lungen, die während des Lebens durchaus latent geblieben waren; aber auch umfangreiche, den grössten Theil eines Lungenlappens einnehmende Cavernen fanden sich bei einzelnen erst wenige Monate alten Kindern, welche im Leben nur eine fortschreitende Abmagerung, Entkräftung und etwas Husten dargeboten hatten, so dass nur die Untersuchung des Thorax die vorgeschrittenen Destructionen verrathen hatte. Bei einem 8 Monate alten, im höchsten Grade atrophischen Kinde, welches gar kein subjectives Zeichen einer Lungenkrankung darbot, dessen Mutter aber an ausgebildeter Phthisis litt, fand ich sogar eine fast hühnereigrosse Caverne in der rechten Lunge. Die Ursache dieser Prävalenz der allgemeinen Ernährungsstörungen vor den localen Symptomen liegt am

hauptsächlich darin, dass in dem ersten Kindesalter die Tuberkulose eine weit grössere Ausbreitung zu zeigen pflegt, als späterhin. Käsigc Herde und Miliartuberkeln finden sich fast immer gleichzeitig in einer ganzen Reihe von Organen, in den Lymphdrüsen, der Milz, den serösen Häuten, der Leber, den Nieren, den Knochen u. s. w.; ja es kommen Fälle vor, bei denen fast kein einziges Organ ganz frei von tuberkulösen Einlagerungen gefunden wird. Alle diese Veränderungen können eben mehr oder weniger latent verlaufen. Das Hauptsymptom bleibt eine von Woche zu Woche stetig zunehmende Atrophie, welche sich in vielen Fällen mit Otorrhoe, ekzematösen Ausschlägen am Kopf und anderen Körpertheilen, Anschwellung der Cervical-, Occipital- und Inguinaldrüsen, oft auch mit multiplen Abscessen im subcutanen Bindegewebe verbindet. Da jedoch diese begleitenden Symptome der tuberkulösen Atrophie keineswegs ausschliesslich zukommen, so ist zur Feststellung der Diagnose, auch wenn der Husten vollständig fehlt, eine genaue Untersuchung des Thorax unerlässlich.

Diese Untersuchung bietet freilich hier viel grössere Schwierigkeiten dar, als bei der Phthisis erwachsener Personen oder älterer Kinder. Mitunter ergibt dieselbe mit Ausnahme eines sehr rauhen Athemgeräusches oder katarrhalischer Rasselgeräusche nichts Abnormes; alle Zeichen einer Parenchymverdichtung können fehlen, und man wäre also nur berechtigt, einen chronischen Bronchialkatarrh zu diagnostizieren, wenn nicht die Atrophie, eine erbliche Familienanlage, oder Drüsenhyperplasien diesen Katarrh als einen tuberkulösen verdächtig machten. In vielen anderen Fällen kommt es aber zu ausgeprägteren bronchopneumonischen Herden, welche unter dem Einflusse ungünstiger Lebensverhältnisse, d. h. wie wir jetzt annehmen müssen, unter demjenigen der Tuberkelbacillen, verkäsen (S. 335), und dann die gewöhnlichen Erscheinungen der Verdichtung (Dämpfung des Percussionsschalles, unbestimmtes oder schwaches Athmen, verlängerte rauhe Expiration, Bronchialathmen, Bronchophones, klingendes Rasseln) darbieten. Während nun im späteren Lebensalter die Entwicklung der pathologischen Prozesse in den Lungen meistens von oben nach unten stattfindet, und demgemäss die Beschränkung der physikalischen Symptome auf die Oberlappen und deren Spitzen das werthvolle Kriterium für die Diagnose der ersten Stadien an die Hand giebt, finden wir nicht selten bei kleinen Kindern eine ganz unregelmässige Verbreitung der Tuberkeln und käsigen Herde durch das ganze Parenchym, wobei dann die Untersuchung der Fossa supraspinata und subclavicularis nur wenig ergibt, und dafür die unteren Lappen Verdichtungssymptome darbieten, oder, wenn diese fehlen, durchweg nur katarrhalische Phä-

nimmere wahrgenommen werden. Unregelmässige Fieberbewegungen, die um so schwächer werden, je mehr die Kinder collabiren, und dyspeptische Symptome, Anorexie und besonders Diarrhoe, sind häufige Begleiter und können den Arzt am so leichter irre führen. Da nämlich, wie schon bemerkt wurde, eine ausgebreitete Tuberkulose der Lungen, ja selbst Cavernen ohne Husten und ohne in die Augen fallende Dyspnoe bestehen können, so lenkt die Diarrhoe um so eher die Aufmerksamkeit von den Respirationsorganen ab, und man ist erstaunt, bei der Section die Hauptveränderungen in den Lungen anastreffen, während man sie im Darmkanal erwartet hatte. Einige Beispiele aus der frühesten Kindheit werden Ihnen das eben Gesagte veranschaulichen:

Otto F., 4 Monate alt, künstlich ernährt. Seit der 6. Lebenswoche multiple Abmagerung am ganzen Körper. Seit 2 Wochen zunehmende Atrophie und Welkheit, wenig Appetit, Husten und kurzer Athem. Percussion oben vorn und hinten auf beiden Seiten mürbe, sonst, als an anderen Partien, rechts oben unbestimmtes Athmen und Dorsophosie. Husten heftigere Paroxysmen. P. 126, T. nicht erhöht. Im Beginn der Krankheit soll Fieber vorhanden gewesen sein. Vater an Phtisis gestorben. Tod nach 5 Tagen. Section: massige Abmagerung. Cervical- und Inguinaldrüsen hyperplastisch, zum Theil kugig. Theilweise Synochie des Pericardiums mit dem Herzen und mit des Mediastinum: Miliartuberkel auf dem vorderen Blatte des vorderen. Linke Lunge frei beweglich, zahlreiche erbsengrosse graue Knoten enthaltend. Rechte Lunge überall fest adhärent, im Oberlappen eine tauchergrosse Höhle, die mit einer noch grösseren nach hinten verlaufenden communicationsirt. Im ganzen Pneumothym verstreut grosse und kleine Tuberkelknoten. Im Unterlappen ein grösserer käsiger Herd, Schwellung und Verklebung der Tracheal- und Bronchialdrüsen, deren eine eine Carcinom enthält. Miliartuberkulose der Leber und ihres vorderen Uterzuges. Milz blausch bei mit den Nachbartheilen verwachsen, sehr gross, innen und aussen tuberkulös. Unter der Nierenkapsel sparsame kleine Krücker. Meistertuberkulose zum Theil kugig. Im Harn einige flache Geschwüre mit kleinen grauen Krücker in den Rändern.

Helene D., 8 Monate alt. Seit 6 Monaten zunehmende Atrophie, Diarrhoe und Husten. Seit 8 Tagen Fieber, besonders in den Morgenstunden. P. 144, R. 68. Stöhnende Expirationen, Dyspnoe. Percussionsschall rechts oben vorn und hinten höher, Athmen überall sehr rauh, hier und da Schüttelrauschen. Allmählig zunehmende Dämpfung an den bezeichneten Stellen, Bronchialathmen und Bronchophosie, Ödem des Gesichts und der Füsse, Collapsus. Tod nach 3 Wochen. Section: Der rechte Oberlappen fest mit der Brustwand verwachsen, fast durchweg käsig entartet, enthält zwei grössere mit einander communicationsirte Höhlen, deren eine fast bis an die Pleura dringt. Der mittlere und untere Lappen sowie die linke Lunge vielfach mit Miliartuberkeln durchsetzt. Bronchialdrüsen kugig, eine derselben central erweicht. Exorme Miliartuberkulose der Milz und des Peritoneums. Leber fettig entartet.

Besonders macht sich die Latenz ausgebreiteter Tuberkulose bei kleinen Kindern bemerkbar, welche schliesslich an Meningitis tuberculosa zu Grunde gehen. Ohne erhebliche Prodromalsymptome, in-

mitten scheinbarer Gesundheit, höchstens durch eine leicht übersehbare Weißheit der Haut und Muskeln und durch mässige Abmagerung eingeleitet, entwickelt sich plötzlich die Meningitis, und der Anfänger ist überrascht, bei der Section Miliartuberkeln und käsige Herde in einer Reihe von Organen anzutreffen, die während des Lebens gar keine krankhaften Erscheinungen dargeboten hatten.

Bei älteren Kindern, vom 3. Jahre an bis gegen die Zeit der zweiten Dentition, sehen wir die Tuberkulose nicht selten mit dyspeptischen Symptomen beginnen. Die Kinder verlieren den Appetit, haben stets eine mehr oder minder belegte Zunge, leiden oft an Diarrhoe, magen ah und klagen über vage Schmerzen in der Brust oder im Unterleibe. Lange bevor der Husten Aufmerksamkeit erregt. Dabei sind sie übel-launig, bekommen gegen Abend vermehrte Wärme, Durst und trockene Lippen, und schlafen unruhig, während in den Morgen- und Vormittagsstunden eine Remission eintritt, und nur eine geringe Temperaturerhöhung mit ungewöhnlich schnellem Pulse das verborgene Leiden anzeigt. In solchen Fällen geht es leicht ebenso, wie bei der schleichenden Pleuritis (S. 364), indem die unklaren Symptome, das allmähliche „Abfallen“ der Kinder (nach dem Ausdrucke der Mütter) auf einen in die Länge gezogenen dyspeptischen Zustand oder gar auf eine präsumirte Helminthiasis bezogen werden. Nicht dringend genug kann unter diesen Umständen die genaue Untersuchung der Brust empfohlen werden. Der Verdacht einer sich entwickelnden Tuberkulose gewinnt an Bestand, wenn erbliche Anlage nachweisbar ist, Husten sich einstellt, oder wenn käsige, skrophulöse Prozesse gleichzeitig constatirt werden können, z. B. Knochen- und Gelenkvereiterungen, Spondylitis, Drüsenanschwellungen und Abscesse am Halse oder an andern Körpertheilen, chronische Entzündungen der Augen, Kopfausschläge, Otorrhoe. Allerdings treten nach einigen Monaten auch die localen Lungensymptome, Husten, Frequenz des Athems u. s. w. so entschieden hervor, dass die Untersuchung sich von selbst aufhängt; aber die bisherige Unterlassung derselben hat vielleicht den Arzt zu einer günstigen Prognose verleitet, welche ihm von dem bekümmerten Eltern nur schwer vergolten wird. Wenn auch die frühzeitige Exploration in der Regel keine entscheidenden Resultate ergiebt, so lässt sie doch oft schon einen chronischen Katarrh wahrnehmen, welcher unter den übwalenden Verhältnissen hinreicht, um die Familie auf die Wahrscheinlichkeit einer drohenden Gefahr vorzubereiten. In diesem Alter (vom 3. Jahre aufwärts) kommt es auch immer früher oder später zur Entwicklung eines remittirenden Fiebers, einer

Hektik, während diese bei kleinen Kindern nicht immer vorhanden ist, vielmehr ganz fehlen kann, wie z. B. in folgenden Fällen:

Paul K., 1½ Jahre alt, von S. bis 30. Mai 1874 in der Klinik behandelt. Enorms Welken und Abmagerung, mässiger Husten, 3. 50–60, Dämpfung beiderseits hinten unten mit klingenden Basalgeräuschen und unbedingtem Athmen; Diarrhoe. Während der ganzen Zeit der Beobachtung erhebt sich die Temperatur nur einmal (am 30. Mai Abends) auf 37,8, sonst bleibt sie stets unter dieser Ziffer, ist sogar meist subnormal. Die Section ergiebt in beiden Lungen vielfache käsige Herde, einige mandel- bis pfaumengrosses Cavernen, Verhärtung der Bronchial- und Mesenterialdrüsen, dünnes intestinales Darmgeschwür.

Marie H., 7 Monate alt, in der Klinik vom 26. Jan. bis 16. Febr. 1875 behandelt. Sehr ausserordentliches Welken und Mager, anfallsweiser Husten, Dyspnoe. Auf der rechten Seite sehr rauhes unbedingtes Athmen und zahlreiche, nicht klingende, gross- und mittelkäsige Basalgeräusche. Dämpfung nirgends nachweisbar. Diarrhoe. Während der ganzen Zeit steigt die Temperatur nur selten über 38°, ist vielmehr meist normal oder subnormal. Erst am 14. Febr. tritt Fieber auf (38,4, Ab. 40,1), am 15. constatirt man 39,3 und am Todestage am 17. 37,8 bei 72 H., dunkler Cyanose und Kälte der Extremitäten. Die Section ergiebt eine völlig gesunde linke Lunge, während die rechte fast ganz von grossen und kleinen Käseherden durchsetzt ist und ihre Spitze eine sehr grosse zerklüftete Caverne enthält. Bronchialdrüsen und Milz theilweise käsig.

Diese Fieberlosigkeit kommt bei älteren Kindern kaum vor. Auch ohne Anwendung des Thermometers kann man die Exacerbation des Fiebers an der erhöhten Wärme des Kopfes und der Hände, dem Durst und dem vermehrten Krankheitsgefühl sofort erkennen. Die Temperatur steigt dann auf 39°, und es leitet ein leichter Schweissausbruch, der aber nie so rapid und regelmässig wird, wie im hektischen Fieber älterer Patienten, in die Remission über. Wiederholt beobachtete ich ganz unregelmässige Fiebercurven, wobei die Morgenstemperatur oft höher war, als die abendliche. Bei einem 2jährigen, am 22. Aug. 1875 aufgenommenen Mädchen, dessen Section Milzmarkstuberkel und ausgedehnte käsige Prozesse in beiden Unterlappen ergab, wurde z. B. die folgende Curve gefunden:

	M.	A.
22. August	37,8	39,5
* 23. "	40,4	37,6
* 24. "	38,8	37,9
25. "	37,8	38,3
26. "	37,9	38,4
* 27. "	39,6	38,4
28. "	37,0	40,7
* 29. "	39,8	39,5
30. "	38,4	40,0
* 31. "	39,5	38,5 u. s. w.

Die mit * bezeichneten Tage weisen eine höhere Morgenstemperatur auf.

Auch der Mangel der Sputa, welche durch den Befund elastischer Fasern, schwarzen Lungengigmentes und besonders der Tuberkelbacillen ein wertvolles diagnostisches Kriterium bei Erwachsenen darbieten, erschwert bei Kindern bis zu einem gewissen Alter die Diagnose. Um so bemerkenswerther sind die Fälle, in denen wirklich Sputa ausgeworfen wurden, was allerdings mehr durch Würgen oder mit Hilfe der Mütter geschieht, welche die in den Mund beförderten Auswurfstoffe mit den Fingern herausziehen. Unter anderen beobachtete ich bei einem erst 7 Monate alten Knaben mit ausgedehnter käsiger Entartung und Cavemenbildung an linken Oberlappen Monate lang sehr reichliche grüngelbe fötide Sputa, welche dann und wann elastische Fasern, aber nie Blut enthielten. Ueberhaupt gehört die Hämoptysis bei Kindern vor dem Alter der zweiten Zahnung zu den äusserst seltenen Erscheinungen, wenn ich auch die Angabe von Billiet und Barthez, dass sie bis zum 6. Lebensjahre niemals Blutspeien beobachtet hätten, nicht bestätigen kann. Mir sind vielmehr mindestens 12 bis 15 phthisische Kinder von 2½ bis zu 5 Jahren vorgekommen, welche bei heftigen Hustenanfällen kleine Mengen, zuweilen aber auch einen Theelöffel voll reinen oder mit Schleim und Eiter vermischten Blutes auswarfen. Nur einmal aber beobachtete ich eine reichlichere Hämoptysis, ohne durch die Section, welche nicht gestattet wurde, über die Ursache derselben aufgeklärt zu werden. Auch kam mir niemals ein Fall vor, in welchem eine Compression oder Perforation eines Astes der Arteria oder Vena pulmonalis durch käsige Bronchialdrüsen, bei gleichzeitiger Eröffnung eines Bronchus, Anlass zu einer massenhaften Hämoptysis gegeben hätte, ein Vorgang, der von anderen Autoren hin und da beobachtet worden ist.

Bei dieser Gelegenheit will ich gleich auf die vorwiegende Disposition der Tracheal- und Bronchialdrüsen, besonders der letzteren, zur Hyperplasie und Verkäsung näher eingehen. Wenn irgendwo im Körper eines Kindes Tuberkel oder käsige Prozesse vorkommen, so kann man fast mit Sicherheit darauf rechnen, auch die genannten Drüsen in gleicher Weise ergriffen zu finden. Unter den unzähligen Sectionen tuberkulöser Kinder erinnere ich mich in der That nur einzelner Ausnahmen von dieser Regel, welche beweist, dass die Neigung dieser Drüsen zur Hyperplasie und Verkäsung bei Kindern noch grösser ist, als diejenige der Lungen. Während Louis unter 123 tuberkulösen Erwachsenen die Lunge nur 1mal verschont sah, fanden Billiet und Barthez unter 312 tuberkulösen Kindern die Lungen 47mal vollkommen frei. Ich glaube die enorme Frequenz der Drüsenanschwellung von zwei Umständen herleiten zu dürfen, einmal von jener vielen Kindern eigenthümlicher

Disposition zu Drüsenhyperplasien überhaupt, welche man als „skrophulöse“ Diathese zu bezeichnen pflegt, zweitens aber von der grossen Häufigkeit der Bronchialkatarrhe und des Keuchstossens. Die Reizung der Schleimhaut wird hier durch die Lymphgefässe auf die benachbarten Bronchialdrüsen in gleicher Weise übertragen, wie bei Darmkatarrhen, Dactylus u. s. w. auf die Mesenterialdrüsen. Die Drüsenaffection bildet bei Kindern gar nicht selten das prävalirende Leiden, während die Lungen selbst nur sparsame Tuberkeln und Infiltrationen enthalten können. Man findet die Bifurcation der Trachea und der grossen Bronchien von isolirten oder conglomirten, bisweilen zu kühnereigrossen Packeten vereinigten Drüsen umgeben, welche zum Theil einfach hyperplastisch, blutreich, grau-roth, meistens aber theilweise oder durchweg tuberkulösirt, oder in eine homogene weiss-gelbe Masse umgestandelt sind. Auch auf Durchschnitten der Lunge findet man an den Bifurcationen der mittleren Bronchien häufig kleine käsige Drüsen. Einzelne Drüsen zeigen auf dem Durchschnitt eine central oder mehr peripherisch gelegene, mit erweichtem Detritus gefüllte Höhle (Drüsen-caverne), welche nach ihrer Verwachsung mit der Pleura pulmonalis oder mit den Bronchien in eine naheliegende Lungencaverne, oder auch in einen grossen Bronchus durchbrechen kann. Große Drüsenpackets an der Lungenwurzel können auch die nahe liegenden grossen Gefässe, besonders die Arteria und Vena pulmonalis mit ihrer Aste, aber auch die Vena cava superior und die Jugularis communis, ferner den Vagus und seine Zweige (Recurrentes) mehr oder weniger comprimiren; zimal des letzteren findet man bisweilen von den Drüsen dergestalt umlagert und umgeplattet, dass es kaum möglich ist, seine Bahn durch das Packet deutlich zu verfolgen. Verwachsungen einzelner Drüsen mit dem Oesophagus, mit der Lungenarterie oder einem Aste derselben sind ebenfalls beobachtet worden, wobei diese Theile nicht bloss dislocirt, sondern durch den Druck allmählig verdrängt und schliesslich perforirt werden können.

Ist man nun im Stande, diese Affection der Bronchialdrüsen während des Lebens durch bestimmte Symptome zu diagnosticiren? Nach meiner Erfahrung muss ich diese Frage für die grosse Majoritas der Fälle verneinen. Allerdings wird man sich kaum einmal täuschen, wenn man bei einem tuberkulösen Kinde die Verhärtung der Bronchialdrüsen vor der Section diagnosticirt, aber nur deshalb, weil sie eben fast normals fehlt. Die Krankheitsbilder, welche die Autoren von der Drüsenanschwellung entwerfen, erinnern etwas an den Stenitisch. Man sagte sich, die comprimirende Beziehung der Drüsen zu ihren Nachbartheilen könne leicht Drucksymptome zur Folge haben, und in der

That kommen Fälle vor, in welchen durch Compression der Venenstämmen Oedem des Gesichts und eine Erweiterung einer oder beider Jugularvenen am Halse, ferner durch Druck auf die Lungenvenen Hämoptoe und hämorrhagische Lungeninfarcte zu Stande kommen. Ich selbst beobachtete bei einem 1 $\frac{1}{2}$ -jährigen Mädchen eine Compression des rechten Bronchus durch ein höhnereigrosses Conglomerat tuberculöser Drüsen, wodurch der Luftzutritt in die rechte Lunge erheblich beschränkt und das Athmungsgeräusch auf dieser Seite nur äusserst schwach hörbar war. Auch die Compression des Vagus und Recurrens durch geschwollene Tracheal- und Bronchialdrüsen kann, wie ich selbst wiederholt beobachtete ¹⁾, gewisse nervöse Symptome, besonders Veränderung der Stimme (Heiserkeit), Anfälle von spastischem Husten mit keuchhaftenartigen Inspirationen, auch wohl asthmatische Anfälle mit pfeifendem Athem und cyanotischer Verfärbung des Gesichts zur Folge haben. Nach meinen neueren Erfahrungen muss ich jedoch solche Fälle für äusserst selten erklären. Oft genug fanden wir bei Sectionen voluminöse Packete klöser Bronchialdrüsen, welche sich im Leben durch kein einziges Symptom verrathen hatten, vielmehr hatten die Kinder zur das bekannte Bild einer Meningitis tuberculosa oder einer Phthisis dargeboten. Selbst die vielfach geltend gemachte starke Füllung der äusseren Jugularvenen und das Oedem des Gesichts können nur als Folgen einer durch ausgebreitete Verdichtungen der Lungen bedingten Stauung im rechten Herzen auftreten, ohne dass eine Compression der grossen Venenstämmen innerhalb des Thorax stattfinden braucht. Ich halte demnach die Diagnose der Drüsenanschwellungen während des Lebens für sehr problematisch, möchte aber am wenigsten Werth auf die von Manchen behauptete Dämpfung des Percussionsschalles im Interapularraume legen. Ich wenigstens habe mich nie einen Drüsencancer von so bedeutendem Umlange beobachtet, dass er eine entschiedene Dämpfung in dieser Region hätte erzeugen können. Rilliet und Barthiez machen auch darauf aufmerksam, dass grosse Drüsenpackete im hinteren Mediastinum als gute Schallleiter alle in der Lunge stattfindenden Geräusche für das Ohr des am Rücken Auscultirenden verstärken, und dass man in Folge dessen zwischen den Schallleitern hinteres Bronchialathmen und klingendes Rasseln hören könne, ohne dass die Lunge selbst verdichtet oder von Höhlen durchzogen ist. Mir selbst ist ein solcher durch Drüsenpackete veranlasster Irrthum bisher noch nicht vorgekommen. Jedenfalls würde die Percussion denselben bald aufklären, denn wo jene Geräusche wirklich

¹⁾ Raulberg und Bernick, Klinische Ergebnisse, Berlin 1846. S. 165.

durch Verdichtung der Lunge und durch Cavernen erzeugt werden, da wird auch eine deutliche Dämpfung des Schalls an der Rückenflechte nur selten fehlen. Ich kann daher der Hyperplasie und Verkäsung der Bronchialdrüsen ein ganz bestimmtes, selbstständiges Krankheitsbild nicht zuerkennen. In den meisten Fällen kann sie nur vermuthet werden und bietet lediglich ein anatomisches Interesse dar; nur ausnahmsweise kann man aus deutlichen Drucksymptomen von Seite der Venen oder des Nerv. vagus mit einiger Wahrscheinlichkeit die Diagnose stellen. —

Die Tuberkulose der Kinder bis zum Alter der zweiten Dentition zeichnet sich im Allgemeinen durch einen stürmischen Verlauf vor derjenigen der späteren Lebensjahre aus. Fälle mit sehr chronischen, jahrelang ausgehnten Verläufe sind äusserst selten, und fast immer handelt es sich nur um mehrere Monate, höchstens um ein Jahr, bis der tödtliche Ausgang eintritt, woran wohl die schon mehrfach berührte grosse Ausbreitung der Tuberkulose über viele Organe im Kindesalter Schuld ist. Auch kommt es hier weit häufiger, als bei Erwachsenen, schliesslich zur Entwicklung einer Meningitis tuberculosa, einer Bronchopneumonie oder Pleuritis, welche das Leben früher ein Ziel setzen, als es sonst der Fall gewesen sein würde. Die Pleura theilhaft sich nämlich an der Tuberkulose fast ebenso häufig, wie die Pia mater, entweder in Form vielfacher miliärer, über Costal- und Lungenpleura zerstreuter Knötchen, oder auch grösserer käsiger Plaques auf der freien Fläche oder im subserösen Bindegewebe der Rippenpleura. Im letzteren Falle sieht man sie und da durch Schmelzung der Plaques kleine extrapleurale Cavernen zu Stande kommen, welche entweder in die Pleurahöhle durchbrechen, oder nach vorübergehender Verwachsung der Pleura mit der Lunge auch in Cavernen der letzteren oder in die Bronchien entleeren können. Mehr oder minder ausgehnte Verwachsungen der beiden Pleuralblätter kommen dabei sehr häufig vor, während es in anderen Fällen zur Entwicklung einer subcutanen oder mehr chronisch verlaufenden Pleuritis mit reichlichem, purulentem, oft hämorrhagisch gefärbtem Exsudat kommt. Dasselbe gilt vom Pericardium, dessen partielle oder totale Synechie ich ungewöhnlich häufig bei tuberkulösen Kindern antraf, worauf ich an einer späteren Stelle ausführlicher zurückkommen werde. —

Der tödtliche Verlauf der Krankheit wird in vielen Fällen durch die rasche Entwicklung einer acuten Miliartuberkulose erheblich beschleunigt, deren Erscheinungen hier ziemlich dieselben sind, wie bei älteren Individuen. Eine acute Eruption miliärer Tuberkel in einer mehr oder minder grossen Zahl von Organen und Geweben kann sowohl wäh-

rend des Verlaufs einer bis dahin chronischen Lungentuberkulose auftreten und dann den tödtlichen Schluss derselben bilden, als auch solche Kinder treffen, welche scheinbar vollkommen gesund und nicht einmal einer tuberkulösen Anlage verdächtig sind. In beiden Fällen bilden stürmische Fieberbewegungen mit unregelmässigen, bald früh, bald Mittags, bald Abends auftretenden Exacerbationen, eine sehr frequente oberflächliche Respiration, scharfes Athemgeräusch, welches sich schliesslich mit weit verbreitetem feimblasigem Rasseln zu verbinden pflegt, die Hauptsymptome, zu denen im weiteren Verlaufe noch eine Anschwellung der Milz und cerebrale Erscheinungen hinzutreten können. Das Fieber erreicht indess nicht immer sehr hohe Grade. So fand ich bei einem 2-jährigen bis dahin ganz gesunden Kinde zwei Wochen lang immer nur eine Temperatur von 38,2 bis 39,0, während die Respirationsfrequenz durchweg 60 bis 80 betrug, ohne dass die Untersuchung der Lungen irgend eine Abnormität nachzuweisen vermochte. Erst im Anfang der dritten Woche mit dem plötzlichen Eintritt von Convulsionen, Hemiparese und Sopor stieg die Temperatur auf 40,0, und zwei Tage darauf erfolgte der Tod. Durch die Cerebralsymptome kann die Diagnose leicht irreföhrt und entweder auf einen Pesttyphus oder auf eine Meningitis basilaris gestellt werden:

Wilhelm K., 3 Jahre alt, am 15. März 1890 mit Spuren einer Scharlachinvasionation in meine Poliklinik gebracht, ist die Kindstouren einer Pnestrogammathe des rechten Unterlappens dar. In den nächsten Tagen trat die Pleuritis mehr in den Vordergrund, wurde indess bis 28. April fast ganz beseitigt, so dass nur noch ein matter Schall und hinten eine sehr geringe Dämpfung bestand, überall aber vollständiges Athmen gehört wurde. Am 6. Aug., also nach 3 Monaten, wurde das bis dahin gesunde Kind von neuem der Klinik zugeführt. Seit 5 Tagen Kopfschmerz, Erbrechen und Verstopfung, P. 72, T. etwas erhöht. Die physikalischen Symptome unverändert. Trotz wiederholter Gaben von Calomel, Syr. spissae cervinae und Klystimen fortdauernde Verstopfung. Am 8. häufig wiederholtes Erbrechen. Pulsfrequenz 125. Am 15. März nicht vergessert. Am Thoma nichts neues wahrnehmbar. Pupillen träge reagierend. Schwellung, aus welcher der Linde nicht zu erwecken ist. Leib etwas eingesenken. Gestern Nachmittag ein Schlingender epileptiformer Anfall. In den nächsten Tagen zunehmender Sopor, längere Schenke, linke Pupille weiter als die rechte, R. 48, ungleich, P. 128. Am 21. endlich permanente Krämpfe und Contracturen. Tod in der folgenden Nacht.

Die Art der Symptome und ihre Succession während des 3 wöchentlichen Verlaufs sind hier so charakteristisch, dass nur die Diagnose der Meningitis tuberculosa zweifelhaft schien. Und was ergab die Section?

Pia mater hypemisch, sonst ganz normal, keine Spur von Entzündung und Tuberkeln in derselben; in den dilatirten Ventrikeln viel Serum, Centralblinde meist macerirt (Leichenphänotem), Bronchialdrüsen regrossirt und küssig; rechte Lunge völlig adhären, die Pleura costalis stark verdickt, mit stumpfklüppelartig gruppierten intrapleuralen grauen Knoten durchsetzt; aus rechtsen untern Rande küssig entartet,

hatten braun verfärbt. Linde Lunge mit zahllosen Miliartuberkeln besetzt. Leber vergrößert. Milz voll von Miliartuberkeln. Im Darm einige kleine tuberkulöse Geschwüre.

Max K., 17½ Jahre alt, am 31. März 1878 in die Klinik aufgenommen. Sopor, blassere lockige Lippen, beide Papillen verengt. R. unregelmäßig, bei Pausen unterbrochen. Perikardion normal. Husten am Thorax markte Athemen mit grobblättrigen Rasseln. Unterleib aufgetrieben, scheint empfindlich gegen Druck. Stuhlverstopfung. P. sehr klein, 144. T. 39,7, gegen Abend 38,5. Am den beiden folgenden Tagen derselbe Zustand; am 3. April, dem Todestage, T. plötzlich bis 40,8 steigend, mit 76 R. und inkohärentem Pulse. Cyanose, Tremor, Steifigkeit des Nackens und aller Extremitäten. Abends 8 Uhr Tod.

Section: Pia vasa hyperämisch und oedematisch, nirgends Exsudat wie Tuberkel. Gehirn sehr atrophisch, Ventrikel (besonders der 4.) mit einer mäßigen Menge klarem Serum gefüllt. Sehr reichliche Miliartuberkulose der Pleura und beider Lungen, der Milz und Leber. Bronchial- und Mesenterialdrüsen geschwellen und käsig erweicht, ebenso die Darmdrüsen.

In beiden Fällen finden wir also weder Tuberkel noch Exsudat in der Pia mater, und dennoch im Leben die charakteristischen Erscheinungen der Meningitis tuberculosa, im zweiten sogar die prägnante Temperatursteigerung, von welcher S. 279 die Rede war. Anatomisch liess sich nur eine Hyperämie, im zweiten Fall auch ein Oedem der Pia mater und eine Serumanhäufung in den Ventrikeln, also ein wirklicher Hydrocephalus acutus (S. 266) nachweisen, von welchem man die cerebralen Symptome herleiten kann. Ganz ähnlich verläuft sich der Fall eines 2 Monate alten Kindes, welches in den letzten Tagen eine tetanusartige Muskelstarre dargeboten hatte, so dass man es am Kopf oder an den Füßen aufheben und fast horizontal gestreckt halten konnte. Die Section ergab hier neben Miliartuberkulose der Pleura, Lungen, Milz, Leber und Verköstung der Bronchialdrüsen nur ein Oedem der Pia und starken Hydrocephalus internus. Derselbe Befund bot sich mir auch in zwei anderen Fällen von Miliartuberkulose dar, welche in typhöser Form aufgetreten war; besonders bei einem 3jährigen Kinde entsprach die Temperaturcurve so vollkommen derjenigen des Heptyphus, dass ich diese Diagnose bis zur Section festhielt, welche statt des erwarteten Typhus eine ausgebreitete acute Miliartuberkulose ergab. In beiden Fällen war die Schädelhöhle von der Tuberkulose völlig verschont, und nur eine Hyperämie der Pia mit seröser Füllung der Ventrikel vorhanden. Die letztere muss also von der allgemeinen acuten Tuberkulose, vielleicht von der in Folge massenhafter Tuberkelentwicklung in den Lungen sich geltend machenden Störung in den cerebralen Venen hergeleitet werden.

Nur einmal beobachtete ich im Gefolge der acuten Miliartuberkulose eine ausgesprochene hämorrhagische Dathese. Dieser Fall, welcher

von Jacobasch⁷⁾ bereits ausführlich mitgetheilt wurde, ist in Kürze folgender:

Otto K., 4jährig, aufgenommen am 8. Dec. 1879. Anamnese dunkel. Erkrankt am 26. Novbr. mit heftigem Fieber und Blutungen aus Mund und Nase, welche seitdem mit kurzen Unterbrechungen fortauern. Früher soll nie eine hämorrhagische Diathese bemerkt worden sein. Mageres, Häsers, sehr collabirtes Kind, Säfero und Haut leicht ödemat. Hautröthe auffallend injicirt, leichte kleinförmige Epidermisabscuppung. Scutum costatum. T. 38,7. R. 40, oberflächlich, costo-abdominal. Die Unterleibsorgane zeigen nur geringfügiges Rausen an der Reibefläche. P. 156. Harn. Urinleib meteoristisch, Leber um 5 Cm. den Rippenrand überragend, Milz nicht zu constatiren. Stühle dünn, gelbschwarz, unwillkürlich entleert. Vom mit dem Katheter (200 Grm.) entlassen. braunroth, sauer, enthält etwas Albumen, keine Cylindrer, keine intakten Blutkörperchen (Hämoglobinkristalle). Tod am 19. Decbr. im Collaps. Nach einigen Kampherinjectionen hatten die Stiehkathete lange und stark gebüet.

Section: Pericardium mit einzelnen verkalkten Knötchen besetzt. Herzmuskel leicht fertig erstarrt, dicht unterhalb der Aortenmündung einzelne submillim. Tuberkel. Denselben finden sich massenhaft in beiden Lungen, auf der Pleura, in der um das Dreifache vergrößerten Milz, in den Nieren, auf dem Voberage und im Panchym der Leber, welche stark vergrößert und bing stark ist. Bronchialdrüsen theilweise wallnustgroß und läng degenerirt. Ductus thoracicus ohne Tuberkel.

Ich muss es dahingestellt sein lassen, ob die in diesem Falle beobachteten Blutungen aus Mund und Nase, so wie die Hämogloburie in der That auf Rechnung der acuten Miliartuberkulose zu setzen sind. Fernere Beobachtungen werden vielleicht darüber entscheiden. Mir selbst ist, außer diesem, bis jetzt kein Fall vorgekommen, und Jacobasch konnte auch bei der Durchsicht der Literatur keinen zweiten finden.

Zuweilen scheint die acute Miliartuberkulose in Schüben aufzutreten, deren jedesmal ein mehr oder weniger hoher Fieberzustand entspricht, zwischen denen aber vollkommen fieberfreie Intervalle liegen. Für diese seltene Form liefert der folgende Fall ein charakteristisches Beispiel:

Hermann K., 6 Jahre alt, am 2. Februar 1878 in die Klinik aufgenommen, äußerst verfallend, mit Ikterus chronicus behaftet. Etwas Husten ohne abnorme physikalische Symptome. Fekaliäe nach Maltäferen. Vom 13.—28. Diarrhoe, welche durch Magiste. Bism. und Argent. nitr. beseitigt wird. Euphorie. Plötzlich am 8. März Anorexie und Fieber (T. 40,9, P. 134, R. 44, sehr oberflächlich). In den Lungen überall nur sehr flaches Atmen, Percussion normal. Das Fieber dauert ununterbrochen 4 Tage, während welcher Zeit 2 mal Morgens ein Schüttelfrost stattfindet. T. nur am 8. früh 37,0, sonst immer 40—41,2. R. liegt auf 64, ohne andere abnorme Symptome. Vom 11. März bis zum 8. Mai, über eine nahe 2 Monate, fieberloses Intervall (nur am 4. Tagen erreichte die Abendtemperatur 38—38,0), sonst

⁷⁾ Jahrb. f. Kinderheilk. N. F. Bd. XV. S. 167.

war sie immer normal oder gar subnormal). Untersuchung ohne Royalist, allgemeine Euphorie und Kräftzunahme. Plötzlich am 8. Mai neues Fiebersturm, 99,8, zwei Tage dauernd (wie unter 40,0) mit 144—160 P. und 60 R. Von nun an traten in beiden Lungen katarrhalische Geräusche auf, und die Frequenz der Resp. betrug anhaltend 40—50. Vom 10. bis zum 13. sank die T. wieder allmählich und blieb ganz normal bis zum 25., während der Katarrh und die schnelle Atmung fort-dauerten, und der Unbehalt meteorologisch wurde. Vom 25. an wieder ein 5 Tage anhaltender Fiebersturm (39,4—40,0). Nach einigen fieberfreien Tagen begann mit am 1. Juni eine Continua remittens, welche bis zum Todestage (5. Juli) ununterbrochen fort-dauerte (M. 38,2; A. 39,2—39,9), mit stets raschem P. und R., zunehmender Mucos und Schwäche, fort-dauerndem Bronchialkatarrh und stets wiederkehrender Diarrhoe. Schließlich Collapse, Oedem der Extremitäten und Füße, rechts hinten unten leichte Blaupflege, Bronchialasthma und Hämoptoe Basilar, hochgradige Dyspnoe. Tod am 5. Juli.

Die Section ergab ausgebreitete pleurische Adhäsionen, enorme Miliartuberkulose der Pleura, beider Lungen, des ganzen Peritoneums, der Milz, Leber und beider Nieren. Käsige Verdichtung an der Basis des rechten Unterlappens, Verklebung der Bronchial- und Mesenterialdrüsen.

Dieser Fall zeigt also, dass scheinbar unerklärliche, mehrere Tage anhaltende, mit sehr hoher Temperatur einhergehende Fieberanfälle, auch wenn sie durch vollständige Apyrexien von Wochen langer Dauer getrennt sind, und die Untersuchung der Lungen nur scharfes Athmen oder katarrhalische Geräusche ergiebt, den Verdacht einer in Schüben sich entwickelnden Miliartuberkulose erregen müssen. —

Ueber die Behandlung der Tuberkulose in den ersten Lebensjahren habe ich Ihnen leider nur wenig zu sagen. Einen wirklichen Erfolg habe ich in keinem einzigen Falle zu verzeichnen, welcher die Zeichen der Tuberkulose oder gar vorgeschrittener Lungenphthisis darbot, während die früher erörterten Fälle von „chronischer Pneumonie“ nicht ganz selten vollständig geheilt wurden. Ich verweise Sie auf die gegen die letztere empfohlene Therapie (S. 361), welche auch hier allen Indicationen entspricht. In prophylaktischer Beziehung muss ich Sie auf die Gefährlichkeit der Milch von tuberkulösen Ammen oder von verächtigten Kühen um so mehr aufmerksam machen, als die Identität der Perlsucht mit der Tuberkulose durch Koch's Untersuchungen sicher gestellt ist. Eine schöne Frucht der letzteren wäre vor allem die Möglichkeit, heranwachsende Kinder mit Familienanlage zur Phthisis vor der ätiologischen Einwirkung der Tuberkelbacillen zu schützen. Aber diese Indication wäre einzig und allein dadurch zu erfüllen, dass man die Kinder sehr frühzeitig an Orten aufzöge, welche mindestens von menschlichen Auswurfstoffen gänzlich verschont bleiben, und dass dies überhaupt unmöglich ist, ja dass auch die ungeliebte Majorität der Individuen an ihrer Scholle gebunden ist,

weiss Jedermann. Vorläufig bleibt also die Erfüllung der prophylaktischen Hauptindication bei der eine Unmöglichkeit.

X. Der Lungenbrand.

Unter den Krankheiten, welche sonst noch die Lungen der Kinder treffen können, bietet die Sarkom- und Echinococcenbildung nichts für dies Alter Charakteristisches dar. Auch der Lungenbrand (*Gangraena pulmonum*) unterscheidet sich von demjenigen der Erwachsenen klinisch nur dadurch, dass er wegen des häufigen Mangels der Sputa schwerer zu diagnosticiren ist. Dazu kommt, dass auch der gangränöse Geruch des Athems bei Kindern aus dem Grunde weniger zu verwerthen ist, weil hier nicht selten gleichzeitig brandige Prozesse in der Mund- und Rachenhöhle bestehen, welche dies Symptom ebenso gut erzeugen, wie der Lungenbrand. Dieser scheint übrigens im Kindesalter häufiger, als bei Erwachsenen vorzukommen. Nur ausnahmsweise erscheint er als Ausgang einer fibrinösen Pneumonie, wenn dieselbe mit Bildung von „Sequestern“ endet und diese durch von aussen hineingelangte Fäulniserreger septisch infectirt werden. Auf diese Weise muss wahrscheinlich der S. 370 mitgetheilte Fall, welcher dann noch zu einer periton. Pleuritis führte, aufgefasst werden. Häufiger entsteht die Lungengangrän auf embolischen Wege, indem septische Stoffe, die in verschiedenen Theilen des Organismus sich gebildet haben können, durch den Kreislauf in die Lungen gelangen. So beobachtete ich z. B. Brandherde der Lunge im Gefolge einer Caries und Verjauchung beider Femurbeine, und wiederholt bei brandigen Processen der Haut, welche bei den elenden Kindern der Armen, besonders nach infectiösen Krankheiten (Masern, Scharlach, Typhus) nicht selten sind, Gangrän der Vula, der Wange oder anderer Hautpartien. Einen gangränösen Herd fand ich in der Lunge eines 2½-jährigen Kindes, welches viele Wochen lang an einem sehr ausgebreiteten *Ecthyma carboeticum* mit Ausgang in Gangrän cutis gelitten hatte:

Brust und Rücken waren derartig von tiefdringenden brandigen, mit schwarzen nekrotischen Fetzen bedeckten Ulcerationen durchsetzt, dass an eine physikalische Untersuchung des Thorax nicht zu denken war. Nach dem im Collaps (T. 38,6) erfolgten Tode ergab die am 6. Mai 1878 ausgeführte Section folgende Veränderungen im Respirationsapparate: Pleuritis sero-fibrinosa chronica, Bronchopneumonia multiplex, besonders linksseits, multiple embolische ichthöse Abscesse und hämorrhagische Infarcte in beiden Lungen, ausgedehnter Brandherd im linken Unterlappen, partielle Thrombosen im Gefasse der Lungarterien. Wegen der Unmöglichkeit den Thorax zu untersuchen, und die Paroxysmen der Haut- und allgemeinen Symptome waren alle diese Affectionen während des Lebens latent geblieben.

Auch durch directe Aspiration septischer Stoffe kommt der Lungenbrand zu Stande, so z. B. bei Pneumonie unter den oben erwähnten Umständen, ferner in tuberkulösen Cavernen oder Abscessen der Lunge, bei Noma und Diphtheritis des Pharynx. Sowohl bei scarlatinöser Rachennekrose, wie bei der wahren Diphtherie beobachtete ich wiederholt putride Bronchitis, und bei letzterer ein paar Mal inmitten einer bronchopneumonischen Verdichtung mehrere taubeneigroße brandige Höhlen. Auch in diesen Fällen wurde die Krankheit erst bei der Section entdeckt, weil der brandige Geruch des Athems während des Lebens auf die Nekrose der Rachentheile bezogen werden musste. Dagegen konnte ich bei einem 4jährigen phthisischen Knaben, dessen Section mehrere grössere und kleinere brandige Höhlen in der verdichteten linken Lunge und putride Pleuritis ergab, durch den anstehenden Geruch beim Husten und Exspiriren die Diagnose während des Lebens stellen. Jedenfalls spielt eine tiefgradige allgemeine Schwäche, wie sie sich in allen erschöpfenden Krankheitszuständen geltend macht, durch die Verlangsamung der Blutcirculation und die Tendenz zur Thrombose eine mächtige Rolle in der Aetiologie des Lungenbrandes. Im Februar 1873 entwickelte sich bei einem kleinen 2jährigen Knaben, welcher an allgemeinem Ekzem auf meiner Klinik behandelt wurde, eine Bronchopneumonie, die anfangs keine Besorgnisse einflößte, nach etwa 14 Tagen aber plötzlich mit einem enormen Verfall der Kräfte, Leichenblässe der Haut und einem so fötiden Geruch des Athems abschloss, dass das Zimmer förmlich verpestet wurde. Die Section ergab im rechten Unterlappen eine von verdichtetem Parenchym umgebene, fast kühnereigroße gangränöse Partie. In diese Kategorie gehören auch die Fälle von Lungenbrand, welche im Gefolge schwerer Abdominaltyphen auftreten, wozu ich Ihnen später zwei Beispiele mittheilen werde. Dabei darf man nicht vergessen, dass gerade unter diesen Verhältnissen das Hineingelangen von Nahrungsstoffen in die Luftwege den septischen Zerfall der Entzündungsherde befördernd kann.

Unerklärt blieb die Entstehung des Lungenbrandes in dem folgenden Falle:

Albert S., 11jährig, aufgenommen am 23. Juni 1881. Früher gesund. Vor 36 Tagen plötzlich mit Fries und nachfolgender Hitze erkrankt; später häufige dünne Stühle und Delirien. Bei der Aufnahme liegt der übrigens kräftige und lebhaft colorirte Knabe in tiefer Schwäche, delirirt vielfach, ist nur schwer auf Augenklippen zu erwecken. Untersuchung der Brust ergiebt von der rechten Spina scapulae abwärts Dämpfung und spärliches klingendes Rauschen. Weiter Mittlinie nach Epistoma. T. 39,5, P. 120, R. 40. Abends steigt die Temp. auf 40,2, der Puls auf 148. In der nächsten Nacht lebhaftes Delirium und 3 Anfälle von Schüttelfrost mit Cyanose.

die, wie sich später ergab, auch schon vor der Aufstauung wiederholt eingetreten waren. Am 24. allgemeiner Collaps, Cyanose der extremen Körpertheile, Erbrechen, T. 40,0; P. 100; R. 52. In der darauf folgenden Nacht reiner Dyspnoe. Tod gegen Morgen.

Section: Zwerchfell rechts kuppelförmig in den Bauchraum vorgedrängt. Aus der rechten Pleurahöhle entleert sich beim Oeffnen überströmendes Gas. Die Höhle füllt einen leeren Sack, an dessen medialer Fläche die stark collabirte, scharfrot grau-grüne Lunge liegt. Consolidation mit einer überdeckenden Jauche bedeckt. Im Pleurarsack etwa 200 Ccm. grünlich-graue Jauche. Im rechten Unterlappen eine schon äußerlich als Brandherd erkennbare 4 Cm. lange und 4 $\frac{1}{2}$ Cm. breite Stelle, welche eine längliche Perforation durch die parietale Pleura enthält. Der Unterlappen ist schwach hyperämisch und enthält an der Basis noch einzelne knochenvergrösserte Brandherde unter einer dünnen lactifizirenden Pleura. An der Spitze des linken Oberlappens ebenfalls ein weniggrüner Brandherd, der Rest des Pneumothyma blutreich und luftkaltig. Milz ziemlich stark geschwollen (9 Cm. lang, 4,5 breit, 5,0 dick). Blaulich-roth, weich. Im Darm reichlicher Epithelbelag, Peyer'sche Plaques bis und da etwas geschwollen, Mesenterialdrüsen unbedeutend vergrößert. Alle anderen Organe normal.

Obwohl Milztumor und Roseola fehlten, schien doch das ganze Krankheitsbild die Diagnose eines Heotyphus mit Bronchopneumonie des rechten Unterlappens zu rechtfertigen. Die sehr geringfügigen Veränderungen der Peyer'schen und Mesenterialdrüsen, welche bei der Section gefunden wurden, lassen sich nun zwar nicht gegen diese Diagnose geltend machen, da, wie wir später sehen werden, gerade beim Typhus der Kinder Fälle dieser Art vorkommen, und die Milz dabei stark geschwollen gefunden wurde. Dennoch möchte ich den Lungenbrand hier nicht als einen typhösen betrachten, einmal weil die Krankheit erst seit etwa 10 Tagen bestand, besonders aber weil die multiple Form der Gangrän und die wiederholten Schüttelfröste auf eine septicämische Quelle hindeuten, deren Ursache allerdings bei der Section nicht gefunden wurde. Wer kann wissen, ob nicht irgendwo im Knochen system ein septischer Herd bestand, von welchem aus embolische Vorgänge stattgefunden hatten. Der tödtliche Ausgang erfolgte hier durch Ruptur eines oberflächlichen Brandherdes der Lunge mit nachfolgendem putriden Pyogemoneurax. Auch in diesem Falle fehlte jeder verlässliche Geruch des Athems.

XI. Der Keuchhusten.

Wenn ich mit dem Keuchhusten (*Tussis convulsiva*, *Pertussis*) die Schilderung der respiratorischen Krankheiten abschliesse, so bin ich mir wohl bewusst, dass derselbe eigentlich nicht an diese Stelle, sondern unzweifelhaft zu den infectiösen Processen gehört. Von klinischen Standpunkte aus halte ich es jedoch für zweckmässig, den Keuchhusten

unmittelbar den Affectionen des Respirationsapparats anschließen, weil seine Symptome vorzugsweise in dieser Sphäre spielen, und auch seine bedenklichsten Complicationen derselben angehören.

Es giebt gewisse Zeichen, welche den Arzt, noch bevor er das erkrankte Kind husten hörte, zur Diagnose der Tussis convulsiva bestimmen könnten. Zu diesen gehört schon die Aussage der Eltern, dass ihr Kind zu einem auffallend, besonders häufig in der Nacht auftretenden Husten leide, der mit gleitenden oder pfeifenden Inspirationen und mit dunkler Gesichtsröthe verbunden sei, und mit Würgen oder Erbrechen von Schleim ende. Die Vermuthung, dass es sich um Keuchhusten handle, wird noch bestärkt, wenn Sie das Gesicht des Kindes, besonders die unteren Augenlider etwas gedunsen und die Venen der letzteren erweitert finden.

Man unterscheidet im Verlaufe der Krankheit gewöhnlich drei Stadien, welche unmerklich in einander übergehen. Das erste (Stadium catarrhale) unterscheidet sich in der Regel durch nichts von einem gewöhnlichen Tracheal- oder Bronchialkatarrh, und erregt daher nur dann den Verdacht, ein Vorläufer des Keuchhustens zu sein, wenn dieser epidemisch herrscht, oder gar Kinder derselben Familie daran leiden. Seltenere zeigt der Husten schon in dieser Zeit einen eigenthümlichen Charakter, ein mehr paroxysmenweises Auftreten mit Neigung zum Würgen am Schlusse, woraus man sofort den Verdacht einer in der Entwicklung begriffenen Pertussis schöpfen kann. Das katarrhalische Stadium ist dann nur äusserst kurz, auf ein paar Tage beschränkt, und vorzugsweise scheinen mit kleinen Kinder im ersten Lebensjahre diese Eigenthümlichkeit darzulegen. Im Allgemeinen aber beträgt die Dauer des einleitenden Stadiums 10—12 Tage, und während dieser Zeit nimmt der anfangs rein katarrhalische Husten sehr allmählig den paroxysmischen Charakter an. Wenn manche Autoren, z. B. Lombard und West, eine 5—6wöchentliche Dauer des ersten Stadiums beobachtet haben wollen, so will ich dies gewiss nicht bestreiten, glaube aber doch, dass es sich in diesen Fällen eher um einen gewöhnlichen Katarrh handelte, während dessen die Kinder mit dem Keuchhusten auftrat wurden. Bei Kindern, welche zum Pseudocroup neigen (S. 306), sah ich auch das erste Stadium des Keuchhustens bisweilen mit einem solchen Anfall beginnen, aus welchem dann zunächst ein Katarrh und schließlich die Tussis convulsiva hervorging. Allmählig geht aus das erste Stadium in das zweite (Stadium convulsivum, Akme) über, welches den Höhepunkt der Krankheit darstellt. Mehr oder minder oft, am stärksten und häufigsten in der Nacht, erfolgen jetzt die charakteristischen Anfälle, welche durch

die unterbrechenden ziemenden Inspirationen der Krankheit ihren Namen gegeben haben.

Häufig, aber keineswegs constant, beginnt der einzelne Anfall mit einer Art von Aura, d. h. mit Prodromen, welche dem Kinde und seiner Umgebung das Herannahen des Anfalls verkünden. Das Kind wird plötzlich unruhig, ängstlich, hört auf zu essen oder zu spielen, richtet sich schnell aus der Rückenlage auf, und klammert sich an die Mutter oder an irgend einen festen Gegenstand an, als könne es dadurch besser dem hereinbrechenden Anfalle Trotz bieten. Schon bei einem erst 3 Wochen alten Sängling beobachtete ich vor jedem Anfall ein ängstliches Schlagen mit den Armen, mitunter auch kurze pfeifende Inspirationen, bei einem 14 Wochen alten Knaben eine rasche Entleerung von Urin und Fäces, bei einigen älteren Kindern ein prodromales Erbrechen. Dieselben laufen plötzlich mit grosser Hast in die Ecke des Zimmers und entleeren ihren Mageninhalt, worauf der Anfall ausbricht. Bei einem 2jährigen Kinde begann derselbe mit Unruhe und zahllosem, rasch aufeinander folgenden Niesen, welches auch am Schlusse niederkehrte, während ein 9jähriges Mädchen als Aura ein sehr beschleunigtes und dyspnoisches Athmen mit stöhnender Expiration zeigte, welches über eine Stunde anhielt und dann in den Anfall überging. Unmittelbar nach demselben und in den Intervallen war die Respiration vollkommen ruhig und war nie und da ein leichtes Rasseln zu hören. Der Anfall selbst besteht in rasch auf einander folgenden Hustenstössen, welche von Zeit zu Zeit von einer ziemenden Inspiration unterbrochen werden. Während der Dauer desselben nimmt das Kind eine vorgebeugte Stellung ein. Je rascher die Stösse auf einander folgen, d. h. je schärfer inspirirt wird, um so mehr tritt das Bild der Suffocation (Stichkusten) hervor, eine dunkle, etwas cyanotische Röthe des Gesichts und Halses, strömende Pulse der Haltnerven, Cyanose der sichtbaren Schleimhäute, besonders der Zunge, Thränen der Augen, Nasenbluten, Eklchyosen unter der Conjunctiva und im subcutanen Bindegewebe des Gesichts sind häufige Begleiter und Folgen. Die Action der bei der Respiration theilnehmenden Muskeln ist erheblich verstärkt, zumal die der Bauchmuskeln und der gewölbten harten Sternocleidomastoidei. Nur während der ziemenden Inspirationen erfolgt ein momentaner Nachlass der erwähnten Erscheinungen, welchem mit der neu beginnenden Reihe von Hustenstössen sofort wieder eine Steigerung folgt. So wiederholt sich die Aufeinanderfolge suffocatorischer Hustenstösse und jäher Inspirationen 3—6 mal, auch noch häufiger, und nach einer Dauer von 2—3 Minuten endet der Anfall entweder ohne oder

häufiger mit Auswürgen von reinem oder blutig tingirtem Bronchialschleim und Speiseresten, wobei viele Mütter mit ihren in die Mundhöhle eingeführten Fingern zu Hilfe kommen. Fast immer beobachtet man nach ganz kurzer Pause noch einen zweiten schwächeren Anfall, welchem selbst noch ein dritter folgen kann, so dass der ganze Paroxysmus eigentlich aus 2 oder 3 schnell auf einander folgenden Anfällen besteht. Nun erst tritt eine vollständige Ruhe ein. Während manche, besonders kleine Kinder in höchster Erschöpfung daliegen, fahren ältere fast unmittelbar in ihren Beschäftigungen fort, als ob nichts vorgefallen wäre. Merkwürdig ist besonders der geringe Einfluss der häufigen nächtlichen Anfälle. Die Kinder fahren in die Höhe, machen ihren Anfall durch und schlafen dann sofort wieder ein, ohne durch die häufige Unterbrechung des Schlafes wesentlich beeinträchtigt zu werden. Nimmt man während des Anfalls eine Untersuchung des Thorax vor, so kann man selbst während der gespanntesten Inspirationen kein Vesiculärathmen hören, weil diese alles andere verdecken, und die Luft nicht in der normalen Weise in die Bronchien eindringen kann.

Die Zahl der innerhalb 24 Stunden erfolgenden Anfälle ist sehr wechselnd. Während manche Kinder im ganzen Verlaufe der Krankheit es höchstens auf 10–12 Anfälle täglich bringen, steigt die Zahl derselben bei anderen auf 30–60, wobei freilich meistens alle Phasen oder Reizen, die, wie oben erwähnt wurde, einen vollständigen Anfall bilden, gezählt zu werden pflegen. Sie begreifen, dass mit der Zahl auch die Gefahr der Krankheit wachsen muss, theils durch die immer mehr sich geltend machende Erschöpfung, theils durch die sich stets wiederholenden Störungen im Venensystem, welche jeden Anfall begleiten und von eraser Bedeutung werden können. Mit Recht giebt daher Troussseau den Rath, die Zahl der Anfälle durch Striche auf einer Tafel zu notiren, um dadurch einen Maassstab für die Zu- und Abnahme, und damit für die Gefahr der Krankheit zu gewinnen. Wenn auch die Anfälle meistens spontan eintreten, so werden sie doch durch Gemüthsaffecte (Weinen, Schreien), durch den Uebergang aus der liegenden in die aufrechte Stellung, zuweilen auch durch Anfüllung des Magens leicht hervorgerufen. Die Zunahme der Frequenz in der Nacht, so wie beim Weinen, Lachen und Schreien, erklärt sich vielleicht durch die gehemmte Ausscheidung der Kohlensäure unter diesen Verhältnissen. Auch durch einen Druck auf den Larynx oder durch die Percussion gelingt es mir gewöhnlich, beiwils der klinischen Demonstration einen Anfall zu erzeugen. Bemerkenswerth ist, dass wenn eine Anzahl solcher Kinder in einem Raum, z. B. in einem poliklinischen Locale, sich bei-

sammen finden, der Anfall des einen sehr leicht auch bei den anderen Anklang findet und nun ein allgemeines Husten erfolgt.

Die zwischen den Anfällen liegenden Intervalle sind beim einfachen Keuchhusten völlig frei von krankhaften Erscheinungen. Husten findet gar nicht statt, die Respiration ist ruhig, und die Untersuchung ergibt entweder ein normales Athmegeräusch oder höchstens sparsame katarrhalische Rhinö. Man merkt eben die Krankheit nur an der schon erwähnten leichten oedematösen Schwellung der Augenlider und an der Erweiterung der kleinen Venen im Umkreise der Augen, welche sich nach längerer Dauer in Folge der immer wiederkehrenden Stauungen einstellen pflegt. Aus derselben Quelle stammen die Nasenblutungen, die blutigen Sputa (Bronchialblutung) und die Eklhymosen unter der Conjunctiva, welche zwar meistens nur fleckweise auftreten, aber auch eine bedeutende Ausdehnung erreichen können, so dass ich die Cornea rings herum von einem die ganze Sclera überdeckenden Bluterguss umgeben, die Conjunctiva palpär. blutig auffand und beide Augenlider schwarzblau gefärbt sah. Der Druck der während der Anfälle eintretenden Stauung kann sich aber auch auf andere Weise äussern. Bei einem mit Ekzem des Ohrs behafteten Kinde sah ich in jedem starken Anfall eine Blutung aus der kranken Hautpartie erfolgen. Auch Blutung aus dem äusseren Ohr kam bisweilen vor und erklärt sich aus einer Ruptur des Trommelfells, welche, zumal bei schon vorhandener Otitis externa, durch den Stoss der während des Hustens stark comprimierten und durch die Tuba in die Trommelhöhle getriebenen Luft bedingt wird. Diese Rupturen heilen inless fast immer ohne Residuen, und Fälle von Eiterung der Trommelhöhle in Folge dieses Vorganges gehören zu den Ausnahmen. Barrier beobachtete eine Blutung zwischen Dura mater und Arachnoidea in Folge des Anfalls, und ich selbst theilte Ihnen bereits (S. 235) einen Fall von Hemiplegie mit, die während eines Keuchhustenanfalls entstanden war und ohne Zweifel auf eine Hämorrhagie im Gehirn bezogen werden musste¹⁾. Als Folge der gewaltsamen expiratorischen Stöße werden auch nicht selten Hernien und Prolapsus ani beobachtet; ja Cadot²⁾ beschreibt einen Fall von Ruptur des Rectus abdominis mit Bildung eines grossen Tumors unter den Bauchdecken, welcher sich allmählig wieder zurückbildete.

Bei sehr vielen Kindern, welche längere Zeit am Keuchhusten ge-

¹⁾ S. einen ähnlichen Fall von Hemiplegie und Aphasie im Jahrb. f. Kinderheilk. 1878. Bd. X. S. 400.

²⁾ L. c. II. p. 306.

litten haben, beobachtet man eine weißlich-grüne Erosion oder tiefere Ulceration des Zungenbändchens, welche eine partielle oder totale Zerstörung desselben herbeiführen kann. Der Umstand, dass dies Geschwür mit sehr seltenen Ausnahmen nur bei solchen Kindern vorkommt, welche bereits Schneidezähne besitzen, beweist schon, dass die immer wiederholte Friction, welche das Bändchen während der Anfälle durch das Herausschleiden der Zunge über die unteren mittleren Schneidezähne erleidet, die Ursache dieser Ulceration ist. Aus demselben Grunde habe ich die letztere ein paar Mal auch an der unteren Fläche der Zungenspitze, oder neben dem Frenulum und sogar auf dem Rücken der Zunge beobachtet, wo dann die Verletzung auf die unteren seitlichen oder auf die oberen Incisoren zu beziehen war. Das Geschwür ist indess auch bei Kindern, die bereits Zähne haben, durchaus nicht immer vorhanden, und es kommt wohl besonders darauf an, ob das Bändchen lang und schlaff, oder kurz und straff ist, in welchem Falle das Herausschleiden der Zunge während des Anfalls und daher die Reibung an den Zähnen nicht in dem Maasse stattfindet, um das Epithel des Frenulum abzustreifen. Seitdem ich meine Aufmerksamkeit mehr auf diesen Punkt richtete, kommen mir auch hie und da Fälle von ganz analoger Ulceration des Zungenbändchens bei Kindern vor, welche entweder gar nicht husten oder nur an einem gewöhnlichen Bronchialkatarrh leiden, aber ungewöhnlich schneidige Zähne haben.

Die Dauer des Akutstadiums beträgt im Durchschnitt 4 Wochen, wobei in der letzten Zeit die nächtlichen Anfälle schon an Intensität und Frequenz erheblich verlieren. Nach und nach erlischt der krankhafte und suffocatorische Charakter des Paroxysmus, die gemessenen Inspirationen werden kürzer und schwächer, das terminale Würgen hört auf, und so erfolgt fast unmerklich der Uebergang in das (dritte) Stadium decrementi, welches man wieder als ein katarrhalisches bezeichnen könnte. Man hat es hier eben nur mit einem losen Husten zu thun, der noch durch gewisse Züge, besonders durch eine Tendenz zum Auftreten in Paroxysmen und durch eine ungewöhnliche Gesichtsröthe an die Pertussis erinnert. Nach etwa 2 bis 3 Wochen schwindet auch dieser Husten, und das Kind tritt nun in volle Convalescenz. Die ganze Krankheit hat daher eine mittlere Dauer von 8 bis 9 Wochen, und der Volksglaube, dass der Keuchhusten nicht unter 18 Wochen heile, ist ein unbegründeter. Allerdings sprach ich nur von einer Durchschnittsdauer, denn jedem Arzte werden Fälle bekannt sein, welche sich 3 bis 4 Monate hinzogen. Die Krankheit bildet aber dann fast nie ein Continuum, sondern nimmt inmitten des Stadium decrementi unvermuthet

Weise wieder einen neuen Aufschwung und dauert dann natürlich viel länger. In vielen Fällen bleibt auch nach dem völligen Abklingen der Pertussis ein chronischer Katarrh der grossen Bronchien zurück, und jede durch eine zufällige Erkältung oder durch andere Einflüsse (z. B. Masern) herbeigeführte Steigerung desselben bedingt auch wieder den Eintritt von Hustenanfällen, deren Charakter immer noch an den Keuchhusten erinnert. Wie Killiet und Barthez sah auch ich noch nach einem halben, ja ganzem Jahre seit dem Beginn der Krankheit plötzlich wieder solche Anfälle eintreten. Bei einem Kinde dauerte der Keuchhusten vom Juli 1881 bis in den Januar 1882, worauf eine dreiwöchentliche vollständige Pause eintrat. Dann begann der Husten von neuem und erreichte im Februar eine solche Intensität, dass während der nächtlichen Anfälle mitunter ein Theelöffel voll Blut entleert wurde. Die Annahme einer ganz neuen Erkrankung ist hier wohl nicht gerechtfertigt; man hat es vielmehr mit Hustenparoxysmen zu thun, welche durch einen neuen Reiz auf die Schleimhaut ausgelöst werden und aus „aller Gewohnheit“, die ja bei Neugeborenen eine so grosse Rolle spielt, wieder den spasmodischen Charakter annehmen, aber schon nach kurzer Zeit dem gewöhnlichen Katarrh wieder Platz machen. Eine wirkliche zweite Infektion und Erkrankung am Keuchhusten habe ich selbst noch nie beobachtet, und musste auch alle Fälle, welche mir von den Angehörigen als solche mitgetheilt wurden, als sehr zweifelhaft betrachten. So mancher einfache aber langwierige Tracheal- und Bronchialkatarrh wird von den Eltern für Keuchhusten gehalten, zumal wenn der Husten, wie dies manchen Kindern eigenthümlich ist, einen rauhen oder leicht pfeifenden Beiklang hat.

Dieser einfache, bisher geschilderte normale Verlauf des Keuchhustens zeigt nun nicht selten wesentliche Abweichungen, welche sowohl den Anfall selbst, wie das Intervall betreffen und über an und für sich nicht gefährlichen Krankheit eine sehr ernste, das Leben bedrohende Schwere verleihen können.

Betrachten wir zunächst die Varietäten des ersteren, so muss ich Sie auf die ungünstige Bedeutung derjenigen Anfälle aufmerksam machen, welche sich durch eine längere Apnoe auszeichnen, in denen nur gehastet, höchst selten oder fast gar nicht inspirirt, daher auch kein glockender Ton gehört wird. Sie beobachten diese Fälle besonders bei kleinen Kindern im ersten Lebensjahr, die keineswegs vom Keuchhusten verschont bleiben; vielmehr beobachtete ich die Krankheit schon bei einem 3 Wochen alten Kinde, dessen Geschwister an derselben litten. Die Cyanose erreicht dann schnell den höchsten Grad, die Suffocation

ist drohend und kann in der That lethal werden, besonders wenn noch ein diffuser Katarrh oder gar eine Bronchopneumonie die Krankheit complicirt. Unter diesen Umständen kommt es bisweilen schon während des Anfalls oder gleich nach demselben zu partiellen Krämpfen (Verdrehen der Augen, Contracturen der Finger, Zehen, Arme u. s. w.) oder selbst zu allgemeinen und tödlichen Convulsionen, sei es nun in Folge der andauernden verödeten Stauung im Gehirn, oder der Anhäufung von Kohlensäure im Blute, die bei dem Mangel ausgiebiger Inspirationen eintreten muss. Dabei kann ich jedoch nicht unerwähnt lassen, dass das Giemen im Anfall sowohl bei älteren wie bei jungen Kindern fehlen kann, ohne dass dadurch eine üble Prognose begründet wird, so lange nämlich die Anfälle kurz sind und die Cyanose, wie die suffocatorischen Erscheinungen, den gewöhnlichen Grad nicht überschreiten oder sogar schwächer auftreten. Solche Fälle kommen nicht ganz selten vor und können bei dem Arzte sogar Zweifel erregen, ob wirklich ein Keuchhusten vorliegt. Es fehlt eben dem Anfall ein charakteristischer Zug, oder derselbe ist nur leicht angedeutet, während alle anderen Charaktere des Anfalls vorhanden sind, und dabei gleichzeitig ein analoges Leiden der Geschwister stattfindet.

Durch die häufige Wiederholung der oben erwähnten schweren, die Kohlensäureausscheidung stark beeinträchtigenden Anfälle können nun auch Cerebralsymptome herbeigeführt werden, welche in den Intervallen fortdauern und unter der Maske einer Meningitis den Tod herbeiführen:

Wilhelm H., 1 Jahr alt, aufgenommen am 14. Febr. 1873 mit *Tussis convulsiva*, Anfälle von grosser Intensität mit langer Apnoe und epileptiformen Krämpfen, welche anfangs nur im Paroxysmus, vom 28. an aber auch im Intervall auftreten. Am 8. März wird zuerst Strabismus convergens auf beiden Augen und starrer Blick, am 7. wiederholte Kaubewegung beobachtet. Vom 18. an Somnolenz, starke Retroversion des Kopfes durch Contractur der Nackenmuskeln, am 19. auch Contractur beider Arme im Ellenbogengelenk, sowie der Beugmuskeln der Unterschenkel bei sehr zunehmendem Sopor, in welchem am 23. der Tod erfolgt. Vom 9. März an bestand resultirende Fieber (Mg. 38,4—38,8; Ab. 39,2—39,7), als dessen Quelle eine doppelseitige Bronchopneumonie der Unterlappen constatirt wurde. Rechtsseitig bildeten sich die Eiseisungen allmählig ganz zurück. Mit dem Einsetzen des Sopors wurden die Keuchanfallsfälle schwächer, aber nicht seltener, während die Cyanose erheblich zunahm, die K. nicht unter 20—30 sinkt, schwach und unregelmässig wurde, die Temperatur der extremen Theile abnahm und Desultes am Hinterkopf und Kniebein sich entwickelte.

Sie finden hier also Strabismus, Starrheit des Blickes, Kaubewegungen, Contracturen und Sopor — ein Complex von Symptomen, der bei einer dreitäglichen Dauer nicht zur Diagnose einer tuberkulösen Meningitis bestimmt, und doch ergab die Section eine starke Hypertrophie der Gehirnhäute und der Pia,

stellenweise Oedem der Leisten. Im linken Unterlappen bestand Bronchopneumonie, in der rechten Lunge nur ein diffuser Katarrh. Sonst erreichten alle Organe völlige Gesundheit. Wir sehen hier also eine Stauungshyperämie im Gehirn und in der Pia, vorzugsweise aber die in Folge der enormen Hustenanfälle und der Bronchopneumonie sich entwickelnde Sclerosemeningitis das täuschende Bild der Bacteriämie hervorrufen. Die beschleunigte Respirationsfrequenz von 50–60 und die stets zunehmende Cyanose sprechen entschieden zu Gunsten dieser Ansicht.

Fast noch größere Gefahren als der Anfall selbst birgt das Intervall. Unter allen Complicationen des Keuchhustens steht an Häufigkeit obenan der diffuse Bronchialkatarrh und die aus demselben hervorgehende Bronchopneumonie (S. 335). Wenn daher ein an Keuchhusten leidendes Kind in den Intervallen der Anfälle nicht vollkommen gesund erscheint, vielmehr schnell und oberflächlich athmet, eine schließende Expiration zeigt und dabei fiebert, so können Sie sofort auf diese Complication schließen, und die Untersuchung des Thorax wird diese Vermuthung bestätigen. Obwohl die Bronchopneumonie eine Menge keuchhustenkranker Kinder heimsucht, darf man doch nie die Hoffnung aufgeben. Selbst kleine Kinder und sehr löse Fälle mit ausgedehnten doppelseitigen Verflüchtungen sah ich nach wochenlangen Schwankungen, nachdem sie wiederholt aufgegeben waren, noch vollständig genesen. Nur ausnahmsweise beobachtete ich fibrinöse Pneumonie und Pleuritis, während Emphysem der Spitzen und Ränder in Verbindung mit den ausgedehnten pneumonischen Verflüchtungen fast nie vermist wurde. Die hin und da beschriebene Ruptur einzelner ausgedehnter Lungenalveolen mit nachfolgendem interlobulären Emphysem, welches sich vor hier aus über den Lungenhilus nach dem Halse und über einen grossen Theil des Rumpfes ausbreiten kann, oder gar Pneumothorax habe ich selbst nie beobachtet. Wohl aber sah ich bei einem an Phthisis leidenden Kinde während des Pertussisanfalls ein tuberkulöses Geschwür des rechten Hauptbronchus reißen, worauf sich sofort ein starkes Emphysem im subcutanen Bindegewebe des Halses und der Brust ausbreitete.

Die den Keuchhusten complicirende Bronchopneumonie hat, wie ich schon (S. 316) erwähnte, die Tendenz, in einen chronischen Zustand überzugehen und Monate lang zu dauern, wobei die Hustenanfälle in unverminderter Stärke fortbestehen können. Gerade in diesen Fällen fand ich auch dem Tode öfters Erweiterung und partielle fertige Degeneration des rechten Herzens. Veränderungen, die sich aus der anhaltenden venösen Stauung und aus den Widerständen im Lungenparenchym, welche das Herz zu überwinden hat, erklären lassen. Oedem der Hand- und Fessrücken und unerwartete plötzliche Todesfälle durch Collaps oder Synkope kamen mir unter diesen Umständen wiederholt vor. Durch

die Herzschwäche erklärt sich wahrscheinlich auch die enorme Pulsfrequenz, welche mir im Laufe mancher den Keuchhusten complicirenden Bronchopneumonie bei verhältnissmässig niedriger Temperatur auffiel. Dasselbe darf zwar, wie der folgende Fall lehrt, nicht gleich als lethales Symptom aufgefasst werden, lässt aber immer durchblicken, wie leicht bei dieser Sachlage eine plötzliche Erschöpfung der Herzaction eintreten kann:

Margaretha B., 1 1/2 Jahre alt, aufgenommen am 13. Juli 1876 mit Parotitis und einem von etwa 4 Wochen bestehenden Keuchhusten. Seit 5 Tagen bronchitische Symptome mit starker Dyspnoe, Blasen und hiernächst geringe Dämpfung mit unbestimmtem Athmen und bläschenartigen Rasselgeräuschen, Hustenattacken nur selten, auch in der Nacht. Vom 18. an wurde die Respiration ruhiger, die Dämpfung schwand, und man hörte hinten nur noch Schnarren und Pfeifen, während die Keuchhustenanfälle, von Erbrechen begleitet, wieder stärker hervortraten. Vom 21. an fortschreitende Erholung, Appetit, keine Dyspnoe mehr. Am 24. Entlassung. Keuchhusten noch fortbestehend. Während dieses Verlaufs beobachteten wir das folgende Verhältnisse des Pulses, der Atmung und Temperatur:

	P.	R.	T.
13. Juli	200	60	38,6
14. "	180	60	38,0—37,5
15. "	164	50	38,5
16. "	168	64	37,0—38,0
17. "	144	56	37,5—38,2
18. "	136	52	38,0
19. "	112	40	37,2
20. "	116	40	37,0
21. "	120	34	37,3
22. "	108	30	37,5

Als Nachkrankheiten der Tussis convulsiva bleiben nicht selten chronische Bronchialkatarrhe und Lungenphthisis zurück, welche aus einer in Verkäsung übergehenden chronischen Bronchopneumonie sich entwickelte. In Folge der Hyperplasie und Verkäsung der Bronchialdrüsen, die in langwierigen Fällen von Keuchhusten von dem begleitenden Katarrh der Schleimhaut her angeregt wird, kommt es auch hiervon nach Jahren, wenn der Keuchhusten selbst schon längst vergessen ist, zur raschen Entwicklung der acuten Miliartuberkulose oder der tuberkulösen Meningitis. Endlich sei noch erwähnt, dass ich in mehreren Fällen eine der rachitischen sehr ähnliche Verbildung des Thorax, nämlich eine stark entwickelte Hühnerbrust, in Folge des Keuchhustens zu Stande kommen sah, und zwar bei zuvor ganz normal gebauten, keinesfalls rachitischen Kindern. Die unregelmässigen Inspirationen und die daraus resultirende unvollständige Ausdehnung der Lunge während der Anfälle, zumal aber eine Complication mit chronischer Broncho-

permutire, welche diese Missverhältnisse längere Zeit unterhält, erklären, wie ich meine, das Zustandekommen dieser Formveränderung. —

Von den aetiologischen Verhältnissen der Pertussis wissen wir so gut wie nichts. Sicher ist, dass die Krankheit schon in der frühesten Kindheit vorkommt; ich selbst habe sie bei Kindern von 3 resp. 6 Wochen, welche von älteren Geschwistern inficirt waren, beobachtet. Ihre grösste Frequenz fällt in das 2. bis 6. Lebensjahr, doch werden häufig auch ältere Kinder, sehr selten aber Erwachsene befallen. Im Frühjahr 1878 beobachtete ich den Keuchhusten bei einem jungen Menschen von 16 Jahren, der beim Confrimandenaunterricht von Anderen inficirt sein wollte, und später nicht nur seine beiden Schwestern von 12 und 14 Jahren, sondern auch die 35jährige Mutter ansteckte. Bei der letzteren trat indess die Krankheit nur in der Form eines in heftigen Paroxysmen mit leichter Cyanose auftretenden katarrhalischen Hustens auf, während bei den jüngeren Patienten deutliches Gienem auf zum Theil auch ziemlich starke Hämoptysen und terminales Erbrechen beobachtet wurde.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass der Keuchhusten contagios ist und von einem Kinde leicht auf das andere übertragen wird, so dass gewöhnlich mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig an demselben leiden. Um so unerklärlicher ist der Umstand, dass ich in meiner Klinik, wo die an Pertussis leidenden Kinder nicht isolirt liegen, nur ausnahmsweise einen Fall von Uebertragung beobachtet habe. Lohr die Dauer des Incubationsstadiums besitze ich keine sicheren Erfahrungen, sah aber wiederholt, dass wenn ein Kind die Krankheit aus der Schule in die Familie einschleppte, mindestens 10 bis 12 Tage vergingen, ehe der Husten bei den Geschwistern sich meldete. Die Annahme, dass das Contagium mit der eingeathmeten Luft auf die Respirations Schleimhaut gelangt und von hier aus seine Wirkung entfaltet, liegt sehr nahe, und es könnte denn nicht fehlen, dass Bakterien auch als Ursache des Keuchhustens beschrieben wurden. So wahrscheinlich auch diese Annahme ist, hatte ich doch die von Leitznerich¹⁾ im Auswurfe der Pertussiskranken gefundenen, und zur Impfung auf die Trachea von Kanarienvögeln benutzten Sporen und Fäden in zötiologischer Beziehung für etwas problematisch, wie die Annahme von Tschamer²⁾, dass ein auf den Schalen von Orangen und Äpfeln vorkommender Pilz, sobald er in die Luftwege gelangt, den Keuchhusten produciere. Mit der Auflösung des-

¹⁾ Jahrb. f. Kinderkrankh. 1870. III. S. 534; 1873. S. 436.

²⁾ Ibid. 1876. X. S. 174.

selten als einer Infektionskrankheit hängt es dann auch zusammen, dass man ihm ein fieberhaftes Vorstadium, analog dem Prodromallieber der acuten Exantheme, zuerkennt. Ich halte dies aber für einen Irrthum, welcher darauf beruht, dass das erste Stadium, wie jeder andere Katarrh, auch mit grösserer Intensität auftreten und dann von Fieber begleitet sein kann. Schon Troussseau¹⁾ spricht von einem sehr heftigen febrilen Katarrhalstadium, und ich selbst habe dies wiederholt beobachtet.

Die Einwirkung, welche das uns noch unbekannte Contagium von der Bronchialschleimhaut her ausübt, beschränkt sich nicht auf die Erzeugung eines gewöhnlichen Katarrhs der Trachea und der Bifurcationsstelle, wie Manche behauptet haben. Dass ein solcher Katarrh vorhanden ist oder wenigstens vorhanden sein kann, bestreite ich gewiss nicht, und einige laryngoskopische Untersuchungen haben denselben in der That wenigstens auf der Larynxschleimhaut nachgewiesen²⁾. Aber jeder, der einen Keuchhustenanfall nur einmal gehört hat, muss sich sagen, dass hier ausser dem Katarrh noch etwas Anderes, und zwar ein verräthes Element, in Betracht kommt, was eben dem Anfälle sein charakteristisches Gepräge giebt, und sich einerseits durch die krampfhaften expiratorischen Stösse, andererseits durch die Apnoe und den gremelnden Ton des Spasmus glottidis bekundet. Ich erinnere Sie ferner an die (S. 392) als Aura des Anfalls beschriebenen Erscheinungen und an das fast constante Erbrechen. Ich gehe an, dass das Würgen und Erbrechen von Schleim am Schlusse der heftigen Anfälle einfach als ein mechanischer Act, als Folge der heftigen Contraktionen der Bauchmuskeln während der Hustenanfälle betrachtet werden kann, denn man beobachtet dasselbe auch nicht selten, wenn der Magen stark gefüllt ist, bei anderen heftigen Hustenparoxysmen, welche mit der *Tussis convulsiva* nichts zu schaffen haben. Man bedenke aber, dass manche Kinder schon bei ganz leichten Anfällen der Pertussis brechen, dass ferner Fälle vorkommen, in welchen das Erbrechen das hervorstechendste Symptom des Anfalls bildet und durch seine Constanz sogar ernstliche Besorgnisse erregen kann. Mir begegneten nicht selten Kinder, die nach einem kurzen, nicht einmal von Gimen begleiteten Anfall sofort den ganzen Mageninhalt entleerten, während andere sogar in den Intervallen der Paroxysmen alles Genessene wieder ausbrachen und allmählig in einen bedenklichen

¹⁾ Clinique, I. 497.

²⁾ Rehn (Wiener med. Wochenschr. 1896, 52 u. 53) und Meyer-Hani (Zeitschr. für klin. Med. Bd. I. Heft 3) beschreiben diesen Katarrh, während Hirsbach (Bull. Min. War. medic. 18. 1880) denselben nicht constatiren konnte.

Schwächezustand verfielen, ohne dass in den Verdauungsorganen selbst ein Grad dafür aufzufinden war. Ein solches Erbrechen kann doch nur als ein nervöses aufgefasst werden. Auch die oben (S. 396) erwähnten Recidive, die gewiss nicht von einer neuen Einwirkung des Contagiums herrühren, sprechen für diese Ansicht. Die Verhältnisse liegen hier ähnlich, wie beim einfachen Glottiskrampf, welcher auch Wochen und Monate lang verschwunden sein kann und dann unter dem Einfluss irgend einer erregenden Ursache, z. B. eines Katarrhs, einer Diarrhoe, plötzlich wieder eintritt. Ob nun eine, durch den Vagus vermittelte, erhöhte reflectorische Reizbarkeit der Medulla oblongata die Schuld trägt, und auf welche Weise gerade dies spezifische Contagium einen solchen Einfluss auf das Centralnervensystem ausübt, dies ist eine bis jetzt noch ungeklärte Frage. So viel steht fest, dass die pathologische Anatomie uns darüber keine Aufklärung giebt, und dass alle Veränderungen, welche man bei den Sectionen findet, besonders auch die Hyperplasien der Bronchialdrüsen, nur als Folgen oder als Complicationen der Krankheit betrachtet werden müssen. —

Der Keuchhusten tritt häufig in mehr oder weniger ausgebreiteten Epidemien auf, welche sich im Allgemeinen nicht an bestimmte Jahreszeiten binden. Eine schon von West hervorgehobene Beziehung zu den Masern lässt sich nicht verkennen. Nicht bloss die Combination oder Succession beider Epidemien wird öfters beobachtet, sondern auch das einzelne Individuum, welches an einer dieser Krankheiten leidet, schien mir eine besondere Disposition zu der anderen zu besitzen. Die Combination dieser beiden Infectionskrankheiten in einem und demselben Individuum halte ich immer für eine bedenkliche, weil ich in diesen Fällen fast durchweg eine ausgedehnte und besonders hartnäckige, zum chronischen Verlauf neigende Bronchopneumonie entstehen sah. Noch schlimmer ist es, wenn ein bereits an Pertussis und Bronchopneumonie leidendes Kind noch von den Masern befallen wird. Ich sah in solchen Fällen schon vor dem Ausbruche des Exanthems eine Cyanose sich bemerkbar machen, der hervorstechende Masernausschlag wurde sofort bläulich, und schon nach wenigen Tagen erfolgte unter den Erscheinungen der Kohlensäurevergiftung der Tod. Ernst erschien mir auch die in der Klinik nicht selten beobachtete Combination des Keuchhustens mit Diphtherie, bei welcher man aber nicht gleich den Muth verlieren darf. Bei einem 11-jährigen Mädchen z. B., wo bereits eine absolute Stimmlosigkeit die Gefahr eines Ubergangs auf den Larynx nahe legte, erfolgte trotzdem vollständige Genesung, und ich erwähne dabei, dass hier statt des gewöhnlichen Toes der Inspirationen während des Pertussisanfalls ein ganz rasches,

fast croupales Geräusch gehört wurde, offenbar in Folge der Schwellung und Rauigkeit der Larynxschleimhaut.

Sie werden aus dieser Schilderung ersiehen haben, dass der Keuchhusten, an und für sich eine prognostisch günstige Krankheit, einerseits durch das zarte Lebensalter, welches er bisweilen befällt, andererseits durch gewisse Complicationen (Bronchitis, Bronchopneumonie, Convulsionen) das Leben ernstlich bedrohen kann, und dass selbst nach vollständiger Heilung in den Lungen oder Bronchialdrüsen Residuen zurückbleiben können, welche später den Ausgangspunkt einer Miliartuberculose bilden. —

Mit der Behandlung werden Sie leider keine Ehre einlegen. Schon die enorme Zahl der seit allen Zeiten gegen diese Krankheit empfohlenen Mittel beweist ihre Unheilbarkeit. Ein Mittel, welches dieselbe abzukürzen, besonders das Stadium der Akme zu coarpiere vermag, besitzen wir nicht, während im Stadium decrementi, wenn die Naturheilung beginnt, anscheinend jedes Mittel hilfreich ist. Sie werden mir erlassen, Ihnen hier alle Medicamente aufzuführen, welche ich im Laufe der Jahre, im Vertrauen auf fremde Empfehlungen, versuchte und unwirksam fand. Ich bin jetzt dahin gekommen, mich nur auf ein einziges, das Morphinum, zu verlassen, welches weit besser als die vielgebrauchte Belladonna wenigstens die heftigen Anfälle, besonders die nächtlichen, zu mildern und ihre Frequenz herabzusetzen vermag, freilich ohne den Verlauf der Krankheit im Grossen und Ganzen zu beeinflussen (F. 10). Versäumen Sie aber bei dieser Verordnung nie, besonders in der Armenpraxis, den Müttern einzuschärfen, dass sie, sobald sich ungewöhnliche Schläfrigkeit einstellt, das Mittel sofort ansetzen müssen. Auf diese Weise passirte es mir nur einmal, dass das Kind 18 Stunden lang ununterbrochen schlief, ohne durch Hustenanfälle gestört zu werden, die sich aber nach dem Verschwinden der Narkose sofort wieder einstellten. Ausserdem erlebte ich noch in einem anderen Falle, welcher ein sechs Monate altes Kind betraf, durch einen noch ungeklärten Zufall eine wirkliche, mit Collaps, Verengerung der Pupillen und Sopor einhergehende Vergiftung, welche durch kalte Begiessungen und Analeptica glücklich beseitigt wurde. Bei sorgfältiger Handhabung der Arznei habe ich indess noch niemals einen Unfall zu beklagen gehabt, auch wenn Wochenlang 1—2 Theelöffel von der Mixtur täglich gegeben wurden, und ich ziehe daher das Mittel allen anderen Narcoticis, besonders dem gefährlichen Atropin, bei weitem vor. Dennoch empfehle ich Ihnen das Morphinum nur für heftige Fälle, in welchen mindestens 20 Paroxysmen innerhalb 24 Stunden auftreten. In mildereren Fällen mögen Sie die Inhalationen

von Carbonsäure versuchen, die ja auch mit dem Gebrauche des Mucplums combinirt werden können. Diese Einathmungen, welche durch die unzweifelhafte Existenz eines infectiösen Stoffes in den Luftwegen theoretisch gerechtfertigt erscheinen, erfreuen sich in neuester Zeit eines guten Rufes (Burchard, Thorner u. A.). Meine eigenen Erfahrungen gestatten mir indess noch kein endgültiges Urtheil über dieselben, indem sie bald auffallend günstige, bald zweifelhafte, bald gar keine Erfolge aufzuweisen hatten. Nachtheile habe ich wenigstens nie beobachtet. Man kann entweder eine 1–2procentige Carbonsäurelösung mittelst eines Zerstäubungsapparats mehrmals täglich einathmen lassen oder, falls dies Schwierigkeiten macht, die Luft des Kinderzimmers mit der verdunsteten Lösung schwängern, und einen mit derselben getränkten Schwamm über dem Kopfe des Bettes aufhängen, auch bei Tage mehrere Mal einen solchen Schwamm vor die Nase des Kindes halten und die Ausdunstung desselben einige Minuten einathmen lassen. Ueber andere Inhalationen, Chloroform, Benzol, Natrium salicylicum, Ol. terebinthinæ, Tannin, Chinin u. s. w., fehlt mir zwar eine ausreichende Erfahrung; nach dem unbefriedigenden Resultat der bisher von mir angestellten Versuche habe ich aber keine Neigung, dieselben fortzusetzen. Dasselbe gilt vom inneren Gebrauch des Bromkali, des Chloralhydrat und des Chinin, von dem ich bis jetzt nie einen entscheidenden Erfolg beobachten konnte.

Vorläufig werden Sie also auf eine Coöperation des Keuchhustens zu verzichten und den Eltern von vorn herein zu eröffnen haben, dass es sich höchstens um eine Linderung der Anfälle handeln könne. Bei gutem Wetter ist der Genuss der frischen Luft so viel als möglich zu gestatten, dagegen bei rauher windiger Witterung, so wie beim Vorhandensein eines stärkeren Bronchialkatarrhs, entschieden zu verbieten. Ob genug wird die Verabstimmung dieser Vorsicht durch eine Bronchopneumonie gerichtet. Fällt der Keuchhusten in den Sommer, so werden Sie häufig befragt werden, ob ein Ortswechsel dem kranken Kinde förderlich sein könne. Obwohl nun ein Theil der Aerzte dieser Ansicht anhängt und sogar bestimmte Localitäten, z. B. den Aufenthalt an der Nordsee-küste, als besonders günstig bezeichnet, kann ich doch nach den Resultaten meiner eigenen Erfahrungen dieser Ansicht nicht beitreten. So oft ich auch keuchhustenkranken Kinder mit ihren Eltern in Badeorte, sei es an die See oder ins Gebirge schickte, sah ich doch davon fast niemals einen Nutzen. Die Kranken hästeten ruhig weiter, und das einzige, aber unerfreuliche Resultat war in solchen Fällen die Ansteckung gesunder Kinder, welche dort mit den erkrankten in Berührung kamen. Nur ausnahmsweise, z. B. bei meinem eigenen Kinde, sah ich eine sich ent-

wickelnde Tussis convulsiva mit bereits charakteristischen Anfällen in Reichenhall binnen 14 Tagen fast gänzlich verschwinden, kalte aber solche ganz vereinzelt stehende Fälle für durchaus ungeeignet, die günstige Wirkung des Ortswechsels oder einer bestimmten Localität zu beweisen. Wie bei jeder Infektionskrankheit kommen auch beim Keuchhusten sogenannte „abortive“ Fälle vor, die eine weit kürzere Dauer als sonst haben und ohne jede Behandlung überraschend schnell sich zurückbilden. Troussseau spricht sogar von einem solchen Falle, welcher nur 3 Tage gedauert haben soll, und so glaube ich auch den meines eigenen Kindes und ein paar ähnliche behandeln zu müssen. Für die Therapie der Complicationen (Eklampsie, Bronchopneumonie) gelten die für diese Krankheiten gegebenen Vorschriften. Schutz vor dem Keuchhusten könnte nur eine absolute Absperrung der Kinder gewähren, welche in der Praxis kaum durchführbar ist.

Fünfter Abschnitt.

Krankheiten der Circulationsorgane.

I. Die angeborenen Herzfehler.

Wenn die älteren Autoren über Kinderkrankheiten die Pathologie des Gefäßsystems ganz übergangen oder mit wenigen Worten abfertigten, so lag der Grund dafür in der Annahme, dass diese Krankheiten im Kindesalter nur selten vorkämen. Diese Annahme ist aber, wie wir jetzt wissen, höchstens für die Arterien der grossen Gefässe gerechtfertigt, während pathologische Veränderungen des Herzens bei Kindern nicht viel seltener als bei Erwachsenen vorkommen. Da indess das Lebensalter weder anatomische noch klinische Differenzen von wesentlicher Bedeutung begründet, so werde ich mich hier auf eine verhältnissmässig kurze Besprechung dieser Krankheiten beschränken können.

Wie ich eben bemerkte, gehören Erkrankungen der grossen Gefässe bei Kindern zu den grössten Seltenheiten. Wenn Hodgson bei einem 15 Monate alten Kinde eine Oscillation der Temporalarterie, Andral bei einem 5jährigen Mädchen kalkige Platten in der Aorta beobachtete, so sind dies eben Ausnahmefälle, welche ich ebenso wenig beobachten konnte, wie ein Beispiel von Aneurysma der Aorta im Kindesalter. Auch die angeborenen Stenosen der Aorta, welche meistens in der Gegend des Ductus Botalli oder im Anfangstheile der Aorta descen-

dens ihren Sitz haben, wurden weit häufiger im Säuglingsalter oder noch später, als bei Kindern diagnosticirt, obwohl ein Theil derselben mit der Involution des Botallischen Ganges, welche sich auf die Aorta fortsetzt, im Zusammenhang zu stehen scheint. Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, dass die Schliessung dieses Ganges, welcher beim Neugeborenen etwa die Dicke eines Astes der Lungenarterie hat, in Folge einer obliterirenden Endarteritis durch Neubildung von Bindegewebe, Wabstung der Wände und Verengung des Lumens erfolgt. Am 9. Tage nach der Geburt schon merklich, pflegt der Proccss am 14. Tage schon zu einer in der Mitte des Ganges befindlichen Stricture geliehen zu sein, schreitet dann nach beiden Seiten hin weiter fort und ist gewöhnlich bis zum Ende der dritten Lebenswoche vollendet, während die Obliteration des Foramen ovale schon wenige Tage nach der Geburt beendet sein soll. Alle Einflüsse, welche eine mangelhafte Füllung des linken Ventrikels in der ersten Lebenszeit bedingen, wie ausgeblutete Atelektasen des Lungengewebes, totale Pneumonie oder Stenose der Arteria pulmonalis müssen den Schliessungsprocess des Ductus Botalli verzögern, weil unter diesen Umständen das Blut aus der Lungenarterie immer durch den Gang hindurch in die mangelhaft gefüllte Aorta einströmt, und desshalb kann die verzögerte Obliteration des Ductus in solchen Fällen die ablen. Folgen einer sonst unvermeidlichen Stauung im rechten Herzen und im gesammten Venensystem Monate lang compensiren. Dasselbe gilt auch von dem Offenbleiben des Foramen ovale, welches, abgesehen von den oben genannten Ursachen, noch durch locale Anomalien desselben oder seiner Klappe bedingt werden kann.

Es wird Ihnen wohl bekannt sein, dass man das Offenbleiben dieser fötalen Wege, des Ductus Botalli und des Foramen ovale, in früheren Zeiten als die Hauptursache der angebornen Cyanosis cardiaca betrachtete. Da man den Grund derselben in einer Vermischung des arteriellen mit dem venösen Blute suchte, so glaubte man in dem Offenbleiben jener fötalen Wege, so wie in der anomalen Communication beider Atrien oder Ventrikel durch eine in der Scheidewand befindliche Lücke, die Ursache der anomalen Färbung suchen zu müssen. Wir wissen aber jetzt, dass die Cyanose auch da vorkommt, wo eine Vermischung der beiden Blutarten nicht stattfindet, und dass andererseits die erwähnten anomalen Communicationen bei Kindern und selbst bei Erwachsenen gefunden werden, welche im Leben keine Spur von Cyanose dargeboten hatten. Bekannt ist der Fall von Zohetmayer, in welchem die Ventrikelscheidewand ganz fehlte und dennoch keine Cyanose bestand, so wie die Beobachtung von Breschet, welcher die Art. sub-

clavia sinistra aus der Arteria pulmonalis entspringend und nach dem betreffenden Arm normal geführt fand.

Bleiben wir einen Augenblick bei der Cyanose stehen! Von Geburt an oder wenigstens sehr bald nach derselben macht sich ein bläulich violettes Colorit der Wangen, Nasenspitze, Hände und Füße, besonders der Nägel, sowie der sichtbaren Schleimhäute (Zunge, Mundschleimhaut, Nasenringang, Conjunctiva palpebr.) bemerkbar, welches beim Schreien, Weinen, Saugen, bei stärkeren Bewegungen und auch der Einwirkung der kalten Luft erheblich zunimmt, in den Intervallen aber so unbedeutend sein kann, dass Nachfürzte es kaum bemerken. Nach längerer Dauer, besonders schon in den ersten Lebensmonaten, entwickelt sich eine kolbige (trümmelstockähnliche) Anschwellung der Nagelglieder an den Fingern und Zehen, und bisweilen eine klauenförmige Verformung der Nägel. Ein paar Mal fiel mir auch eine schwammige scierotähnliche Beschaffenheit des dunkelvioletten Zahnfleisches auf, welches spontan und bei Berührung leicht blutete und am Rande von den Zähnen abgelöst war. Bei einem 1½-jährigen Mädchen war diese Erscheinung sogar so prävalierend, dass die Mutter nur ihrerwegen in der Klinik Hilfe suchte, die Cyanose aber ganz übersehen hatte. Die Hände und Füße sind nicht selten etwas oedematös gedunsen, die Augen prominent, die Temperatur der extremen Körpertheile gesunken, mitunter bis auf 32 oder gar 28° C., während die Messung im Rectum normale Verhältnisse ergibt. Dann kommt häufig ein Zustand allgemeiner Schwäche, Trägheit der Bewegungen, Neigung zum Schläfe, Zurückbleiben des Wachstums, und endlich der ganze Complex der bekannten, den verschiedensten Herzerkrankheiten eigenen Symptome, Erstickungszufälle, besonders nach starken Bewegungen, Ohnmachten, Anschwellung der Leber und Milz u. s. w. Die physikalische Untersuchung ergibt dabei oft eine deutlich nachweisbare Volumszunahme des Herzens, zumal des rechten, systolische oder diastolische Altergeräusche, pulsatorisches Schwirren, — in selteneren Fällen auch wohl gar keine Atonalität.

Aus jenen Symptomen können wir nun freilich mit Sicherheit auf einen angeborenen Herzfehler schließen, aber die specielle Diagnose der Mischbildung bleibt in den meisten Fällen eine Unmöglichkeit. Ist dies auch für die Praxis ohne Bedeutung, so verdient doch das Bestreben, auch hier die Wissenschaft zu Ehren zu bringen, gewiss hohe Anerkennung. Mir selbst stehen, wie jedem Einzelnen, persönliche Erfahrungen über die congenitalen Herzfehler nur in geringer Zahl zu Gebote. Da ich mich aber auf eine Wiederholung fremder Arbeiten, welche meistens auch nur compilatorischer und kritischer Natur sind, hier

nicht unlassen kann, so verweise ich diejenigen, welche sich für diesen Gegenstand interessieren, auf die umfassende Arbeit von Rauchfuss¹⁾, welcher über ein ungewöhnlich reiches eigenes Material verfügt und fast Alles zusammengestellt hat, was über diese Dinge bekannt ist. Nur erwarte man davon, wie schon gesagt wurde, keinen praktischen Nutzen. Der Verfasser selbst muss wiederholt bekennen, dass alle Bemühungen, für die einzelnen Missbildungen bestimmte diagnostische Kriterien aufzufinden, doch höchstens zu einer „Wahrscheinlichkeitsdiagnose“ führen. Es handelt sich hier entweder um Lücken, durch welche die beiden Vorhöfe oder die beiden Kammern mit einander communiciren, um grössere Defecte, welche in ihrer höchsten Entwicklung einen vollständigen Mangel des Septum begründen, oder um Stenosen und Atresien des Coetus der Lungenarterie, dieser selbst, der Aorta, der Vorhofsmündungen, endlich um Transpositionen der grossen Gefässe, wobei die Arteria pulmonalis aus dem linken, die Aorta aus dem rechten Ventrikel ihren Ursprung nimmt. Die unüberwindlichen Schwierigkeiten, welche sich der Diagnose dieser Anomalien entgegenstellen, werden noch dadurch gesteigert, dass in den meisten Fällen eine Combination zweier oder gar mehrerer Bildungsfehler stattfindet, und dass dabei das von den Ärzten vorzugsweise ins Auge gefasste Symptom, die Cyanosis congenita, vollständig fehlen kann. Nicht jeder angeborene Herzfehler verläuft mit dieser auffälligen Erscheinung. Mir selbst kamen öfters solche Kinder in den ersten Lebensmonaten oder wenigstens im ersten Jahr vor, welche entweder nur an dyspnoischen Zufällen litten oder auch gar keine cardialen Symptome darboten, sondern nur wegen einer Lungen- oder Darmaffection behandelt werden sollten. Hier zur ein Beispiel:

Kind von 30 Tagen, mit Luft hnothorax aufgenommen. Vom 19. bis 21. März 1878 tieferlose Pneumonie des rechten Oberlappens (Temp. 36,1—37,2; Resp. 36—70). Keine Cyanose, keine Anomalie am Herzen hörbar. Die Section ergab ausser der Pneumonie, der Knochenmyelitis und interlobulärer Hepatitis eine heftigste Missbildung des Herzens. Beide Ventrikel communicirten durch eine mächtige Lücke; das Septum fehlte fast ganz, und das der Atrien war sehr dünn. Die Valvula tricuspidalis fehlte, und die Mitralis inserirte sich mit einem Zipfel in der rechten Herzhälfte. Arterien normal²⁾.

Bleiben die Kinder einige Jahre am Leben, so treten freilich in der Regel mehr oder minder ausgesprochene Symptome, und meistens auch

¹⁾ Gerhardt, Handb. d. Kinderkrankh. Bd. IV. 1878.

²⁾ Zu den seltensten Verformungen gehört wohl ein von Barth beobachteter Fall (France med. Juni 1880), in welchem durch die Amputation des Fetus (intensiven Tausch statt des ersten Herztans) eine angeborene Endocarditis schon vor der Geburt entzückt wurde.

Cyanose auf, entweder unter dem Einflusse zufälliger Erkrankungen der Respirationsorgane, oder einer Endocarditis, die sich von den anomalen Löchern oder den congenital erkrankten Klappen und Östien aus ebenso häufig entwickelt, wie es bei Erwachsenen mit alten Klappenfehlern der Fall ist (*Endocarditis recurrens*). Unter diesen Umständen werden die bis dahin latenten Bildungsfehler manifest, und man erkennt nun durch die Untersuchung, welche bis dahin oft noch gar nicht eingenommen wurde, dass es sich um eine längst bestehende Anomalie handeln muss. Am prägnantesten pflegen die Stenosen und Atresien der Lungenarterie oder ihres Conus sich zu gestalten, welche auch die häufigste Ursache der angeborenen Cyanose bilden. In vielen Fällen lässt es sich nicht feststellen, ob die Schrumpfungen und partiellen Atresien dieser Arterie die Folgen einer fötalen Endo- und Myocarditis, oder einer ursprünglichen Hemmungsbildung sind, zu welcher sich erst später ein entzündlicher Process gesellt hat. Immer müssen aber in Folge dieser Stenosen Erweiterungen der rechten Herzhöhlen und erhebliche Stauungen im gesammten Körperkreislaufsystem entstehen, deren Ausdruck eben die Cyanose ist. Dabei überschreitet die Herzdilatation den rechten Sternumrand, der Herztoss wird in weiterem Umfange sichtbar fühlbar und oft von einem fühlbaren Schwere begleitet, und ein systolisches Aftgeräusch ist über dem Herzen, am lautensten über dem Östium der Lungenarterie bis gegen die Clavicula hin, mitunter auch am ganzen Thorax und am Rücken hörbar. Durch das gleichzeitige Bestehen anderer Missbildungen des Herzens können indess Abweichungen der Symptome bedingt werden, welche die Diagnose erschweren, so wie es auch nicht an solchen Beispielen fehlt, in welchen die Herztöne ganz rein ohne Beimischung eines Geräusches gehört wurden. Noch schwieriger gestaltet sich die Localdiagnose anderweitiger Missbildungen des Herzens, und Sie werden mir daher erlassen, hier auf Einzelheiten näher einzugehen, welche sich in der Praxis nur ausnahmsweise als stichhaltig erweisen.

Ueber den Verlauf der angeborenen Herzfehler lässt sich nie etwas Bestimmtes voraussagen. Je stärker die Hindernisse für den venösen Kreislauf sind, und je weniger dieselben durch andere compensatorische Fehler (Lücken in der Scheidewand, Offenbleiben des Ductus Botalli) ausgeglichen werden, um so kürzer wird auch die Lebensdauer des betreffenden Kindes sein. Kinder mit einer sehr bedeutenden Stenose der Lungenarterie gehen früh zu Grunde, auch wenn das Foramen ovale noch offen blieb und keine Cyanose stattfand, während milder starke Stenosen, zumal wenn die fötalen Circulationswege nicht geschlossen oder Lücken in der Scheidewand vorhanden sind, bis in die Finglingsjahre hinein und

länger leben können. Ähnlich verhält es sich mit den Stenosen der Aorta, welche fast alle erst in einer vorgerückten Periode des Lebens beobachtet und zum Theil diagnostiziert wurden. Fieberhafte Krankheiten, z. B. die acuten Exantheme, sah ich wiederholt bei solchen Kindern ohne Nachteile verlaufen. Der lethale Ausgang erfolgt schliesslich wie bei allen Herzerkrankungen, entweder plötzlich synkopal, oder unter dem Einflusse einer an sich nicht lebensgefährlichen Krankheit der Respirationsorgane, eines diffusen Katarths, einer Pneumonie, seltener unter den Erscheinungen der allmählig zunehmenden venösen Stauung und Wassersucht. Auch käsige Pneumonie, die mit ähnlichen Processen in anderen Organen und mit Milientuberkulose verbunden sein kann, kommt als Todesursache bisweilen vor, und die von Rokitsansky behauptete Immunität der Cyanotischen gegen Lungentuberkulose entspricht keineswegs den wirklichen Thatsachen¹⁾. —

Wie bereits erwähnt wurde, entdeckt man bei der Untersuchung mancher Kinder, welche dem Arzte wegen einer ganz anderen Affection vorgestellt worden, zufällig Klappenfehler und deren Folgen, die entweder gar keine subjectiven Symptome, oder höchstens ein kaum beachtetes Herzklappen oder Kurzatmigkeit beim Laufen und Treppensteigen verursachen. Auch die genaueste Anamnese vermag über die Entstehung dieser Affectionen keine Auskunft zu geben, vielmehr sollen die Kinder immer gesund gewesen sein, weder an Rheumatismus, noch an Scharlach, noch an einer eitrigen Brustaffection gelitten haben. Es bleibt also in solchen Fällen trotz des Mangels der Cyanose nichts weiter übrig, als die Annahme eines angeborenen Fehlers. Ich will bei dieser Gelegenheit daran erinnern, dass schon bei kleinen Kindern, sogar bei Neugeborenen, an den Herzklappen, besonders am freien Rande der Mitrals, kleine sphärisch prominirende Blutextravasate vorkommen, welche Laschka schon vor längerer Zeit²⁾ beschrieb. Später hat besonders Parrot³⁾ sich mit diesen Klappenhämatomen beschäftigt, welche er bei Neugeborenen häufig an den venösen Ostien beider Herzhälften in der Form sehr kleiner, aber auch bis kirschkerngrosser, schwarzer oder violetter, kugelförmiger oder conischer Prominenzen antraf. Diese Hämatome, welche auf eine Ruptur intravalvulärer Blutgefässe zurückzuführen sind, liegen immer unter der oberflächlichsten Schicht des Endocardiums, scheinen sehr bald nach der Geburt, vielleicht schon vor derselben zu

¹⁾ Rauchfuss, l. c. S. 92.

²⁾ Virchow's Archiv, Bd. XI, Heft 2.

³⁾ Arch. de physiol. Sc. 4 u. 5, 1874.

entstehen, und bilden sich meistens in den ersten Lebensmonaten zurück, indem ihre Hülle mehr und mehr sich zusammenzieht, während Epithel und Bindegewebe der Umgebung proliferiren. Auch scheinen aus diesen Hämatomen kleine, breit oder gestielt aufsitzende, vom Epithel überzogene harte Knötchen hervorgehen zu können, welche nicht selten an denselben Standorten vorkommen und schon früher von Crayvillhier u. A. erwähnt worden ¹⁾. Es ist also wohl möglich, dass aus einer anormalen Rückbildung solcher Hämatome auch eine Schrumpfung der Klappenränder und damit eine Stenose des Ostium oder eine Insufficienz der Klappe hervorgehen kann, deren Ursprung, wenn man sie bei älteren Kindern entdeckt, natürlich nicht mehr nachweisbar ist. Der Klappenfehler wäre dann kein eigentlich congenitaler, sondern in den ersten Monaten des Lebens entstanden.

Die Behandlung der angeborenen oder in der ersten Kindheit entstandenen Herzfehler kann sich nur auf die Anbahnung einer möglichst ruhigen Lebensweise beschränken, und auch diese Vorschrift stösst bei älteren Kindern, die man dadurch von ihren Spielgenossen trennen würde, auf grosse, selbst unüberwindliche Schwierigkeiten. Auch sonst weicht die Behandlung von derjenigen der organischen Herzkrankheiten in keiner Weise ab.

II. Die erworbenen Affectionen des Herzens.

In einer Reihe von Fällen lässt sich als Ausgangspunkt einer organischen Krankheit des Herzens ein acuter Rheumatismus nachweisen. Die Zeit, in welcher man diese Krankheit im kindlichen Lebensalter für eine grosse Seltenheit hielt, ist längst vorüber. Da ich später noch auf dieselbe zurückkommen werde, so bemerke ich hier nur vorläufig, dass ihr Auftreten bei Kindern im Allgemeinen zwar minder häufig und in milderer Form als bei Erwachsenen beobachtet wird, dafür aber die Complication mit Endo- oder auch Pericarditis nur selten fehlt. Selbst bei ganz leichten, kaum fieberhaften Anfällen des Rheumatismus vernachlässigen Sie niemals die Untersuchung des Herzens; zu Ihrer Ueberraschung werden Sie dann nicht selten peri- oder endocarditische Geräusche hören, auf welche Sie bei der scheinbaren Geringfügigkeit der Affection nicht gefasst waren. Daher ergibt in den Fällen von ausgebildeten Klappenfehlern die Anamnese so häufig, dass einer oder mehrere Anfälle von acutem Rheumatismus, zumal der Gelenke, vor

¹⁾ Eine andere aus der Entwicklungsgeschichte entstammende Deutung dieser „Knötchen“ siehe bei Pott, *Jahrb. f. Kinderheilk.* 1878. XIII. S. 21.

Monaten oder Jahren stattgefunden haben. Die vollständige Uebereinstimmung, welche diese Krankheiten des Klappenapparats und ihre Folgen mit denjenigen der Erwachsenen darbieten, erspart mir ein näheres Eingehen auf ihre physikalischen Zeichen. In Betreff der subjectiven Symptome will ich nur den Umstand hervorheben, dass, wenn auch bei Erwachsenen Fälle von langer Compensation und dadurch bedingter Latenz des Klappenfehlers nicht zu den Seltenheiten gehören, dieselbe mir doch bei Kindern noch häufiger vorkommen schien. Nicht einmal starke Bewegungen beim Spielen und Treppensteigen rufen wahrnehmbare Beschwerden hervor, und in vielen Fällen wurde die Krankheit erst durch die Mutter entdeckt, welche beim Auskleiden und Waschen der Kinder die stürmische Herzhätigkeit bemerkte. Erst mit dem Beginn der Compensationstörung treten dann die ihnen bekannten cardiacen Symptome auf, welche früher oder später ihren lethalen Verlauf nehmen. Auch in anatomischer Beziehung findet kein Unterschied vom erwachsenen Alter statt; hier wie dort finden wir die Erweiterung und Hypertrophie der Ventrikel, die rothbraune Lungeninduration, die hämorrhagischen Infarcte, die Stauungsniere und Stauungsleber, die Vergrößerung und Induration der Milz, das Ödem und die hydrogischen Ergüsse in den Höhlen und in den Lungenalveolen.

Wenn zuz. auch in vielen Fällen der in Folge des Rheumatismus sich bildende Klappenfehler erst nach einer Reihe von Monaten oder Jahren in die Erscheinung tritt, kommen doch andererseits auch Beispiele eines weit stürmischeren Verlaufes vor:

Anna M., 7 Jahre alt, früher stets gesund. Mitte Decbr. 1878 an einer Gelenkrheumatismus, besonders an den unteren Extremitäten, der nur wenige Tage dauerte. Zwischen Weihnachten und Neujahr, als sie sich schon wieder vollständig wohl fühlte, plötzlich sehr Erregtheit mit Herzklopfen, verminderter Urinsecretion und Husten, oft auch Schmerzen in der Herzgegend. Aufnahme in die Klinik am 12. Febr. 1879, also etwa 2 Monate nach dem Beginn der Krankheit. Die Untersuchung ergab: allgemeine Anämie, Catarrh in beiden Unterlappen, besonders im linken; Husten und Dyspnoe. Herzvergrößerung reicht bis zum rechten Sternumrand, nach oben bis zur 8. Rippe, nach links bis zur Mamillarlinie. Herztöne hebelnd und diffus, undeutlicher Spitzenstoss nach aussen von der Mamillarlinie im 5. Intercostalraum. Der erste Herztöne verdeckt durch ein lautes systolisches Blasen, beide Arterientöne rein, ungewöhnlich laut. Puls klein, 120—144, kein Fieber, Urinmenge sehr spärlich, starkes Albuminurie. Am 21. plötzliche Temperatursteigerung auf 40,0, die schnell wieder sinkt und bis zum 24. 37,8 nicht übersteigt. Am Morgen des 22. deutlicher Puls bigeminus; am linken Sternumrande pericarditisches Reiben. Zunehmender Collaps (T. 36,7), leichte Cyanose, extreme Athembeschwerden (84). Tod in der Nacht zum 25.

Section: Herz um das Dreifache vergrößert, beide Ventrikel stark dilatirt und verdeckt. Aortenklappen und Mitralis am freien Rande verdeckt, etwas retrahirt.

und mit granuulösen Vegetationen besetzt. Frische, partielle Synchie der beiden Pericardialblätter an der Vorderfläche des Septum ventriculorum. Diffuser Eosinophil-katarh, Oedem und leucocytäre Infiltration der Lungen.

Auch bei einem 7-jährigen Mädchen, welches im October 1874 einen mit Endocarditis verbundenen leichten acuten Rheumatismus überstanden hatte, fand ich schon im März 1875 nicht bloss die Zeichen einer Mitralinsuffizienz, sondern auch schon eine sehr beträchtliche Hypertrophie und Dilatation beider Ventrikel.

Ebenso bei ein 7-jähriger Knabe (Mai 1882) schon 12 Wochen nach dem Beginn des Rheumatismus eine massive Hypertrophie excentrica mit Veränderungen der Aortenklappen und der Mitralis, und in deren Folge eine starke Hervorwölbung der Praecordialregion dar.

Sie finden hier also einige Monate nach dem ersten Auftreten eines acuten Gelenkrheumatismus bereits die in Folge der Klappenfehler entstandene excentrische Hypertrophie beider Ventrikel zu einem hohen Grade entwickelt. Der Verlauf war so stürmisch, dass im ersten Falle von einer Compensation überhaupt gar nicht die Rede war, und wurde hier durch den complicirenden diffusen Katarh und die sich schliesslich hinzugesellende frische Peri- und Endocarditis auch beschleunigt. Diese „Endocarditis recurrens“ fanden wir fast bei allen alten Klappenfehlern, welche zur Section kamen, mochten dieselben nun angeboren oder, wie in dem obigen Falle, erst später erworben sein. Mitunter lässt sich dieser Vorgang, der in der Regel erst bei der Section erkannt wird, schon klinisch nachweisen:

Im September 1872 behandelte ich ein 5-jähriges bis dahin gesundes Mädchen an einem acuten Gelenkrheumatismus mit Endocarditis, nach dessen Heilung das systolische Geräusch an der Mitralklappe fortbestand, ohne die Euphorie des Kindes zu stören, wovon ich mich nach Jahresfrist, im Noire 1873, überzeugte. Erst im Januar 1875, also etwa 3 Jahre nach dem Beginn der Krankheit, entwickelte sich in dem bereits stark dilatirten und hypertrophischen Herzen eine frische Endocarditis, welche sich durch Fieber, systolisches Geräusch und enorme Dyspnoe kundgab und mit dem Tode endete.

Andererseits lehrt die Erfahrung, dass die Endocarditis rheumatica im Kindesalter besser überwunden wird, und ihre Folgen sich leichter vollständig zurückbilden, als bei Erwachsenen. Während meiner ganzen Praxis sah ich nur bei einem erwachsenen Kranken, welchen ich an Endocarditis rheumatica behandelt hatte, das viele Monate zurückbleibende, ein rauschalisches Timbre darbietende Aortengeräusch endlich ganz verschwinden und, wovon ich mich jetzt noch überzeuge, vollständige Heilung eintreten. Bei Kindern kommt dies häufiger vor, obwohl auch hier in der überwiegenden Zahl der Fälle ein dauernder Klappenfehler zurückbleibt:

Clara F., 3 Jahre alt. Debutir 1871 mit rheumatischem Schmerz und An-

schwellung der Hand- und Fingergelenke befielen; dabei heftiges Fieber, rascher Athem, am Ende der ersten Woche hartes systolisches Rausen an der Herzspitze ohne Veränderung der Percussion. Kataströf der Beweglichkeit. Nach 14 Tagen Schwinden aller Symptome mit Ausnahme des Geräusches, welches erst im Frühjahr 1872 allmählig schwächer wird und im November aporlos verschwunden ist.

Paul H., 6jährig. Anfang Februar 1868 Klagen über Schmerzen im Oberbauch, besonders beim Bücken, Dyspepsie und mässiges Fieber. Am 16. Juni Tod, in welchem das Kind starken Frost bekam. Nach 1 $\frac{1}{2}$ Tagen heftiges Fieber, Schmerz und leichte Anschwellung des rechten Hand- und Fussgelenkes, Flexion im rechten Kniegelenk und Adhäsion des Oberschenkels; beides nur unter heftigen Schmerzen zu überwinden. In den nächsten Tagen wird das Handgelenk frei, dafür aber Schmerzen im linken Oberschenkel mit unmerklicher Beweglichkeit. Fieber mäßig intermittirend, Bronchialkatarrh, Harn frei. Nach einer temporären Besserung aller Symptome neue Steigerung, am 29. heftiges Fieber, lautes diastolisches Geräusch über dem Herzen, besonders in der Mammorgengegend, nach oben verschwindend, Vesicans, Calomel mit Digitalis. Allmähliche Besserung, bis zum 22. März alles normal bis auf Anämie und das hochtönebende diastolische Geräusch. Im Frühjahr 1869 war auch dies vollständig verschwunden, und der Knabe blieb fortan gesund.

Im letzten Fall sehen wir die Endocarditis erst mit der Exacerbation des Fiebers und der übrigen Symptome des Rheumatismus am 29. Februar eintreten, während die ersten 9 Tage der Krankheit ohne Herzaffectio verliefen, und man schon an den Eintritt der Convalescenz dachte. Diese Erscheinung ist keineswegs selten:

Am 19. Jan. 1875 wurde ich bei einem 5jährigen Knaben consultirt, welcher bereits seit einer Woche an einem acuten Gelenkrheumatismus darniederlag. In der Mitte der zweiten Woche trat eine dreitägige Pause des Fiebers und der Schmerzen ein, dann aber plötzlich eine neue Steigerung und mit dieser auch eine Affection des Herzens. Schmerzen in der Herzgegend und ein hartes Reibegeräusch längs des Sternum, welches beiden Tönen nachschleifte, machte eine Pericarditis unweifelhaft. Durch örtliche Blutentziehungen, Einreibungen mit grauer Salbe, Calomel und Digitalis war nach 8 Tagen ein befestigter Nachlass aller krankhaften Erscheinungen erzielt, das Fieber ganz verschwunden, das Reibegeräusch nicht mehr wahrzunehmen, dafür aber wieder ein hartes systolisches Rausen hörbar, welches nach einigen Monaten, als ich das Kind wieder untersuchte, noch fortbestand.

Wie nun in diesen Fällen die Peri-Endocarditis erst nachträglich zu einer neuen Exacerbation des Rheumatismus sich hinzugesellte, so kommen andererseits bisweilen Fälle vor, in welchen eine Endocarditis als das erste Zeichen des Rheumatismus auftritt, und die Gelenkaffection sich erst später bemerkbar macht:

Paul F., 5jährig, kühnte sich seit etwa 12 Tagen kränkelnd, lebte unregelmäßig, verlor den Appetit und schliefte ungewöhnlich schnell. Erst vor 5 Tagen war es dem behandelnden Arzte gelungen, ein systolisches Geräusch an der Spitze zu entdecken, so dass die Diagnose auf Endocarditis gestellt wurde. Am 13. Mai

1875 hinzugehen konnte ich dieselbe bestätigen. Der Knabe klagte abes an diesen Tage meist über Gliederschmerzen, und Abends erfolgte plötzlich der Ausbruch eines multiplen Rheumatismus in den Fingern, Knie- und Armgelenken mit starken Schmerzen, Steifheit, Anschwellung und Schwelligkeit. T. 39—40. In den nächsten Tagen keine Veränderung. Digitalis ohne Einfluss. Vom 20.—22. Mai Schallenwerden neuer Gelenke, verstärkte Dyspnoe, Stimm- und Umgebung bei der Percussion matt, Herzton und Geräusch schwächer, so dass eine Complication mit Pericarditalexsudat anzunehmen war. Tod am 3. Juni durch eine rasche Zunahme desselben, wobei der Puls ganz Hess, die Hautkälte spastisch wurde und die Dämpfungslager sich rasch ausbreitete. Section nicht gestattet.

In diesem Fall sehen Sie also die Endocarditis nicht, wie es gewöhnlich ist, dem Ausbruche des acuten Gelenkrheumatismus nachfolgen, sondern mindestens 5 Tage lang vorausgehen, denn ich glaube, dass das unbestimmte febrile Kranksein, an welchem der Knabe seit 12 Tagen litt, schon von der Endocarditis abhängt, wenn diese sich auch noch nicht physikalisch nachweisen liess. So lange die Endocarditis nicht den Klappenapparat oder die Ostien befallt, können alle abnormen Geräusche fehlen; ja einzelne Fälle von Endocarditis ulceroosa Erwachsener, z. B. im Puerperium, beweisen, dass selbst ulceröse Defecte der Klappen ohne Aftergeräusche bestehen können. Ich werde mich stets der Frau eines Collegen erinnern, welche mindestens zwei Wochen lang keine andere Erscheinung darbot, als ein allgemeines Krankheitsgefühl und ein remittirendes Fieber mit sehr scharfem Pulse, nirgends aber eine Organerkrankung wahrnehmen liess, so sorgfältig auch nach derselben geforscht wurde. Erst nach 14 Tagen entdeckte ich ein mehr und mehr zunehmendes systolisches Blasen am Herzen und stellte die Diagnose auf Endocarditis, welche durch die Section bestätigt wurde. Fälle dieser Art, welche eine Zeitlang nicht erkannt und leicht für Typhus gehalten werden, kommen nun auch bei Kindern vor. Bei einem 3jährigen Knaben, der einige Monate zuvor an einem leichten Rheumatismus gelitten hatte, sah ich eine Endocarditis sich 3—4 Tage lang nur durch hohes Fieber (39,5—40,5) verrathen. Erst dann traten endocarditische und bald auch Reibungsgeräusche auf. Ganz ähnlich verhielt sich der obige Fall (Paul F., S. 414). Da in beiden Fällen beobachtete Complication mit Pericarditis rheumatica, welche keineswegs selten ist, kann durch das Dazwischenschieben ihrer auscultatorischen Symptome die Beurtheilung erschweren:

Emil P., 11 Jahre alt, bei welchem ich am 19. Decbr. 1877 consultirt wurde, war vor circa einer Woche mit heftiger Angina erkrankt. Einige Tage darauf schmerzhaft Anschwellung und Unbeweglichkeit beider Knie- und Kniegelenke, gegen welche Aed. salicyl. 0,5 3mal täglich mit Erfolg gebraucht wurde. Seit vorgestern

plötzlich heftige Schmerzen in der linken Brust und verstärktes Fieber. Puls 112, regelmäßig. Man hört ein lautes systolisches Blasen an der Herzspitze, welches nach oben schwächer wird, und gleichzeitig über der unteren Partie des Brustkorbs ein laute Herztöne begleitendes Reibungsgeräusch, welches sich über das Epigastrium und bis zur Nabelhöhe hin verbreitet. Percussion nicht verändert. Vesicans zwischen Brustwarze und Sternum, Digitalis. Nach weiteren 8 Tagen war das Fieber und das pericardische Reiben vollständig verschwunden, das endocardiale Geräusch aber bestand unverändert fort; auch klagte der Knabe noch über Stiche und Beklemmung und musste während des Sprechens oft abbrechen, um Athem zu schöpfen. Jedoch. Am 3. Januar 1878 Exacerbation des rheumatischen Schmerzes in der linken Schulter. Nach heute besteht das Geräusch an der Mittellinie fort, und ein dauernder Klappenfehler dürfte daher unabwendbar sein.

Carl S., 8 Jahre alt, Ende Dede. 1879 an einem leichten Gelenkrheumatismus mit sehr mäßigem Fieber erkrankt, bekam einige Tage darauf Endocarditis (heftiges Fieber, rascher Athem, Schmerzen in der linken Brust und laute bläuliche Geräusche, welche laute Herztöne begleiten). Eiblane und Digitalis. Nach einigen Tagen waren überhaupt keine Töne mehr, sondern nur zwei Abgerundete hörbar. Vesicans. Zwei Tage später waren die letzteren weniger laut, und die beiden Töne sagten wieder wahrnehmbar, gleichmäßig aber auch ein pericarditisches Schaben am mittleren Theil und am rechten Rande des Sternum. Man dehnte sich nach die Herzdämpfung allmählig über das Sternum aus und überschritt am 13. Januar den rechten Rand desselben um $1\frac{1}{2}$ Ctm., während die Dorsale durch die Entwicklung einer Pneumonie des linken Unterlappens bedeutend gesteigert wurde. P. 150, ziemlich voll, R. 50—60. Trockene Schnupfköpfe, Digitalis, hydropathische Umschläge, bei stärkeren Schmerzen Eiblane aufs Herz. Obwohl die Pneumonie als Pneum. migrans am 17. auch noch den linken Oberlappen befallen hatte, erfolgte dennoch zu unserer Ueberraschung ein allmählicher Nachlass aller drohenden Symptome. Das pericardische Reiben war schon am 13. verschwunden, die vergrößerte Herzdämpfung (Pericardialstomat) ging auf ihre normalen Grenzen zurück, und schon am 25. konnte der Knabe das Bett verlassen. Auffallend blieb jedoch, dass der Spitzentast auch in der rechten Seitenlage immer noch 3—4 Ctm. innerhalb der linken Mammatlinie tastbar war (Adhäsion). Auch jetzt ist diese Erscheinung, wie das systolische Blasen an der Nabelhöhe, noch unverändert, während das diastolische Geräusch kaum noch hörbar ist.

In beiden Fällen gesellte sich also zu einer bereits vorhandenen rheumatischen Endocarditis nach wenigen Tagen noch eine Pericarditis, deren Prognose sich, wenn man nach den physikalischen Erscheinungen urtheilt, der Rückbildung weit günstiger zeigen, als die endocarditischen, wenn auch im zweiten Fall Synechie und Adhäsion des Pericardiums an der Pleura unweifelhaft zurückblieb. In der Regel findet man beim Hinzutreten einer Pericarditis zur Endocarditis das Reibegeräusch zuerst an der Basis des Herzens, während das systolische Blasen vorzugsweise an der Spitze wahrnehmbar ist. Man denke immer daran, dass gerade bei Kindern die Pericarditis erst einige Wochen nach Beginn des Rheumatismus, und zwar ganz plötzlich mit heftigem Erbrechen auftreten

und äusserst rapide mit copiosem Exsudat im Herzbeutel verlaufen kann, während in anderen Fällen, z. B. in den oben mitgetheilten, das flüssige Exsudat nur geringfügig ist, dafür aber reichliche fibrinöse Beschläge der beiden Pericardialblätter stattfinden, welche um so leichter zu dauernden Adhäsionen führen.

Ueber die Beziehung der Chorea zu den rheumatischen Herzaffecti-
onen habe ich mich schon früher (S. 184) ausgesprochen und dabei den Standpunkt festgehalten, dass sowohl die Chorea, wie die Endocarditis, aus einer und derselben Quelle, nämlich dem Rheumatismus, herzuleiten, nicht aber die erstere als von der Herzaffecti-
on allein abhängig zu betrachten sei. Ich berufe mich dabei noch auf die Thatsache, dass das rheumatische Grundübel sehr geringfügig sein, zumal bei Kindern, die nur an vagen Muskel- oder Gelenkschmerzen leiden, ganz übersehen werden kann, und dass erst die Folgen, nämlich Endocarditis und Chorea, zur Kenntniss des Arztes gelangen, welcher dann geneigt ist, die erstere allein für die Neurose verantwortlich zu machen. —

Weit seltener, als der Rheumatismus, geben die Infecti-
onskrankheiten, und zwar besonders das Scharlachfieber, Anlass zur Entwick-
lung einer Peri- oder Endocarditis, welche einen dauernden Klappenfehler hinterlassen kann. Wenn man auch nicht jedes vorübergehende systo-
lische Geräusch bei Scharlach als ein Zeichen von Endocarditis betrachten darf, so kann doch nicht an derselben gezweifelt werden, sobald das Geräusch längere Zeit in gleicher Weise mit einem fieberhaften Zustande besteht. Man beobachtet diese Complication sowohl beim Scharlach selbst, wie auch im Laufe der nachfolgenden Nephritis.

Willy K., 5jährig, aufgenommen am 1. Februar 1876 mit Scarlatina simplex. Das Fieber, welches ohne nachweisbaren Grund noch während der Desquamation fortauerte (Temp. Mg. 38,5; Ab. 38,4), ging bei völliger Euphorie am Ende der zweiten Woche auf 38,5 Abends hinunter. Am 12. Februar wurde zum ersten Mal ein kurzes systolisches Geräusch am Herzen gehört, welches mit jedem Tage deutlicher hervortrat, besonders laut in der Gegend der Herzs Spitze, wobei der 2. Ton in der Pulmonalarterie etwas verstärkt war. Spitzendiastole und Dämpfung normal, P. 126, etwas unregelmässig. In den nächsten Tagen hörte man ausser dem systolischen Geräusch, links vom Sternum in der Höhe der 5. Rippe, auf der Höhe der Inspiration, oft aber auch isochronisch mit der Systole, noch ein kurzes Knurren, dessen Entstehung mir um so weniger klar wurde, als dasselbe während der nächsten Tage bald hörbar war, bald verschwand. Da aber während dieser Zeit die Temperatur Abends wieder 39,8 erreichte, so liess ich 5 Häufige Schrägköpfe auf die Herzgegend setzen und gab innerlich Calomel und Digitalis. Vom 17. an nur noch Abends geringe Temperaturerhöhung, Puls normal, das systolische Geräusch schwächer werdend. Nachdem das Kind noch eine Nephritis mit Oedem und Anurie durchgemacht hatte, war am 22. April das Geräusch an der Herzs Spitze kaum noch hörbar, am 25. ganz verschwunden.

Dass es sich hier wirklich um eine Endocarditis scarlatinosa handelte, wird durch das fortbestehende Fieber, den schnellen, etwas irregulären Puls und das systolische Geräusch bewiesen, welches erst nach 2 Monaten vollständig verschwand. Gerade auf dieses lange Bestehen und die allmähliche Abnahme des Geräusches lege ich einen besonderen Werth, welchen vorübergehende Geräusche, wie ich schon bemerkte, nicht beanspruchen können. Wiederholt beobachtete ich namentlich im Verlaufe einer Nephritis scarlatinosa systolische Geräusche in der Mitralgegend, welche nur 24–36 Stunden hörbar, hiessweilen auch mit Unregelmässigkeit des Pulses verbunden waren und dann spurlos verschwanden, während in anderen Fällen eine Spaltung des ersten Tons oder ein Galopprhythmus der Töne einige Tage oder selbst Wochen lang beobachtet wurde, dann aber verschwand, ohne Residuen zu hinterlassen. Selbst in einem Falle von Synovitis scarlatinosa mit Ausgang in Eiterung des Claviculo-Akromialgelenks, welche durch die Section constatirt wurde, begleitete ein systolisches Blasen nur den hochfieberhaften Eintritt des Leidens, war aber schon am nächsten Tage nicht mehr hörbar, und in der Leiche erschien auch der Klappenapparat vollkommen normal. Dagegen lässt sich nicht in Abrede stellen, dass gerade die scarlatinöse Gelenkaffection, ähnlich der rheumatischen, eine Tendenz hat, sich mit entzündlichen Processen des Endocardium, seltener des Herzbeutels, zu verbinden.

Richard Sch., 6jährig, am 14. Febr. 1875 mit Scharlach in die Klinik aufgenommen. Complication mit leichtem Bronchialcatarrh. Herz vollkommen frei. Am 19. Beginn der Desquamation. Auch Fortbestand des Fiebers (Ab. 39.2) in Folge einer doppelseitigen Adenitis cervicalis und einer rechtsseitigen Otitis. Am 22. (T. Mg. 39.5, P. 106) hörte man über dem Herzen, besonders stark in der Höhe des 4. Rippenknorpels am linken Sternumende ein deutliches systolisches Geräusch; Dämpfung normal. Späterstoss im 5. Intercostalraum abnorm stark. Am nächsten Tage Schmerzen in den Hand- und Fussgelenken, doch ohne Anschwellung (Temp. Ab. bis 40.2; P. 100–124). In den nächsten Tagen auch Schmerzen in den Knie-, Hüft-, Ellenbogen- und Schultergelenken. Vom 26. an Abnahme aller Symptome, auch des Geräusches. Am 1. März nur noch der sogenannte Galopprhythmus wahrnehmbar. Bis zum 25. April, an welchem Tage das Kind entlassen wurde, nicht Abgemessenes.

Ebenso beobachtete ich im Februar 1878 bei einem zu einfacher Scharlach erkrankten Knaben mit dem Eintritt einer Synovitis der Hand-, Finger- und Fussgelenke in der zweiten Krankheitswoche ein neu auftretendes Fieber (bis 39.8) und 4 Tage darauf ein lautes systolisches Geräusch an der Herzspitze, welches noch bei der Entlassung des Knaben aus der Charité fortbestand.

Dass unter diesen Umständen auch Chorea auftreten kann, erwähnte ich bereits (S. 187) unter Mittheilung eines von mir beobachteten

Falles, welcher indess für die Abhängigkeit der letzteren von der Endocarditis nicht beweisend ist. Denn gerade die Chorea wurde auch ohne Synovitis und ohne Herzaffectio in Gefolge des Scharlachfiebers bisweilen beobachtet. Bei der Betrachtung dieser Krankheit werde ich noch auf die scarlatinöse Endocarditis, zumal auf diejenige Form, welche sich im Gefolge von Septicämie entwickelt, zurückkommen. —

Für die Entstehung der Pericarditis, deren Frequenz bei Kindern überhaupt eine grössere als bei Erwachsenen ist, können ausser den erwähnten Ursachen noch krankhafte Zustände benachbarter Theile durch ihre Fortpflanzung auf das Pericardium bedeutsam werden, vorzugsweise Pleuritis der linken, weniger der rechten Seite, Pneumonie, Caries der Rippen¹⁾. Dabei kommt es bisweilen zu einem entweder serös-fibrinösen, oder purulenten Exsudat im Herzbeutel, bei chronischem Verlauf aber leicht zu mehr oder minder ausgedehnten Verwachsungen des Herzens mit dem Pericardium, die auch nach der Resorption flüssiger Exsudate nicht selten zurückbleiben. Eiterige Pericarditis beobachtet man in Verbindung mit eitriger Pleuritis besonders bei sehr jungen Kindern, wobei die Diagnose einerseits durch die geringe Menge des Eiters, andererseits durch die ausgelehnte, von dem pleuritischen Exsudat abhängende Dämpfung sehr erschwert, ja unmöglich gemacht werden kann (S. 367).

Richard L., 8 Monate alt, am 10. März 1877 in die Klinik aufgenommen. Rachitis, sehr frequente stöhnende Respirationen. Husten mit schmerzverzerrtem Gesicht. Links im ganzen Umfang des Thorax absolute Dämpfung und beschleunigtes Athmen. Verdrängung des Herzens nicht nachweisbar, Herztöne rein. T. 37,6, P. 100, R. 60. In den nächsten Tagen verschwand vom das Bronchialathmen; man hörte jetzt gar kein Athmen mehr, und die Dämpfung umschritt den linken Sternumrand um 1 Ctm., wobei ich aber nicht im Stande war, eine Verdrängung des Herzens nach rechts deutlich nachzuweisen. Eine zweimalige Protopneumation und Aspiration mittelst der Pravaz'schen Spritze lieferte kein Resultat. Dabei war die Temperatur fast immer subnormal (36,0—37,2), R. 54—60, P. sehr wechselnd (108—126), äusserst klein. Zusehender Collaps verhinderte jedes operative Eingreifen. Tod am 21. Die Section ergab ein die ganze linke Pleurahöhle ausfüllendes purulentes Exsudat, Compression der linken Lunge, Pericarditis fibrinopurulenta (Herzbeutel nicht wesentlich ausgedehnt, ein paar Eudübel reinen Eiters enthaltend; beide Pleuren mit frischen fibrinösen Auflagerungen besetzt).

Dass auch Endocarditis unter diesen Verhältnissen sich entwickeln kann, ist sicher. Bei einem 3-jährigen Mädchen, dessen ich früher (S. 367) schon gedenkte, fand ich neben einem alten abgekapselten pleuritischen Exsudat der rechten Seite eine bedeutende Synechie des

¹⁾ Vergl. die S. 367 u. 368 mitgetheilten Fälle.

Herzbeutels und eine sehr erhebliche Verdickung und Inasufficienz der Mitralklappe mit Stenose des Ostium venosum, welche schon bei Lebzeiten diagnosticirt worden war. Bei zwei anderen Kindern von 2 und 4 Jahren gesellte sich zu einer ausgedehnten Bronchopneumonie der linken Lunge ein endocardiales systolisches Geräusch, welches in einem Fall bis zum Tode dauerte, in dem anderen nach der Heilung der Lungenerkrankung fortbestand. —

Als eine nicht seltene Ursache der Pericarditis acuta und chronica im kindlichen Alter muss ich noch die Tuberkulose bezeichnen. Die Entwicklung miliärer oder submiliärer Knötchen im Pericardium, zumal auf dem visceralen Blatte, gehört zwar nach dem, was ich selbst gesehen, auch bei allgemeiner Tuberkulose nicht gerade zu den häufigen Erscheinungen, aber auch ohne diese localen Producte kommt es hier mitunter zu einer Pericarditis mit serös-fibrinösem oder hämorrhagisch gefärbtem Exsudat, oder schliesslich zu mehr oder weniger ausgedehnten Synechien des Herzbeutels. Der folgende Fall bietet ein solches Beispiel, während in zwei anderen beide Blätter des Herzbeutels durch eine dicke, theilweise verkäste und mit Tuberkeln durchsetzte Schwiide mit einander verklebt waren.

Paul M., 8 Jährig, am 29. Mai 1878 in die Klinik aufgenommen. Früher gesund, soll er seit 8 Tagen fiebern und sich krank fühlen. Grosses Blasse, R. 36, T. 38,6, P. 116. In der Herzgegend und noch 2 Ctm. über den rechten Sternumrand hinaus hört man ein lautes, beide Töne begleitendes Reibungsgeräusch. Percussion normal, Spitzenstoss nicht deutlich fühlbar; 8 trockene Schnupflügel, Eiblässe, Digitalis. In den nächsten Tagen reichliche Klagen über stechende Schmerzen in der Herzgegend. R. bis 60, T. bis 39,5 steigend. Schon am 24. war das Reibungsgeräusch verschwunden, während die Herzdämpfung sich nach oben bis zur 3. Rippe und 2 Ctm. über den rechten Sternumrand ausdehnte. Puls sehr klein. Vesicans auf die Herzgegend, Calomel 0,015 2 mündlich, von 28. an Jodkal (1,0 auf 100,0). Während nun das Fieber allmähig sank, war in den ersten Tagen des Juni vorübergehend wieder 38,3 erreicht, und am Katach die Respiration wieder auf 60 steigerte, hob sich die Kraft des Pulses, und stete dass die Percussion sich veränderte, fühlte man am 6. Juni wieder einen schwachen diffusen Herzstoss, hörte auch beide Töne, wenn auch schwach, doch vollkommen rein. Am 13. Juni konnte man wieder deutliches Reiben bei beiden Tönen hören (R. 30—40) P. 112—116) und die Dämpfung erreichte nun nicht mehr den rechten Sternumrand, auch nach links nicht ganz die Mamillarlinie. Noch am 21. war das Reibungsgeräusch oben am Sternum deutlich hörbar, während die Töne weiter unten rein erschienen. Temp. Morgens normal, Abends noch 38,3, R. 28—32. Am 6. Juli bestand nur noch sehr schwaches Reiben auf dem Sternum, sonst alles normal, so dass der Knabe am 7. August als gesund entlassen wurde. Im October wurde er von neuem wegen eines leichten Fiebers in die Klinik gebracht. Die Schilderung dieser Phase wird bei der Peritonitis chronica tuberculosa, denn um diese handelt es sich, ihre Stelle finden; hier sei nur bemerkt, dass während des ganzen Aufenthaltes im

Hospital, bis zum 5. Mai 1879, trotz einer häufig wiederholten Untersuchung am Herzen auch nicht die geringste Abnormität wahrgenommen wurde. Aus dem Sectionsbefunde will ich nur die an dieser Stelle interessirenden Thatsachen hervorheben:

Die ganze linke Pleura costalis dicht besetzt mit Tuberkeln, weniger stark die Lungenpleura. Die Pleurahöhlen leer. Durch vollständige Verwachsung beider Blätter des Herzbeutels ist die Höhle desselben vollständig obliterirt und das Herz überall von einem dicken schwieligen Gewebe umhüllt. Bei genauer Untersuchung derselben zeigt sich an verschiedenen Stellen die Muskelaubstanz der Vorderwand des rechten Ventrikels fast durchweg schwielig erhartet. Pericardium und Herz vollkommen frei von Tuberkeln. Klappenapparat völlig intact. Mediastinum anticum stark oedematös infiltrirt und verdickt. Ausserdem Peritonitis und Meningitis tuberculosa.

In diesem Falle schienen mir besonders drei Momente bemerkenswerth: 1) die völlige Latenz der totalen Synechie des Herzbeutels, welche als die Folge der vor einigen Monaten überstandenen Pericarditis zu betrachten war. Insbesondere war an keiner Stelle eine systolische Einziehung der Brustwand beobachtet worden; 2) der Beginn der Erkrankung mit einer acuten Pericarditis. Wir konnten damals den Grund der letzteren nicht auffinden; durch den weiteren Verlauf der Krankheit ist es aber wohl unzweifelhaft, dass die Pericarditis von einer bereits bestehenden Tuberkulose der linken Pleura, die zunächst eine entzündliche Reizung des Mediastinum anticum hervorrief, angeregt wurde. Dass es dabei weiter im Mediastinum, auch im Pericardium zur Entwicklung von Tuberkeln kam, vielmehr nur entzündliche Producte gefunden wurden, ist besonders hervorzuheben; 3) die Theilnahme des Myocardium, wenigstens des rechten Ventrikels, und zwar nicht in der Form einer peripherischen Verletzung, wie sie bei Pericarditis häufig vorkommt, sondern als eine bei Kindern nur selten zu beobachtende interstitielle Myocarditis mit Schwielenbildung, welche sich klinisch ebensowenig bemerkbar machte, wie die totale Synechie des Herzbeutels. Mir selbst kam diese sklerotische Erkrankung des Myocardium nur noch ein paar Mal vor, nämlich in einem ganz ähnlichen Falle, wie dem eben erwähnten, und dann bei einem 10jährigen Knaben (Section am 15. November 1878):

Pericardialhöhle sehr weit, enthält $\frac{1}{2}$ Eistafel hämorrhagisch gefärbter Flüssigkeit. Herz sehr gross. Rechter Ventrikel sehr; Epicardium überall leicht fibrin verdickt, hier und da warzig. An der Spitze des linken Ventrikels zeigt sich neben einer sehr ausgeprägten Atrophie eine kugelartige aneurysmatische Erweiterung, an welcher die Herzwand kaum $\frac{1}{2}$ Ctm. dick ist. Endocardium des linken Vorhofs stark verdickt. Schrumpfung und warzige Beschaffenheit der Mitrals und der Aortaklappen.

Während des Lebens konnte man hier nur die Symptome der Klap-

penkrankheit und der Hypertrophie des Herzens nachweisen. Anatomisch ist aber der Fall in sofern von Interesse, als er die geringe Zahl von Herzaneurysmen, welche bei Kindern bisher beobachtet wurden, um einen vermehrt. Offenbar lag demselben eine partielle chronische Myocarditis zu Grunde, die in Verbindung mit der Endocarditis und der Entzündung des Epicardium sich entwickelte, und die betreffende Partie des Muskelfleisches allmählig in eine bindegewebige, durch den Blutdruck sich mehr und mehr verdünnende Schwiele veränderte. Ausgedehnte chronische Fettentartungen des Herzmuskels, wie sie bei Erwachsenen, mit und ohne Sklerosirung der Coronararterien, so häufig vorkommen, habe ich im Kindesalter noch niemals beobachtet; wohl aber ziemlich oft eine besonders im rechten Ventrikel entwickelte partielle fettige Degeneration: 1) bei Kindern mit langwierigem Keuchhusten und chronischer Pneumonie (S. 398), wo sie in Folge der Widerstände im Lungenkreislaufe, welche das Herz zu überwinden hat, entsteht und zu passiver Dilatation der Höhlen und zu synkopalen Todesfällen Anlass geben kann. Dahin gehören auch die partiellen Fettentartungen, welche im hypertrophischen Herzmuskel bei Klappenfehlern schliesslich zu Stande kommen. 2) Bei Kindern, welche lange an tabeischen Krankheiten, Eberungen u. s. w. gelitten haben. 3) Am häufigsten nach acuten Infectiouskrankheiten, besonders nach Scarlatina und Diphtherie, worauf ich bei den betreffenden Krankheiten zurückkommen werde.

Auch die einfache Hypertrophie und Dilatation des Herzens habe ich im Kindesalter nur selten beobachtet, so ein paar Mal im Gefolge einer chronischen Nephritis und bei zwei kleinen Kindern, die wahrscheinlich von Geburt an ein zu grosses Herz hatten. Sonst war meistens eine Affection des Klappenapparats als Ursache der Hypertrophie und Dilatation nachzuweisen, in einzelnen Fällen auch eine frische scarlatinöse Nephritis, wovon bei dieser Krankheit weiter die Rede sein wird. Die in neuester Zeit von Steffen u. A. beschriebene acute Dilatation, deren Diagnose sich fast nur auf Percussionsresultate stützt, und welche bei Endocarditis in Folge von Blutstauung, Ueberarbeitung des Herzens, und bei infectiösen Krankheiten auftreten soll, habe ich selbst einige Mal beobachtet, am deutlichsten in einem später mittheilenden Falle von ulceröser Endocarditis bei Scharlach; dennoch kann ich nicht verhehlen, dass mir ein Theil der beschriebenen Fälle durch die schnelle Rückbildung der Dilatation binnen wenigen Tagen Bedenken erregte. Man denke nur an die vielfachen Fehlerquellen, welche bei der Percussion aus den verschiedenen Expansionszuständen der linken Lunge hervorgehen können. —

Die Therapie der Herzkrankheiten ist im Kindesalter dieselbe, wie bei Erwachsenen. Wenn auch die chronischen Formen (Klappenfehler mit consecutiver Hypertrophie) im Allgemeinen von Kindern schon wegen der Seltenheit myocarditischer Prozesse und der Gefäßerkrankungen besser vertragen und bis in die Pubertätszeit und noch weiter verschleppt worden, bevor ernstliche Compensationstörungen eintreten, fehlt es doch nicht an Fällen, welche wegen qualvoller Symptome ein ärztliches Eingreifen nöthig machen. Auffallend war mir die Frequenz der Anämie bei diesen Kindern, durch deren zweckmässige Behandlung mit Eisenpräparaten, (F. 12) es oft gelang, wenigstens einen Theil der Symptome (Palpitationen, Schwäche) zu ermässigen und den Allgemeinzustand erheblich zu verbessern, wenn auch das Herzleiden selbst davon unberührt blieb. Nachtheilige Wirkungen hatte das Eisen in diesen Fällen niemals. Die Behandlung der acuten (entzündlichen) Herzaffectationen muss selbstverständlich eine antiphlogistische sein; örtliche Blutentleerungen, Eubengel, Calomel und Digitalis, Vesicantia sind hier an der Stelle, und die mitgetheilten Krankengeschichten werden Ihnen am besten die Wirkung dieser Mittel veranschaulichen. Bei Pericarditis mit massenhaftem Exsudat kann die drohende Lebensgefahr, wie einige Beispiele lehren, durch die Function des Herzbeutels mit Aspiration abgewendet werden, wovon ich selbst indess keine Erfahrungen besitze¹⁾.

Sechster Abschnitt.

Krankheiten der Verdauungsorgane.

I. Die entzündlichen Affectionen der Mundschleimhaut.

Die einfachste Form dieser im Kindesalter sehr häufig vorkommenden Krankheiten (Stomatitis simplex s. erythematosa) charakterisirt sich durch eine allgemeine oder mehr partielle, hellere oder dunklere Röthe der Schleimhaut, besonders des Zahneisches, welches dabei gewulstet und gegen Berührung empfindlich erscheint. Ueber die halbgeöffneten, oft etwas geschwellten und lebhafter gerötheten Lippen fliesst Speichel in ungewöhnlicher Menge. Säuglinge lassen beim Versuch zu

¹⁾ Gallet berichtet über 9 Fälle mit 5 Heilungen, und Kowarsky (Berl. Min. Wochenschr. 1881. No. 5) machte sogar nach erfolgter Pericardie die Incision des Pericardiums, legte Drain ein und bewirkte nach 19 Tagen Heilung.

saugen aus Schmerz die Brustwarze los und schreien, und die Mutter oder Amme bemerkt beim Saugen oft eine bedeutend erhöhte Wärme der Mundhöhle, noch bevor andere Erscheinungen wahrgenommen werden. Die vermehrte Speichelsecretion giebt der ganzen Mundhöhle ein ungewöhnlich schlüpfriges, glänzendes Aussehen, und ein weisslich grauer, grösstentheils aus massenhaft abgelöstem Epithelium bestehender Belag überzieht allgemein oder strichweise den Zangerrücken. Nicht selten ist dabei die Unterkiefergegend ödematös infiltrirt und erscheint theils dadurch, theils durch die consensuelle Anschwellung der hier befindlichen Lymphdrüsen voller als sonst. Leichte Fieberbewegungen, Unruhe, Schlaflosigkeit können sich hinzugesellen.

So beobachten diese Form von Stomatitis am häufigsten während des Zahndurchbruchs (S. 143). Bei älteren Kindern erscheint sie nicht selten im Gefolge acuter Infectionskrankheiten, besonders der Masern und des Scharlachs, wo leicht der Uebergang dieser einfachen Form in einen höheren, mit fibrinöser Exsudation einhergehenden Grad, auf welchen ich beim Scharlachfieber zurückkommen werde, erfolgen kann. Die einfachen Fälle bedürfen keiner besonderen Therapie, da mit dem Durchbruch einer Zahngruppe oder mit dem Schwinden des Exanthems auch die Stomatitis meistens von selbst schwindet. Sie haben daher nur für die Fernhaltung aller stärkeren Reize von der Mundschleimhaut zu sorgen.

Weit charakteristischer und fast noch häufiger tritt uns eine zweite Form entgegen, welche vom Publicum gewöhnlich, wie der Sorb, mit dem Namen „Schwämmchen“, von den Aerzten als Stomatitis aphthosa bezeichnet wird. Die meisten Kinder, welche ich an derselben leiden sah, befanden sich im Alter der Dentition, also zwischen dem 9. Lebensmonat und der Mitte des dritten Jahres; seltener kam die Affection vor oder gar nach dieser Zeit vor, so dass doch ausser dem Zahnreiz hier noch andere unbekannte Einflüsse angenommen werden müssen. Neben den bei der Stomatitis simplex angeführten, aber meistens noch stärker entwickelten Erscheinungen beobachtet man auf den Rändern, der Spitze und dem Rücken der Zunge, seltener auf ihrer unteren Fläche und neben dem Frenulum, graugelbliche oder grauweisse, von einem schmalen röthlichen Saum umzogene, runde, bisweilen etwas ausgezackte Flecken von Stecknadelkopf- bis Erbsengrösse und darüber, entweder nur vereinzelte, so dass sie leicht zählbar sind, oder in weit grösserer Menge, mitunter dicht beisammen stehend und theilweise zu grauweisen Plaques oder gewundenen Figuren confluirend. In einzelnen Fällen sah ich grauweisse, fest anhaftende Plaques von der Grösse

eines Fünfpfennigstückes über dem Niveau der Schleimhaut hervorragend, wobei ihre Ränder pilzartig lose auflagen. Oft sieht man auch kleine Plaques auf der Schleimhaut der Wangen, des Gaumens und selbst der Mandeln, so wie auf den gerötheten und stark gewulsteten Lippen, welche bei der Untersuchung, oder wenn die Kinder sie berühren, leicht bluten und daher oft mit dunkelbraunen oder schwärzlichen Borken vertrockneten Blutes bedeckt erscheinen. Gruppen von Herpesbläschen am Saume der Lippen und weissgraue Exservationen der Mundwinkel sind dann nicht seltene Begleiter, und durch die meistens fühlbare Tumescenz der submaxillären Lymphdrüsen, auch wohl durch ein leichtes Oedem des umgebenden Bindegewebes kann in diesen intensiveren Fällen der untere Theil des Gesichts merklich anschwellen. Die Zunge ist dabei, abgesehen von den Rändern, fast immer mit einem dicken graugelben Belag überzogen, die Secretion des Speichels in dem Grade vermehrt, dass derselbe ankaffend aus dem halbgeöffneten Munde fliesst, das Zahnfleisch dunkel geröthet und gewulstet, auch wohl hier und da mit carten weislichen Epithelialhaufen bedeckt. Nur in vereinzelten Fällen beobachtete ich die Plaques ausschliesslich auf der Schleimhaut der Wangen und des Gaumens, während die Zunge ganz verschont war. Erhöhte Temperatur, besonders in den Abendstunden, Verdriesslichkeit und Unruhe, besonders aber Schmerz, welcher den Kindern das Essen und Trinken sehr erschwert oder fast unmöglich macht, sind stete Begleiter.

In einem Theil der Fälle gesellt sich zu den eben geschilderten Symptomen noch ein widriger Geruch aus dem Munde, und bei genauer Untersuchung findet man dann immer den die Zähne umrandenden Saum des hyperämischen, leicht blutenden Zahnfleisches zu einem graugelben bröcklichen, mit dem Spatel leicht abstreifbaren Detritus zerfallen.

Trotz der grossen Frequenz ist doch die Pathogenese dieser Krankheit noch dunkel. Eine Herausbildung der Plaques aus Bläschen, wie man früher annahm, konnte ich selbst niemals beobachten, da sämtliche Kinder mir mit schon ausgebildeten Plaques zukamen, und auch da, wo sich im Verlaufe der Behandlung neue bildeten, sich nie ein vesiculöses Initialstadium nachweisen liess. Man darf sich nicht dadurch täuschen lassen, dass unter den gewöhnlich ganz fackel Plaques hin und wieder einzelne mehr oder weniger prominirende, die indess keineswegs als bläschenförmige Abhebungen der Epidermis, sondern vielmehr als dichter geschichtete Exsudate zu betrachten sind. Denn mit der Ablagerung eines fibrinösen Exsudats in die oberflächlichste Schleimhautschicht hat man es wohl hier zu thun. Es gelingt nie, eine Plaque mit der Pinzette einfach abzuheben; vielmehr ist dieselbe, wie Robin

nachweis, durch Fasern und eine amorphe Masse fest mit der Schleimhaut verbunden. Es entsteht dadurch eine gewisse Adhärenz mit „diphtheritischen“ Producten, die aber nur eine rein äusserliche ist. Die Krankheit bleibt immer nur eine locale Entzündung der Mundschleimhaut mit fibrinösen Exsudaten, welche, so weit meine Erfahrung reicht, in allen Fällen einen günstigen Ausgang nimmt. Unter einer zweckmässigen Behandlung pflegt das Leiden binnen 8—10 Tagen zu heilen, indem zunächst die vermehrte Speichelsecretion abnimmt, der etwa vorhandene Foetor oris verschwindet, dann aber die Plaques sich von der Peripherie nach dem Centrum hin derartig verkleinern, dass ein etwa erbsengrosser Fleck nach einigen Tagen nur noch stecknadelkopfgross erscheint. Sehr dicke weissgraue Flecken werden dabei mehr und mehr gelblich, durchscheinender, verlieren den umgebenden rothen Saum und verschwinden endlich ganz, ohne eine Spur von Narbe oder eine andere Veränderung, als höchstens eine dunklere Rötze an der erkrankten Stelle zu hinterlassen. Auch hier scheint also, ähnlich wie bei den diphtheritischen Processen, eine allerdings nur ganz oberflächliche Nekrose der infiltrirten Partie stattzufinden, die sich von der Peripherie her abstösst, worauf die zurückbleibenden seichten Erosionen sich sofort mit neuem Epithelium bedecken.

Bedeutender wird der Process, wenn sich an der fibrinösen Stomatitis die S. 425 erwähnte moleculäre Nekrose des Zahneischrandes gesellt. Ich sah zwar solche Fälle oft ebenso schnell heilen, wie die gewöhnlichen; doch hat man immer zu bedenken, dass hier schon eine Combination mit den Anfängen einer schlimmeren Form stattfindet, welche wir unter dem Namen „Stomatitis ulcerosa“ oder „Stomatocoe“ kennen lernen werden.

Dass die Krankheit contagiös sei, wurde früher (Taupin) behauptet, und in der That kamen mir selbst mitunter Fälle von gleichzeitiger Erkrankung mehrerer Geschwister vor, welche sich eines und desselben Löffels oder Glases bedient hatten. Ein Knabe bekam die Stomatitis, nachdem er wiederholt in einen Apfel, welchen ein mit derselben behaftetes Kind verzehrt, hineingebissen hatte. Solche Fälle gehören indess zu den Ausnahmen und können die Annahme eines parasitären Ursprungs noch nicht rechtfertigen. Ob die in der Poliklinik beobachtete Häufung der Fälle zu gewissen Zeiten mehr als Zufall war, wage ich nicht zu entscheiden.

Für die Behandlung der Krankheit empfehle ich Ihnen vor Allen den innerlichen Gebrauch des Kali chloricum, welches hier specifisch wirkt, und zwar nach meiner Erfahrung am schnellsten gerade in den

mit Foetor oris und Theilnahme des Zahnfleischesrandes verbundenen Fällen. (P. 26.) In Form eines Mund- und Gurgelwassers lässt sich das Chlorkali bei kleinen Kindern fast niemals anwenden, weil sie das Verständnis dieser Gebrauchsweise nicht besitzen. Der leichte Schmerz, welchen die Arzenei beim Contact mit der kranken Schleimhaut erregt, kommt nicht in Betracht gegenüber dem überraschend schnellen Verschwinden des Foetor und der Salivation. Viele Fälle heilen bei dieser Behandlung schon in 5–6 Tagen; weit seltener treffen Sie auf rebellische, welche selbst dem fortgesetzten Gebrauche des Chlorkali widerstehen oder gar schlimmer werden, ohne dass man im Stande ist, einen Grund für diese Resistenz aufzufinden. Unter solchen Umständen leistete mir die ärtliche Anwendung des *Zincum sulphuricum* (1,0 auf 20,0 Aq. destillat.) oder auch des *Caprum sulphuricum* (0,5:20), womit die kranken Stellen 2–3mal täglich bepinselt wurden, in der Regel gute Dienste. —

Eine äusserlich sehr ähnliche, meistens aber in- und extensivere Stomatitis fibrinosa beobachtete ich wiederholt im Gefolge acuter Exantheme, besonders des Scharlachs, seltener der Masern, und werde bei der Besprechung des ersteren auf diese Form, welche sich durch copiose Blutungen aus der Zunge und den Lippen auszeichnen kann, zurückkommen. Auch in Verbindung mit einfachen katarrhalischen Anginen der Kinder kam die Stomatitis fibrinosa vor; insbesondere sah ich bei einem 5-jährigen Kinde mit Angina das Gaumensegel über den Mandeln mit zahlreichen gelblichen runden Plaques bedeckt, deren centrale Lücke eine Benetzung zu den Follikeln bewirkte. —

Seltener, als die eben beschriebene Form, begegnete mir eine andere, welche mit dem Namen *Stomatitis ulcerosa*, o. *Stomatocoe* bezeichnet wird. Während die fibrinösen Plaques hier entweder fehlen oder eine untergeordnete Rolle spielen, nimmt das Leiden des Zahnfleisches die volle Aufmerksamkeit des Arztes in Anspruch. Dasselbe ist dunkel- oder bläulich roth, geschwollen, leicht blutend, und zerfällt vor dem die Zähne umrandenden Saume aus mehr und mehr zu einem grüngelben Beel, wodurch die Zahnkronen entblösst und schliesslich gelockert werden. Beim Druck quillt zwischen dem abgelösten Zahnfleisch und den Zähnen eine eiterige Flüssigkeit hervor, ein fectider Geruch strömt aus dem Munde, und die umgebenden Weichtheile, die Wangen und das submaxilläre Bindegewebe schwellen häufig öfters an. Diese Anschwellung und die zunehmende Blässe des Kindes entstellen oft das Gesicht auf beunruhigende Weise und können die Befürchtung eines sich entwickelnden Noma erwecken. Aber schon die nächsten Tage bekämpfen durch die langsame

Progression des Processes und die bleibende Weichheit der Anschwellung, dass jene Befürchtung nicht gerechtfertigt ist. Die durch den Schmerz bedingte Unmöglichkeit, Nahrung in hinreichender Menge aufzunehmen, wird um so bedenklicher, als die Krankheit in der Regel einen prostrirten Verlauf zu nehmen pflegt, welcher sich auf viele Wochen ausdehnen kann. Unter diesen Umständen sehen wir theils den Process auf das Perist. der Kiefer übergreifen, in die Alveolen derselben einsteigen, den Ausfall der Zähne und schliesslich partielle Nekrosen der Kiefer herbeiführen. In einem dieser Fälle bestand viele Tage lang eine wohl durch Reflex zu erklärende trismusartige Contraction der beiderseitigen Kaumuskeln, welche das Öffnen der Kiefer unmöglich machte und nur den Genuss von Flüssigkeiten gestattete.

Kind von 1 $\frac{1}{2}$ Jahren, am 15. Jani 1877 vorgestellt. Seit 6 Wochen Pester etc., Speichelfluss, Anschwellung der submaxillären Lymphdrüsen, Entzungen am Zahnfleisch. Seit dieser Zeit sind 14 Zähne ausgefallen, in den Alveolen beider Kiefer sind mehrere tiefe mit grauen Brei belegte Lücken wahrnehmbar. Breiung durch Chlorella. Ausgang unbekannt.

Kind von 1 $\frac{1}{2}$ Jahren, im October 1878 in die Poliklinik gebracht. Pester etc., bedeutende Anschwellung der rechten Wange und der Submaxillargegend, Verfall, Blässe, Fieber, Unmöglichkeit zu essen. Zahnfleisch überall, besonders rechts unten, geschwollen, von den Zähnen abgelöst, die rings von Eiter umspült sind. Der obere linke Alveolarmund stark geschwollen und schmerzhaft, enthält zwei lockere Zähne, welche sofort extrahirt werden. Flüssige Ausspitkungen der Mundhöhle mit einer $\frac{1}{2}$ proc. Lösung von Kali hypermanganicum, innerlich consequenter Gebrauch von Decoet. Chinæ (5 i 100) mit Kali citric. 3.0. — Nach 3 Monaten (29. Jan 1879) erhebliche Breiung, aber Nekros des rechten Unterkieferendes, von welchem ein paar Sequester entfernt wurden. Anschwellung beträchtlich geringer. Eiterung nachlassend. Weiterer Verlauf nicht bekannt.

Bei einem sehr chronischen Verlauf kann durch die fortdauernde Eiterung und mangelhafte Ernährung schliesslich ein lethtaler Kräfteverfall herbeigeführt werden. Die verhältnissmässig geringe Zahl so schwerer Fälle, die in meine Behandlung kam, erklärt wohl, dass mir dieser traurige Ausgang bisher noch nicht vorgekommen ist. Mit Ausnahme der beiden angeführten waren nämlich alle von mir beobachteten Fälle leichterer Art und wichen der beharrlichen Anwendung eines Decoet. Chinæ mit Chlorella (F. 27) und desinficirender Ausspitkungen mit Kali hypermangan., Carb.- oder Salicylsäure. Bei guten Verhältnissen ist der Genuss einer reinen Landluft dringend zu empfehlen. Die Extraction loser Zähne oder Sequester, sobald sie ohne zu grosse Gewalt ausführbar ist, beschleunigt die Heilung.

Bei älteren Kindern von 5—8 Jahren, d. h. also in der Periode der zweiten Zahnung, sehen wir die ulceröse Stomatitis zwar auch

nicht selten das Zahnfleisch mit Rötze, Schwellung und moleculärer Nekrose des Randes befallen, aber doch nicht tiefer eindringen, während die Hauptveränderung an der Schleimhaut der Zunge, der Wange und der Lippen hervortritt. Hier kommt es zur Bildung umfanglicher, mit einem graugelben Brei bedeckter unebener Geschwürsflächen mit wallartig gewulsteten Schleimhauträndern, welche bei Berührung leicht bluten und einen äusserst foetiden Mundgeruch bedingen. Sitzt das Geschwür am Zungenrande, so finden Sie fast immer ein ganz ähnliches an der entsprechenden Stelle der inneren Wangenfläche, so dass man an einer Uebertragung durch Contact der beiden Flächen nicht zweifeln kann, und dasselbe beobachtete ich an den sich berührenden Flächen der Unterlippe und des unteren Zahnfleisches. Die starke Wulstung der umgebenden Schleimhaut lässt übrigens das Geschwür meistens tiefer erscheinen, als es wirklich ist; denn nach der schliesslichen Abstossung des aus Detritus bestehenden gelblichgrauen Belages bleibt in der Regel nur ein ziemlich oberflächlicher Substanzverlust zurück, dessen Heilung keine Schwierigkeiten macht. Ich bin nicht im Stande, Ihnen etwas Bestimmtes über die Aetiologie dieser mit Nekrose der Schleimhaut oder gar der Knochen einhergehenden Affectionen mitzutheilen. Die von mir beobachteten Kinder boten wenigstens keine Spur einer bestimmten Dyskrasie dar, waren vielmehr vor der Erkrankung vollkommen gesund gewesen. Nur einzelne zeigten die Symptome der „*Cachexia pauperum*“. Dass der Zahnungsprocess, sowohl der erste wie der zweite, dabei eine Rolle spielen kann, scheint mir unzweifelhaft zu sein, denn Hyperämien, Blutungen, kleine Abscesse des Zahnfleisches kommen ja sehr häufig um diese Zeit vor und können sich leicht zu höheren Graden der Entzündung steigern:

Bei einem 7jährigen Mädchen waren sämtliche noch vorhandene Milchzähne gelockert, während die keilenden Zähne hinter und über denselben stürmisch hervorsprossen. Das ganze Zahnfleisch dunkelroth, geschwollen, leicht blutend, in hohem Grade empfindlich. Nach dem völligen Durchbruch einiger neuer Zähne spontane Heilung binnen 4 Wochen.

Bei einem 7 $\frac{1}{2}$ jährigen Knaben bildete sich nach dem Ausstehen eines hinteren unteren Backenzahns ein langgestrecktes Ulcus an der anteroposterioren Partie der Wangenschleimhaut, von welchem aus sich die hyperämische Wulstung des blut blutenden Zahnfleisches weiter nach vorn ausbreitete, und Anschwellung der Lymphdrüsen, *Foetor oris* und oedematöse Infiltration der Wange beiderseits. Heilung nach 10 Tagen durch Chlorkali und Pinselungen mit *Ungt. sulphuricum* (0,3 auf 15,0 Aq. dest.).

Dieser Fall veranschaulicht gleichzeitig die Therapie, welche mit der gegen Stomatitis aphthosa (S. 426) empfohlenen Überstimulant.

II. Der Mundbrand, Noma.

Diese furchtbare, auch unter dem Namen „Wasserkrebs“ bekannte Krankheit, ist dem Kindesalter, und zwar besonders dem Alter zwischen 3 und 8 Jahren, eigenthümlich, glücklicher Weise aber so selten, dass so selbst den beschäftigsten Aerzten nur in langen Intervallen vorkommt.

In der Regel findet der Arzt bei der ersten Untersuchung des erkrankten Kindes die eine Hälfte des Gesichts, vorzugsweise die Wange und die Hälfte der Oberlippe, zuweilen auch die Unterlippe und das Kinn beträchtlich geschwollen, bisweilen bis zum unteren Augenlid hinauf, so dass das Auge halbgeschlossen und das ganze Antlitz erstarrt wird. Die Anschwellung erscheint farblos, bleich, zeigt gewöhnlich einen durch vermehrte Secretion von Serum bedingten fettigen Glanz, und ist gegen Druck wenig oder gar nicht empfindlich, aber stark gespannt, so dass der Fingerdruck kaum eine Grube hinterlässt. Bei genauer Bestatung fühlt man an der hervorragendsten Stelle der Geschwulst in der Tiefe eine mehr oder weniger umfangreiche, sich in die Umgebung verbreitende Hülte.

Obwohl nun, wie ich oben (S. 427) erwähnte, auch die oberste Stomatitis mit einer ähnlichen Anschwellung der Weichtheile einhergehen kann, so muss man doch unter diesen Umständen immer an die Möglichkeit eines Noma denken, besonders wenn das betreffende Kind kachektisch ist, sich in elenden Lebensverhältnissen befindet, oder vor Kurzem eine schwere Krankheit, zmal Parvulae, Typhus, ein acutes Exanthem durchgemacht hat. Die Untersuchung der Mundhöhle ergibt dann einen nicht nur stinken, sondern entschieden brandigen Fetus, welcher, stets zunehmend, die nächste Umgebung des Kindes verpestet kann. Dies ist jedoch nicht immer der Fall. Bei zwei Kindern fand ich den Geruch bis zum Tode so schwach entwickelt, dass ich meine Nase den Lippen des Kindes nähern musste, um denselben deutlich wahrzunehmen. Das Öffnen des Mundes und das Niederdrücken der Zunge mit dem Spatel wird durch die Anschwellung und Spannung der Wangentheile in hohem Grade erschwert. Gelingt es trotz dieser Hindernisse, einen Einblick in das Innere der Mundhöhle zu gewinnen, so bemerkt man auf der Schleimhaut der geschwollenen Wange, seltener der Ober- oder Unterlippe, einen umfangreichen, mindestens markstückgrossen Substanzverlust von bräunlicher, grünliche oder schmutzgrauer Farbe, in dessen Umgebung die Schleimhaut oedematös gewulstet ist und die Geschwürsränder überragt. Dieser brandige Zerfall der Schleimhaut macht

nun so rapide Fortschritte, dass schon nach wenigen Tagen ein grosser Theil derselben in einen graubraunen, fetigen, stinkenden Brei verwandelt ist, und bald auch das Zahnfleisch und die Gaumenschleimhaut dieser Seite demselben Schicksal anheimfällt. Mit dem Spatel oder der Pinzette kann man bröcklige und fetige Stücke des brandigen Detritus ablösen, doch haften die Massen im Allgemeinen fester an ihrer Unterlage, als man nach dem ersten Anblick glauben sollte. Ein fester Speichel fliesst gewöhnlich aus dem Munde, die submaxillären Lymphdrüsen sind geschwollen, und durch eine oedematöse Infiltration des umgebenden Bindegewebes kann die Anschwellung sich mehr oder weniger tief abwärts über die betreffende Halsseite ausbreiten.

Man sollte nun glauben, dass eine so umfangreiche brandige Affection den ganzen Organismus immer in lebhafteste Mitleidenschaft ziehen müsse, und doch geschieht dies keineswegs in der erwarteten Weise. Nur in den Fällen, wo das Noma sich unmittelbar an eine erschöpfende locale oder allgemeine Krankheit anschliesst, macht sich von vorn herein ein Verfall der Kräfte geltend. Sonst kann das Allgemeinbefinden Tage lang überraschend gut stehen. Man findet dann die Kinder im Bette aufrecht sitzend, selbst spielend und mit gutem Appetit essend, obwohl doch Theile des brandigen Detritus ohne Zweifel mit dem Speichel verschluckt werden. Dabei kommt es freilich öfters zu schwer stillbaren Diarrhöen, welche durch die Section nicht erklärt werden und wahrscheinlich durch eine faulige Zersetzung des Darminhaltes, welche durch den Contact der verschluckten sepsischen Stoffe angeregt wird, zu erklären sind. Trotz der sichtbaren Euphorie besteht aber fast immer Fieber, dessen Temperatur in einigen von mir beobachteten Fällen sogar zwischen 39,4–40,0 schwankte, mit entsprechender Frequenz des Pulses und der Athmung.

Schon in diesem Stadium kann plötzlich ein tödtlicher Collaps eintreten, noch bevor der Verwesungsprocess die ganze Dicke der Weichtheile durchbrochen hat. Häufiger aber besteht das Leben noch fort, nachdem nicht nur das Zahnfleisch und das Perist der Kiefer gangränös zerfallen, der Kiefer blossgelegt und ein Theil der Zähne aus den brandigen Alveolen ausgefallen, sondern auch nachdem die entsprechende Seite der Zunge und des Gaumens gangränös geworden und die Perforation der Wange oder Lippe vollendet ist. Der prominenteste Theil der Geschwulst bekommt zunächst eine rosige Färbung, wird steinhart und bald schwärzlich gefärbt, bis endlich ein die ganze Dicke der Weichtheile einnehmender, schwarzer, trockener Brandschorf zu Stande kommt, welcher sich rapide ausbreitend, schliesslich bis zum Auge hin-

auf und abwärts bis an den Hals reiben kann. Eine Masse Rötthe, welche den Schorf umskumt, bekundet die Demarcation des Brandes, worauf entweder spontan oder unter ärztlicher Hilfe ein Theil des Brandeschorfs sich ablöst, und eine entsprechend grosse scharfgerandete Lucke den freien Einblick in die verwüstete Mundhöhle gestattet. Aus dieser Oeffnung sieht man auch das Getränk häufig wieder ausschessen. Ein grosser Theil der Wange, der Lippen, des Augenlids kann auf diese Weise vollständig verloren gehen, und dennoch zeigt das unglückliche Kind fast nie Zeichen von Schmerz, ja man findet es auch jetzt noch bisweilen aufrecht sitzend und nach Nahrung verlangend. Zusehender Kräfteverfall, anhaltende Durchfälle oder ausgebreitete Bronchopneumonien, welche zum Theil wohl durch das Aspiriren brandiger Flüssigkeiten in die Luftwege entstehen, machen schliesslich dem bejammerswerthen Zustande ein Ende, nachdem derselbe 2—3 Wochen bestanden haben kann. Das Bewusstsein sah ich gewöhnlich bis zum Tode fortbestehen.

Nur wenige Fälle nehmen einen günstigen Ausgang, selbst noch im letzten Stadium, nachdem die Perforation der Weichtheile schon eingetreten ist. Mit dem Stillstände der brandigen Verwüstung heben sich bei ausreichender Ernährung die Kräfte, und es beginnt nun nach der Abstossung alles Brandigen die Vernarbung unter strangförmiger Heranziehung der übrig gebliebenen Weichtheile. In diesen immerhin seltenen Fällen bleiben immer zähe Deformitäten, Ektropien des unteren Augenlids, Verwachsungen der Wange mit dem Kiefer, Vereagerungen der Mundhöhle zurück, welche allenfalls durch plastische Operationen theilweise beseitigt werden können. Man darf aber dabei nicht vergessen, dass mit dem Namen „Noma“ zuweilen Missbrauch getrieben wird. Wiederholt wurden mir Kinder vorgeführt, die von dieser Krankheit geheilt sein sollten, und als Beweis wurde ein Stück des nekrotischen Alveolarfortsatzes vorgezeigt, welches unter Zurücklassung eines ansehnlichen Knochendefects abgestossen oder entfernt worden war. Diese Fälle gehören indess der oben beschriebenen Stomatocoe, nicht dem eigentlichen Noma an, welches nur da angenommen werden darf, wo nach die Weichtheile der Wange oder der Lippe in mehr oder minder grosser Ausdehnung brandig zerstört wurden und daher entstehende Deformitäten zurückblieben.

Die Sectionen der an Noma gestorbenen Kinder ergaben nicht viel mehr, als die Untersuchung während des Lebens. Nur die Ausdehnung der gangränösen Verwüstung nach hinten gegen den Pharynx zu lässt sich besser in der Leiche nachweisen. In den inneren Organen finden sich mitunter analoge brandige Veränderungen, zumeist putride

Bronchitis, Bronchopneumonie, Gangrän der Lunge und Katarrhe der Darm Schleimhaut; letztere werden aber auch in manchen Fällen vermisst, welche unter starken Durchfällen zu Grunde gingen (S. 431). Die Beobachtungen über bewegliche Mikroorganismen im Blute, welche Jordan mittheilt¹⁾, stehen bis jetzt noch vereinzelt.

Unter den aetiologischen Momenten des Noma spielt die durch armselige Verhältnisse, schlechte Nahrung, Unreinlichkeit, mangelhafte Wohnungen erworbene „*Cachexia pauperum*“ eine Hauptrolle. Unter diesen Umständen sah ich entweder spontan, oder häufiger nach einer vorausgegangenen Bronchitis, Pneumonie oder Dysenterie Noma zu Stande kommen, besonders wenn der durch diese Krankheiten herbeigeführte Kräfteverfall noch durch eine schwächende Behandlung gesteigert worden war. Ob speziell das Quincksilber, namentlich das Calomel, im Stande ist, bei längerer Anwendung Noma zu erzeugen, ist eine unter den Aerzten noch nicht geschlichtete Streitfrage. Bedenkt man, dass dies Mittel bei Kindern selbst Stomatitis und Speichelfluss bei weitem seltener hervorruft, als bei Erwachsenen, obwohl es gerade in der Kinderpraxis viel häufiger in Anwendung kommt, so sollte man ohne Weiteres denjenigen beistimmen, welche dem Calomel eine Noma erzeugende Wirkung entschieden absprechen. Meine eigenen Erfahrungen sprechen in der That für diese Ansicht, und ich glaube, dass jeder erfahrene Praktiker, welcher das Calomel ja namentlich oft anzuwenden Gelegenheit hatte, ebenso denken wird. Es versteht sich dabei von selbst, dass man Calomel nicht Wochen lang bei elenden erschöpften Kindern anwenden wird, wo es auch in anderer Beziehung ganz unpassend wäre. Dagegen haben die Infectionskrankheiten, namentlich Masern, Typhus, mitunter das Noma ebenso gut im Gefolge, wie heftige Affectionen anderer Theile, namentlich der Haut und der Vulva. Dass endlich auch eine gewöhnliche ulceröse Stomatitis unter sehr ungünstigen Verhältnissen in Noma übergehen könne, glaube ich aus folgenden von mir beobachteten Fällen schliessen zu dürfen.

Albert P., 4jährig, bekam in der Convalescent von einer intensiven Bronchitis erstende Symptome (Schnupfen, Fieber, Kauwegungen u. s. w.). Die Behandlung bestand in Einschnürlagen auf den Kopf, später in Einreibungen denselben mit Borchweinsteinalte, welche so angestrichelt gemacht wurden, dass ein heftiger Decubitus am Hinterkopfe entstand und nach theilweiser Abkennung der Haut der Knochen blossgelegt wurde. Um diese Zeit bildeten sich vereine Geschwüre am Zahnfleisch und auf der Zunge mit Speichelfluss und Foetor oris, und etwa 6 Tage später ein markstückgrosses grün-grünes fettiges Ulcus auf der Schleimhaut der

¹⁾ *Lancet* 1877. II. 538.

linken Wange, wiew denn auch bald die charakteristische Anschwellung der Wimpern, die centrale Härte und Rötze sich geoffen. Der capite fortschreitende Brand verpestete das Krankenzimmer, Tod noch vor der völligen Perforation durch raschen Collaps.

Mädchen von 3 Jahren mit allgemeiner Tuberkulose und heftiger Entzündung der Leber (Sotian am 28. März 1881). Erkrankt vor 3 Wochen an einer Stomatitis, welche bald mit Ulceration der Wangenschleimhaut, häufigen Borken der Lippen und Foetor oris einhinging. Allmählig fortlicher Ausfluss aus dem Munde, den 26. harte, glänzende, bläulich-rotze Anschwellung der ganzen rechten Wange. Beim Pressen der Innenseite liess sich die Schleimhaut in Fetzen reißen. Tod am 27.

Es unterliegt kaum einem Zweifel, dass das Noma fast in allen Fällen sich zuerst als ein brandiges Geschwür der Schleimhaut entwickelt und von hier aus die Dicke der Weichtheile durchdringt, so dass man fast immer sicher ist, sobald auf der äusseren Haut die Rötze und Härte erscheinen, den Brand im Inneren schon ziemlich weit verbreitet zu finden. Dennoch kann ich nicht in Abrede stellen, dass die Ansicht, der Brand könne auch ohne Betheiligung der Schleimhaut von vorn herein in den äusseren Theilen der Wange auftreten, für gewisse Fälle ihre Berechtigung hat. Ich selbst habe diesem Vorgang freilich nur ein einziges Mal beobachtet, wie sich Noma aus einer Phlegmone der Wange heraus bildete:

Im Jahr 1875 wurde ich bei einem 7 Monate alten Kinde consultirt, welches, obwohl von blühender Constitution, doch successiv wohl von 100 kleinen und grossen Abscessen an den verschiedensten Theilen des Körpers heimgesucht worden war. Schliesslich bildete sich ein umfangreicher Abscess der linken Wange mit äusserst harter Infiltration des umgebenden fettreichen Kindergewebes, welcher geöffnet wurde und normalen Eiter entlierte. Wiederholt hatten wir bis dahin das Innere der Mundhöhle untersucht, die Wangenschleimhaut aber stets völlig intact gefunden. Ganz unerwartet war daher die Umwandlung des Abscesses in eine brandige Blähe, welche allmählig eine Nekrose der halben Wange herbeiführte, wobei aber die Schleimhaut immer noch unversehrt und normal gefärbt erschien, bis endlich der Process, nach innen durchdringend, die ganze Dicke der Weichtheile zerstörte und eine theilweise Perforation der Wange herbeiführte. Auffallender Weise erfolgte namentlich ein Stillstand des Brandes; von des Randes her bildeten sich überall gute Granulationen, das Fieber liess auf, und unter einem Verbands mit Campherweiss und feinnigen Ausspülungen mit einer $\frac{1}{2}$ proc. Carbolsäurelösung war der Heilungsprocess des colossalen Defects am 13. Juli fast schon vollendet, als das Kind von einem äussere epidemisch herrschenden Diphtheriefalle befallen und hingerafft wurde. —

Die Behandlung des Noma muss eine möglichst robörizende (Decoct. Chinaz, Wein, Bouillon, Eigelb) sein. Sollte das Schlucken von Nahrungsmitteln durch die Ausbreitung des Processes verhindert werden, so hat man ernährende Klystire (von Eigelb, Bouillon, Milch, Pepton)

zu versuchen. Zur Beschränkung des Brandes werden vielfach Aetzmittel, besonders Pausungen mit *Acidum nitricum dilutum* empfohlen, während Andere dazu den *Liquor ferri sesquichlorati* oder concentrirte Carbonsäurelösung benutzen, noch Andere eine dicke, aus Campher bereitete Pflaste auf die brandigen Theile auftragen ratheo. Ich habe von allen diesen Mitteln noch keinen Erfolg gesehen, welcher überhaupt höchstens da zu erwarten ist, wo der Brand sich noch auf die Schleimhaut des Mundes beschränkt. Sind aber die Weichtheile schon gänzlich in einen Brandschorf verwandelt, so kann nur noch das Glück einen etwas leisten, und ich rathe ihnen überhaupt, dasselbe von vorn herein anzuwenden, sobald Sie sich von der Entwicklung des Nerna auf der Schleimhautflache überzeugt haben. Am besten eignet sich zu diesem Zwecke das von Paquelin unter dem Namen „Thermocauter“ empfundene Instrument, mit welchem man vermöge der Vielgestaltigkeit seines Brenners auch den sonst schwerer zugänglichen Stellen der Mundhöhle leichter beizukommen vermag. Nach völliger Ausbildung des Brandschorfes lässt sich mit einem klingenförmig gestalteten Brenner die ganz abgestorbene Partie wie mit einem Messer ausschneiden, wobei man Sorge tragen muss, durch den innerhalb des normalen Gewebes geführten Schnitt alles Brandige zu entfernen. Aber selbst dann, wenn die Gangrän nach dieser Operation stillsteht, ist damit noch keineswegs ein guter Ausgang gesichert. Vielmehr sah ich in zwei Fällen, obwohl die Wundränder ein gutes Aussehen und normale Granulationen zeigten, nach 4–5 Tagen die Kinder unter den Erscheinungen eines plötzlichen Collapses oder zu den Folgen einer Complication (Darrhen, Bronchopneumonie) zu Grunde gehen. Ausspülungen der Mundhöhle mit einer Carboll-, Salicyl- oder Thymollösung und Bedecken der Wunde mit einem in *Vinum camphorae* getauchten Charpiéwasch sind nicht zu vernachlässigen.

III. Die entzündlichen Affectionen des Pharynx.

Kinder über 4 Jahren erkranken besonders an den leichteren Formen der Angina catarrhalis fast häufiger, als Erwachsene, während sie in den ersten Lebensjahren weit seltener von derselben beunruhigt werden. Im Allgemeinen weichen die Symptome von denjenigen des späteren Lebensalters nicht ab, und ich kann mich deshalb hier auf wenige Bemerkungen beschränken.

Zunächst fesselt uns das Verhalten des Fiebers. In den meisten Fällen tritt das Fieberleiden, der Schmerz beim Schlucken, worüber Erwachsene von vorn herein zu klagen pflegen, erheblich zurück oder fehlt auch wohl ganz, während das Fieber mit einer Intensität einsetzt, welche

an die Entwicklung einer ersten acuten Krankheit denken lässt. Die Angina beginnt in der Regel mit Verstimmung und Mattigkeit; die Kinder verlangen nach dem Bett, vorwiegend die Nahrung und erbrechen sich auch wohl ein- oder ein paar Mal. Frost mit darauf folgender Hitze, oder die letztere allein eröffnet nun die Scene; die Temperatur steigt schnell auf 39 bis 40° und darüber, so dass der Arzt, der bei der Untersuchung das Gaumensegel und die Mandeln stark geröthet findet, die Prodrome des Scharlachs vor sich zu haben glaubt. Selbst epileptiforme Convulsionen sah ich einige Mal im Gefolge dieser initialen Temperaturerhebung eintreten (S. 155). In der Regel sinkt aber dieselbe schon am nächsten Tage sehr erheblich, ja selbst auf den Normalstand, und die Kinder bleiben dann entweder ganz fieberlos oder zeigen nur noch geringe Erhebungen in den Abendstunden, während nun erst die localen Symptome im Rachen deutlicher hervortreten. Manche Kinder besitzen eine so grosse nervöse Reizbarkeit, dass sie unter diesen Umständen eine Pulsfrequenz von 136—144 Schlägen darbieten, welche leicht Besänftigung hervorruft, aber schon nach 24—36 Stunden beträchtlich zurückgeht. Ob das hohe Initialfieber genügt, um die Angina catarrhalis, wie Manche wollen, zu einer Infectiionskrankheit zu stampeln, glaube ich nicht. Eine Anschwellung der Milz habe ich wenigstens in diesen Fällen niemals sicher constatiren können.

Für die Praxis ist nun besonders die Ähnlichkeit bedeutsam, welche gewisse Anginen mit der Diphtherie haben. Sehr häufig erscheinen nämlich am zweiten Tage der Krankheit auf den gerötheten und mehr oder weniger geschwollenen Tonsillen stecknadelkopfgrosse und grössere, rundliche, gelbweisse oder graugelbe Flecken in verschiedener Anzahl, mitunter nur vereinzelt, oft aber auch ziemlich dicht beisammen stehend und dann zum Theil conflürend, so dass die Mandel stellenweise mit einer unregelmässig geformten, weissgelblichen Masse bedeckt erscheint, welche nicht nur dem ängstlichen Eltern, sondern auch dem Arzte verdächtig erscheinen kann. (Angina follicularis). Gewöhnlich lässt zwar die Beschaffenheit dieser Fleckchen keinen Zweifel an ihrer eiterartigen Natur aufkommen. Es handelt sich dabei um eine eitrige Secretion, die aus den Schleimhautfalten der Mandel herausquellend auf der Oberfläche nur locker aufliegt und mit einem Spatel oder Pinzel abstreifbar ist, wobei aber doch durch kleine Läsionen der Schleimhaut etwas Blut ausströmen kann. Auch ist der gelbliche Schimmer der Flecken von der grau- oder ganz weissen Farbe der diphtheritischen Auflagerung wesentlich verschieden. Dennoch kommen hierhaus nicht selten Fälle vor, in denen Sie Ihr Urtheil wenigstens 24—36 Stunden

lang zurückhalten müssen, wenn Sie sich nicht schlimmen Vorwürfen aussetzen wollen. Besonders die grösseren confluirenden Flecken können Zweifel erregen; dieselben haften bisweilen ziemlich fest auf der Tonsille, und das hohe initiale Fieber, sowie eine begleitende Anschwellung der submaxillaren Lymphdrüsen scheinen die Annahme einer Diphtherie zu unterstützen. Selbst der Erfahrenste kann hier in der Diagnose schwanken, und ich selbst bekenne offen, mich ein paar Mal am ersten Tage der Krankheit getäuscht zu haben. Glücklicher Weise dauert der Zweifel nicht lange, denn während die einfache katarthale Angina schon nach 24—36 Stunden entweder einen Stillstand oder gar schon eine Rückbildung, d. h. eine Abstossung der gelblichen Flecken zeigt, nimmt die Diphtherie an Ausdehnung und Dicke der Auflagerung progressiv zu. Auf das Fieber und die Anschwellung der Lymphdrüsen lege ich indess keinen Werth, da sie beiden Affectionen gemeinsam zukommen. Ebenso wenig dürfen Sie von der mikroskopischen Untersuchung der abgestreiften Masse einen sicheren Aufschluss erwarten, weil Bakterien sich in beiden Fällen finden können. Dazu kommt, dass mitunter auch bei der Angina weisse pseudomembranöse Fetzen auf den Mandeln und Gaumenbögen vorkommen, die aus zernarbtem Fibrin und Epithel bestehen und die Diagnose noch schwankender machen. Bei einem 5jährigen Kinde mit ausgesprochener „folliculärer“ Angina sah ich sogar die Spitze der Uvula mit einer solchen weisslichen Decke bekleidet. Man hat es hier mit einem wirklichen Croup der Rachenschleimhaut zu thun, der mit der spezifischen Diphtherie nichts weiter gemein hat, als das äussere Ansehen, vielmehr rein entzündlichen Ursprungs ist (Trousseau's *Angine couenneuse*), und der sich, was ich ein paar Mal bei Erwachsenen beobachtete, mit Abscessbildung in der Mandel combiniren kann. Unter diesen Umständen werden Sie aber immer gut thun, Ihr Urtheil über die Natur der Krankheit 24—36 Stunden zu vertagen, das Kind von seinen Geschwistern vorläufig zu isoliren und den weiteren Verlauf genau zu beobachten. Jedenfalls werden von oberflächlichen Untersuchern sehr viele Fälle ohne Weiteres für Diphtherie erklärt, welche nichts weiter waren, als eine zu höheren Graden entwickelte katarthale Angina, und die famosen Erfolge vieler Aerzte, die mit Kali chloricum und andern Mitteln fast jede Diphtherie geheilt haben wollen, erhalten dadurch ihre richtige Beleuchtung.

Dass aber unter diesen zweifelhaften Fällen, welche binnen 6 bis 8 Tagen nach der Abstossung aller Auflagerungen günstig verlaufen, auch wirkliche Diphtherie leichten Grades vorkommt, soll nicht geleugnet werden. Besonders verflüchtig erschien es mir, wenn mehrere

Geschwister gleichzeitig oder successiv auf dieselbe Weise erkranken, oder wenn die ursprünglich auf die Mandeln beschränkten Fleckchen sich auch auf dem Rande des Velum oder der Uvula entwickeln, besonders aber, wenn sich eine starke Absonderung der Nasenschleimhaut einstellt. Liegen auch in diesen Momenten immer noch keine entscheidenden Beweise für die infectiöse Diphtherie, so wird man sich doch immer veranlassen sehen, die Krankheit als solche zu behandeln. Findet man dann später, dass die betreffenden Kinder, was nicht selten vorkommt, wiederholt, selbst alljährlich von dieser zweifelhaften Angina befallen werden, so wird man lieber das Bekenntniss einer Täuschung ablegen, als in den bewussten oder unbewussten Fehler Dorez verfallen dürfen, welche sich oft wiederholter Heilungen einer Diphtherie bei einem und demselben Kinde rühmen. Schliesslich sei noch erwähnt, dass bisweilen bei Kindern auf einer Mandel (nach meiner Beobachtung sehr selten auf beiden zugleich) ausgebildete und auch etwas in die Tiefe grüfende, grau gelbliche, hängende Ulcerationen vorkommen, welche, wenn man nach den in der Umgebung noch hier und da sichtbaren gelben Eiterpunkten urtheilen darf, durch Confluenz kleiner dicht beisammen stehender Abscesse entstanden sind. Diese katarrhalischen Ulcerationen haben daher weder mit Diphtherie, noch mit Lux, welche bisweilen fälschlich angenommen werden, irgend etwas zu thun und heilen fast immer spontan nach 8–14 Tagen.

Bei jeder katarrhalischen Angina, mag sie nun mit mehr oder minder heftigem Fieber auftreten, rathe ich Ihnen die Kinder ein paar Tage ruhig im Bette zu halten, und nur wenn sie keinen gehörigen Stuhlzug haben, ein leichtes Purgans (inf. Sennae comp., Elect. e Senna F. 7, 28) zu geben. Von Chlorkali, welches hier oft verordnet wird, verspreche ich mir keinen wesentlichen Nutzen, und Gurgelungen mit einem Fladen- oder Malvenabkocht sind nur bei älteren, schon intelligenten Kindern anwendbar. Bei grosser Disposition zu diesen Anginen kann man durch tägliche Bepinselung der Mandeln mit einer Hillerstein-solution (1 : 20) die häufige Wiederkehr des Uebels zu verhüten suchen, doch ist der Erfolg nicht constant, und erst das vorrückende Alter bringt die Disposition zum Schwinden.

In Folge der häufigen Wiederkehr dieser Entzündungen können die Mandeln mit der Zeit hypertrophisch werden. Im Allgemeinen beobachtete ich aber diese Hypertrophie weit häufiger bei solchen Kindern, die niemals oder nur höchst selten an einer Angina gelitten hatten. Auch liess sich nur in einem Theil der Fälle eine skrophulöse Grundlage, welche so ohne rechten Grund angenommen wird, durch bestimmte

Symptome nachweisen. Die Entwicklung dieser Tonsillärhypertrophie ist eine so langsame, dass krankhafte Erscheinungen gewöhnlich erst nach Ablauf der ersten Lebensjahre hervorstritten und man nur selten Gelegenheit hat, die Affection schon im ersten oder zweiten Jahre zu beobachten. Drei Symptome sind es besonders, welche Ihre Aufmerksamkeit auf die Tonsillen lenken müssen: ein ungewöhnliches Schnarchen der Kinder während des Schlafes oder auch geräuschvolles Athmen bei Tage, veränderter nasaler Klang der Stimme, und Schwerhörigkeit, welche durch den Druck der vergrößerten Mandeln auf die Öffnung der Tube Eustachi bedingt wird. Die Untersuchung ergibt eine starke Hervorragung beider Mandeln, seltener nur der einen, so dass der Eingang des Pharynx mehr oder weniger verengt, und bei höheren Graden durch den Contact der Mandeln mit der Uvula fast gänzlich geschlossen erscheint. Nicht selten sehen Sie dann die beiden Mandeln aneinander liegen, und das Zäpfchen mit dem Velum nach hinten und oben oder auch nach vorn gedrängt. Dabei kann das Schlucken ganz ungestört vor sich gehen, und nur die unter diesen Verhältnissen häufiger eintretenden Anginen rufen Schmerz und Schlingbeschwerden hervor. Durch die Behinderung des Athmens während des Schlafes kann auch ein Aufschrecken aus demselben bedingt werden, und es fehlt nicht an Beispielen, in denen unter solchen Umständen wirkliche Anfälle von *Pavor nocturnus* (S. 241) zu Stande kamen, so dass man gut thut, bei Kindern, welche an solchen Anfällen leiden, immer eine Untersuchung der Rachenhöhle vorzunehmen. Ich möchte Sie bei dieser Gelegenheit noch daran erinnern, dass man weder bei Anginen, noch bei einer selbst beträchtlichen Tonsillärhypertrophie im Stande ist, die vergrößerten Mandeln von aussen in der Submaxillargegend durchzufühlen, wie dies von den Linsen und auch von manchen Avelen angenommen wird. Ich versuchte sogar wiederholt, die hypertrophische Mandel mit dem eingeführten Finger nach aussen zu drängen und dadurch fühlbar zu machen, aber stets ohne Erfolg, und in der That ist dies auch wegen der vielen darzwischen liegenden Theile (*Musc. constrictor pharyngis* sup., *Fascia buco-pharyngea*, *Platysma*, *Parotis*, Haut) eine anatomische Unmöglichkeit (Luschka). Was Sie also unter solchen Umständen fühlen, sind geschwollene Lymphdrüsen oder Infiltrate des Bindegewebes, nicht aber die Mandeln.

Bildet sich eine beträchtliche Tonsillärhypertrophie schon in sehr zartem Alter, so kann durch die Hemmung des freien Luftstrittes zu den Lungen eine der rachitischen analoge Deformation des Thorax, die sogenannte „Hühnerbrust“ herbeigeführt werden (*Dupuytren*, *Shaw*

n. A.). Der äussere Luftdruck überwiegt bei der mangelhaften Füllung der Lungen den inneren und drängt die nachgiebigen Rippenknorpel einwärts, wodurch der Thorax seitlich abgeflacht wird und das Brustbein stärker hervortritt. Auch eine Verengung der Nasenlöcher, und eine Hemmung im Wachsthum des Oberkiefers mit grösserer Concavität des Gaumens und Auseinanderdrängung der Zähne ist bei solchen Kindern beobachtet worden. Nur ausnahmsweise aber erreichte das Athemungs-Hinderniss einen so hohen Grad, dass zur Tracheotomie geschritten werden musste.

Als Heilmittel kam nur die Excision oder wenigstens die partielle Resection der vergrösserten Tonsillen empfohlen werden. Alle anderen Mittel, auch die in neuerer Zeit gerühmten parenchymatösen Einspritzungen von Jodkali oder Jodglycerinlösung stehen der Operation bei Weitem nach, weil ihr Erfolg unsicher und ihre Ausführung bei reizten Kindern weit quälender und schwieriger ist, als der rasche chirurgische Eingriff.

IV. Die contagöse Paratittis.

(Angina paratidea, Mumps, Ziegenpeter.)

In der Gegend vor dem Ohr und unter dem Kieferwinkel kommen bei Kindern verschiedene mit einer Anschwellung verbundene krankhafte Prozesse vor, welche der Ungeübte leicht mit einander verwechseln kann. Besonders während der ersten Dentition, oft aber noch viel später, finden Sie in der genannten Gegend häufig diffuse, meistens nur einseitige Anschwellungen, welche Anfangs weich und normal gefärbt erscheinen, allmählig aber härter und roth werden, schliesslich fluctuiren und spontan oder nach einer Incision reichlichen Eiter entleeren. Ich würde diese häufig vorkommenden Bindegewebsabscesse, die wahrscheinlich von einer Adenitis der Lymphdrüsen ausgehen, hier gar nicht erwähnen, wenn ich nicht wiederholt erlebt hätte, dass sie im ersten Stadium für eine Angina paratidea gehalten wurden. Dasselbe gilt von den oedematösen Schwellungen, welche im Gefolge einer Stomatitis oder einer Alveolarperiostitis auftreten. Von allen diesen Anschwellungen unterscheidet sich diejenige der contagösen Paratittis sowohl durch ihre Beschaffenheit, wie durch ihren Verlauf. In den meisten Fällen werden Ihnen die Kinder, am häufigsten solche zwischen 3 und 8 Jahren, mit schon entwickelter Krankheit vorgeführt, und Sie finden dann entweder nur auf einer oder auf beiden Seiten eine diffuse, ziemlich weiche, oft aber auch reitendere, mehr oder weniger starke Anschwellung vor dem Ohre, welche sich über den Kieferwinkel abwärts fortsetzt und hinter demselben mit einer oft

deutlich fühlbares abgemessenes Spätes, dem unteren Ende der Parotis, abschließt. Sind beide Seiten gleichzeitig befallen, was in der Mehrzahl der Fälle geschieht, so kann es in intensiveren Fällen dahin kommen, dass die diffusen Schwellungen von rechts und links her unter dem Kiefer conflüiren und die ganze submaxilläre Partie wurstförmig geschwollen erscheint, während sonst nur die Partien vor dem Ohr und hinter dem Unterkiefer prominiren, und von vorn betrachtet dem Gesicht eine auffallende Breite verleihen. Ja die Anschwellung kann sich über den Hals abwärts bis zum äusseren Ende der Clavicula ausdehnen, und in diesem Falle, wenn sie doppelseitig auftritt, dem Kopf eine conische himfförmige Gestalt verleihen. Einzelne geschwollene Lymphdrüsen kann man häufig unter dem Kiefer fühlen. Die Haut über der Geschwulst ist in der Regel normal gefärbt, seltener blass geröthet, und selbst beim Druck wenig oder gar nicht empfindlich. Nur beim Essen, beim Kauen harter Bissen und beim Versuch den Mund recht weit zu öffnen, wird von Vielen über Schmerz geklagt. Ein paar Mal fand ich die an der rechten Schläfe und in der Umgehung des Auges sichtbaren Venen auf der kranken Seite stark ausgedehnt, wahrscheinlich in Folge des Druckes, welchen die geschwollene Parotis auf die Vena facialis ausübte. Veränderungen der Speichelsecretion konnte ich ebenso wenig beobachten, wie die Mehrzahl der Autoren, wohl aber öfters eine begleitende leichte Angina tonsillaris. In vielen Fällen ist die Euphorie überhaupt gar nicht gestört, obwohl das Thermometer fast immer, wenn auch nur beim Eintritt oder am ersten Tage der Krankheit, eine geringe Erhebung auf 38,0—38,5 ergibt. Fälle mit stärkerem Fieber bis 39 und 40°, heftigen Kopfschmerzen, Erbrechen habe ich nur ausnahmsweise bei Kindern, wiederholt aber bei Erwachsenen beobachtet.

Die Dauer der Krankheit beträgt im Durchschnitt 3—7 Tage. Während dieser Zeit nimmt die Geschwulst ein paar Tage zu, bleibt etwa 48 Stunden stationär und schwindet dann allmählig; doch sah ich durch ein successives Befallenwerden beider Seiten den Verlauf sich auf 10 bis 14 Tage und darüber verlängern. Die bei Erwachsenen bisweilen vorkommende Metastase auf den Hoden habe ich im Kindesalter niemals gesehen, ebenso wenig den Ausgang in Eiterung oder in bleibende Verhärtung der Parotis. In allen von mir beobachteten Fällen erfolgte voll- oder vollständige Zertheilung.

Der Umstand, dass die Krankheit fast ausnahmslos das Individuum nur einmal im Leben befällt, ihre unbestreitbare Contagiosität mit einem etwa 14tägigen Incubationsstadium, und ihre nicht selten zu beobachtende epidemische Verbreitung stellen die infectiöse Natur

dieser Parotitis steht. Man muss annehmen, dass der seinen Weg nach uns unbekannte Infectiousstoff¹⁾ durch die Mündung des Ductus Stenonianus in die Parotis hereingelangt und hier einen Irritationszustand mit parenchymatöser Schwellung der Drüse, vielleicht mit theilweiser Speichelretention hervorruft. Eine Anschwellung der Milz und vieler Lymphdrüsen, welche Einige auch hier als Beweis des infectiösen Processes gefunden haben wollen, konnte ich freilich nie constatiren. Ob übrigens die Parotis allein sich des Vorrechtes erfreut, das Contagium in sich aufzunehmen und festzuhalten, oder ob sie diese Eigenschaft mit den Sublingual- und Submaxillardrüsen theilt, steht noch dahin. Einige von Penzoldt²⁾ mitgetheilte Fälle, und Beobachtungen von Saltzman³⁾ sprechen zu Gunsten der letzteren, und ich selbst behandelte einen Erwachsenen, bei welchem nach gastrischen und febrilen Vorläufern beide Submaxillardrüsen anschwellen, und schliesslich eine Metastase auf den rechten Testikel erfolgte, ohne dass die Parotis dabei betheiligt gewesen war. Die Incubationsperiode der Krankheit schwankt zwischen 14 und 22 Tagen.

Bei der stets günstigen Prognose wäre es überflüssig, ein von dieser Parotitis befallenes Kind von seinen Geschwistern zu isoliren. Jedemfalls aber rathe ich Ihnen, das Kind am ersten Tage im Bett und die nächstfolgenden wenigstens im Zimmer zu halten. Die Geschwulst wird nur mit Watte bedeckt. Die von mir versuchte Application eines Eisbeutels auf dieselbe bewirkte keine Abkürzung des Verlaufs, ist also entbehrlich.

Es scheint mir hier die passendste Stelle, Ihnen eine Beobachtung mitzutheilen, welche mir bisher nur ein einziges Mal vorkam, und deren Natur ich auch nicht befriedigend zu erklären vermag:

Ein 9-jähriges blasses Mädchen, im Mai 1878 wegen doppelseitiger Otitis in die Klinik aufgenommen, sonst gesund, klagte am 1. October über Schmerz im Halse, ohne dass die Untersuchung etwas Abnormes ergab. Am folgenden Tage zeigte sich indess der ganze Boden der Mundhöhle stark angeschwollen und empfindlich, die Schleimhaut bleichlich blass. Oeffnen des Mundes, sowie jede Bewegung des Zuges, sehr schmerzhaft und schwierig, reichlicher Speichelfluss. T. 38.4; Ab. 38.8. Trotz reichlichen Purgirens und der Application eines Eisbeutels auf den Kiefer war die Anschwellung am 3. noch stärker und auch ausserlich rings unter dem Kiefer deutlich wahrnehmbar. Die Geschwulst war heiss, schmerzlos.

¹⁾ Es von französischen Autoren, Capitan und Charrin, beschriebene Bakterien im Halse dieser Kranken bedürfen noch weiterer Bestätigung (Soc. de biol., 28. Mai 1881).

²⁾ *Demode's med. Wochenschr.* IV, 19. Oct. 1875.

³⁾ *Jahrb. f. Kinderheilk.* XII, S. 409.

Zunge doch demselbe aufwärts gedrängt, vollkommen unbeweglich. Ober- und Unterkiefer standen etwa 1 Ctm. weit auseinander, letzterer unbeweglich. T. bis 38,8. Als auch am 4. die Symptome nicht abnahmen, der Speichelfluss vielmehr noch stärker wurde, und die T. auf 40,0 stieg, liess ich 5 Blutegel unter dem Kiefer setzen und innerlich Chlorkali (3,0:120,0) nehmen. Schon Mercks Erleichterung und Abnahme der Geschwulst. Am folgenden Tage sank auch die T., welche am 6. nur noch 32,8 und Ab. 38,8 betrug. Schmerz und Anschwellung merklich geringer, Unterkiefer beweglich, Schlundknochen nirgends geröthet, Zunge nicht geschwellen, ihre Oberfläche mit einer weisslichen Decke belegt, welche unter dem Mikroskop nur die gewöhnlichen Filiformen und eine grosse Menge verästelter Epithelien zeigt. In den nächsten Tagen zunehmende Besserung und rasche Heilung, so dass der ganze Process etwa eine Woche gedauert hatte. Nach Ablauf von 3 Wochen erfolgte indess ohne erkennbare Ursache ein Recidiv unter ganz ähnlichen Erscheinungen, welches wiederum 6—7 Tage dauerte und unter derselben Behandlung heilte. Seitdem blieb das Kind, abgesehen von einer Otitis, gesund.

Ich kann in diesem Fall, dessen Hauptsymptome eine entzündlich-ödematöse Schwellung des Bodens der Mundhöhle, copioser Speichelfluss und Fieber bildeten, nichts anderes sehen, als einen acuten Reizzustand der Sublingualdrüsen und des umgebenden Bindegewebes, bin aber nicht im Stande, eine annehmbare Ursache desselben aufzufinden. Gegen eine der contagiosen Parotitis analoge Affectio spricht schon der Speichelfluss, vorzugsweise aber das schon nach 3 Wochen eingetretene Recidiv. Ebenso könnte die Einwirkung von Quecksilber mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Man könnte daher an kleine Oeurements in den Sublingualdrüsen denken, wenn diese auch bei Kindern nur sehr selten beobachtet worden sind¹⁾. Aber der Nachweis dieser Ursache fehlt vollständig. Will man also der Krankheit, welche jedenfalls zu den Seltenheiten gehört, einen Namen geben, so wäre die Bezeichnung „Subglossitis“, welche Hoffmann²⁾ einem ähnlichen Falle beilegte, am passendsten.

V. Die Krankheiten der Speiseröhre.

Unter den krankhaften Zuständen des Ösophagus, welche im Kindesalter vorkommen, sind einige, wie der Saure (S. 80) und die Diphtheritis desselben wegen ihrer absoluten klinischen Latenz nur von anatomischem Interesse. Praktische Bedeutung haben allein die Stenosen der Speiseröhre. In ausserordentlich seltenen Fällen erschei-

¹⁾ Guinardaux (Revue med. Août 1835) fand unter 112 Fällen von Speicheldrüsen, von denen 60 auf die Sublingualdrüsen kamen, keine einzigen unter dem 20. Lebensjahre.

²⁾ Hirsch und Virchow, *Jahrbuch*. Im 1871. II. S. 365.

nen diese schon als congenitale, wobei vom ersten Tage an die genossene Milch sofort aus Mund und Nase herausquillt. Fast ebenso selten treten sie uns als die Folgen einer Compression durch benachbarte Organe und Tumoren, oder gar einer carcinomatösen Entartung der Wandungen entgegen. Dagegen kommen die durch Anätzung des Oesophagus verursachten Stenosen bei Kindern im Allgemeinen weit häufiger vor, als bei Erwachsenen. Hier spielt das Trinken von Natronlauge, die zum Waschen und Scheuern benutzt und von den Kindern oft für Weissbier gehalten wird, die Hauptrolle. Ich habe diesen Unfall vielfach bei Kindern zwischen 2 und 8 Jahren, einmal sogar bei einem erst 15 Monate alten Kinde beobachtet. Sind erst einige Tage seit dem Trinken der Lauge verflossen, so lassen Sie noch die deutlichen Spuren der Anätzung auf der Schleimhaut des Mundes und Pharynx, mit bedeutenden Schlingbeschwerden und Würgen von Schleim, welcher zuweilen mit Blut vermischt ist. Bei dem erwähnten jüngsten Kinde war in der ersten Woche auch eine fast vollständige Aphonie vorhanden, welche durch die Anätzung und Schwellung des Larynxeinganges zu erklären war und späterhin einer hochgradigen Heiserkeit Platz machte. Da nun ältere Kinder schon beim ersten Schluck den Missgriff sofort erkennen und die Flüssigkeit zum Theil wieder ausspeien, so kann sich die schädliche Wirkung derselben auf den Mund und Pharynx beschränken, oder es gelangt nur eine kleine Partie noch in den Oesophagus, aber nicht über denselben hinaus, woraus sich das verhältnissmässig seltene Auftreten entzündlicher Magensymptome in solchen Fällen erklären lässt. Deutch hatte ich ein paar Mal Gelegenheit, in frischen Fällen Erscheinungen von Gastritis zu beobachten, anhaltende heftige Schmerzen in der Magenregion, Ausbrechen aller Speisen und Getränke und reichlicher Mengen von Schleim, Stuhlverstopfung, heftiges Fieber, grosse Empfindlichkeit der ganzen epigastrischen Gegend, in einem Fall auch Abgang schwärzlichen Blutes aus dem After ohne Blutbrechen. In den meisten Fällen bekommt man aber die Kinder erst 4–8 Wochen nach dem Unfall, d. h. zu einer Zeit in Behandlung, wo die Spuren der Verbrennung im Munde und Rachen längst verschwunden sind, und die Symptome einer Vereiterung des Oesophagus, welche durch die narbige Schrumpfung der ulcerösen Substanzverluste entstanden ist, sich schon deutlich entwickelt haben. Das Hauptsymptom bleibt hier immer das Erbrechen oder vielmehr Auswürgen der genossenen Nahrungsmittel und zäher Schleimmassen unmittelbar nach dem Schlucken, also noch während der Mahlzeit. Anfangs werden auch Flüssigkeiten geschluckt, später nicht mehr; ich sah, dass nicht einmal ein Theelöffel Wasser getrunken werden konnte.

ohne dass sofort köstliches Würgen eintrat. Manche Kinder bezeichnen auch mit dem Finger genau die Stelle hinter dem Sternum, bis zu welcher die Speisen und Getränke gelangen können. Durch den fortwährenden sehr regen Appetit, welcher auf keine Weise befriedigt werden kann, wird das Bild um so trauriger, und die Kinder fallen schon nach einigen Monaten geradezu der Verhungernag anheim. Eine zunehmende, schließlich skelettartige Abmagerung, erkranktes Colorit des späten eingefallenen Gesichts, und die äusserste Schwäche sind unvermeidliche Folgen. Bei einem 10-jährigen Knaben, welcher in diesem elenden Zustande auf meine Abtheilung gebracht wurde, zählte ich bei subnormaler Temperatur und cyanotischer Verfärbung der Haut und Schleimhäute in der Mundhöhle nur noch 44 ganz kleine, kaum fühlbare Pulse, wahrscheinlich in Folge der an des allgemeinen Atrophie theilnehmenden Ernährungsstörung im Herzmuskel. Der Tod durch zunehmende Erschöpfung ist unter diesen Umständen unabweisbar, wenn es nicht gelingt, eine bessere Ernährung, sei es durch Erweiterung der Stenose, sei es auf anderem Wege anzubahnen.

Um den Sitz und den Grad der Stenose zu erkennen, führen wir die Schlundsonde, und wenn diese, wie gewöhnlich, nicht durchgeht, einen elastischen Katheter oder eine mit einer kleinen stählernen Olive versehene Fischweinsonde ein. Ueberraschend ist dabei oft der hohe Grad von Schrumpfung, welcher uns zwingt, immer dünnere Probearme zu wählen, bis endlich eins sich findet, welches die verengte Stelle passiert. Zuweilen konnten wir deutlich zwei Stricturen nachweisen: von ihnen die eine leichter, die andere schwerer zu durchdringen war. Bei älteren intelligenten Kindern, welche selbst die Stelle des Hindernisses angeben, pflegt die Untersuchung mit der Sonde diese Angaben zu bestätigen. Das einzige Mittel zur Heilung bleibt natürlich die allmähliche Dilatation der verengten Stelle mittelst täglich eingeführter Bougies oder Sonden, welche mit einer Metall- oder Elfenbeinolive armirt sind. Dies Verfahren erfordert aber unendlich viel Geduld und Vorsicht, da man sich vor jeder gewaltsamen, mit Gefahr der Perforation verbundenen Durchführung zu hüten hat, also immer mit einer so dünnen Sonde oder Bougie beginnen muss, dass sie oben noch durchgeht. Man kann sogar genötigt werden, zuerst nur mit einer Darmsonde vorzugehen. Lässt man das Instrument täglich etwa 5–6 Minuten, später auch länger, liegen, so kann man nach einigen Tagen oft schon ein stärkeres durchleiten, wobei dann auch immer die Dysphagie nachlässt und Flüssigkeiten in geringer Menge ohne Würgen in den Magen gelangen. Allmählig beten sich auch die Kräfte und

die Ernährung, und ich selbst war oft erstaunt, wie rasch unter diesen Umständen die Wangen sich wieder füllen und das Colorit sich verbessert. So war es auch bei dem oben erwähnten Kinde, dessen elender langsamer Puls binnen wenigen Wochen wieder völlig normal wurde, und dessen Wangencyanose mit zunehmender Herzenergie einer gesunden Färbung Platz machte. Aber Geduld und Konsequenz ist den Müttern hier ebenso zu empfehlen, wie den Ärzten. Da nämlich das narbige Bindegewebe, welches durch seine Schrumpfung die Stenose bedingt, die Neigung behält, sich nach der künstlichen Ausdehnung stets wieder zusammenzuziehen, so bleibt der Erfolg immer nur temporär, wenn die Dilatation nicht viele Wochen und selbst Monate lang täglich fortgesetzt wird. Diese Konsequenz wird jedoch in der Armen- und poliklinischen Praxis sehr häufig vermisst, zumal da die Einführung der Instrumente immer unter heftigem Geschrei und Würgen erfolgt und den Müttern ein höchst peinlicher Anblick ist. Mir gelang es daher bis jetzt nur einmal¹⁾ in der Poliklinik zur völligen Heilung zu gelangen, während sonst immer nur Besserung erzielt wurde und die Kinder dann fortblieben. Dagegen verspricht die Behandlung im Krankenhaus bessere Erfolge, und ich selbst verfüge über einige Fälle, welche völlig geheilt entlassen werden konnten. Allerdings darf man sich von dieser Behandlung nicht immer Erfolg versprechen, da, wie einige Sectionen mich lehrten, die stenosirte Stelle nicht bloss sehr dicht und starr, sondern auch von ansehnlicher Länge sein kann, auch bei längerer Dauer oberhalb derselben Erweiterungen des Oesophagus sich ausbilden, in welche die Instrumente hineingerathen. Für solche unheilbare Fälle wird die in neuester Zeit hier und da mit Glück unternommene Gastrotomie das letzte Mittel bleiben. Während der Cur ist die Ernährung durch Klystire von Eiweiß, Bouillon, Wein oder Pepsin zu unterstützen.

VI. Die Krankheiten des Magens.

Wie der Oesophagus wird auch der Magen im kindlichen Alter bei weitem seltener von einer acuten Erkrankung befallen, als bei Erwachsenen. Fälle von acuter Entzündung, sei es der Schleimhaut oder des submucösen Gewebes, kommen, abgesehen von den eben erwähnten durch das Trinken einer ätzenden Flüssigkeit entstandenen, fast niemals vor, während der chronische Catarrh der Magenschleimhaut und das Ulcus rotundum zu den Seltenheiten, Carcinome aber zu den seltensten Ausnahmen gehören. Obwohl einzelne Fälle von Ulcus rotundum in der

¹⁾ Beiträge zur Kinderheilk. N. F. 8. 275.

Literatur beschrieben sind¹⁾, und ich wiederholt Ältere Kinder zu behandeln hatte, deren Symptome (Kardialgie und Erbrechen) diese Diagnose fast sicher stellten²⁾, glaube ich doch hier darüber hinweggehen zu können, weil ich dem aus der Klinik der Erwachsenen bekannten Bilde nichts Hinzuzufügen hätte. Da nun auch die hier und da beobachteten tuberkulösen Geschwüre, die kleinen Ulcerationen der Neugeborenen (S. 60), die diphtheritischen Prozesse der Magenschleimhaut, welche ich ein paar Mal bei der Section diphtheritischer Kinder antraf, die hämorrhagischen Saffusionen u. a. nur ein anatomisches Interesse darbieten, aber nicht zu diagnostizieren sind, so werde ich mich hier auf die Betrachtung einiger Krankheitszustände beschränken, welche dem Kindesalter zwar nicht ausschließlich zukommen, in demselben aber mit gewisser für die Praxis wichtigen Eigenthümlichkeiten auftreten. Unter diesen nimmt die

— Dyspepsia gastrica

vermöge ihrer Frequenz die erste Stelle ein. Sie erinnern sich des Bildes, welches ich Ihnen früher (S. 112) von der Dyspepsie der Neugeborenen und Säuglinge zu entwerfen versuchte. Es wird also hier nur von der Dyspepsie Älterer Kinder die Rede sein, welche in Folge der Neigung fast aller Kinder, sich den Magen zu überladen, zu den häufigsten Objecten der ärztlichen Praxis gehört. Bei jeder Ueberladung des Magens mit Nahrungsmitteln, zumal mit schwer verdaulichen, welche dem Magen eines Kindes nicht angemessen sind, kann, wie in jedem Alter, durch den Eintritt von spontanem Erbrechen oder auch von copiosen fäulig riechenden Darmausleerungen eine mehr oder minder schnelle Naturheilung eintreten. Wo dies nicht erfolgt, bildet sich der Status gastricus s. sabarralis, die „Gastritis“ aus, ein Zustand, über dessen Wesen wir trotz seiner Frequenz so gut wie nichts wissen. Ob hier ein acuter Catarrh der Schleimhaut, oder eine chemische Alteration der Verdauungsscrete, oder eine Gasansammlung der Magenwände, oder vielleicht ein Complex dieser Bedingungen besteht, ist uns nicht bekannt, und wir müssen uns daher vorläufig mit den Krankheitserscheinungen begnügen. Die Kinder haben keinen Appetit, eine in verschiedenen Graden roth oder gelblich belegte Zunge, welche oft wie mit einem dicken Filz überzogen erscheint, einen schlechten Geruch aus dem Munde und

¹⁾ Vergl. Chvostek, Archiv f. Kinderheilk. III. S. 257.

²⁾ Baur, vor. Kinderheilk. 1861. S. 89 u. N. F. 1868. S. 275. — Wertheim, Ber. Jahrb. f. Kinderheilk. 1882. XIX. S. 79.

ein verändertes psychisches Wesen. Viele leiden auch an Uebelkeit und brechen alles Genossene rasch wieder aus. Dabei sind sie verdrieselich, matt, trübsüchtig, klagen über Kopfschmerzen und können den Kopf nicht lange aufrecht halten. Fieber ist nicht immer, aber häufig vorhanden, namentlich von bedeutender Höhe (39–40°), mit bedeutender Pulsfrequenz (120–144 Pulse und mehr), lebhaftem Durst, Röthe der Wangen, abendlicher Exacerbation und nächtlichen, seltener auch bei Tage sich einstellenden Delirien. Dabei ist der Stuhlgang meistens verstopft, seltener dünn und reichlich, die epigastrische Gegend bei Vielen etwas aufgetrieben, gespannt und gegen Druck empfindlich. Viele klagen auch spontan über drückende oder schmerzhaft empfundene in der Magenregion. Bei dieser Sachlage geräth der Anfänger leicht in Verlegenheit, und in der That ist selbst der Erfahrene nicht immer im Stande, mit voller Sicherheit von vorn herein ein sicheres Urtheil abzugeben. Man denkt allerdings sofort an eine Indigestion, aber auch das Gespenst eines sich entwickelnden Pesttyphus oder einer tuberkulösen Meningitis drängt sich hervor und lähmt die Entscheidung. Ueber die Diagnose der letzteren sprach ich mich schon früher (S. 274) aus, und füge hier nur noch hinzu, dass besonders der dicke weissgelbe Zungenbelag und der Foetor oris für die Dyspepsie bedeutsam sind. Uebrigens braucht man sich in sehr zweifelhaften Fällen vor der Anwendung eines Brechmittels nicht zu fürchten, welches selbst im Fall eines Irrthums weder auf das erste Stadium der Meningitis tuberculosa, noch auf einen beginnenden Pesttyphus eine nachtheilige oder gar bedenkliche Wirkung ausübt. Für die acute Dyspepsie aber, wenn sie frisch entstanden oder erst einige Tage alt ist, gibt es sicherlich kein besseres Mittel, und ich glaube, dass die jetzige Therapie, schon gemacht durch den früher mit dem Emeticum getriebenen Missbrauch, die Anwendung dieses Mittels viel zu sehr vernachlässigt. Ist es doch soweit gekommen, dass Ärzte noch in vollem Ernste fragen, ob ich denn überhaupt noch Brechmittel anwende! Nach der gehörigen Wirkung desselben (F. 6) schwindet oft wie durch einen Zauberschlag der ganze Complex scheinbar drohender Symptome, und es bedarf, wenn das Mittel nicht gleichzeitig purgirend gewirkt hat, nur noch leichter Abführmittel (F. 7, 28), oder wenn die Appetitlosigkeit und der Zungenbelag fortauern sollten, kleiner Gaben von Acidum muriaticum (F. 3), um den krankhaften Zustand nach wenigen Tagen zu beseitigen. Eine Hauptsache aber bleibt dabei die Diät, welche selbst im günstigsten Falle mehrere Tage lang nur aus leichten Speisen (Wassersuppen mit Schleim, leichter Brühe, Zwieback u. dgl. m.) bestehen darf. Das so häufige Scheitern vor der Anwen-

dung des Brechmittels rächt sich meistens durch eine längere Dauer der Affection, und wenn erst 6–7 Tage darüber hingezogen sind, darf man sich auch von dem Emeticum keine rasche Wirkung mehr versprechen. In diesen verschleppten Fällen lasse ich die Kinder bei strengster Diät im Bette liegen und das Acidum muriaticum nehmen, welchem bei Stuhlverstopfung ein Infus. Sennae comp. oder ein Infus. rai. rhei mit Kali tartaricum (F. 7) interponirt wird. Bei langsam wiederkehrendem Appetit ist der Gebrauch der Tinctura rhei aquosa, zu 2–3 Theelöffeln täglich mehrere Tage lang zu empfehlen. —

Schon zu wiederholten Malen machte ich Sie darauf aufmerksam, dass durch reflectorische Einwirkung von den Magenerven aus im Gefolge der Dyspepsien nervöse Symptome, epileptiforme Convulsionen (S. 151), Unnebelungen des Sensoriums (S. 153), Verlangsamungen des Pulses (S. 275) zu Stande kommen können, welche den Arzt leicht zu Trugschlüssen verleiten. Durch dieselbe Reflexwirkung kann nun auch ein vorzugsweise in der respiratorischen Sphäre spielender Symptomencomplex entstehen, welchen ich mit dem Namen „Asthma dyspepticum“ bezeichnet habe¹⁾:

Am 10. Mai 1875 kam in meine Poliklinik ein 9-jähriges Mädchen mit angstvoll verfallenen Gesicht und bläulicher Cyanose desselben, sowie der Nasen- und Mundschleimhaut. Athembewegungen des Thorax sehr oberflächlich, 70 in der Minute. Mittheilten der Nasenflügel und anderer Rhythmus, stolpernde Expirationen. Puls sehr klein, etwa 108. Grösse Brülligkeit, so dass die Mittheilung der Mütter, das Kind habe den Tag nach der Klinik (etwa 10 Minuten lang) zu Fuss zurückgelegt, Behinden erregte. Brustorgane in jeder Beziehung normal. Geklagt wurde abwechselnd über grosse Athemnoth, Schläfe, deutlicher auch über Kopfschmerzen und Empfindlichkeit der Magenregion, die in der Rückenlage etwas aufgetrieben schien, einen tympanitischen Schall gab und gegen Druck recht empfindlich war. Anamnese liess sich nur ermitteln, dass das Kind bis zum vorigen Abend gesund gewesen sei, dann aber angefangen habe, über Stöße in der Magenregion zu klagen. Die Nacht sei sehr unruhig gewesen, und am Morgen Cyanose und Dyspnoe eingetreten. Bei der sehr unruhigen Schlaflosigkeit und dem ätiologischen Dunkel wagte ich kein entscheidendes Eingreifen und verabreichte kleine Dosen von Morphin. Es kam jedoch gar nicht zum Gebrauch desselben. Kaum zu Hause angelangt, begann das Kind über häufige Defäkation zu klagen und brach bis zum Abend wiederholt Speisereste, darunter grosse unverdaute Stücke eines harten Klee aus, welches, wie sich nun ergab, am Tage vorher mit grosser Hast gegessen worden war. Nach der Entleerung dieser Massen erfolgte sofort ruhiger Schlaf und Wohlbefinden. Die am folgenden Tage in der Klinik wiederholte Untersuchung ergab vollkommene Exuberie, so dass nur noch eine diätetische Verordnung nöthig schien.

¹⁾ Berliner Klin. Wochenschr. 1876, No. 18.

Sie sehen hier durch den Reiz unverdauter Ingesta einen scheinbar bedenklichen asthmatischen Symptomencomplex entstehen, welcher nach der Entloerung der reizenden Stoffe wie durch Zauber verschwindet. Enorme Dyspnoe, Cyanose, äusserst kleiner Puls, Kühle der Hände, — dies alles bestand ohne die geringste Abnormität der Lungen oder des Herzens. Ebenso wenig konnte eine Compression der Brustorgane durch den erweiterten Magen angenommen werden, da ein anormaler Hochstand des Zwerchfells nicht zu constatiren war. Ganz ähnlich verlief ein zweiter Fall:

Knabe von 9 Jahren, vorgestellt am 9. Jan. 1876. Seit 6 Tagen Schmerzen in der Magenregion, welche geröthet und empfindlich erschien. Respiration oberflächlich, 50 in der Minute, Puls klein, 120 und darüber, Gedrückt und Schlingmäte cyanotisch. Bei der Untersuchung fand sich eine Insufficienz der Mitralklappe mit mässiger Erweiterung des rechten Ventrikels, in den Lungen nichts Abnormes. Ausserdem dicker Zungenbelag und Faustus oris. Ich verordnete sofort ein Brechmittel und der Erfolg war evident. Schon am folgenden Tage war die Respiration auf 32 gefallen, Puls normal, Cyanose verschwunden. Am 11. völlige Euphorie, abgesehen von den objectiven Zeichen des alten Herleidens.

Diese beiden Fälle werden genügen, um Ihnen das Bild des „Asthma dyspepticum“ zu veranschaulichen. In meiner oben angeführten Arbeit finden Sie noch eine schlagende Beobachtung, welche ein 9 Monate altes, vor kurzem entwöhntes Kind mit dyspeptischem Erbrechen betraf, bei welchem ebenfalls so stürmische dyspnootische Erscheinungen mit kleinem, fast unzählbarem Pulse, Cyanose und Apathie eintraten, dass ein wichtiges Leiden der Thoraxorgane angenommen werden konnte, obwohl die wiederholte Untersuchung nicht die geringste Abnormität im Herzen oder in den Lungen ergab. Auch dieser Fall endete binnen einer Woche mit völliger Genesung. Ganz ähnliche Beobachtungen wurden in letzter Zeit von Silbermann¹⁾ publicirt, und ich selbst hatte vor Kurzem wiederum Gelegenheit einen 12jährigen Knaben zu behandeln, welcher die Erscheinungen des drohenden Collapses (Kühle der Extremitäten, äusserst frequenten kleinen Puls, rasche Respiration, leichte Cyanose) zugleich mit einer dyspeptischen Diarrhoe Tage lang darbot, und schliesslich unter einer Behandlung mit Salzsäure vollständig genas. Zur Deutung dieser Vorgänge reichen die Experimente von S. Mayer und Pribram²⁾, welche durch verschiedenartige Reizungen des Magens von Hunden und Katzen eine Drucksteigerung im arteriellen System und Pulsverlangsamung beobachteten, nicht aus; sie erklären uns höchstens

¹⁾ Berliner Klin. Wochenschr. 1882. No. 23.

²⁾ Sitzungsber. d. Wiener Akad. Juli 1872.

Fälle wie den S. 275 angeführten, in welchem durch eine reflexorische Erregung der hemmenden Vagusfasern bei Dyspepsie der Puls bedeutend retardirt wurde. Bei unserem Asthma dyspepticum war aber der Puls nicht verlangsamt, sondern im Gegentheil sehr beschleunigt, und es müssen daher noch andere Vermittelungswege zwischen der Magenreizung einerseits und den respiratorischen Störungen andererseits bestehen. Ob hier, wie Silbermann meint, zunächst eine Lähmung der hemmenden Vagusfasern des Herzens in Betracht kommt, lasse ich dahingestellt. Ich erinnere übrigens an die bei Dyspepsien mit oder ohne Gasanhäufung nicht selten vorkommende eigenthümliche Oppression, welche darin besteht, dass der Patient häufig den Drang empfinde, möglichst tief zu inspiriren, ohne dass ihm dies vollständig gelingt. Sobald dies der Fall ist, schwindet für einige Zeit das dringende Bedürfniss tief Athem zu holen, kehrt aber bald wieder, und erst ein rasch wiederholtes krampfhaftes Gähnen macht dem Anfall ein Ende. Auch hier handelt es sich wahrscheinlich um einen Reflex auf den Vagus, welcher unter gleichen Verhältnissen bisweilen auch eine intermittirende Herzaction hervorruft. Ich habe nun diese Art von Asthma nicht nur bei Erwachsenen, sondern wiederholt auch bei Kindern von 6–10 Jahren beobachtet, welche die von der Mutter eines Herz- oder Lungenleidens befallenen Eltern mir zuführten. Ein paar Mal war dieser schon Wochen lang in verschiedener Intensität sich gehend merkende Zustand so auffallend, dass während einer Minute mehrere tiefe und doch nicht ausreichende Inspirationen unter starker Betheiligung der Schultermuskeln erfolgten. Auch hier liess sich fast immer eine Dyspepsie oder eine Anfüllung des Dickdarms mit angesammelten Fäcalmassen nachweisen, und die dagegen gerichtete Behandlung hatte in der Regel schnellen Erfolg. Die nervöse Natur dieses „Asthma“ gab sich auch dadurch kund, dass, wenn die Aufmerksamkeit der Kleinen durch irgend etwas, z. B. durch die stethoskopische Untersuchung gefesselt wurde, das Asthma sofort pausirte, aber wieder trat, sobald die Untersuchung beendet war. —

Die chronische Dyspepsie ist im Kindesalter, wie ich schon bemerkte, weit seltener die Folge eines Magenleidens, als einer andern wichtigen chronischen Krankheit, sei es einer allgemeinen (Tuberkulose) oder einer localen. Ich will hier nur anführen, dass Appetitmangel, Aufreißung des Magens, Uebelkeit und Stuhlverstopfung sehr häufig bei anämischen Kindern vorkommen und mit der Verbesserung des Blutes schwinden. Unter allen Umständen müssen Sie aber darauf gefasst sein, dass Ihnen von ängstlichen Müttern öfters Kinder wegen Appetitmangels zugeführt werden, welche bei der Untersuchung absolut nichts

Krankhaftes darbieten und, wie die nähere Erkundigung ergibt, auch für ihr Bedürfniss ausreichend essen, ohne jedoch die übertriebenen Wünsche der Eltern in dieser Beziehung zu befriedigen. Auch erfahren Sie dabei oft, dass die Kinder sehr wählerisch im Essen sind und gegen manche Speisen, z. B. Bouillon, Fleisch, oder auch Milch, einen entschiedenen Widerwillen haben. Alle diese Dinge müssen natürlich berücksichtigt werden, bevor man eine wirkliche krankhafte Anorexie annehmen darf. Ebenso behutsam sei man in der Beurtheilung von „Magenschmerzen“ bei Kindern, welche ich unter dem Namen

Kardialgie

zusammenfassen will. Die Deutung dieser, etwa vom 6. Lebensjahre aufwärts durchaus nicht selten vorkommenden „Magenschmerzen“ ist wegen der mangelhaften Angaben, welche die Kinder über den Sitz und die Art der Schmerzen zu machen pflegen, sehr viel schwerer als bei Erwachsenen. Oft fand ich bei der Untersuchung, dass gar nicht der Magen, sondern das Colon transversum der Sitz jener Schmerzen war, welche entweder das Epigastrium oder eine der Hypochondrien einnahmen und von hier aus auch gegen den Nabel oder das Colon descendens hin ausstrahlten. Man hat es hier also nicht mit einer „Kardialgie“, sondern mit einer „Kolik“ zu thun, welche durch Gasspannung oder Ueberfüllung des Dickdarms mit Fäcalmassen veranlasst wird. Nur selten beobachtete ich wirkliche Magenschmerzen in Folge von Indigestion, dann aber immer in Verbindung mit anderen dyspeptischen Symptomen, wie sie eben geschildert wurden. Ein Brechmittel brachte auch in diesen Fällen schnelle Hilfe, und ich ratho Ihnen daher, sich von der Anwendung desselben bei acuter Dyspepsie nicht durch die Angst vor einer entzündlichen Magenaffection abschrecken zu lassen, wenn nicht ein bestimmter Anlass nachweisbar ist, dem man eine solche Wirkung zutrauen kann. So beobachtete ich bei einem Kinde, welches vor einigen Tagen eine brühhelisse Köhlrübe gegessen hatte, anhaltende Schmerzen im Epigastrium, besonders nach dem Essen, so dass jede Nahrung verweigert wurde. Hier musste man allerdings an eine Läsion der Schleimhaut denken, und in der That wurden durch den ausschliesslichen Gebrauch von Eismilch und einer Emulsion oleosa die Schmerzen binnen wenigen Tagen vollständig beseitigt.

Wirkliche kardialgische Paroxysmen konnte ich, abgesehen von den wenigen Fällen, in denen man ein rundes Magengeschwür anzunehmen berechtigt war, nur bei älteren chlorotischen Mädchen von 10 bis 16 Jahren beobachten, und zwar ganz in der Weise, wie sie auch bei

Erweichungen dieser Art auftreten. Die Auftreibung und Spannung des Epigastriums während dieser Anfälle, welche die Patienten nöthigt, sich aller beengenden Kleidungsstücke, Bänder u. s. w. zu entledigen, beruht auf einem Krampf der Magenscificien hin, durch welchen die im Magen befindlichen Gase abgesperrt werden und eine excessive schmerzhafto Spannung seiner Wände erzeugen, welche nach dem Abgange von Ectus und Blähungen bald verschwindet. Bei mehreren Mädchen, welche sich der Pubertät näherten oder bereits ein paar Mal menstruiert waren, nur einmal bei einem Knaben, hatte ich auch Gelegenheit, eine Erweiterung des Magens zu beobachten, auf welche ich Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte. Die Hauptscheinung derselben bildete die ungewöhnliche Fülle oder kugelförmige Hervorreibung des Epigastrium, welches je nach dem Grade der Gasspannung bald weicher, bald äusserst gespannt und dann gegen Druck empfindlich war. Der in aufrechter Stellung meistens dumpfe Percussionsschall wurde in der Rückenlage fast immer laut tympanitisch, wobei die Auftreibung und Empfindlichkeit bedeutend abzunehmen pflegten. Durch das Eingeben eines Brausepulvers liess sich jedoch die Auftreibung und Spannung, öfters mit deutlich erkennbaren Contouren des dilatirten Magens, sofort wiederherstellen. Nach dem Essen oder Trinken erfolgte nicht immer eine wahrnehmbare Zunahme der Ektasie, und da kardialgische und dyspeptische Symptome fast immer fehlten, beschränkten sich die Klagen auf ein Gefühl von Spannung in der Magenregion, Aufstossen oder flüchtige Uebelkeit, besonders aber Luftmangel bei Bewegungen oder nach dem Essen. In einem Falle mit sehr hochgradiger Dilatation zeigte sich sogar eine Verschiebung des Herzens um einen Intercostalraum nach oben. An der linken Thoraxhälfte war vom vom Rippenrande bis zur 4. Rippe hinauf der Schall laut tympanitisch, ähnlich wie bei Pneumothorax, der Herzstoss zwischen der 3. und 4. Rippe wahrnehmbar, und dem entsprechend die Herzdämpfung in dieser Region am deutlichsten nachweisbar. Der Grad der Erweiterung war übrigens niemals ein constanter, vielmehr Schwankungen unterworfen, welche keineswegs immer durch Aufstossen von Gasen zu erklären waren.

Die Anamnese dieser Fälle liess viel zu wünschen übrig. Während bei einem 12jährigen Mädchen die Affection von der Mutter auf eine vor 7 Wochen überstandene Variolais, bei einem andern gleichaltrigen auf einen Typhus zurückgeführt wurde, liessen sich in der Mehrzahl hysterische Symptome als Vorläufer oder Begleiter der Magenektasie constatiren, Schre- und Weinkrämpfe, Kardialgien, somnambule Anfälle, exstatische Erscheinungen, wie ich sie Ihnen früher (S. 193) geschildert

habe. Anämie war zumeilen, aber nicht immer nachzuweisen, einige Mädchen erschienen sogar auffallend blühend. In einem Falle bestanden gleichzeitig noch vollständige epileptiforme Anfälle. Meiner Ansicht nach handelt es sich in den meisten dieser Fälle um einen kramphhaften Zustand der Orificien des Magens, welchem man keine zu grosse Bedeutung beilegen darf. In der That pflegt das Leiden, nachdem es Wochen oder Monate mit wechselnder Intensität gedauert, von selbst zu verschwinden oder anderen hysterischen Symptomen Platz zu machen. Ob der Eintritt der Menstruation günstig wirkt, kann ich aus eigener Erfahrung nicht entscheiden, halte es aber nach der Analogie anderer um die Pubertätszeit auftretender hysterischer Erscheinungen für wahrscheinlich. Unter den von mir versuchten Mitteln hatte nur der faradische Strom einen, wenn auch nur vorübergehenden Erfolg. Setzte man die eine Elektrode auf die Wirbelsäule, die andere auf das ausgedehnte Epigastrium, so fiel dasselbe jedesmal sofort, ohne dass Ructus abgingen, zusammen, wobei es zweifelhaft blieb, ob daran eine Contraction der Bauchmuskeln oder eine selbstständige Zusammenziehung der Magenmuskulatur Schuld war. Leider war aber dieser Erfolg immer nur ein temporärer, mitunter sogar nur auf wenige Stunden, höchstens ein paar Tage beschränkt. Selbst in den wenigen Fällen, wo die elektrische Behandlung 3 bis 4 Wochen lang beharrlich fortgesetzt wurde, hatten wir keinen dauernden Erfolg zu verzeichnen, und ich kann Ihnen daher die Elektrizität immer nur als ein palliatives Mittel in hochgradigen Fällen empfehlen.

Die im späteren Lebensalter häufigste Ursache der Magenverwölbung, die Stenose des Pylorus oder des Duodenum, kam bei Kindern bis jetzt nicht zu meiner Beobachtung, und auch die durch enorme Auffüllung des Magens mit Nahrungsmitteln herbeigeführte Ektasie kam mir nur einmal bei einem 8jährigen Mädchen vor, welches ihren starken Appetit durch einen massenhaften Genuss von Kartoffeln befriedigt hatte. In solchen Fällen muss auch der Entleerung des Magens und Darmkanals eine strenge Diät mit Ausschluss aller Vegetabilien empfohlen werden, während man gleichzeitig durch Eisentel, Extr. nuc. vom. und Elektrizität die in Folge der übermässigen Ausdehnung entstandene Atonie der Magenwände zu heben sucht.¹⁾ In diese Kategorie gehören auch die Erweiterungen des Magens, welche in Folge von Gährungsdyspepsie entstehen, und sich besonders durch ein zeitweise eintretendes massenhaftes Erbrechen einer sauren, schäumigen, reichlichen Mengen von Nahrungs-

¹⁾ Zeits. f. Kinderheilk. N. F. S. 282.

jedes enthaltenden Flüssigkeit kaud geben. Bei Kindern von 11 bis 14 Jahren sind mir diese Erscheinungen wiederholt vorgekommen¹⁾, ohne aber von den im späteren Lebensalter beobachteten in irgend einer Weise abzuweichen. Die Anwendung der Magenpumpe führt auch bei diesen Kindern, wie ich wiederholt gesehen habe, zu guten Resultaten.

Mit diesem Erbrechen darf man eine andere Form nicht verwechseln, welche ich ein paar Mal bei Kindern von 7—9 Jahren beobachtet habe und welche mit einer materiellen Erkrankung des Magens entschieden nichts zu schaffen hat. Dies Erbrechen tritt vorzugsweise bei zarten „nervösen“ Kindern, fast immer nur in den Morgenstunden auf, wenn die Kinder kurz vor dem Schlafesuch häufig ihr Frühstück verzehrt haben. Bei einem Knaben, welcher sehr ängstlich war, und bei einem 8jährigen psychisch sehr regen Mädchen trat das Erbrechen auch wohl im Laufe des Tages, immer aber nach Gemüthsaffecten, z. B. beim Schelten des Vaters, ein. Mehr Tage lang aus, stellte sich dann wieder ein und bestand mit wechselnden Intervallen Wochen- und selbst Monate lang fort, ohne weitere Folgen zu haben. Ich glaube, dass man es hier in der That mit einem *Vomitus nervosus* zu thun hat. In den mir bis jetzt vorgekommenen Fällen erfolgte unter einer allgemein einwirkenden Behandlung immer vollständige Genesung.

VII. Der Brechdurchfall.

Diese gefürchtete Krankheit (*Cholera nostras* s. *arctica*) befällt zwar Kinder jedes Alters und bekanntlich auch Erwachsene, weitaus am häufigsten aber das erste und zweite Lebensjahr, in welcher Periode sie auch ihre verheerlichsten Wirkungen entfaltet. Schon daraus geht hervor, dass die Art der Ernährung, besonders die künstliche, oder der Uebergang von der Brustnahrung zur Entzöhung hier eine wichtige Rolle spielt, zumal Säuglinge, welche eine gute Mutter- oder Ammenmilch bekommen, ungleich seltener befallen werden, als die sogenannten Pappelkinder in der Armenexalt. So weit stehen wir mit dem Boden der Thatfachen. Alles was darüber hinaus liegt, ist hypothetisch, aber mit grosser Wahrscheinlichkeit muss noch ein anderes Moment hier in Betracht gezogen werden, welches man dreist als ein „infectiöses“ bezeichnen darf. Dafür spricht schon das epidemische Auftreten dieser Krankheit in den heissen Sommermonaten Juni, Juli und August, vorzugsweise in grossen Städten, unter welchen in Deutschland Berlin und München obenan stehen. Dies ist so constant, dass man der Krank-

¹⁾ Beitr. zur Kinderheilk. N. F. S. 314.

1800 mit Recht den Namen *Cholera aestiva* (Sommer complaint der Amerikaner) beigelegt hat. Jeder Arzt weiss, dass, wenn die ersten warmen Tage des Frühsommers eintreten, sofort auch die Fälle dieser Krankheit vorkommen, welche nun allwöchentlich an Frequenz zunehmen, sich bis zur epidemischen Verbreitung steigern, massenhafte Todesfälle besonders in der Armenpraxis veranlassen, und endlich im September allmählig erlöschen, wobei aber Ausläufer der Epidemie bis in den October hinein beobachtet werden. Trotz der eusigsten Forschungen ist das Wesen dieser Erkrankung uns noch gänzlich unbekannt. Bestimmte Formen von Bakterien, denen man die infectirende Eigenschaft mit Fug und Recht zuschreiben dürfte, sind bisher nicht gefunden worden, wenn auch die Ausläuferungen massenhafte Gebilde dieser Art enthalten. Man darf dabei nicht übersehen, dass Micrococci, zumal Gährpilze, sich in allen Stühlen, besonders reichlich in den sauer reagirenden, finden¹⁾. Dass aber fortgesetzte genaue Untersuchungen nach dieser Richtung hin vielleicht befriedigendere Ergebnisse bringen werden, lässt sich hoffen, wenn man die in der Literatur verzeichneten Fälle von Intestinalmykose²⁾ in Betracht zieht. Hier schienen schnell tödtliche choleraartige Erkrankungen durch milchsaureähnliche Fadenpilze bedingt zu sein, welche nicht bloss im Darminhalt, sondern auch in den Epithelien und im submucösen Gewebe des Darmkanals nachweisbar waren, und von da aus weiter in die Chylgefässe und Mesenterialdrüsen gelangten. Vorläufig aber dürfen wir die mykotische Entstehungsweise des Brechdurchfalls der Kinder immer nur als eine Hypothese betrachten. Thatsächlich ist, dass der unbestreitbare Einfluss der hohen Lufttemperatur die Neigung zu Gährungs-dyspepsien, welche bei kleinen unweckmässig ernährten Kindern zu allen Jahreszeiten vorhanden ist (S. 118), erheblich steigert, und dieselben nicht bloss in epidemischer Verbreitung, sondern auch in einer äusserst acuten Form erscheinen lässt, welche unter den gewöhnlichen Verhältnissen nicht gerade häufig ist. Dies lässt in der That darauf schliessen, dass ausser der Hitze noch infectiöse Keime, welche, durch dieselbe massenhaft entwickelt, mit den Nahrungsmitteln in den Magen gelangen, eine fördernde Rolle spielen. Unter gewissen Umständen kann daher die Krankheit auch während des Winters in überfüllten Krankenzimmern eine endemische Verbreitung gewinnen³⁾.

¹⁾ Nöthnagel, Zeitschr. f. Klin. Med. III. p. 205.

²⁾ Barkart, Klin. Wochenschr. 1873. No. 13. — Danne, 18. Bericht des Kaiserlichen Kinderpitals pro 1890. p. 26.

³⁾ Eysaie, Fragen med. Wochenschr. 1881. No. 33.

Das Bild der Cholera aestiva kleiner Kinder hat mit demjenigen der acuten Dyspepsie der Säuglinge (S. 118) sowohl klinisch wie anatomisch die grösste Aehnlichkeit. In beiden Fällen finden wir sehr verschiedene Intensitätsgrade von einer mehr oder minder copiosen Diarrhoe an bis zum schwersten, schnell tödtlichen Borchdurchfall. Rasch auf einander folgende, anfangs noch braungelb oder grünlich gefärbte dünne Ausleerungen eröffnen die Scene. Schmerz fehlt dabei ganz oder ist so unbedeutend, dass selbst ältere Kinder kaum darüber klagen. Abgesehen von Anorexie und vermehrtem Durst, kann das Allgemeinbefinden ungestört bleiben, und bei gehöriger Pflege geht die Diarrhoe spontan oder unter einer zweckmässigen Behandlung nach 24—48 Stunden vorüber, sobald die autonomen Darmconcenta durch die gesteigerte Peristaltik aus dem Körper entfernt sind. Aus diesem Grunde ist es auch nicht gerathen, von vorn herein stopfende Mittel anzuwenden, vielmehr passt hier dieselbe Diät und Behandlung, wie sie bei der acuten Dyspepsie empfohlen wurde (S. 122), besonders die Salzsäure oder kleine Dosen Calomel. Bei älteren Kindern ist Abstinenz (Schleimsuppen) und Ruhe im Bette dringend zu empfehlen. — In einer anderen Reihe von Fällen beginnt die Affection sofort mit stürmischem Erscheinungen. Bisweilen eröffnet ein heftiges Fieber, wie bei den Infectiouskrankheiten, die Scene¹⁾, während häufiger nur geringe oder gar keine Temperatursteigerung wahrgenommen wird. Massenhafte wässerige Ausleerungen und Erbrechen folgen schnell aufeinander. Die Intensität des letzteren ist sehr verschieden; bald tritt es nur selten, bald sehr häufig, nach jedem Genuss von Flüssigkeiten ein, und es fehlt selbst nicht an Fällen, in welchen das Erbrechen die Hauptrolle spielt und nur sehr wenige dünne Stühle im Laufe des Tages erfolgen. Allen gemeinsam ist aber die schnelle Rückwirkung auf den Kräftezustand, die um so rascher und stärker sich geltend macht, je jünger das befallene Kind ist, aber auch bei älteren Kindern und, wie Sie wissen, auch bei Erwachsenen nicht ausbleibt. Grosse Mattigkeit, Erblässen der Haut, Einsinken der Augen in die Orbita, Kühle der Wangen, der Hände und Füsse, zunehmende Frequenz und Kleinheit des Pulses, schwache erloschene Stimme, leichte Cyanose des Gesichts und der Schleimhäute bekunden das Sinken der Herzenergie. Die anfänglich vorhandene Unruhe und Jeritation geht bald in einen apathischen, somnolenten Zustand über. Dabei ist die Zunge und Mundhöhle trocken, der Durst enorm vermehrt, der Unterleib

¹⁾ Demme und Epstein haben Temperaturen von 40—42° beobachtet.

in der Regel nur wenig oder gar nicht aufgetrieben, auch nicht empfindlich gegen Druck, die Urinabsonderung wegen der starken Wasserverlaste durch Magen und Darm bedeutend vermindert.

In diesen stürmischen Fällen nehmen die anfangs noch faecal gefärbten und häufig riechenden Stühle sehr bald eine wässrige, hellgelbe, schliesslich fast farblose Beschaffenheit an. Schleim oder blutige Beimischung fehlt meistens, und wenn Blutspuren darin vorkommen, so stammen dieselben nur aus dem untersten Theile des Rectum oder aus der Umgebung des Anus, welche durch die copiosen Ausdeerungen erodirt werden. Ich habe solche Ausdeerungen wiederholt mikroskopisch untersucht, und als Formelemente nur viel abgestossenes Darmepithel und Vibrationen finden können, wie sie auch in anderen diarrhoeischen Stühlen vorkommen. Ueber die chemische Natur dieser Seces fehlen noch genügende Untersuchungen.

Während nun noch viele Fälle dieser Art bei zweckmässiger Behandlung unter allmähligem Nachlassen der stürmischen Erscheinungen in Genesung übergehen, endet ein grosser Theil derselben, welcher das erste Kindesalter, zumal unter ungünstigen Lebensverhältnissen betrifft, mit dem Tode, und die Sterblichkeitslisten der Sommermortalität liefern einen grauenvollen Beweis für die Wuth, mit welcher diese Krankheit die hauptstädtische Bevölkerung decimirt. Der Tod erfolgt hier immer in Folge der rapide zunehmenden Erschöpfung unter den Symptomen des Collapses und des Hydrocephalus (S. 269), cadaveröse Blässe, Cyanose, anhaltende Somnolenz mit halbgeschlossenen Augen, schliesslich vollständiger Sopor, Einsinken der noch offenen Fontanelle, Kälte der extremen Theile und Unföhlbarkeit des Pulses. Fast constant ist im letzten Stadium ein die eingefallenen Augen umgebender dunkler Schatten, zumal am unteren Augenlide, welcher durch das Vorspringen der Orbitalränder über den einsinkenden Bulbus und durch die in Folge der Herzschwäche entstehende venöse Stauung in den Augenlidern erzeugt wird. Schon an diesem Symptom erkennt man oft beim ersten Blick die schwere Form der infantilen Cholera. Auch vermiste ich im letzten Stadium fast niemals die büschelförmige Injection der Conjunctivalgefässe und die Schleimfetzen im Bindehautsack, von denen schon wiederholt die Rede war (S. 277). Nicht selten kam es auch zu partiellen Trübungen der Cornea, zumal desjenigen Theils derselben, welcher von den halbgeschlossenen Lidern nicht mehr bedeckt ist. Wie bei der Meningitis tuberculosa erschienen mir diese Veränderungen an den Augen auch hier immer als ein entschieden lethales Symptom, welches nur in einem einzigen Falle täuschte. Das Kind genau, obwohl die charakte-

risischen Schleimhäuten und Fötzen schon den Glanz der Cornea trübten, wobei aber in Betracht zu ziehen war, das ein leichter Katarrh der Conjunctiva schon vor der Cholera bestanden hatte. Das Symptom verlor also dadurch nichts von seiner entschiedenen letalen Bedeutung. Mitunter hören in diesem letzten Stadium die Ausleerungen nach oben und unten zur Freude der Eltern plötzlich auf, welche sich nunmehr den besten Hoffnungen überlassen. Ich warne Sie indes vor dieser Uebereilung, wenn nicht eine Zunahme des Kräftezustandes und eine allgemeine Besserung damit Hand in Hand geht. Oft genug sah ich, obwohl die Ausleerungen gänzlich cessirten, das Hydrocephaloid sich dennoch weiter entwickeln und tödtlich enden, mochte auch die durch *Erythrasia* bewirkte temporäre Wiederkehr der Wärme und Hebung des Pulses trügerische Hoffnungen erweckt haben.

Bei den Sectionen dieser Kinder findet man, wie fast alle Autoren bekennen und ich selbst vielfach erfahren habe, durchaus nichts Charakteristisches. Häufig beobachteten wir nur eine abnorme Blässe der ganzen Mucosenschleimhaut, allenfalls noch eine leichte Schwellung der soliden und Peyer'schen Drüsen, in andern Fällen streckenweise eine katarrhalische Röthung und Wulstung der Magen- und Darmschleimhaut, Partielle Atelektasen des Lungengewebes, venöse Hyperämie des Gehirns und der Pia, frische Thrombosen der Sinus oder anderer Venen, z. B. der *Vena renalis*, waren häufige Befunde, welche sich auf die bedauernde Schwäche und die gesunkene Herzenergie zurückführen liessen. Von der Auffassung der Krankheit als einer rein katarrhalischen kann daher keine Rede sein; vielmehr spricht gerade das meistens negative Resultat der Autopsie für die Annahme eines durch noch unbekannte Einflüsse angeregten abnormen chemischen Vorganges im Magen- und Darmkanale, welcher freilich bei längerer Dauer durch die anhaltende Reizung secundär zu katarrhalischen Processen führen kann. Daraus erkläre ich auch die Thatsache, dass viele Kinder nach einem glücklich überstandnen Hirschfeld'schen Fall noch längere Zeit an einem gewöhnlichen Darmkatarrh leiden.

Die hohe Gefahr der Krankheit erklärt die grosse Menge von Arzneimitteln, welche die Aerzte gegen dieselbe ins Feld geführt haben. Sie werden mir verlassen, diese Mittel hier einzeln aufzuführen und zu kritisiren. Viele Aerzte haben sich im Laufe der Praxis ihre Methode für die Therapie der Kindercholera gebildet, an welcher sie hängen, wenn auch die Resultate nicht gerade befriedigend sind; viele andere experimentiren hin und her, und ergreifen mit Begierde jedes von un-reifen Beobachtern empfohlene neue Mittel, um es bald wieder fallen zu

lassen. In jedem Sommer wiederholen sich die Anfragen der Collegen, welchem Mittel denn überhaupt und speciell in der gerade herrschenden Epidemie Vertrauen zu schenken sei. Das alles bestätigt nur die traurige Thatsache, dass es kein Specificum gegen die Cholera infantilis giebt, dass wir nicht im Stande sind, die in den Magen und Darmkanal eingedrungenen infectiösen Keime zu zerstören. Weder das Chinin noch die Carbol- oder die Salicylsäure, welche ich wiederholt innerlich versucht habe, bewährten sich, und das Chloalhydrat (1 : 120) zeigte höchstens eine das Erbrechen mässige Wirkung, konnte aber in schweren Fällen den tödtlichen Verlauf ebenso wenig aufhalten, wie das in neuester Zeit hin und da empfohlene Resorcin. Bei der Unmöglichkeit, die eigentlichen Krankheitserreger zu vernichten, bleibt daher nur übrig, die Wirkungen derselben, d. h. die durch sie bedingten Gährungsprocesse im Magen- und Darmkanal zu bekämpfen, und in allen Fällen, wo die Menge der eingedrungenen infectionselemente nicht zu bedeutend, ihre Wirkungen also nicht zu stürmisch sind, kann es gelingen, nach der völligen Ausstossung der toxischen und gährenden Stoffe eine Heilung herbeizuführen. Im entgegengesetzten Falle aber werden auch die kräftigsten Excitantien nicht vermögen, den durch die fortwährenden Entleerungen herbeigeführten Kräfteverfall aufzuhalten, und die Kinder gehen trotz aller unserer Bemühungen zu Grunde.

Es ergibt sich daraus, dass uns zur Bekämpfung der Cholera nur dieselben Mittel zu Gebote stehen, welche ich Ihnen schon für die Therapie der Gährungsdyspepsien (S. 123) empfehlen habe, und dass die sofortige Anwendung der Opiate, welche die deletären Massen im Darmkanal zurückhalten könnte, hier ebenso wenig passt, wie dort. In frischen Fällen, d. h. in den ersten 2–3 Tagen geben wir oft mit Erfolg die kleinen Dosen des Calomel (F. 2) und die Salzsäure (F. 3), und wenn diese erfolglos blieben das Creosot (F. 4). Bei eintretenden Zeichen der Schwäche lassen Sie sofort selbst zweimal täglich ein (28° R.) warmes Kamillenbad machen, in welchem die Kinder 5–10 Minuten verweilen, und Port-, Ungarwein und Sherry (20 gtt. bis einen Kinderlöffel je nach dem Alter) 2- bis 3stündlich reichen. Oft wird der Wein behalten, während andere Nahrungsmittel, Milch, Bouillon und die Medicamente rasch wieder ausgebrochen werden. Milch rathe ich überhaupt nur in Eis gekühlt, theelöffelweise zu geben (S. 122). Sollte sie trotzdem stets erbrochen werden, so versuche man concentrirte Bouillon oder Hühnereweiss (eins auf $\frac{1}{2}$ Liter abgekochten Wassers nach Epstein und Demme). Dauert das Uebel trotzdem fort oder bekommt man es überhaupt erst nach einigen Tagen in Behandlung, so scheue ich vor der

Anwendung des Opium nicht mehr zurück, weil wohl anzunehmen ist, dass die infectiösen Elemente nunmehr entleert worden, ihre Retention also nicht mehr zu fürchten ist. Ich lasse dann der Salzsäuremixtur je nach dem Alter 3—10 Tropfen Tinct. Opii simpl. zusetzen, auch wohl täglich ein paar Anhydanklystire mit 1—2 gr. Opiumtinctur appliciren. Ein möglichst grosses Krankenzimmer und sorgfältige Reinigung der Bettwäsche sind dringend zu empfehlen, leider aber nur in der Minorität der Fälle zu erzielen. Bei stärkerem Hervortreten des hydrocephaloiden Zustandes sind Injectionen von Schwefeläther und Campher (F. 14), kalter Champagner (thee- bis kinderlöffelweise), Senflöser, endlich hydropathische Einwickelungen und Begiessungen des ganzen Körpers zu versuchen, wodurch einerseits eine kräftige Ableitung nach der Haut bewirkt, andererseits die Herzhätigkeit stimulirt werden soll, leider oft ein vergebliches Bemühen. Der kaum zu stillende Durst der kleinen Patienten, welcher sich durch geringes Oeffnen des Mundes beim Anblick der Tasse oder des Löffels zu erkennen giebt, wird durch Einflüssen von kalter Milch oder Eiswasser am besten befriedigt. Sollte, was ja häufig geschieht, nach dem Ablauf der stürmischen Symptome noch eine katarrhalische Diarrhoe zurückbleiben, so kommen diejenigen Mittel in Anwendung, welche ich Ihnen bei der Schilderung der letzteren nennen werde.

Dies wäre die Behandlung der Kindercholera, welche sich mir persönlich am besten bewährt hat. Nach vielen Versuchen mit anderen Mitteln komme ich immer wieder auf dieselbe zurück und glaube daher, sie Ihnen vor allen anderen empfehlen zu dürfen. Ueber die Wirkungen der Ausspülungen des Magens und Darmkanals mit 2—2½% Borlösung (Demin) stehen mir keine eigenen Erfahrungen zu Gebot.

VIII. Die katarrhalische Diarrhoe.

Der Katarrh der Darmschleimhaut kann, wie ich schon bemerkte, durch die längere Einwirkung chemisch abnormer Contents, besonders durch die in saurer Gährung begriffenen Faecalmassen bei der Dyspepsie (S. 117) veranlasst werden, und auf ähnliche Weise haben wir uns auch die nach der Cholera oft zurückbleibende Diarrhoe zu deuten. Dass auch Reize anderer Art, zumal Fremdkörper, dieselbe Wirkung ausüben können, konnte ich wiederholt beobachten. Bei einem 2½-jährigen Mädchen entstand Erbrechen und hartnäckige Diarrhoe durch den Genuss von Kalkstückchen und Eierschalen, welche es auf dem Hofe aufgefunden und verschluckt hatte, und bei dem Kinde eines Erseurs bewirkte das Verschlucken abgeschaltener Haare einen äusserst heftigen

schleimigen Durchfall, welcher erst, nachdem man seine Ursache, die Haare, in den Ausleerungen entdeckt hatte, durch einige Gaben von Ocul. resin. beseitigt wurde. Ausser diesen directen Reizungen der Schleimhaut können aber, wie bei Erwachsenen, auch atmosphärische Schädlichkeiten, (Erkältung, Durchnässung) die Ursachen eines Darmkatarrhs werden. In einer dritten Reihe von Fällen tritt derselbe secundär in Gefolge gewisser Allgemeinkrankheiten, am häufigsten der Masern, auf. Im Allgemeinen wird das Colon häufiger und intensiver befallen, als der Dünndarm.

Man erkennt die katarrhalische Diarrhoe besonders an der mehr oder minder reichlichen Beimischung zäher Schleimfetzen oder Klumpchen in den Ausleerungen, denen nicht selten auch Blutpunkte und Strömen anhaften. Sehr häufig wird dabei Tenesmus in Form wiederholten Dringens nach erfolgter Defecation beobachtet, wobei ein kleiner Theil der dunkel gerötheten Mastdarmschleimhaut mit herausgepresst werden kann. Dieses Drängen und Pressen der Kinder wird besonders in den Fällen beobachtet, wo der untere Theil des Colon mit Einschluss des Mastdarms der Sitz des Katarrhs ist, während bei höherem Sitz desselben nur ein geräuschvolles Ausspritzen der dünnen Massen aus dem Anus stattzufinden pflegt. Bisweilen sah ich mit den Ausleerungen auch zahlreiche lebende Madenwürmer (*Ascarides*) abgehen, welche durch die starke Darmbewegung und den Strom der Flüssigkeiten aus ihrem Nestern fortgeschwemmt wurden. Fieber kann dabei vollständig fehlen und tritt, wo es vorhanden ist, immer nur als eine leichte Remittens auf (Morgentemperatur ganz oder nahezu normal, Abendtemperatur 38,0 bis 38,5). Bei etwas gesteigertem Durst kann der Appetit normal, aber auch vermindert und die Zunge mässig grau belegt sein. Schmerzhafte Koliken verkünden und begleiten häufig die Ausleerungen, können aber auch vollständig fehlen.

Fast alle diese Diarrhöen nehmen bei guter Pflege und Behandlung einen günstigen Ausgang. Eine Steigerung desselben zu hohen Graden, die man als acute Enteritis bezeichnen könnte, muss sehr selten sein, da ich trotz meines grossen Krankematerials Fälle dieser Art nur ausnahmsweise zu sehen Gelegenheit hatte. Einen der schlimmsten erlaube ich mir Ihnen hier mit wenigen Worten mitzutheilen¹⁾.

Ein 2-jähriges schwächliches Knabe, welcher schon früher oft an Diarrhoe gelitten hatte, war 12 Tage vor seinem ersten Besuch plötzlich mit heftigen epileptiformen Anfällen, hohem Fieber und copioser Diarrhoe erkrankt. Die letzten

¹⁾ Beiträge zur Kinderheilk. N. F. S. 301.

letzten Erscheinungen hatten schon längst trocken fortgedauert und allen Mitteln (Salzwasser, Ipecacuanha, Opium, Colombo, Tannin, Bismutstein innerlich und in Klystirform) hartnäckig Trotz geleistet. „a. mit 3 Tagen auch erheblich zugenommen. Innerhalb 24 Stunden erfolgten nochmals 12–15 ganz dünne, spinadgrüne, mit vielem Schleim vermischte Stühle, ungeschädigt und begleitet von heftigem Geschrei und rastlosem Umherwerfen. Dabei starker Fieber mit Kühle der extremen Theile. In den nächsten Tagen zunehmender Collaps, Apathie mit halbschlossenen Augen, kleiner sehr frequenter Puls und leichter Meteorismus. Schließlich Aufhören der Diarrhoe, erhebliche Zunahme des Meteorismus, Sopor und Tod am 17. Tage der Krankheit. Section: Allgemeine Anämie, Füllfelder, hochgradige Enteritis follicularis, reicht von der Mitte des Dünndarms bis zur Flexura sigmoidea reich; ausgekehrte Hyperämie und Wulstung der Schleimhaut, zahlreiche angeschwollene und gefäßreiche Follikel; an vielen Stellen ist die Mucosa unförmig von sehr kleinen runden Ulcerationen mit hyperämischer Umgebung durchsetzt; Röhre und netzartige Beschaffenheit der Peyerschen Plaques.

In diesem Falle gab schon der Beginn mit heftigem Fieber und reflectorischer Ekklampsie von der Schwere der Erkrankung Kunde. Es handelte sich hier um eine acute folliculäre Enteritis in grosser Ausdehnung, welche wahrscheinlich als plötzliche Steigerung eines bereits vorhandenen chronischen Darmkatarrhs durch eine unbekannt gebliebene Ursache (Düftfelder, Erkältung) betrachtet werden musste. Ungleich häufiger beobachten wir das umgekehrte Verhältniss, dass nämlich ein einfacher Darmkatarrh von den Eltern, zumal in der Armenpraxis, vernachlässigt, auf die „Zahne“ bezogen, und der Arzt erst consultirt wird, wenn viele Wochen und Monate darüber hingegangen sind. Dieser Uebergang in den chronischen Zustand, dessen ich schon bei der Dyspepsie (S. 117) gedachte, ist hier wie bei älteren Kindern fast immer eine Folge der Vernachlässigung und gehört zu den häufigsten Vorkommnissen in der poliklinischen Praxis. Die abnormalen Darmausleerungen dauern dann eine Reihe von Wochen mit wechselnder Frequenz fort, erfolgen bald selten, bald 10, 12 Mal täglich, wobei die Form des Unterleibs normal bleiben und Kolikschmerzen ganz fehlen können, während in anderen Fällen über Schmerz vor den Ausleerungen und Tenesmus geklagt wird, und der Leib etwas meteoristisch aufgetrieben erscheint. Die Stühle sind mehr oder weniger flüssig, ihre Quantität und ihr Aussehen sehr verschieden, grünlich braun, schwärzlich oder auch viel heller, mit Schleim vielfach vermischt und sehr übelriechend. Auch kleine Mengen von Blut werden nicht selten darin gefunden. Kräftige Kinder können, wenn die Diarrhoe nicht gerade peritus wird, Monate lang dabei bestehen, ohne dass der Appetit und die Ernährung merklich leiden. Bei den meisten aber macht sich sehr bald Abmagerung, Welkheit der Haut und Muskeln, zunächst der Adhärenzen des Ober-

schenkels, und blasse Hautfarbe bemerkbar. Diese Erscheinungen steigern sich, wenn es nicht gelingt, der Diarrhoe Einhalt zu thun, von Woche zu Woche, bis zu einem hohen Grade von Entkräftung und Atrophie. Oft erfolgt beim Stuhlgang ein Verfall der Mastdarmschleimhaut, und schliesslich laufen auch wohl die Excremente ununterbrochen aus dem gelähmten After heraus. Ein remittirendes Fieber (38—39° Abends) begleitet fast immer diesen traurigen Zustand, welcher unter zunehmendem Collaps nicht selten mit Entwicklung einer terminalen Bronchopneumonie lethale endet. In der letzten Zeit kommt es häufig zur Bildung von Soor in der Mund- und Rachenhöhle und zu oedematösen Anschwellungen der Füsse, Hände und des Gesichts, welche meistens als Folgen der sinkenden Herzenergie und der dadurch bedingten verösen Stauung betrachtet werden müssen; weit seltener lassen sich Thrombosen grösserer Venen oder eine complicirte Nephritis als Grund derselben nachweisen.

Selbst in diesen anscheinend hochgradigsten Fällen lässt sich doch die Intensität und Ausbreitung der anatomischen Veränderungen vor dem Tode nie bestimmen. Oft genug überzeuge ich mich von der Richtigkeit des Ausspruches von Rilliet und Barthéz, dass die Sectionen hier Resultate ergeben können, welche mit den Erscheinungen im Leben durchaus nicht harmoniren. Die Hyperämie und Wulstung der Schleimhaut, welche in diesen chronischen Fällen gewöhnlich eine rosabeaune oder Graurothe spielende Farbe zeigt, kann grosse oder kleine Strecken betreffen, mit oder ohne Anschwellung der Darmzotten, mit äusserst spärlichen kleinen Ulcerationen in der Nähe der Klappe oder mit sehr zahlreichen folliculären Geschwüren des Dünn- und Dickdarms einkeringehen, ohne dass während des Lebens die Intensität oder die relative Geringsfügigkeit der Symptome, zumal der Diarrhoe, dem Grade dieser anatomischen Alterationen zu entsprechen braucht. Besonders hüte man sich vor der übereilten Annahme sehr ausgedehnter Geschwüre, sobald nur eine copiose Diarrhoe, zunehmende Atrophie und ein remittirendes Fieber vorhanden sind. Denn ich war öfters sehr überrascht, unter diesen Umständen doch nur einen mässigen Darmkatarrh und ein paar vereinzelte folliculäre Geschwüre in der Nähe der Ileocaecalklappe oder im Colon aufzufinden. Man versäume übrigens niemals, in solchen Fällen die Mastdarmschleimhaut zu untersuchen, weil gerade hier der Katarrh und die Geschwürsbildung am stärksten entwickelt sein kann, während die höheren Darmtheile geringere Veränderungen darbieten. Andererseits fanden wir wiederholt die ganze Schleimhaut vom unteren Ende des Ileum an bis ins Rectum dunkelroth oder schiefenig gefärbt

und von zahlreichen folliculären Geschwüren siebförmig durchsetzt. Zu den häufigen Befunden gehört auch die schon von Legendre erwähnte fötliche Entartung der Leber, welche nicht immer stark geschwellen, aber missgebillt und etwas marmorirt erscheint, und mikroskopisch alle Charaktere der Fötalleber darbietet.

Die katarrhalischen Diarrhöen des Kindesalters müssen, wie aus diesen Folgen hervorgeht, von Anfang an recht ernst genommen, und den Eltern die genaue Beobachtung der ärztlichen Vorschriften um so dringender ans Herz gelegt werden, als die Gefahr hier grösser ist, wie bei Erwachsenen, einmal wegen der grösseren Neigung der Darmfollikel zur Hyperplasie und Ulceration, und zweitens wegen der bei Kindern vorherrschenden Tendenz der Mesenterialdrüsen, in Folge wiederholter oder länger andauernder Reizungen der Darmschleimhaut anzu-schwellen und zu verkäsen, in derselben Weise, wie wir es an den Bronchialdrüsen in Folge chronischer Bronchialkatarrhe und Bronchiecemenien beobachten. Auf die weitere Möglichkeit einer schliesslich daraus resultirenden allgemeinen Miliartuberkulose brauche ich nicht zurückzukommen.

Bei der Behandlung einer frischen katarrhalischen Diarrhöe hat man sich zunächst die Frage vorzulegen, ob vor dem Eintritt derselben Verstopfung bestanden, ferner, ob eine Indigestion den ersten Anlass zur Erkrankung gegeben hat. Unter diesen Umständen wird man die Cur am besten mit einem milden Purgans, z. B. einem Kinderöffel Öl ricini oder einigen Dosen Calomel (0.015 bis 0.03) eröffnen, besonders wenn auch Tenesmus vorhanden und die Stühle quantitativ gering und mit Blutpunkten oder Streifen vermischt sind. Nach der durch diese Mittel bewirkten Entleerung stagnirender oder chemisch reizender Darmcontenta sieht man nicht selten die Diarrhöe nach einigen Tagen verschwinden. Da nun die meisten primären Darmkatarrhe der Kinder, zumal in den ersten Jahren, ursprünglich dyspeptischer Natur sind, so wird man fast in jedem frischen Falle zuerst purgirend vorgehen können, auch wenn man die veranlassende Indigestion und Dyspepsie nicht sicher nachzuweisen vermag. Wenn aber schon Tage lang reichliche dünne Ausleerungen bestanden haben, oder gar eine Erkältung, der Missbrauch eines Purgans, des Brechweinsteins, mit Sicherheit als Ursache zu constatiren ist, so rathe ich Ihnen, die Kinder ins Bett zu legen, recht warm zu halten, nur eine schleimige, nährliche Diät zu gestatten und sofort ein Infus. rad. ipecac. mit einem kleinen Zusatz von Tinctura Opil (F. 29) zu verordnen. Ich ziehe diese Formel dem ähnlich zusammengesetzten Pulv. Doweri deshalb vor, weil ich das

letztere, selbst in kleinen Dosen, wiederholt Uebelkeit erzeugen sah, was beim Gebrauch jener Mixture nur ausnahmsweise der Fall war. Statt der Tinctur können Sie auch das Extr. Opii aquosum (0,002—0,005 pro dosi) anwenden; die noch immer bestehende Scheu vieler Ärzte vor der Anwendung der Opiate in der Kinderpraxis ist bei gehöriger Dosirung und Ueberwachung durchaus nicht gerechtfertigt. Bietet nun die Diarrhœe diesen Mitteln Trotz und zieht sich über eine Woche oder länger hinaus, so empfehle ich Ihnen zunächst das Bismuthum subnitricum (Magister. Bismuthi) in grossen Dosen (schon im ersten Jahre 0,1; später bis 0,3 2stündlich, F. 30), von dessen Wirksamkeit ich mich seit Jahren in einer sehr grossen Zahl von Fällen überzeugt habe. Die Stühle werden beim Gebrauch dieses Mittels oft schon nach wenigen Tagen consistenter und nehmen eine graugrüne Färbung an, doch ist immer ein längerer, mindestens 10—14tägiger Fortgebrauch nothwendig, um Recidive zu verhüten. In hartnäckigen Fällen ist ein Zusatz von Extract. Opii aquos. (0,003—0,005) zu jedem Pulver zu empfehlen. Die von Manchen betonte Unwirksamkeit des Wismuths beruht meiner Ueberzeugung nach auf den viel zu kleinen und seltenen Dosen, welche ein Theil der Ärzte anwendet. Dennoch wird man immer auf Fälle stossen, welche auch diesem Mittel Trotz bieten und in den chronischen Zustand übergehen. Wir appelliren dann zunächst an die Adstringentien, unter welchen die Decocte der Rad. Columbo oder des Cort. Cascarillae mit kleinen Opiumdosen (F. 31, 32) zwar wegen des bitteren Geschmacks den Kindern schwer beizubringen, aber oft sehr wirksam sind. Auch das Acidum tannicum (0,05—0,1 pro dosi) kann den ohnehin schon schwachen Appetit noch mehr beeinträchtigen, leistete mir aber, besonders in Verbindung mit der Tinct. nucem vom. (F. 33) häufig gute Dienste. Unter den metallischen Mitteln verdient zunächst das Argent. nitricum (0,002—0,003, F. 34), und wenn dasselbe etwa eine Woche lang erfolglos gebraucht wurde, das Plumbum aceticum (0,01—0,015) 3mal täglich mit kleinen Dosen Extr. Opi aq. (F. 35) Ihr Vertrauen. Noch in anscheinend hoffnungslosen Fällen sah ich von dem letzteren bisweilen Erfolg, niemals aber eine nachtheilige toxische Wirkung.

Man muss jedoch immer darauf gefasst sein, dass alle diese Mittel erfolglos bleiben oder durch Erregung von Anorexie, Uebelkeit oder gar Erbrechen nachtheilig wirken. Für solche Fälle besitzen wir noch in den Klystiren und besonders in den Eingiessungen medicamentöser Flüssigkeiten in den Darm ein Verfahren, welches, mit Consequenz angewendet, überraschend gute Dienste leisten kann. Man benutzt dazu

einen gewöhnlichen Irrigator oder Glastrichter, an welchem ein langer, mit einem Endstück von Horn oder Elfenbein versehener Gummischlauch befestigt ist. Sie haben nur darauf zu achten, dass das in den Mastdarm eingeschobene Endstück frei in der Höhlung desselben liegt und nicht gegen die Darmwand gepresst wird, weil dann die Öffnung verlegt wird und die Flüssigkeit nicht anströmen kann. Sie erkennen dies sofort aus dem unveränderten Niveau der Flüssigkeit im Trichter oder Irrigator, und müssen dann das Endstück etwas herausziehen und behutsam wieder verschieben. Die Eingiessungen werden zwar am besten in der Knie-Elleghenlage vorgenommen, gelangen aber auch in der rechten Seitenlage. Wir benutzten zu denselben in der Regel eine Lösung von Plumb. acetic. (5:1000), seltener von Alun und Tannin (20:1000), wovon etwa 300.0—500.0 jedesmal eingegossen wurden¹⁾. Bei grosser Empfindlichkeit der Schleimhaut wird oft schon während der Eingiessung ein Theil der Flüssigkeit wieder angestossen, während dieselbe sonst meistens 5—10 Minuten und länger im Darm verblieb. Einer der ersten auf diese Weise behandelten Fälle²⁾ verlief überraschend gut:

Mädchen von 2 Jahren, am 8. April 1874 mit einem schon seit Monaten bestehenden chronischen Catarrh des Colon aufgenommen. Typisches schleichendes Durchfälle, Meteorismus, massive Abmagerung. Nach der erfolglosen Anwendung innerer Mittel (Colochole, Opium, Blei u. s. w.) wurden am 29. die Eingiessungen der Solut. Plumb. acetic. begonnen und täglich einmal, später von Alun- und Tanninlösung abwechselnd ausgeführt, alle inneren Mittel aber unterbrochen. Stühle sofort von 5—6 täglich auf 2—3 vermindert. Fortsetzung bis zum 11. Juni, also beinahe 2 Monate lang, worauf nur noch 2—3 ganz normale Stühle täglich erfolgten, der Meteorismus verschwunden war, und das Kind an Körperfülle fastartig gewonnen hatte, dass es kaum wieder zu erkennen war. Anfangs August völlige Heilung.

Die seitdem fortgesetzten Versuche haben indess meine durch diesen Fall hochgespannten Erwartungen nicht ganz erfüllt. Wenn wir auch immer noch einzelne Fälle vorkamen, in welchen schon die ersten Eingiessungen überraschend günstige Wirkungen erzielen, blieb doch in vielen anderen der Erfolg ganz aus oder war nur ein temporärer. Immerhin ist das Verfahren in hartnäckigen Fällen, welche allen inneren Mitteln widerstehen, des Versuches werth, erfordert aber Beharrlichkeit, da die günstige Wirkung nicht gleich in den ersten Tagen zu erwarten ist.

¹⁾ Das zu Klypturen vielfachmalige Argentum nitricum (0.66 bis 0.1 auf 50.0 Aq. dest.) habe ich als Ungiessung noch nicht in Gebrauch gesetzt.

²⁾ Charité-Anal. Bd. I, S. 613.

Auf grosse Schwierigkeiten stößt gerade bei Kindern das Festhalten an einer zweckmässigen Diät, ohne welche an Heilung nicht zu denken ist. Dieselbe muss sich auf Fleischbrühe, gute Milch, Rothwein, schleimige Suppen, Eier, Reis, Gries und fein gehacktes Fleisch beschränken; alle zur Gährung neigenden Dünge, Gemüse, rohes und gekochtes Obst, Leguminosen u. s. w. sind ausgeschlossen. Gegen das vielfach verordnete rohe geschaltete Fleisch liegt nur das Bedenken vor, dass der Genuss desselben Bandwurm erzeugen kann. Ob Milch dem Kinde bekommt oder nicht, muss der Versuch entscheiden. Ich scheue mich nie, dieselbe zu empfehlen und sah oft die bis dahin ganz dünnen Stühle bei der Milchdiät sofort consistenten werden. Bedenkt man die milde Natur dieses Nahrungsmittels, welches bei Reizzuständen der Alimentaryschleimhaut Erwachsener oft so Vortreffliches leistet, so muss die Besorgnis vor der Anwendung desselben beim chronischen Darmkatarrh der Kinder in der That sehr übertrieben erscheinen. Bei älteren Kindern rathe ich auch zu einem Versuch mit den getrockneten Heidelbeeren (*Vaccinia myrt.*), aus denen man ein dickes Compot bereiten und davon ein bis zwei Untertassen voll täglich verzehren lässt. Dies alte Volksmittel, welches von den meisten Kindern gern genommen wird, leistete mir in mehreren Fällen, welche zwar nicht bedenklich waren, aber doch vielen Arzneien widerstanden hatten, überraschend schnell gute Dienste. Schon nach 24 Stunden sah ich danach dicke schwarze Auswürfungen, und bei fortgesetztem Gebrauche ohne Anwendung anderer Mittel dauernde Heilung erfolgen. —

Ich habe nun noch einige Worte über diejenige Form des Darmkatarrhs hinzuzufügen, welche secundär im Gefolge eines andern Krankheitsprocesses auftritt, nicht etwa als Complication, z. B. mit Bronchialkatarrh, die ja zu manchen Zeiten ausserordentlich häufig ist, sondern als ein wichtiges Glied, als eine Theilerscheinung im Gesammtbilde einer allgemeinen Erkrankung. Vor allem kommen hier die Infectionskrankheiten, besonders die Masern und der Typhus abdominalis in Betracht. Während bei diesen im Gefolge der Darmdrüsenanschwellung ein, wenn auch oft nur beschränkter, Katarrh der Schleimhaut anatomisch fast nie vermisst wird, giebt derselbe sich klinisch nicht immer durch Diarrhoe zu erkennen, vielmehr gehören Fälle von Ileus-typhus mit constanter Stuhlverstopfung oder mit nahezu normalen Stühlen auch bei Kindern nicht zu den Seltenheiten. Bei den Masern ist der Darmkatarrh schon im Blüthestadium eine häufige Erscheinung, und manche Epidemien zeichnen sich sogar durch ein Vorwiegen hartnäckiger Diarrhoen, welche die Reconvalescenz verzögern können, aus. Seltenere

finden wir dieselben beim Scharlachfieber, wo sie zumal im ersten Stadium und bei grosser Intensität nach meiner Erfahrung eine ungünstige Bedeutung haben. Die meisten Fälle, in denen ich von vorn herein eine copiose Diarrhoe beobachtete, waren milderer Natur und nahmen schnell einen letalen Ausgang.

Die anatomischen Charaktere eines mehr oder weniger ausgebreiteten Darmkatarrhs mit oder ohne Anschwellung der Follikel fand ich aber auch nicht selten in den Leichen von Kindern, die an den verschiedensten Krankheiten gestorben waren und während des Lebens wenig oder gar nicht an Diarrhöe gelitten hatten, so dass Niemand einen solchen Leichenbefund für möglich gehalten hätte. Ja, diese latente Erkrankung der Schleimhaut erreichte bisweilen einen über die Grenzen des Katarrhs weit hinausgehenden Grad, und kann eine intensive hämorrhagische Enteritis mit stellenweise eitrigen oder diphtheritischen Charakter darstellen, ohne dass während des Lebens ein ernstliches Symptom von Seiten des Darmkanals beobachtet worden ist. Am ausgeprägtesten beobachtete ich diese Erscheinung in zwei Fällen von chronischer Nephritis:

Otto W., 9 Jahre alt, Anfangs Januar 1874 mit Ekzem und Septikämie chronica (Delen u. s. w.) aufgenommen. Am 14. plötzlich Magenschmerzen und völlige Anorexie; Zunge grauweiss, Epigastrium stark aufgetrieben und beim Druck empfindlich. Zwei dünne braune Stühle sollen erfolgt sein. In den nächsten Tagen Fortdauer dieses Zustandes ohne Fieber, am 16. eisd. Vomitus, Stuhl dann und wann, aber am 18. auch Schmerz in der unteren rechten Partie des Unterleibs. Temp. ab 37,5 überschreitend, zunehmende Schwäche, plötzlicher Tod am 19. Jan. Die Section ergab neben einer vergrößerten Nephritis im Pouchet und längs des grossen Curvatur des Magens starke Rötze und Schwellung der Schleimhaut, welche hier von einer Lage sehr dünn gefalteten Schleims bedeckt ist. Darmschleimhaut durchweg mit reich, im Lumen und Colon besonders bedeutende Hyperämie, verbunden mit zahlreichen Hämorrhagien und starker Schwellung der Peyerschen und Solitärdrüsen. Die Mesenterialdrüsen zum Theil bis zur Kirschengrösse angeschwollen, derb, innen rötlich grau.

Wie gering waren hier die Symptome, Cardialgie, einmaliges Erbrechen, nur zwei dünne Stühle während des ganzen Verlaufs und totale Fieberlosigkeit, im Vergleich mit der hämorrhagisch-eitrigen Affection der Magen- und Darmschleimhaut, welche die Section nachwies! Noch intensiver war dieselbe bei einem

11jährigen Mädchen, welches mit Curie des Fieberbettes und chronischer Nephritis in die Klinik aufgenommen wurde und nach wenigen Tagen unter uräemischen Symptomen zu Grunde ging, ohne dass während des Lebens irgend ein auffallendes Darmsymptom beobachtet werden war. Bei der Autopsie fand sich das ganze untere Drittel der Darmschleimhaut nicht nur dunkelroth durch Hyperämie und hämorrhagische Infiltration, sondern auch streckenweise mit einer massigen

hängenden fibrinösen Aufhängung befecht, welche sich als ein Coagulum ausstülpen lässt.

Wodurch in diesen Fällen die intensive Reizung der Alimentschleimhaut bedingt war, bleibt dahingestellt. Vielleicht muss dabei der Reiz des von derselben abgesonderten und zersetzten Harnstoffs in Anschlag gebracht werden, welcher schon früher von Treitz für die Darmkatarrhe und Ulcerationen der Schleimhaut bei chronischer Nephritis geltend gemacht wurde. In klinischer Beziehung bleibt die Latenz einer so heftigen Erkrankung im hohen Grade auffallend, und muss vielleicht im zweiten Falle durch die alles überwiegenden Erscheinungen der Urämie, welche die letzten Tage der Patientin anfüllten, erklärt werden.

IX. Die Ruhr.

Häufiger, als bei Erwachsenen, beobachtet man im Kindesalter die allmähliche Entwicklung der Dysenterie aus einer katarrhalischen Diarrhoe. Ja in vielen Fällen, zumal in den beiden ersten Lebensjahren, kann der Arzt in Zweifel bleiben, ob er es in der That mit der wirklichen infectiösen Ruhr, oder nur mit einem nicht infectiösen acuten Katarrh des Dickdarms zu thun hat. Schleim und kleine Mengen von Blut können, wie schon bemerkt wurde, bei jeder katarrhalischen Diarrhoe in den Ausleerungen vorkommen, und auch der Tenismus, welcher sich durch anhaltendes Stöhnen und Pressen bei und nach dem Stuhlgange und durch die Weigerung der Kinder, ihren Sitz auf dem Nachtöpfe zu verlassen, kund giebt, ist keine seltene Erscheinung. Erst wenn der Stuhlgang sich ungewöhnlich oft wiederholt, und dabei entweder nur etwas blutiger Schleim oder sehr geringe mit vielern Schleim und Blut vermischte Faecalstoffe entleert werden, pflegt man den Fall als einen „dysenterischen“ zu bezeichnen. Damit ist aber noch keineswegs ausgesprochen, dass derselbe in der That durch den specifischen Infectiösstoff der eigentlichen Ruhr veranlasst, also eine „Ruhr“ im wahren Sinne des Wortes ist. Anatomisch und klinisch handelt es sich immer nur um eine Colitis, für deren infectiöse Natur sich eigentlich nur die epidemische Häufung der Fälle zu gewissen Zeiten, zumal in den Monaten August und September, geltend machen lässt. Sporadische Fälle von Colitis, selbst sehr intensive, werden immer Zweifels in dieser Beziehung Raum geben.

Das Krankheitsbild bietet keine wesentlichen Unterschiede von demjenigen der Erwachsenen. Meistens eröffnet eine Diarrhée die Scene; erst nach 24—48 Stunden treten die eigentlichen dysenterischen Stühle ein,

bestehend aus kleinen Mengen eines zähen, blutgestreiften, glasigen, braunen Schleims, welcher unter starkem Tenismus sehr häufig, mitunter 5 bis 6mal und öfter in einer Stunde entleert wird. Kolikschmerzen, Empfindlichkeit und Aufreibung des Unterleibs, auch wiederholtes Erbrechen, sind nicht seltene Begleiter. Der Appetit ist erloschen, der Durst gesteigert. Fieber kann gänzlich fehlen oder sehr mässig sein, so dass nur in den Nachmittags- und Abendstunden 38,5 bis 39° erreicht wird, während in intensiveren Fällen eine Continua remittens mit Remissionen in den Morgenstunden (38,0 M., 39,5 und darüber Ab.) besteht. Dieser Zustand kann nach 8 bis 10 Tagen, allmählig abnehmend, sein Ende erreichen, aber auch viel länger dauern. Bei einzelnen Kindern sah ich das Fieber, den Tenismus und die zahlreichen Defaecationen (16—20 täglich) volle 3 Wochen fortauern und erst dann Genesung eintreten. Schon in den leichteren Fällen ist die Schwäche, welche sich im Pulse und noch mehr in der ganzen Haltung der Kinder ausprägt, viel bedeutender, als bei einfachen Darmkatarrhen von ebenso langer Dauer; auch ist die zurückbleibende anämische Blässe intensiver und nachhaltiger. In schweren Fällen aber steigert sich die Schwäche in Folge der zahllosen schmerzhaften und stets blutigen Ausleerungen, so wie des stärkeren Fiebers, bald zu einem drohenden Collaps; Kühle der extremen Körpertheile, fadenförmiger Puls, grosse Apathie und Somnolenz, welche nur durch Unruhe beim Eintritt des Tenismus und der heftigen Koliken unterbrochen wird, subnormale Temperatur (36—37°), schliesslich Paralyse des Sphinkter ani mit permanentem Offenstehen desselben und continuirlichem Abfluss eines übelriechenden, oft membranösen Fetzen und Blutgerinnsel enthaltenden bräunlichen Schleims, leiten allmählig in den durch äusserste Herzschwäche bedingten Tod hinüber. Die erwähnte Lähmung des Schliessmuskels gestattete mir bisweilen durch Auseinanderziehen der Nates den Anus so zu dilatiren, dass ich einen guten Einblick in das untere Ende des Rectum ohne Anwendung des Spiegels gewann. Unter diesen Umständen wird man immer sehr ausgedehnte, meistens durch diphtherische Nekrose bedingte Substanzverluste der Kolenschleimhaut, von welcher oft nur noch Rudimente vorhanden sind, entdecken können.

Max K., 4-jährig, aufgenommen am 18. Juli 1877. Vor 5 Tagen angeblich nach dem reichlichen Genuss von Kirschen starke Diarrhoe (8 Stühle, welche auch unvollständigen Kirschen enthielten). Schon am folgenden Tage aber bestanden die Stühle nur aus Schleim und Blut, und erfolgten fast alle 15 Minuten, begleitet von starken Koliken und Bringen. Der Knabe wurde ständl theilnahmlos, matt und febrile. Anteeckung nicht nachweisbar. Bei der Aufnahme grosse Blässe und Mattigkeit, Augäpfel halb geschlossen, T. 39,4. P. 132, Mein. Vollständige Anurie,

wenig Durst; Zunge dick grauweiß belegt, etwas trocken. Urstuhlgang stark eingesunken, wenig empfindlich, schließt. Anhaltender Tenismus, Kolikschmerzen, stündlich voll 6—8 spärliche Ausleerungen, welche aus ausvergrünem blutigem Schleim bestehen. Therapie: Öl, nicht 1 Kinderschöfel, Eibistel auf die Regio hypogastrica. Nuxvom. Alsbei Eingiehung einer Lösung von Plant. acut. (5 : 400) in das Reum (s. S. 467) und Bopylana. Am folgenden Tage erster Fortschritt der Dys-symptome kleine Exsudationen: T. 38,4; P. 132, schlaflos, Seufzen und Schreie. Tod in der Nacht zum 15.

Section: Im unteren Theil des Reum 1' oberhalb der Klappe beginnt starke Rötzung der Schleimhaut, zu welcher sich bald eine diphtheritische Infiltration gesellt. Im Colon ascendens und transversum zahlreiche durch Abtödtung derselben entstandene Gänge wahr, noch zahlreicher im Colon descendens, wo auch frische diphtheritische Infiltrationen wieder auftritt. Diese greift auch auf das obere Drittel des Mastdarms über, dessen untere zwei Drittel ganz frei sind. Alle übrigen Organe intact.

Dieser äusserst rapide, kaum eine Woche dauernde Fall, ist wohl durch den Drüsenschler kaum zu erklären. Trotz des sehr acuten Verlaufs war es bereits zu tief greifenden nekrotisirenden Veränderungen der Schleimhaut gekommen. Noch prägnanter finden wir dieselben bei dem Knaben.

Richard S., 8 Jahre alt, aufgenommen am 29. Juli 1878. Vor 5 Tagen ohne Ursache plötzliche Erkrankung mit starkem Durst, schon nach 36 Stunden blutiger Stuhlgang und Tenismus, der sich seit dem letzten Tage fast alle 15—30 Minuten wiederholt. Ausleerungen sehr gering, aus Schleim und Blut bestehend. Unterleib nicht aufgetrieben, wenig empfindlich; Zunge dick grauweiß belegt, Anorexie, grosse Schwäche, P. 132, Klein T. 36,5. Nach einem Löffel Öl, nicht enthält der Stuhl ein paar Mal kleine Fäcalmassen, doch nur vorübergehend. Trotz 2mal täglich wiederholter Eingießungen von Solut. Planti acut., und dem innerlichen Gebrauche von Inf. mal. (pouc.) mit Opium, später auch von Argent. nitric., sowohl innerlich (0,12 : 120), wie per rectum keine Besserung. Heftige Schmerzen, anhaltende blutige schaumige Stühle, zunehmende Schwäche mit wechselnder Qualität des Pulses, dessen Frequenz von 104 bis 126 schwankt, und stets auf normaler Temperatur (36,2 bis 37,2). Tod am 4. August nach einer Dauer von etwa 12 Tagen.

Section: Colon stark contrahirt, Serosa desselben injicirt. Dünndarm abgesehen von heftigem Catarrh und Fäkalbeschweifung intact. Im Cecum beginnt sofort eine lebhafte Rötzung der Mucosa, von der Flexura hepatica an ruckackförmige Gefässkreise, theils in Verwachsung begriffen, theils mit diphtheritischer Auflagerung bedeckt. Letztere auch auf der die Geschwüre umgebenden Schleimhaut, welche stark gerötzt und geröthet ist, als eine leicht abnehmbare, misfarbige, nicht pseudomembranöse Schicht sichtbar. Weiter abwärts wird diese Veränderung ausgeblendet, die Schleimhaut hämorrhagisch. Von der Flexura sigmoidea an ist diese nur noch in kleinen inselförmigen Resten vorhanden und verschwindet endlich ganz, so dass die innere Oberfläche des stark verklebten Darms vollständig von diphtheritischer Infiltration gebildet wird. Alle übrigen Organe intact. —

In anderen Fällen zieht sich der Verlauf weit länger, viele Wochen und Monate lang hinaus (Dysenteria chronica). Während dieser

ganzen Zeit zeigen die Symptome eine wechselnde Intensität, und eine temporäre deutliche Beschaffenheit der Ausleerungen kann trügerische Hoffnungen erwecken. Bei einem am 19. September 1876 aufgenommenen 6jährigen Mädchen dauerte die Krankheit auf diese Weise beinahe 8 Wochen, wobei die Temperatur Morgens normal oder gar subnormal war, Abends aber immer auf 39–39,7 stieg. Hier war der Wechsel rein blutiger und schleimiger mit consistenteren, selbst Scybala enthaltenden Ausleerungen besonders auffallend, wobei aber doch trotz aller therapeutischen Bemühungen Schwäche und Abmagerung unauffällige Fortschritte machten. Die Section ergab fast dieselben Resultate wie in dem zuletzt mitgetheilten Falle des Knaben Richard S. In der That kann man sich einen Erfolg nur in den leichten und mittelschweren Fällen versprechen, in welchen, wie man annehmen darf, die anatomischen Veränderungen nicht über einen mehr oder minder intensiven Kolonkatarth mit Schwellung, und allenfalls mit vereinzelter Ulceration der Follikel hinausgehen. Sobald aber die Erscheinungen jenes höchsten Grad erreichen, und besonders in den Ausleerungen grössere abgestossene Fetzen des nekrotischen Schleimhautgewebes erscheinen, ist die Prognose höchst ungünstig, die Heilung äusserst selten. Selbst im günstigsten Falle können in Folge der nachigen Schrumpfung nekrotisierter Stenosen Stenosen des Kolons oder des Mastdarms zurückbleiben, welche das Leben untergraben, und selbst in Fällen von mittlerer Intensität muss man auf solche Dinge vorbereitet sein.

Ich beobachtete ein paar Mal bei Kindern von 5–7 Jahren in Folge einer nicht sehr schweren Dysenterie Erscheinungen, welche die Desorganisation des Ektums und des Anus wohl rechtfertigten. Es handelte sich nämlich um sehr dünn membranöse, häufig gestreifte Massen, welche ohne Schmerz und Tenesmus von Zeit zu Zeit entleert wurden, wobei aber der Stuhlgang sonst normal und das Allgemeinbefinden ungestört blieb. Dieser Abgang erfolgte nämlich täglich, bald mehr, bald weniger reichlich, meistens eine oder ein paar Wochen hintereinander, worauf dann wieder Wochen, ja Monate lange Intervalle eintraten, in denen trotz täglicher gewisser Untersuchung des Stuhlganges nichts Verächtliches wahrgenommen wurde. Brachte man den Abgang in Wasser aus, so kühlte er flammende mehr flüssige Fetzen, welche unter dem Mikroskop aus einer grössentheils structurlosen, zum Theil aber faserigen Masse mit eingestreuten Blut- und Eiterkörperchen bestanden. Ich sah diese Abgänge noch sechs Jahre lang nach einer abgeklungenen Dysenterie von Zeit zu Zeit wiederholen, konnte aber bis jetzt noch ein den schliesslichen Ausgang bezeichnen. Da die locale Untersuchung des Rectum mit Finger und Spiegel keine Abnormität ergab, so musste der Sitz des Uebels höher oben, wo er nicht zu erreichen war, gesucht werden, und es liegt nahe, dass dysenterische Reizden in Form von Ulcerationen oder beschrankten eitrigen Processen der Kolonschleimhaut annehmen, welche zumeist keimen, dann unter dem Einflusse von Reizen, z. B. Pflanzentraktionen, wieder

exercitium. In keinem dieser Fälle gelang es, durch adstringierende innerliche Mittel oder Eingiessungen in den Darm eine dauernde Heilung zu bewirken.

Glücklicher war ich bei einem 2jährigen Kinde, welches am 30. Januar 1877 in die Poliklinik gebracht wurde. Dasselbe hatte Anfangs December 1876 im Gefolge der Malaria eine Colitis mit blutigen Stühlen und Tenesmus überstanden, welche nach einer 3wöchentlichen Dauer folgenden Zustand hinterlassen hatten: täglich erfolgten noch etwa 4—6 Stühle, von denen einige wenig consist., andere mit Blut und eitrigen Schleim vermischte waren, oder nur aus kleinen Mengen von Schleim und Blut bestanden. Tenesmus und Proctopus am fehlten dabei fast nie. Das Kind war mager und mager, bot aber sonst nichts Krankhaftes dar, und auch die Untersuchung des Rectums blieb resultatlos. Von der Annahme einer nach der Colitis zurückgebliebenen Ulceration ausgehend liess ich täglich ein Klystir von Argent. nit. (0,1 : 90), und nach 5 Tagen Klystir von Aloes (1 Theelöffel auf einem Tassenlopf Wasser) appliciren, worauf binnen 14 Tagen alle krankhaften Symptome verschwunden waren.

Die Behandlung der dysenterischen Zustände ist im Allgemeinen die gleiche in allen Lebensaltern. Ich eröffne die Cur in frischen, höchstens einige Tage alten Fällen immer mit einem milden Abführmittel, z. B. einem Kinderlöffel *Ol. ricini* oder einer grösseren Dosis *Calomel* (0,1 bis 0,3), und gebe eine *Emulso ricinosa* (F. 36), oder *Calomel* zu 0,05—0,05 2stündlich ein paar Tage fort. Erst nachdem die Stühle consist. geworden und damit die Möglichkeit grösserer Fäcalstagnationen im Darm beseitigt ist, gehe ich zu einem Infus. *rad. ipecac.*, bei fortwährenden Schmerzen und Tenesmus mit einem Zusatz von *Tinct. theb.* oder *Extr. Op. sq.* (F. 29) über. Bei starker Auftreibung und Empfindlichkeit des Unterleibs wird ein Eisbeutel auf denselben applicirt, und als Nahrung nur in Eis gekühlte Milch, höchstens noch etwas Haferseifen und Bouillon gestattet. Diese Behandlung führt in den leichteren Fällen (der sogenannten katarrhalischen Dysenterie) meistens zum Ziel. Gelingt dies nicht, so empfehle ich Ihnen die bereits (S. 467) erwähnten Eingiessungen von Tannin, Aloes, und besonders von *Pimentum aceticum*, denen man jedesmal eine Irrigation des Darms mit lauwarmem Wasser oder mit einer Lösung von Salicylsäure (1 : 1000) vorausschickt. Diese Eingiessungen können 2 mal täglich vorgenommen werden.

Hedwig R., 11 Jahre alt, aufgenommen am 2. Juli 1875. Vor 3 Tagen, angeblich nach dem vorübergehenden Genuss von Johannisbeeren heftige Kälten und Umläufe. Schon am folgenden Tage starker Tenesmus, gelbbraune Leichliche mit auf zu Frequenz stets zunehmende, nur aus Blut und Schleim bestehende Stühle. Bei der Aufnahme erfolgen dieselben wohl 15—20mal täglich; Leib beim Druck schmerzhaft, wenig aufgetrieben, hart; graugelb belegte Zunge. T. 38,4, P. 120. Nach einem Löffel *Eclicissal* forcirte Ausräumungen, die aber sehr bald wieder den dysenterischen Hitz machen. Dasselbe geschieht nach einer zweiten Dosis *Richmüll.*, und

auch der Gebrauch von Calomel (0,05 mit Extr. Opii sq. 0,01 2mal d.) Unst 14 mm 6. ohne wesentlichen Erfolg. Der Bauch ist gespannt und empfindlich; einmal ist auch Erbrechen eingetreten, die Temp. Mg. 38,4, Ab. 39,0. Nachdem auch eine Euphrasia-rinnsal ohne Erfolg geblieben, werden von 8. an zwei täglich Eingiessungen einer Auflösung von Natrium acet. (5:1000) in den Darm eingeführt und bis zum 12. consequent fortgesetzt, alle anderen Mittel weggelassen. Während dieser Tage vermehrt sich die Frequenz der Stühle, dieselben werden dauernd laxirend, wenn sie auch noch immer etwas Blut und Schleim enthalten; die Temp. wirdieberlos (36,9—37,6); Puls 104—108. Vom 12. an statt der Eingiessungen innerlich Magn. Bisnuthi 0,2 2mal d. Am 15. vollkommen fester faeculenten Stuhl, Wohlbefinden, Am 24. Entlassung.

Dass man in sehr schweren Fällen auch mit diesen Darmirrigationen nicht weiter kommt, lehren frolich die oben (S. 472 ff.) mitgetheilten Krankengeschichten. Jedenfalls aber verdienen sie entschieden den Vorzug vor den früher gerühmten Klystiren von emollirenden oder adstringirenden Flüssigkeiten, welche wohl nie über das Rectum hindringen und nur da mit Aussicht auf Erfolg anzuwenden sind, wo man eben im Rectum die Hauptveränderungen annehmen darf. Dass aber in den schwersten Fällen von Dysenterie weder die Eingiessungen, noch die gerühmtesten Internas (Ipecacuanha, Nux vomica, Argent. nitr., Magist. Bisnuthi u. a.) etwas leisten können, wird Jedem klar sein, der nur ein paar Mal Gelegenheit hatte, die furchtbaren Verwüstungen des Darmkanals, welche diese Krankheit hinterlässt, auf dem Sectionstische zu beobachten.

X. Die Stuhlverstopfung.

Schon bei kleinen Kindern, selbst Säuglingen, wird die Hilfe des Arztes nicht selten wegen Obstructio alvi in Anspruch genommen. Es giebt viele Kinder, welche ohne künstliche Nachhülfe Tagelang verstopft bleiben, oder nur mit grosser Anstrengung, wobei sie dunkelroth im Gesicht werden, ganz harte Stühle auspressen, welche beim Hineinfallen ins Nachtgeschirr steinähnlich klappen und durch ihre mechanische Einwirkung kleine Erosionen und Blutungen aus dem Anus erzeugen. Man findet daher oft an diesen harten Faecalknollen Blutspuren. Auffallend ist dabei die meistens sehr helle, blassgelbe oder weniglich graue Farbe der Faeces, die meistens gerade so aussehen, wie beim Icterus, ohne dass aber eine Spur von Gelbsucht wahrzunehmen oder das Befinden sonst in irgend einer Weise gestört ist. Es könnte sich daher um eine mangelhafte Absorption von Galle oder um eine blässere Farbe ihres Pigmentes handeln, worüber indess, so viel ich weiss, bis jetzt nichts Genaueres bekannt ist. Auch ein vermehrter Kalkgehalt der Faeces soll eine der-

artige Beschaffenheit derselben erzeugen könnten. Bei Säuglingen pflegt diese Verstopfung mit einem Wechsel der Amme oder mit der Entwöhnung der Erde zu erreichen, kann aber auch bis in das spätere Kindesalter fortauern und erst durch den Genuss einer gemischten Nahrung und durch heissige Körperbewegung günstig beeinflusst werden. Gewöhnlich suchen sich die Mütter selbst durch Darreichung von Puly. magnes. cum rheo, Puly. liquor. cytop., Ol. ricini, Tinct. rhei, Tamarindenconfect u. s. w. zu helfen, ehe sie den Arzt aufsuchen, müssen aber immer grössere Dosen dieser Mittel anwenden, um genügende Wirkung zu erzielen. Am besten ist es, sich in solchen Fällen mit Ausschluss aller inneren Mittel auf die tägliche Application eines Klysters von kaltem Wasser zu beschränken, welchem man bei sehr hartnäckiger Obstruction eine Prise Kochsalz zusetzen kann. Mit diesem Verfahren und besonders mit Geduld kommt man fast immer zum Ziel. —

Weil seltener als bei Erwachsenen beobachtete ich im kindlichen Alter jene Form von Kothanhäufung im Dickdarm, welche ganz allmählig zu Stande kommt, obwohl die Patienten noch täglich oder mindestens einen um den anderen Tag Stuhlgang haben. In diesen Fällen wird immer nur ein kleiner Theil der Darminhalte entleert, der bei weitem grössere Theil bleibt zurück, häuft sich im Colon an und veranlasst endlich krankhafte Erscheinungen. Ich spreche hier noch nicht von den Fäcalstuckungen im Coecum, welche durch übermässige Spannung desselben zur Typhlitis stercoralis führen können, sondern von einer enormen Auftreibung des ganzen Unterleibs, welche ich bei zwei Knaben von 7 und 9 Jahren beobachtete. Durch ihre halbkugelige Form, grosse Spannung und partielle Drackempfindlichkeit macht dieselbe nicht bloss die Eltern, sondern auch den Arzt ernstlich besorgt, und ich selbst konnte beim ersten Anblick des Vorplatz einer chronischen Peritonitis nicht unterdrücken. Beide Patienten waren die Kinder vermögender und sehr zärtlicher Eltern, und wurden mit allen möglichen unpassenden Leckerbissen (Austern, Pasteten u. s. w.) vielfach gefüttert, ohne dass man daran dachte nachzusehen, ob denn auch die Defecation dieser Polyphagen entsprechend von Statten ging. So entstand allmählig jene enorme Ausdehnung des Colons durch Kothmassen und Gas, welches sich aus diesen entwickelte, und erst durch eine Wochen lang fortgesetzte tägliche Anwendung von Abführmitteln bei strenger Diät (Fleischnahrung, Compot., Ausschluss aller Amylacea und Leguminosen) gelang es, die Auftreibung des Bauches allmählig zu remissiren und endlich ganz zu beseitigen, wobei die massenhaften scybalösen und breiigen, äusserst dunklen und stinkenden Ausleerungen, welche täglich ganz

Töpfe füllten, unser Stauen erregten. Als Abführmittel empfehle ich Ihnen für solche Fälle besonders das Electuar, o Senna, entweder rein zu 1—2 Theelöffel täglich, oder nach E. 28. Nur bei relativ wenigen Kranken bewirkt dasselbe starke Kolik, so dass man es aussetzen muss; meistens kann man es mit gutem Erfolg ein paar Wochen hinter einander nehmen lassen. —

In einigen Fällen, welche fast alle kleine Kinder im ersten und zweiten Lebensjahre betrafen, wurde die Verstopfung offenbar durch Schmerz am Anus bedingt. In dem Augenblicke der Defécation entstand nämlich eine krampfartige, schmerzhaft-Contractur des Sphinkter ani, und machte die Entleerung der Faeces, nach welcher die Kinder wiederholt verlangten, unmöglich. Jeder Versuch erregte sofort heftiges Geschrei und wurde alsbald wieder aufgegeben, so dass bisweilen mehrere Tage vergingen, ohne dass eine Ausleerung erfolgte¹⁾. Bei der Untersuchung des Anus findet man zuweilen einen, selten ein paar schmale röhrl. Längsriss (Fissuren) in den die Anusöffnung umgebenden Hautfalten, in der Regel an der Uebergangsstelle der äusseren Haut in die Schleimhaut, welche bei der Berührung äusserst empfindlich sind und vielleicht durch die mechanische Einwirkung harter Stühle entstehen. Von diesen Fissuren aus scheint dann reflectorisch jene schmerzhaft, die Defécation hemmende Contractur des Sphinkter ani auszugehen²⁾. Oeffters wird mit den harten Kothkugeln etwas blutiger Schleim oder selbst reines Blut tropfenweise entleert. Mitunter liegt die Fissur auch höher oberhalb des Anus in der Schleimhaut und kann dann nur durch eine Untersuchung mit dem Mastdarmspiegel erkannt werden. Ich lasse es dahingestellt, ob in dem folgenden Falle eine solche interne Fissur oder eine primäre Contractur des Sphinkter ani vorhanden war. Bei einem 1½-jährigen Kinde konnte ich trotz sorgfältiger Untersuchung (aber ohne Spiegel) keine Fissur finden, und doch war die Contractur des Sphinkter so stark, dass der Versuch, mit dem kleinen Finger durch den Anus einzudringen, stets energischen Widerstand fand. Nachdem ich den Eingang indess gewaltsam erzerragen und dabei deutlich das Gefühl einer partiellen Zerreissung gehabt hatte, war das Uebel sofort beseitigt. Schmerz und Contractur hörten auf, und nachdem ein paar Tage lang noch Ol. cum ricini gebraucht worden, erfolgte der Stuhlgang ohne

1) Damme (18. Jahrbuch.) sah bei einem 18 Monate alten Kinde mit Fissura ani nur alle 8—10 Tage schmerzhaften harten Stuhlgang erfolgen, welchen stets heftigste Uebelabreibungen einige Tage vorausgingen.

2) Aekische Entzündungen beobachtete Bozz (Memoriali IV, List. 12) in Folge einer Ekzema ani.

weitere Störungen. Diese mechanische Therapie der Dehnung oder Zerreißung des Sphinkter genügt aber nicht, wo Fissuren vorhanden sind. Hier wird man durch Aetzen derselben mit Lapis infernalis, oder durch Bestreichen mit einer Tanninsalbe (1:20) bei gleichzeitigem Gebrauch von Purgantia die Heilung derselben zu bewirken versuchen. Kommt man damit nicht weiter, so ist die Exstirpation oder die Spaltung der Fissur und der angrenzenden Muskelfasern des Sphinkter mit vorzunehmen. Unter allen Umständen muss man hier consequent eingreifen, weil sonst die im Rectum angehäuften Massen durch ihren Reiz zu anhaltendem Tenismus und bald auch zur Secretion eines übelriechenden Schleims Anlass geben könnten. —

Mit dem Namen *Ileus* bezeichnet man bekanntlich die hartnäckigste, auch den bewährtesten Abführmitteln widerstehende, acute auftretende Form der *Obstructio alvi*, welche sich bald mit Erbrechen schliesslich faeculent riechender, brauner Flüssigkeiten verbindet. Schon bald nach der Geburt kann diese Form der Obstruction zur Beobachtung kommen, wenn eine angeborene Stenose oder eine vollständige Impermeabilität des Darmrohrs an irgend einer Stelle seines Verlaufs vorhanden ist. Das Duodenum und die Ileocolicpartie zeigen am häufigsten diese angeborenen Fehler, doch kann, wie z. B. der folgende Fall lehrt, auch jede andere Darmpartie der Sitz derselben sein:

Kind von 3 Tagen, aufgenommen am 7. Jan. 1881 mit gleichschwellenden Händen und Füssen (Finger und Zehen fast ganz fehlend), sonst gut entwickelt. Seit der Geburt noch kein Stuhlgang, dagegen Erbrechen aller genommenen Milch und schwärzlich grüne Massen. After und Rectum normal beschaffen, Ventril mässig gespannt, hat gar nicht aufgetrieben. Kein Fieber. Diagnose: Atresie einer Strecke des Dünndarms. Bis zum 18., dem Todestage, keine erhebliche Veränderung, langsamer Verfall. Section: Duodenum und Jejunum in einer Strecke von 80 Ctm. bis zur Dicke eines starken Daumens dilatirt und in einem 20 Ctm. langen 5 Ctm. im Durchmesser habenden Hohlack endend; darauf folgt ein 7 Ctm. langer solider Strang von der Dicke einer Stricknadel (das obste Duodenalstück) und dann der Rest des freien und verbluteten Darmkanals.

Bemerkenswerth ist die Combination der foetalen Darmobliteration mit dem Defect der Finger und Zehen, ein Zusammentreffen, welches mich in der Diagnose der ersten wesentlich unterstützte. Die weit häufiger zu beobachtende Atresie des Anus, welche der durch Mangel der Meconiumentleerung beunruhigte Arzt alsbald entdeckt, soll uns als ein der Chirurgie anheimfallender Fehler nicht länger beschäftigen. Ich wende mich vielmehr gleich zu denjenigen Krankheitszuständen, welche in einem normal entwickelten kindlichen Darmkanal die Erscheinungen des *Ileus* hervorzuführen pflegen.

Im Allgemeinen finden wir hier dieselben Verhältnisse wie bei Erwachsenen, nur nicht alle in gleicher Häufigkeit. So gehören z. B. Brucheinklemmungen, welche bei diesen unter den Anlässen des Ileus die erste Stelle einnehmen, bei Kindern zu den Seltenheiten. Dass man aber auch hier an diese Möglichkeit denken muss, beweisen Fälle von *Hernia incarcerata*, welche bei Kindern in den ersten Wochen des Lebens vorkamen und zum Theil glücklich operirt wurden¹⁾. Man wird daher auch bei einem an Ileus leidenden Kinde, und sei es noch so jung, die Untersuchung der bekannten Bruchpforten nie verabsäumen dürfen. Aber weder diese Art des Ileus, noch die durch einen Volvulus oder durch obstruierende Darmacontenta, z. B. einen Kothstein veranlasste, bieten Verschiedenheiten von den bei Erwachsenen weit häufiger beobachteten Fällen dieser Art dar. Dem Kindesalter eigenthümlich ist nur die sehr selten gefundene Obturation des Darmlumens durch einen Klappen in einander verschlungener Spulwürmer; aber auch hier kann höchstens von einer Vermuthung, nicht von einer Diagnose die Rede sein. Charakteristische Erscheinungen bietet nur eine Art des Ileus, und gerade die häufigste bei Kindern, dar; ich meine

Die Darmeinschiebung

(*Intussusceptio* s. *Invaginatio*). Es handelt sich hier nicht um die oft mehrfachen kleinen Invaginationen im Verlaufe des Dünndarms, welche man in den Leichen vieler an den verschiedensten Krankheitsen gestorbenen Kinder findet. Das Fehlen aller Symptome, der ausserst geringe Umfang und die Leichtigkeit, mit welcher das eingeschobene Darmstück schon dem leisen Zuge der Hand folgt, beweisen, dass diese Invaginationen erst kurz vor dem Tode entstanden sein können. Die *Intussusception*, mit welcher wir es hier zu thun haben, betrifft vielmehr immer einen weit grösseren Theil des Darmkanals, und zwar gewöhnlich in der Art, dass das untere Ende des Ileum nebst dem Cecum sich in das Colon ascendens einstülpt und beim weiteren Vorrücken auch unten nach das letztere umgestülpt in das Colon transversum oder descendens mit herabzieht. In vielen Fällen ist die Invagination freilich eine beschränkte und erreicht nur eine Länge von 6—8 Ctm. Die Ausdehnung derselben kann aber viel bedeutender werden, und Fälle, in welchen das untere Ende des Ileum, das Colon ascendens und transversum bis in das absteigende Colon eingestülpt waren, und die Spitze dieses Intusus-

¹⁾ Berliner klin. Wochenschr. 1879, S. 688 u. 677. — Deutze's Jahresber. für 1878, S. 58. — Archiv f. Kinderheilk. III. 1882, S. 203 ff.

ceptum im Rectum gefühlt oder gar aus demselben herausgefrängt wurde, und wiederholt beobachtet werden.

Bei weitem die grösste Zahl der Invaginationen, welche im Kindesalter vorkommen, betrifft das erste Lebensjahr. Die Ursache dieser zufallenden Disposition ist nicht bekannt, denn den von Maachen geltend gemachten starken passiven Bewegungen, insbesondere dem Hin- und Herschwingen in horizontaler und verticaler Richtung wird man doch kaum einen so nachtheiligen Einfluss zuschreiben können, wenn man damit die heftigen activen Bewegungen älterer Kinder vergleicht, welche doch ungleich seltener an Intussusceptionen leiden. Auch eine vorausgehende Diarrhoe, welche als Ursache beschuldigt wird, fehlte in vielen Fällen. Die Diagnose dieses Zustandes beruht vorzugsweise auf dem Complex dreier Symptome, Stuhlverstopfung, Erbrechen und Blutabgang aus dem After. In der Regel beginnt die Krankheit ganz plötzlich inmitten voller Gesundheit mit heftigem Geschrei, grosser Unruhe, wiederholtem Erbrechen und Verstopfung. Abführmittel und Klystire haben keinen Erfolg, letztere werden alsbald wieder ausgestossen, und häufig zeigt sich schon am ersten Tage, fast immer aber im weiteren Verlaufe Abgang von Blut aus dem Anus, welches Anfangs noch mit Kothresten, später mit vielem Schleim oder mit seröser Flüssigkeit vermischt ist, oder auch wohl rein, zum Theil coagulirt, in verschöner Menge entleert wird. In der Regel wird die Menge von den Angehörigen überschätzt, doch werden meistens 1 bis 1 $\frac{1}{2}$ Esslöfel voll Blut und selbst noch mehr auf einmal ausgestossen. Tenismus fehlt dabei selten, und oft kommt es zu 5, 6 und mehr der beschriebenen Ausleerungen im Laufe des Tages. Getränke, nach welchen die Kinder zierig verlangen, erregen fast immer Erbrechen. Der Unterleib kann in den ersten 24 bis 48 Stunden seine normale Form und Weichheit behalten, wird aber dann meistens gespannt, meteoristisch aufgetrieben und empfindlich. Sobald dies geschieht, ist man nicht mehr im Stande, eine durch Invagination bedingte Geschwulst im Laufe des Rectum durch die Palpation deutlich zu constatiren. Dass dies aber möglich ist, so lange der Unterleib noch weich und die Wände nachgiebig sind, ist bei Kindern so gut wie bei Erwachsenen durch Beobachtung erwiesen. Mir selbst ist in drei Fällen, die ich persönlich zu untersuchen Gelegenheit hatte, der Nachweis eines Tumors nicht gelungen, weder durch das Gefühl, noch durch die Percussion, weil die Invagination durch die von Gas stark ausgedehnten Dünndarmschlingen völlig überdeckt war. Ich möchte daher auf den Befund eines Tumors hier keinen besonderen diagnostischen Werth legen. Dagegen gelang es mir zwei Mal, mit dem

tief in den Mastdarm eingeführten Finger die abgerundete Spitze des Intussusceptum deutlich zu fühlen und ihren Umfang zu umschreiben. Derselbe hat entschiedene Ähnlichkeit mit der vaginalen Portion des Uterus und bietet auch, wie diese, eine central oder mehr seitlich gelegene rindliche oder spaltförmige Oefnung dar, in welche der Finger etwas eindringen kann, das stark comprimirt und verschmollene Lumen des eingeschobenen Darmtheils. Unter diesen Umständen ist die Diagnose unzweifelhaft. Weit seltener wird durch ungestümes Drängen das Intussusceptum in der Länge einiger Centimeter herausgepresst, und liegt dann als eine dunkelrothe blüige Geschwulst mit centraler Oefnung vor dem Anus.

Kann man die Einziehung nicht im Rectum fühlen oder gar ausserhalb desselben sehen, so lässt sich zwar die Diagnose nicht mit absoluter Sicherheit, aber doch mit grosser Wahrscheinlichkeit daraus stellen, dass ja, wie ich bereits erwähnte, alle anderen Ursachen des acuten Ileus im ersten Kindesalter unendlich viel seltener vorkommen, und dass die drei mit einander verbundenen Symptome, unbesiegbare Verstopfung, Erbrechen und die aus der Schleimhaut des eingeschobenen Darmstückes stattfindende Blutung, nach den Erfahrungen aller Autoren fast entscheidend sind. Der weitere Verlauf entspricht ganz dem bei Erwachsenen beobachteten. In den ungünstigen Fällen, welche leider die grosse Mehrzahl bilden, Zunahme des Meteorismus, anhaltendes schmerzhaftes Wimmern und Schreien, welches schliesslich einer völligen Apathie Platz macht, kühle Wangen und Extremitäten, kleiner schwindelnder äusserst frequenter Puls, zuweilen halb- oder doppelseitige Convulsionen, endlich lethaler tödtlicher Collaps nach einer mittleren Krankheitsdauer von 4–8 Tagen; im günstigen Falle Rückbildung der Invagination mit Abgang von Flatus und kothigen Stühlen, oder nekrotische Abstossung des eingeschobenen Darmstückes mit Herstellung eines mehr oder weniger normalen Darmlumens und entsprechender Verkürzung des Darmkanals. Bemerkenswerth ist es, dass nach den Erfahrungen aller Autoren eine diffuse Peritonitis in Folge der Intussusception bei Kindern weit seltener als bei Erwachsenen beobachtet wird.

Kind C., 1 Jahr alt, stets an Obstructionen leidend, soll gerade in den letzten Tagen ganz normale Ausstürungen gehabt haben. Am 15. Oct. 1873 völlige Euphorie bis zum spätem Abend. In der Nacht grosse Unruhe, kein Schlaf, einmal Stuhlgang, welcher nur aus Schleim und Blut besteht, gegen Morgen Erbrechen der Milch. Bismuth-Milch ebenso wirkungslos wie mehrere Klystire, die sofort wieder ausgesprochen wurden. Erlöschen aller Genossenzen, und abermals ein rein blutiger Stuhlgang. Unterleib normal, mit Flies. Am 17. Sonstiges, nachwieder Verfall, kein Stuhlgang. Abends nachmittags Klystir von Dornoway eine Stunde nach Hin-

selben eine fümige braune Anfeuerung, in welcher das am 16. getrennte Ektisid deutlich erkennbar war. In der Nacht nach mehrere Stühle. Am 18. mit Ausnahme von Schwäche alles normal. Dauernde Heilung.

Kind Ph., 1jährig, mütterl. gewöhnt, schlachte am Abend des 27. Februar 1875 ohne erkennbare Ursache plötzlich mit heftigen Geschrei und Erbrechen. Am folgenden Morgen eine starke Entleerung reinen Blutes aus dem After, mäßiger Meteorismus. Diese Erscheinungen dauern mit gesteigerter Intensität bis zum 2. März, wo ich das Kind zuerst sah, fort. Fäulnis Stuhlgeruch war nicht zu erzielen, doch hatte das Erbrechen aufgehört. Ich fand bereits beginnenden Collaps. Wiederholte Euklysien blieben ohne Erfolg. Als ich nun mit dem Finger in den Anus einging, stieß ich deutlich im mittleren Theile des Mastdarms auf mit centraler Öffnung versehenes Intusussceptum, welches ich mit der Fingerspitze ebenso wie die Vaginalportion eines Uterus umschreiben konnte. Unmittelbar nach dem Zurückziehen meines Fingers erfolgte ein Ausfluss schaumig brauner Flüssigkeit aus dem Anus und gleichzeitig die Ausstoßung eines nekrotischen Darmstückes von etwa 2½ Zoll Länge, welches, wie die Untersuchung ergab, dem Colon angehörte. Damit erleichteten die Intususceptione ihr Ende, und in den nächsten 5 Tagen erfolgte häufige dünne fadenförmige Stühle. Vom 6. an trat indess von neuem Verstopfung ein, der Meteorismus nahm wieder zu, und anhaltendes Geschrei deutete auf heftige Colikschmerzen. Trotzdem wurde das Aussehen bedeutend besser und der Puls kräftiger, Erbrechen blieb aus und das Kind nahm Brühe, Wein und Eismilch in kleinen Mengen zu sich. Der Afterloß wurde mit einem Einleitel bedeckt und innerlich eine *Potio gummosa* (120/6) mit *Tinct. Opi* (gtt. IV.) versetzt, um die heftigen Schmerzen zu beruhigen. Unter dieser Behandlung erfolgte vom 8. an täglich 8—10 mal sehr reichliche fümige braune Stühle, welche einen gangränösen Geruch verbreiteten, aber keine Darmfetzen mehr enthielten. Dabei schwand allmählig der Meteorismus, der Appetit wurde lebhafter, die Schmerzen immer seltener, das Aussehen besser, so dass der Ektisid fortgelassen wurde. Die Diarrhoe bestand trotz des Opiumgebrauchs fort, und noch am 20. wurden 15 dünnflüssige hellgelbe schleimige Stühle gelöst. Erst unter dem Gelsenbe des Tannins mit *Tinct. rac.* vom (F. 33) und der Stärkenchylature erfolgte eine Abnahme der Diarrhoe und bis zum 30. völlige Heilung.

In beiden Fällen kann nur eine Invagination von geringer Ausdehnung bestanden haben, welche sich bei dem ersten Kinde plötzlich zurückbildete, bei dem zweiten nach der äusserst kurzen Dauer von etwa 3—4 Tagen durch Nekrose abgestossen wurde. Wir sehen aber auf dies Ereigniss nicht sofort eine vollständige Heilung, vielmehr noch einen heftigen Darmkatarrh folgen, welcher uns wochenlang in Athem erstickt und das Leben des Kindes in Frage stellte. Wodurch derselbe bedingt wurde, ob durch den direct reizenden Einfluss des Intusussceptum auf die Schleimhaut, oder durch gangränöse Reste, welche erst allmählig entleert werden mussten, bleibt dahin gestellt; für die letztere Annahme lässt sich wenigstens der gangränöse Geruch der Stühle geltend machen.

Diese spontanen Heilungen der Invagination gehören indess in allen Lebensaltern zu den Seltenheiten, und bei Kindern wird insbesondere

die Abtossung der eingeschlossenen Darmpartie noch seltener als bei Erwachsenen beobachtet. Aus diesem Grunde wird sich auch der Arzt schwerlich mit einem abwartenden Verfahren begnügen. Die Befeuken, welche sich einer eingreifenden Behandlung entgegenstellen, sind indess hier dieselben, wie im späteren Lebensalter. Sobald die Diagnose einer Invagination feststeht, pflegt man von der Anwendung der Abführmittel, welche durch die starke Vermehrung der Peristaltik nur Schaden stiften können, abzistehen. Auch Klystire werden von Vielen geschont, weil sie sofort fruchtlos wieder abgehen und dabei in derselben Weise wie die Purgantien ein weiteres Vorschreiten der Invagination begünstigen sollen. Das letztere scheint mir indess noch keineswegs bewiesen zu sein; vielmehr scheint ausser manchen anderen unser erster Fall, in welchem schon eine Stunde nach der Application des ersten Eiwasserklystirs eine faeculente Ausleerung erfolgte, dafür zu sprechen, dass die Anregung der Peristaltik auch wohl einen günstigen Einfluss ausüben vermag. Ich würde daher, so unsicher das Verfahren auch sein mag, den Versuch mit Eiwasserklystiren, welche 1–2 stündlich applicirt werden, immer empfehlen, und diesem Verfahren schreibe ich auch die Heilung in dem folgenden Falle zu, welcher trotz des Fehlens der Blutabgänge wohl nur als eine Intussusception gedeutet werden kann:

Kind von 6 Monaten, am 12. Febr. 1881 zuerst untersucht. Seit 3 Tagen Verstopfung trotz Calomel, Elixiröl und wiederholter Klystire. Auch kein Abgang von Flatus. Dafür häufiges Erbrechen gelblicher schleimiger Flüssigkeit. Harth geformt, Rectum frei, Verfall der Gesichtszüge und Kinks der Carotiden. Ther.: Zufall ein Eiwasserklystir, Etwasch theilweise, Wein. In der folgenden Nacht noch häufiges Erbrechen bräunlich, abschleimender Flüssigkeit. Von 3 Uhr an Besser. Bald darauf Kollern im Leibe und zwei dünne bräunlich-gelbe, sehr fetide Stühle. Den 13. Bauch weicher, Aussehen besser, P. 140. Eiwasserklystir Zufall. Fortschreitende Besserung. Nehmen dünne Stühle. Am 14. früh zum ersten Mal ein knäuelgrüner Stuhl. Euphorie. Auch in diesem Falle traten in den nächsten Tagen noch heftigste Erscheinungen mit Darhörs. Gleich wie bei dem Kinde Pk. (p. 482) etc.

Statt der Klystire kann man auch reichlichere Eingiessungen von Eiwasser mittelst des Irrigators machen, wenn diese auch jedes Mal sofort wieder entleert werden sollten. Dies Verfahren vermag gleichzeitig durch den mechanischen Druck der Flüssigkeit denselben Zweck zu fördern, welchen man bei der Empfehlung anderer mechanischer Reductionsmethoden zu erreichen versucht; ich meine das Einblasen von Luft in den Darm mittelst eines Blasbalgs und die Einführung einer mit einem Schwämmchen armirten Fischbeisstange, mit welcher man die im Rectum fühlbare Invagination direct nach oben zurückzuschieben

strebt. Der Erfolg dieser Methoden ist durch eine, wenn auch nur kleine Zahl geheilter Fälle (Senator, Nissen u. A.) festgestellt, und es lässt sich daher gegen dieselben, einmal gegen den Versuch des Luft-einblasens nichts einwenden, wenn man nur vorsichtig dabei zu Werke geht und sofort davon absteht, wenn die Sache nicht bald gelingt. Die Gefahr liegt nämlich darin, dass man nie vorauswissen kann, ob das Intussusceptum überhaupt noch reducibel, oder ob es bereits durch Verklebung der beiden serösen Blätter (des Intussusceptum und der sogenannten Schride) fixirt ist. In diesem Falle könnte jeder gewaltsame Versuch der Reposition Zerreißen der Adhäsionen und der Serosa selbst zur Folge haben, deren Folgen gar nicht zu berechnen sind. Ich würde also diese mechanischen Repositionsversuche (Einblasen von Luft, Wasserinjection, Sondeneinführung) vorzugsweise dann unternehmen, sobald es gelingt, eine im Mastdarm zu fühlende Darmanschwellung durch dieselben nach oben zurückzudrängen, wenn sie auch immer wieder recidiviren sollte. Man darf den Versuch dann ohne Gefahr mehrfach wiederholen, und er kann schliesslich zur wirklichen Heilung führen¹⁾. Gelingt dies nicht, so scheint es mir gerathener, von jedem gewaltsamen Verfahren abzustehen und die spontane Abtossung, welche, wie wir in unserem zweiten Falle sahen, schon innerhalb weniger Tage erfolgen kann, abzuwarten. Ich gebe zu, dass der Thätendurst des Arztes dabei keine Befriedigung findet, und zwar um so weniger, als es äusserst ungewiss ist, ob überhaupt das Leben bis zur Abtossung des Intussusceptum fortbestehen wird; aber es scheint mir doch immer besser sich in Geduld zu fassen, als gewaltsame Eingriffe, welche Rupturen und Peritonitis zur Folge haben könnten, in Scene zu setzen. In den häufigeren Fällen, wo man die Intussusception nicht im Mastdarm fühlen, sondern nur aus den anderen angegebenen Symptomen diagnosticiren kann, wird man ebenfalls Lufteinblasungen versuchen können, wenn diese aber ohne Erfolg bleiben, sich auf Irrigationen grösserer Mengen von Eiswasser beschränken, einen Eisbeutel auf den Unterleib appliciren und etwa vorhandene heftige Kolikschmerzen durch kleine Dosen von Opium oder Morphinum (F. 10) zu lindern suchen. Die Nahrung darf immer nur aus kleinen Mengen Wein und Eismilch (Hüffelweise gereicht) bestehen. In einzelnen Fällen soll Aufhängen an den Beinen, oder die Massage des Abdomens, besonders an der Stelle, wo ein Tumor fühlbar ist, die Reduction desselben bewirkt haben. Unter verzweifelten Umständen ist auch die Laparotomie mit darauf folgender Entwirrung

¹⁾ Senator, Ludwig (Klin. Wochenschr. 1878. No. 26).

der Intussusception oder Anlegung eines künstlichen Alters wiederholt, aber nur ausnahmsweise mit Erfolg versucht worden, welcher besonders dadurch vereitelt wurde, dass selbst nach glücklicher Auffindung der Invagination das Herausziehen desselben aus dem unteren Darmstücke fast immer misslang ⁷⁾. Bei der Unmöglichkeit, eine bestimmte Indication für den Zeitpunkt der Laparotomie festzustellen, muss daher die Verantwortlichkeit für den Erfolg dem Arzte zur Last fallen, welcher das Warniss unternimmt.

XI. Die Mastdarmpolypen.

Abgesehen von der *Melaena nematorum* (S. 59) und der Invagination fanden wir Blutabgang aus dem Darmkanal noch bei Colitis, Dysenterie und deren Residuen, wobei das Blut immer mehr oder weniger mit Schleim oder Faecalmaterie vermischt ist. Andere Ursachen einer Darmblutung, insbesondere Magengeschwüre, Darmkrebs, Hämorrhoids kommen im Kindesalter nur ganz ausnahmsweise vor. Ich selbst habe nur ein paar Mal Hämorrhoidalknotten, welche indess nicht bluteten, bei Kindern beobachtet, z. B. bei einem 9jährigen Knaben, welcher öfters über Schmerzen beim Stuhlgange klagte und, wie die Untersuchung ergab, dicht über dem Anus 3—4 erbsengrosse und grössere häutige Varicen hatte, welche beim Drängen aus dem After hervortraten. Wirkliche Hämorrhoidalblutungen sind mir bis jetzt nicht begegnet. Dagegen trifft man hier und da auf Fälle von Blutabgang aus dem Darmkanal, welche trotz der sorgfältigsten Untersuchung ein diagnostisches Räthsel bleiben, wie z. B. der folgende:

Im März 1868 wurde ich bei einem 1½-jährigen Kinde consultirt, welches seit 8 Tagen an gastrischen Symptomen litt. Anorexie, Neigung zur Obstipation, Zungenbelag, Störsch und Erbrechen auf, welches sich im Verlauf einiger Stunden mehrmals wiederholte und copiosen Massen von Speiseresten und Schleim mit etwas Blut entleerte. Eine Stunde später erfolgten auch reichliche Abgänge eines dunkeln mit Kathallen vermischten Blutes aus dem Anus, welche sich im Laufe der Nacht 4 mal wiederholten. Die Gesamtmenge des entleerten Blutes möchte wohl einen Tassenkopf füllen. Dabei kein Fieber, kein Collaps. Am nächsten Morgen noch ein paar Mal schleimiges Erbrechen und Kolikschmerzen, dann einige normale Stühle und damit dauernde Besserung.

Ich muss es dem Leser überlassen, sich hier selbst eine Diagnose zu bilden. An eine Invagination ward wohl Niemand denken, eher noch

⁷⁾ Bell, Marsh and Hutchinson, *Jahrb. f. Kinderheilk.* IX, S. 427 u. ff. — Grünländer, *Jahrb. f. Kinderheilk.* XVII, S. 304) beschreibt einen letal abgelaufenen Fall, in welchem nach der Laparotomie die sekretisch gewordene Dickdarmpartie reseirt werden war.

an eine wunde Stelle auf der Schleimhaut des Magens oder Darcanals, deren Ursprung aber wegen des acuten Verlaufs und der raschen Heilung vollkommen dunkel ist. Um so klarer ist die Diagnose in einer Reihe von Fällen, welche bei Kindern von 3—12 Jahren ziemlich häufig vorkommen, und in welchen die Hämorrhagie durch die Bildung von Polypen im Mastdarm bedingt wird. Polypöse Wucherungen von Erbsen- bis Bohnengrösse und darüber finden sich auf der Schleimhaut des kindlichen Dickdarms durchaus nicht selten; ich selbst beobachtete sie bisweilen in multipler Form bei den Sectionen von Kindern, die an sehr verschiedenen Krankheiten gestorben waren und keine auffälligen Erscheinungen von Seiten des Darmkanals dargeboten hatten. Am häufigsten aber ist der Mastdarm, und zwar die einige Centimeter über dem äusseren Sphinkter gelegene Partie der Sitz des Polypen, welcher aus einer Wucherung der Schleimhaut und der in derselben befindlichen Schleimdrüsen (Adenom) hervorgegangen, bis zur Grösse einer Kirsche, ja selbst einer kleinen Pflaume heranwachsen kann und schliesslich nur noch durch einen mehr oder weniger langen und dünnen Stiel mit seinem Mutterboden verbunden ist.

Das erste und zugleich einzige Symptom des Mastdarmpolypen ist eine Blutung, die selten spontan, vielmehr fast immer nur beim Stuhlgange oder unmittelbar nach demselben erfolgt, wobei das Blut tropfenweise oder auch in etwas grösserer Menge aus dem After rieselt und die Wäsche befeuchtet. Niemals ist das Blut mit den Faeces innig gemischt, sondern liegt auf der Oberfläche derselben, so dass es erst im letzten Augenblicke der Defaecation sich denselben beigesellt haben kann. In jedem Falle dieser Art müssen Sie sofort an einen Mastdarmpolypen denken und die Sache niemals leicht nehmen; denn mag auch jedesmal nur wenig Blut verloren gehen, so kann doch die tägliche Wiederholung der Blutung die Kinder schwach und anämisch machen. Oft genug besteht dieses Uebel schon viele Monate und länger, ehe die Eltern überhaupt daran denken, einen Arzt zu consultiren; ja es sind mir Fälle bekannt, wo bei kleinen Mädchen das Leiden als frühzeitige Menstruation betrachtet und gänzlich vernachlässigt wurde. Bei genauerer Nachfrage erfährt man nun oft, dass bei jedem Stuhlgange sich aus dem After des Kindes „etwas hervordränge“, und wenn man gerade während des Stuhlganges zugegen ist oder ältere Kinder auffodert, tüchtig zu drängen, so kann man bisweilen selbst beobachten, wie eine dunkelrothe, bohnen- bis kirschgrosse oder noch grössere rindliche Geschwulst, mit leicht blutender Oberfläche, aus dem Anus sich hervorstülpt und nach der Defaecation in denselben wieder zurückzieht. Diese Wahrneh-

nung ist aber, was ich besonders betone, immer nur eine zufällige; sehr oft habe ich danach gesucht und den Tumor doch niemals vor dem After sehen können, obwohl die betreffenden Kinder selbst angaben, dass beim Stuhlgange etwas aus dem After herauskomme und nach demselben zurücktrete. Unerlässlich bleibt daher immer die Untersuchung des Rectum mit dem Finger, am besten in der Knieelhockengelage des Kindes, wobei Sie nicht selten den Polypen oberhalb des Sphinkters deutlich fühlen können. Verlassen Sie sich indes nicht allzu sehr auf diese Untersuchung. Sät der Polyp etwas hoch, so kann er gerade während der Exploration durch Hineinschlüpfen in die hier befindliche Ausweitung des Mastdarms dem Finger entgehen, und die Untersuchung bleibt ohne Resultat; auch mit dem Mastdarmspiegel ist er kaum je zu sehen, weil er dem eingeführten Instrument auszuweichen pflegt.

Im Juni 1877 erschien in meiner Sprechstunde ein fünfjähriges Mädchen, welches nach Aussage der Mutter an einem Mastdarmentfalle leiden sollte. Die häufigen Blutungen beim Stuhlgange sprachen indeed mehr für einen Polypen, und ich bestellte das Kind behufs genauerer Prüfung in meine Klinik. Trotz der genauesten und wiederholten Untersuchung konnten aber weder ich, noch meine Assistenten einen Polypen im Rectum fühlen, obwohl die Mutter fest behauptete, dass noch vor einer Viertelstunde eine Geschwulst aus dem After herausgedrückt worden sei. Da nach starkem Drängen auf dem Topfe nicht zum Ziel führte, so entliess ich das Kind, ohne über den Fall ins Klare gekommen zu sein. Aber schon nach wenigen Minuten kehrte die Mutter mit dem Kinde zurück und zeigte mir erst in der That einen blau-rothen pflaumengrossen Polypen, welcher vor dem After des Kindes lag und durch einen mehr als 2 Ctm. langen dünnen Stiel mit der Mastdarmschleimhaut zusammenhing. Ich fasste den Stiel sofort zwischen zwei Finger, um ihn zu fixiren und abzuschneiden; aber noch ehe ich dazu kam, machte das erschrockene Kind eine gewaltsame Bewegung, der Stiel zerbrach und der Polyp blieb in meiner Hand. Von diesem Augenblicke an hörten die Blutungen für immer auf.

So ersieht man schon aus diesem Fall, dass Polypen mit langem und dünnem Stiel im Rectum beim Durchgang harter Faecalmassen abreißen können, und in der That gehört diese spontane Elimination des Tumores nicht zu den Seltenheiten, wenn auch der Polyp nicht immer gefunden wird. So erklären sich manche Fälle von Jahre langen Mastdarmlidungen, welche plötzlich von selbst verschwinden. Die Behandlung kann natürlich nur eine operative sein. Man fasst den Polypen, wenn er gerade vor dem After liegt, mit einer Kornzange, zieht ihn nach stärker hervor und schnidet den Stiel mit einer Schere durch. Schwieriger wird die Sache, wenn man den Polypen nicht wasserhalb des Anus trifft, sondern innerhalb des Mastdarms zu fassen suchen muss. Jedenfalls hat die Durchschneidung des Stiels vor der Ligatur den Vorzug der Schnelligkeit und ist dabei durchaus gefahrlos.

XII. Der Mastdarmvorfall.

Weit häufiger, als die Polypen, kommt der Prolapsus ani im kindlichen Lebensalter vor, ja bei der Seltenheit desselben im späteren Alter können wir den Prolaps fast als eine Specialität der Kinder betrachten. Am häufigsten werden die ersten Lebensjahre befallen, wenn auch das Alter von 2 bis 6 Jahren immer noch genug Beispiele dieser Affection aufzuweisen hat.

Der Mastdarmvorfall stellt gleichsam eine Invagination des Rectum „en miniature“ dar, die aus dem After herausgedrängt wird. Man muss hier in Betracht ziehen, dass über dem untersten stark muskulösen Theile des Mastdarms sich eine etwas weitere und schlaffere Partie befindet, welche nach oben wieder in eine mit stärkerer Ringmuskulatur versehene übergeht. Diese letztere nun ist es, welche vermöge ihrer Contractur die mittlere schlaffe Partie in die untere einsülpen und in Form eines glänzend roten, prallen, den After ringförmig umgebenden Wulstes aus diesem hervordrängen kann. Mitunter kommt es nur zum Hervordrängen der Schleimhaut, die indess immer nur einen kleinen Prolaps darstellt, die grösseren müssen wohl immer als wirkliche Umsülgungen sämtlicher Hauto betrachtet werden. Die Länge des Prolapsus ist sehr verschieden und beträgt im Durchschnitt 3—4 Ctm., in einzelnen Fällen auch mehr. Die Oberfläche, d. h. die nach aussen gekehrte Schleimhaut, blutete häufig, und war bisweilen mit lebenden Ascariden mehr oder weniger bedeckt. Wie die Polypen pflegen auch die Prolapse, zumal kleine, nur während des Stuhlganges sichtbar zu werden und sich nach vollendeter Defecation von selbst in den Mastdarm zurückzuziehen. Grössere Vorfälle aber bleiben nicht selten vor dem After liegen und müssen dann jedesmal von der Mutter reponirt werden, was nicht immer gelingt. Jeder Arzt weiss, dass diese Repositionsversuche äusserst schwierig sein können, nicht etwa wegen einer Contractur des Sphinkter, welcher in diesen Fällen immer sehr schlaff zu sein pflegt, sondern weil das Kind, sobald man auch der Reposition die Finger aus dem Rectum entfernt, durch starkes Drängen den Vorfall sofort wieder hervorpresst.

Häufig, zumal bei kleinen Kindern, war es trotz der genauesten Nachfragen unmöglich, die Ursache des Prolapsus, welcher oft schon viele Monate bestand, zu ergründen. Die Kinder waren sonst vollkommen gesund und hatten auch niemals auffällige Darmsymptome dargeboten. Bisweilen liess sich eine anhaltende, zu stetem Drängen Anlass gebende Stuhlverstopfung, weit häufiger eine gleichseitig bestehende oder vor-

ausgegangene hartnäckige Diarrhoe oder Dysenterie als Ursache nachzuweisen, wobei dann die katarthale Wulstung der Schleimhaut und die gesteigerte Schläffheit der mittleren Partie des Rectum als prädisponirendes Moment anzuklagen ist. Durch die übermässige Action der Bauchpresse kann auch während der Tussis convulsiva oder bei heftigem Schreien ein Mastdarmvorfall zu Stande kommen, was ich aber nur selten gesehen habe. Ob auch eine Atonie des Sphinkter internus in der Pathogenese des Vorfalls eine Rolle spielt, bleibt dahingestellt; für dieselbe spricht der Umstand, dass man in den meisten dieser Fälle mit dem Finger sehr leicht in den Mastdarm eingehen konnte, ohne dem kräftigen Widerstande des Schliessmuskels, welchen man sonst fühlt, zu begegnen, dann aber auch die therapeutische Erfahrung, dass contractilbefördernde Mittel hier am besten wirken.

Den Einfluss des immer wiederkehrenden starken Drängens auf die Entstehung des Prolapsus ani beweist auch das Auftreten desselben im Gefolge der Lithiasis vesicalis. Ich rathe Ihnen besonders bei Knaben, welche die zweite Dentitionsperiode bereits überschritten haben und an Mastdarmvorfall leiden, immer an einen Blasenstein zu denken, zumal wenn noch andere verdächtige Symptome, Harntröpfeln, Urindrang, auffallende Länge des Penis damit verbunden sind. In zwei Fällen dieser Art, wo der Mastdarm bei jedem Stuhlgange und sogar beim Uriniren prolabirte, ergab die Untersuchung das Vorhandensein eines Blasensteins, welcher auf der chirurgischen Klinik der Charité durch den Schnitt entfernt wurde. Ohne Zweifel zieht hier das stete Drängen zum Harnlassen die Mastdarmumsculatur in Mitleidenschaft, und die sich stets erneuernde Action desselben hat schliesslich den Prolapsus zur Folge. Je häufiger nun der Mastdarm vorfällt, um so mehr wird der Sphinkter ausgeleert und erschläft, und diese Atonie muss ihrerseits wieder das Zustandekommen des Prolapsus begünstigen. Man behauptet dass auch Ascariden im Mastdarm den Prolapsus erzeugen können, indem der von ihnen ausgehende Reiz reflectorisch heftiges Drängen hervorruft, also in derselben Weise, wie bei einer bis ins Rectum hinabreichenden Colitis oder Dysenterie der Tenesmus nicht selten von Prolapsus ani begleitet wird. Mir selbst kamen, wie ich schon bemerkte, zwar ein paar Fälle vor, in denen die vorgetallene rothe Schleimhaut mit Ascariden hier und da bedeckt war; da ich dieselbe aber bald aus den Augen verlor, so blieb ich im Zweifel darüber, ob hier in der That ein ursächlicher Connex oder nur eine zufällige Complication bestand.

Der Mastdarmvorfall ist fast immer ein langwieriges Uebel, welches viele Monate, selbst Jahre lang dauern kann. Temporäre Besserungen

und erwartet darauf folgende Recidive sind nicht selten. Es ist daher immer gerathen, so früh als möglich gegen das Uebel einzuschreiten und dasselbe nicht der Natur zu überlassen. Bisweilen kommt die Heilung überraschend schnell zu Stande. So erinnere ich mich einzelner Fälle, in denen schon eine einmalige Reposition, nach welcher ich die Finger einige Minuten im Rectum liegen liess, genügte, um den Vorfall für immer zu beseitigen. Zu diesen gehört wohl auch ein 9-jähriges Mädchen, welches am 25. März 1874 mit einem starken, nach jeder Reposition sofort wieder prolabirenden Mastdarmvorfall in die Klinik aufgenommen, und durch eine Injection von 0,002 Strychnin und einem in den Mastdarm eingeführten, mit einer T-Binde befestigten Leinwandtampon dauernd geheilt wurde, obwohl der Tampon wegen einer Diarrhée schon am nächsten Tage entfernt werden musste. Solche Fälle sind indess schwer erklärbare Ausnahmen. Sonst blieb die Reposition und selbst die Tamponade nur ein Palliativmittel, welches die Wiederkehr des Prolapsus nicht verhindern konnte und immer von neuem in Anwendung kommen musste. Ich will dabei nicht unerwähnt lassen, dass bei der Reposition (am besten in der Knie-Ellebogenlage) der centrale Theil des Vorfalls, als der zuletzt vorgefallene, immer zuerst zurückgeschoben werden muss, indem man zwei mit einem gölten Leinwandlappchen überzogene Finger der rechten Hand in die centrale Öffnung des Prolapsus einschiebt und dabei sanft einwärts drängt. Bei Kindern, welche heftig drängen und schreien, kann die Chloroformirung, und nach derselben die Einlegung eines Tampons nothwendig werden, um den sofortigen Wiedervorfall zu verhüten.

Zur Erfüllung dieser Aufgabe werden aus besonders diejenigen Mittel gerühmt, welchen man eine die Contraction der Mastdarmmuskulatur fördernde Wirkung zuschreibt, besonders das Extract. nucum vomicae und das Strychnin. Ersteres habe ich recht häufig (F. 37), aber mit so unsicherem Erfolg angewendet, dass ich immer mehr davon zurückgekommen bin. Auch das Strychnin, welches besonders von französischen Aerzten äusserlich entweder in Pulverform auf den Vorfall oder subcutan applicirt wurde, ist nach meinen Erfahrungen durchaus kein zuverlässiges Mittel. Weit bessere Erfolge sah ich von den subcutanen Injectionen des Ergotin am Perineum und in der unmittelbaren Nähe des Anus, wovon ich schon früher¹⁾ berichtet habe. Ich injicirte bei Kindern von $1\frac{1}{2}$ –3 Jahren täglich einmal 0,02–0,1 Ergotin (F. 38), worauf in der Regel schon nach 8 Tagen eine deutliche

¹⁾ Chir.-Annalen. Jahrg. I. 1874. S. 614.

Besserung eintrat. Der Prolapsus erfolgte zuerst nicht mehr bei jedem Stuhlgange, sondern seltener, blieb an manchen Tagen ganz aus und verschwand nach 2—3 Wochen gänzlich. Obwohl ich diesen günstigen Erfolg des Ergotin, welches dabei niemals eine nachtheilige Localwirkung hatte, seitdem wiederholt bestätigt fand, bin ich doch weit entfernt, das Mittel als ein absolut sicher wirkendes zu betrachten. Vielmehr werden Sie öfters auf sehr hartnäckige Fälle stossen, welche auch diesem Mittel widerstehen und andere Heilungsversuche nöthig machen. Von dem täglichen Einlegen grösserer Stücke von Eis in den Mastdarm sah ich nur einen vorübergehenden Erfolg, nicht viel mehr von Klystiren mit einer Lösung von Tannin, Alaun oder einem adstringirenden Decoct (Ratanhia, Eichenrinde), oder von wiederholtem Bestreichen der prolapsirten Schleimhaut mit Lapis infernalis. Wo auch diese Versuche fehlschlagen, bleibt daher nur die chirurgische Behandlung des Vorfalles übrig, sei es nun durch Excision einiger Hautfalten um den Anus (Dupuytren), oder besser durch punktförmige Kauterisation der unmittelbaren Umgebung des Anus mit einem feinen Glüh Eisen (F. Guersant), dessen Einwirkung bis auf den Sphinkter externus dringen soll.

Bei jeder Art von Behandlung hat man darauf zu sehen, dass die Kinder das heftige Drängen unterlassen. Bisweilen bleibt der Prolapsus schon weg, wenn desselben ihre Faces nicht auf dem Nachtopfe, sondern liegend ins Bett entleeren, weil dabei die Bauchpresse viel weniger einwirkt, und ich wiederhole desshalb einen schon vor Jahren von mir gegebenen Rath, solche Kinder beim Stuhlgange nicht in der gewöhnlichen Weise auf dem Toile, die Füsse gegen den Boden gestemmt, sitzen zu lassen, sondern das Geschirr auf einen festen Stuhl oder Tisch zu stellen und die Kinder mit lose herabhängenden Beinen auf denselben fest zu halten, wobei das Drängen in weit geringerem Maasse stattfindet. Ist Verstopfung vorhanden, so muss der Stuhlgang durch Abführmittel erweicht werden, während im Falle einer längeren katarrhalischen Diarrhoe oder Dysenterie die erfolgreiche Behandlung dieser Zustände schon hinreichen kann, um auch den von ihnen abhängenden Prolapsus zu beseitigen.

XIII. Die Entozoen des Darmkanals.

Die „Helminthiasis“ oder „Wurmkrankheit“, welche früher einen weiten Raum in der Pathologie des Kindesalters einnahm, ist jetzt mit Recht auf ein äusserst kleines Gebiet zurückgedrängt worden. Aber wenn auch die meisten Aerzte von der einstigen Ueberschätzung der Entozoen zurückgekommen sind, so spielen diese doch in der Auffassung des

Publicans, und zwar nicht bloss in den niederen Ständen, noch immer eine grosse Rolle, und der Arzt hat oft Mühe, sich der aufdringlichen Diagnose der Mütter, welche bei den verschiedensten Affectionen ihrer Kinder von Würmern träumen, zu erwehren, oder sich gar vor absichtlichen Täuschungen zu hüten. Fälle, in welchen die Mütter den Arzt geradezu mit der Angabe, in den Ausleerungen des Kindes Würmer gesehen zu haben, belügen und später diese Lüge eingestanden, sind wiederholt vorgekommen. Bei alledem darf man aber in der Nichtachtung der Helminthen, wie sie als Gegensatz der alten Ansichten jetzt üblich ist, nicht soweit gehen und dieselben unter allen Umständen für ganz unschuldige Insassen des kindlichen Organismus betrachten. Wenn auch verhältnissmässig selten, — kommen doch immer einzelne Fälle vor, in welchen der Einfluss dieser Gäste auf die Erzeugung bestimmter Symptome unbestreitbar, und eine entsprechende Behandlung von Erfolg gekrönt ist.

Auf die Naturgeschichte der Darmhelminthen werde ich hier nicht näher eingehen, und verweise Sie deshalb auf die klassischen Werke von Davaine¹⁾ und Leuckart²⁾. Für unseren Zweck werden, wie ich glaube, die folgenden Mittheilungen genügen. Für uns kommen überhaupt nur drei Gruppen von Entozoen in Betracht, der *Oxyuris vermicularis*, der *Acaris lumbricoides* und die *Tenia*.

1) *Oxyuris vermicularis* (Madenwurm) ist ein weisscr, etwa 9 bis 10 Mm. langer und $\frac{1}{2}$ Mm. breiter, spindelförmiger, besonders am hinteren Ende zugespitzter Wurm, welcher in grossen Massen das Colon, vorzugsweise den Mastdarm bewohnt und sich von dem hier angesammelten Kotke nährt. Früher kannte man nur die Weibchen; die erst in diesem Jahrhundert von Bremser und Sommering entdeckten Männchen finden sich immer viel seltener als jene (etwa im Verhältniss von 1 : 9), sind bedeutend kleiner ($2\frac{1}{2}$ — 3 Mm. lang) und zeigen ein spiralförmig gerolltes Schwanzende. Die Oxyuren, auch „Ascariden“ genannt, gehen entweder mit den Fäces ab, auf denen oft unzählige, noch deutlich sich bewegende Würmer, welche wie feine in Stückchen geschnittene weisse Fäden aussehen, wandeln, oder sie wandern ganz unabhängig von der Defecation in den Abendstunden aus dem After aus und erregen durch ihre Bewegungen in der Umgebung desselben ein lebhaftes, die Kinder zum Kratzen reizendes Jucken, auf welches die Eltern gewöhnlich ihre „Wurmadiagnose“ gründen. Bei genauer Untersuchung findet

¹⁾ Traité des entozoaires, 2. édit. Paris 1877.

²⁾ 100 weissenlicher Parasiten u. s. w. Leipzig 1888.

man auch um diese Zeit häufig mehrere sich bewegende Ascariden in der Umgehung des Afters vor, und viele Mütter brachten eine recht ansehnliche Sammlung derselben mit in die Klinik. In manchen Fällen bleibt es aber nicht bloss beim Jucken, sondern es können allabendlich, meistens zur Zeit des Einschlafens, wirkliche Schmerzen am After entstehen und die Kinder zum Schreien bringen. Ich erinnere mich besonders eines Knaben, welcher sich dann in der grössten Unruhe auf den Boden warf, tobte, und den After gewaltsam gegen die Dielen presste, um sich Erleichterung zu verschaffen. Die allabendliche, fast typische Wiederholung dieser Scenen, welche bei mangelhafter Beobachtung auch als convulsivische gedeutet werden können, hat schon manchen unerfahrenen Arzt zur falschen Annahme einer Intermittens larvata und zur Verordnung von China verleitet, bis die Untersuchung und der Befund der Ascariden den Irrthum aufklärte. Zuweilen kommt das Afterjucken auch bei Tage oder mitten in der Nacht vor, und fast immer trifft man dann Würmer ausserhalb der Afteröffnung an. Da dieselben sich nur auf der feuchten Schleimhautfläche bewegen können, ausserhalb derselben aber, sobald sie auf die trockene Cutis kommen, sehr bald bewegungslos werden, und die Fähigkeit zu springenden Bewegungen ihnen mangelt, so ist die Weiterwanderung der Ascariden kaum anzunehmen, und wenn sich auch nicht leugnen lässt, dass bei kleinen Mädchen bisweilen Oxyuren in der Vulva gefunden werden und hier durch ihren Reiz Hyperämie, Schleimabsonderung und Trieb zur Onanie bewirken können, so ist dies doch immer viel seltener, als man gewöhnlich annimmt. Mir selbst ist dies nur ein paar Mal von den Müttern berichtet worden; mit eigenen Augen habe ich es nie gesehen, und gehe Ihnen dabei zu bedenken, ob nicht in solchen Fällen eine directe Uebertragung der Würmer oder ihrer Eier mittelst der kratzenden Finger wahrscheinlicher ist, als eine selbstständige Wanderung derselben bis in die Vulva hinein. Dasselbe gilt von den nicht seltenen Fällen, in welchen nicht nur mehrere Kinder derselben Familie, sondern auch die Mutter, welche mit einem der Kinder zusammen in einem Bette schläft, an Ascariden leidet. Man ist hier gewöhnlich mit der Annahme einer Ueberwanderung rasch bei der Hand, ohne zu bedenken, dass diese Wanderung aus dem Anus des einen Individuums bis in denjenigen des andern doch rein unmöglich ist, weil die Helminthen auf diesem langen Wege unfähig verstreichen müssen; vielmehr muss auch hier eine directe Uebertragung der Oxyuren oder ihrer Eier mittelst der Finger oder durch Schwämme angenommen werden. Es ist auch nachgewiesen, dass die meisten Ascariden, welche aus dem After aus-

wandern oder in grossen Mengen mit dem Stuhlgange entleert werden, legerische Weibchen sind, und dass die Faeces dieser Kinder immer eine Menge reifer Eier enthalten. Durch die kratzenden Finger, ferner durch die Eintrocknung und Zerstückung des Koths können also die Eier, zumal in engen schmutzig gehaltenen Räumen, leicht in den Magen anderer Personen gelangen, wo ihre Schale durch den Magensaft gelöst und der Embryo frei wird. Daraus erklärt sich auch die grosse Hartnäckigkeit dieser Würmer, welche in manchen Familien viele Jahre lang nicht auszurotten sind, so wie ihr häufiges massenhaftes Vorkommen bei schmutzigen Idioten, deren Colon bisweilen einen pelzartigen Ueberzug von Ascariden zeigte (Vix). Die Uebertragung reifer Eier oder eben ausgekrochener Embryonen erklärt wohl auch die selteneren Fälle, in welchen man Oxyuren auf anderen, vom Colon weit entfernten Theilen beobachtete, z. B. auf einem nassenden Ekzem der Inguinalfalten (Michelson¹⁾) oder gar in der Mundhöhle (Seligsohn²).

2) Der Spulwurm (*Ascaris lumbricoides*), cylindrische, regenwurm-artige Anneliden von bräunlicher oder röthlich grauer Farbe und von beträchtlicher Grösse. Die Weibchen werden bis gegen 400, die Männchen selten über 250 Mm. lang (grösste Dicke 3,5 und 3,2 Mm.). Der Körper ist nach beiden Enden, besonders nach vorn hin verjüngt, die Mundöffnung von drei mit äusserst feinen Zähnen besetzten Lippen umgeben, das Schwanzende kurz und konisch. Der Hinterleib der Männchen ist hakenförmig nach dem Bauche zu eingerollt, und der keulenförmige Penis sieht nicht selten aus der aufgewalsteten Kloakenöffnung hervor. Die Vulva liegt dicht hinter dem vorderen Körperdrittheil oder mehr in der Mitte.

Die Spulwürmer bewohnen den kindlichen Dünndarm mitunter in so enormer Zahl, dass man es kaum für möglich halten sollte. Ich erinnere mich z. B. eines Kindes, welches beim Gebrauch einer Latwerge aus Semin. Casae ganze Topfe voll Spulwürmer der verschiedensten Grösse, und zwar Tage lang hintereinander entleerte, ohne dass irgend ein Symptom auf eine solche Massenanhäufung hingedeutet hatte³. Sie begreifen nun, dass unter diesen Umständen durch die gegenseitige Verschlingung der Würmer zu grossen Ballen in der That Verstopfungen des Darmlumens und Symptome des Ileus (S. 479), selbst mit

¹⁾ Berl. Klin. Wochenschr. 1877. No. 35.

²⁾ Ibid. 1878. No. 40.

³⁾ Fancouneau-Dufresne (Union med. 1880. p. 62) berichtet von einem 12jährigen Knaben, welcher im Laufe dreier Jahre über 5000 Spulwürmer theils per anum, theils durch Erbrechen entleerte.

einer von aussen durch die Bauchdecken fühlbaren Geschwulst herbeigeführt werden können?). In der grossen Mehrzahl der Fälle ist aber die Zahl der Spulwürmer eine weit geringere, und bei den vielen Sectionen von Kinderleichen, welche ich zu solchen Gelegenheiten hatte, fiel es mir immer auf, wie selten man überhaupt eine grössere Anzahl derselben im Darmkanal antraf. Häufig fanden wir sogar nur vereinzelte Exemplare. Wenn nun schon, wie der oben erwähnte Fall lehrt, ganz colossale Massen von Würmern ohne auffälliges Symptom bestehen können, so wird dies noch weit häufiger da stattfinden, wo nur eine geringe Zahl derselben im Darmkanal vorhanden ist, und in der That kann ich Ihnen nur ein einziges Symptom nennen, aus welchem Sie mit voller Sicherheit auf die Gegenwart von Spulwürmern schliessen können, nämlich den Abgang derselben. In einer gewissen Zeit seiner Entwicklung trifft nämlich der Wurm Vorbereitungen, den von ihm bewohnten Organismus zu verlassen, und unternimmt dann Wanderungen vom Dünndarm aus nach dem Colon, oder auch aufwärts in das Duodenum und den Magen. Im ersten Fall wird er entweder todt oder noch lebend mit dem Stuhlgange entleert, kriecht aber auch, unabhängig von der Defecation, aus dem After heraus und wird dann gewöhnlich in zusammengekrümmtem Zustande im Bett der Kinder gefunden; im zweiten Fall wird er entweder durch Erbrechen entleert, oder gelangt selbstständig sich bewegend längs des Oesophagus in die Rachenhöhle und weiter. Fälle, in denen Spulwürmer während des Schlafes aus dem Munde der Kinder herausgekrochen waren und Morgens todt vor demselben gefunden wurden, sind durchaus nicht selten. Diese Eliminationen der Lumbrici, wie der Ascariden, sind in der That das einzig sichere Zeichen ihres Daseins. Alles andere, worauf Laien und auch Aerzte Weith legen, die bleiche Farbe, der dunkle Ring um die Augen, der Foetor oris, das Jucken an der Nasenspitze, die häufig eintretende Kolik, kann höchstens Verdacht erregen und uns daher zur Anwendung anthelminthischer Mittel berechtigen, aber nur der Abgang von Würmern ist entscheidend. Wo dieser fehlt, dürfen Sie sich nie bei der Annahme einer Helminthiasis zur Erklärung krankhafter Zustände beruhigen, müssen vielmehr immer die Möglichkeit vor Augen haben, dass es sich um ganz andere und viel schlimmere Dinge handeln kann, welche sich bei aufmerksamer und wiederholter Untersuchung auch schliesslich herausstellen werden.

Wir berühren hier die vielfach ventilirte Frage, ob die Spulwürmer

eine locale Einwirkung auf den von Ihnen besetzten Darmtheil auszuüben vermögen. Von vornherein sollte man dies nicht in Abrede stellen, da auch die Ascariden bei sehr reichlicher Anhäufung einen katarthalschen Reizzustand des Rectum erzeugen können, und die Beschaffenheit der Mandöffnung (die mit Zähnen besetzten Lippen) für die Möglichkeit einer solchen Einwirkung spricht. In der That will man Hyperämien der Dünnarmschleimhaut und selbst Diarrhoe durch den Reiz der Spulwürmer entstehen lassen, wovon mir indess aus eigener Erfahrung kein sicherer Fall bekannt ist. Man muss vielmehr immer bedenken, dass bei einer gewöhnlichen katarthalschen Diarrhoe die zufällig im Darm vorhandenen Spulwürmer, welche gerade auf der Wanderung ins Colon begriffen waren, mit entleert werden könnten, gerade wie dies auch bei der Dysenterie und dem Ileotyphus beobachtet wird. Man geht aber auch viel weiter und hält es für möglich, dass der Spulwurm durch starkes Anpressen seines Kopfendes gegen die Schleimhaut, wobei nicht einmal die Zähne in Rechnung gebracht werden, die Fasern der Muscosa und der übrigen Darmhäute auseinanderzudrängen und durch die gebildete Lücke in die Peritonealhöhle auszuschnüpfen im Stande sei. Man beruft sich dabei auf Fälle, in welchen einer oder mehrere dieser Würmer frei im Peritonealraume gefunden wurden, ohne dass an irgend einer Stelle des Darmkanals eine Lücke erkennbar war, aus welcher die Helminthen ausgetreten sein könnten. Ich kann indess diesem Durchschnüpfen des Wurms durch die auseinandergedrängten Gewebselemente der Darmhäute, nach welchem die gebildete Lücke sich sofort hermetisch wieder schliessen müsste, keinen Glauben schenken, ebenso wenig der Annahme, dass der Spulwurm mittelst seiner „zähnelwaffnen“ Lippen im Stande sei, sich durch die Darmwand „durchzufressen“. Ich glaube vielmehr, dass in allen Fällen, wo man Spulwürmer im Peritonealraume fand, diese durch eine schon vorhandene ulceröse Lücke im Darm ausgekrochen sind, möchte diese nun schon mit einem abgesackten peritonitischen Herde communiciren, oder noch durch den flechtig dünnen serösen Ueberzug geheckt sein, welcher beim Andrängen des Wurms arises. Am wenigsten kann ich mir denken, dass die in die Bauchhöhle gelangten Spulwürmer selbstthätig eine circumscripte Peritonitis mit Eiterdurchbruch nach aussen erzeugen können. Mir selbst ist ein solcher Vorgang am Unterleibe, welchen man wegen des Austretens von Spulwürmern aus demselben mit dem Namen „Wurm-abcess“ bezeichnet, noch niemals vorgekommen; wohl aber sah ich in zwei Fällen von chronischer tuberkulöser Peritonitis einen spontanen Durchbruch durch den Nabel oder neben demselben erfolgen, und auch

der Entleerung von faulentem Eiter auch einen oder zwei Spulwürmer aus der Oeffnung herauskommen. Ich glaube daher, dass alle Fälle von „Wurmabscessen“ auf analoge Weise gehandelt werden müssen, d. h. die Wurm benutzen eine zufällig im Darmkanal befindliche Lücke, sei es nun ein folliculäres oder ein tuberkulöses Geschwür, in dessen Umkreise sich bereits ein umschriebener peritonitischer Herd gebildet hat, zur Auswanderung aus dem Darm, und gerathen dann sofort in den Abscess hinein, zu dessen Entstehung sie durchaus nichts beigetragen haben¹⁾. Dafür lässt sich auch die Erfahrung geltend machen, dass die Spulwürmer überhaupt die Tendenz haben, sich durch enge Oeffnungen durchzuzwängen. Man fand z. B. im Darm eine früher verschluckte Oese von Drath, welche ringförmig einen Spulwurm umfasste, und auch das bisweilen beobachtete Durchzwängen des Wurms durch den Ductus chyloductus scheint mit dieser Tendenz in Zusammenhang zu stehen. Wenn bei einem Kinde, welches anatomisch an Spulwürmern leidet, ein chronischer unheilbarer Icterus oder gar Symptome von Abscessbildung in der Leber entstehen, wird man an die Möglichkeit einer Verstopfung des Ductus chyloductus oder hepaticus durch einen solchen Wurm, oder an eine Abscedirung in der Leber denken müssen, welche durch den Reiz junger bis in die feinsten Gallengänge gelangter Larvee zu Stande kommen kann. Ob diese, wenn sie auf ihrer Weiterwanderung auch oben bis in den Magen gelangen, außer Uebelkeit und Erbrechen noch sonstige Reizzustände des letzteren erzeugen können, ist mir ebenso zweifelhaft, wie die präsumte Einwirkung auf die Darm Schleimhaut. Bei einem 4jährigen Knaben, welcher an einer fieberhaften Gasrose litt, sah ich zwar mit dem Erbrechen nicht nur einen lebenden Spulwurm, sondern auch etwas geronnenes Blut abgehen; dasselbe fand ich aber öfters in den retrahirten Massen bei Kindern, welche niemals Spulwürmer eulireet hatten, und bei einem am 8. Mai 1877 vorgestellten 6jährigen Mädchen, welches über häufige Koliken klagte, wurden innerhalb einer Woche 8 Spulwürmer nach unten und 9 durch Erbrechen milireet, ohne dass jemals eine Spur von Blut im Erbrochenen zu bemerken war. Wandert der Wurm noch weiter hinauf bis in die Rachenhöhle, so kann er durch eine nur ausnahmsweise vorkommende „Verströmung“ auch wohl

¹⁾ Auch der von MARELLI (Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 29, Hft. 5 u. 6) mitgetheilte Fall von „Durchwanderung“ des Drosophila durch Spulwürmer scheint mir nicht verwundl. Meiner Ansicht nach handelt es sich hier um ein Ungepöbrenge Insekt.

in den Larynx, in die Nasenhöhle oder gar in den Throatengang¹⁾ und in die Tuba Eustachii gelangen; wüßte ich indess keine eigenen Erfahrungen beizubringen.

So viel von den localen Erscheinungen, welche die Spulwürmer durch ihre massenhafte Anhäufung oder durch ihre Wanderungen hervorbringen können. Wir stehen hier immer noch auf dem festen Boden der Thatsachen, verlassen denselben aber sofort, wenn es sich um die Entscheidung der Frage handelt, ob die Würmer, seien es aus Lumbago, oder Ascariæ, oder Taenia, auch gewisse Symptome von Seiten des Nervensystems zu veranlassen vermögen. Alle möglichen convulsivischen Krankheiten, Ekklampsie, Epilepsie, Katalapsie, Chorea, Contracturae, sollten, wie man besonders früher annahm, durch den von den Würmern ausgehenden Reflexreiz zu Stande kommen können, und die Literatur hat eine ansehnliche Zahl solcher Beobachtungen aufzuweisen. Um so mehr wundere ich mich darüber, dass ich persönlich trotz des reichen mir zu Gebote stehenden Materials doch fast niemals im Stande war, diesen Connex ganz sicher zu constatiren, am wenigsten bei Chorea minor und magna, Ekklampsie, Epilepsie und verwandten Zuständen. In der Regel konnte ich bei diesen Kindern gar keinen Abgang von Würmern, auch nicht nach der Anwendung anthelminthischer Mittel beobachten, und wenn auch hier und da Würmer entleert wurden, blieb doch die Neurose unverändert. Und doch wäre das Verschwinden derselben der einzige Beweis für das behauptete ursächliche Verhältniss gewesen. Ich gebe indess gern zu, dass die Erfahrung eines Menschen, und wäre sie die nächste, zur Entscheidung dieser Frage nicht ausreicht, und will daher die Möglichkeit jenes Connexes um so weniger in Abrede stellen, als auch mir leichtere nervöse Erscheinungen wiederholt in Zusammenhang mit Würmern vorkamen. Ich rechne dahin ausser dem häufigen Jucken an der Nase, der ungewöhnlichen Weite der Pupillen und den heftigen Kolikschmerzen Frostschauder, selbst Schüttelfröste, wobei das Gesicht erbleichte, die Lippen bläulich wurden und die unteren Augenlider von einer schattigen Rinne umgeben wurden, denen jedoch weder Hitze noch Schweiß folgte, ferner Kopfschmerzen, Schwindel, und in einem Fall auch exstatische Zufälle:

Kinde von 12 Jahren, seit mehreren Tagen heftige Schmerzen in der Gegend des Nabels descendens, wo auch der Druck sehr empfindlich war, und allseitige Fieber. Bistage, Antipyretica, innerlich Calomel. Am 4. Tage Nachlass der Schmerzen, dafür allabendlich exstatische Symptome, Irrsprechen, grosse Unruhe,

¹⁾ Balfour, *Med. Ann. Wochenschr.* 1890, No. 24.

Eschewen, allgemeines Zittern, im Mittelnacht dauernd; bei Tage völlige Kapsion, Oben hoch ohne Wirkung. Am 10. Tage plötzlich Abgang zweier ungewöhnlich grosser, noch lebender Spatwürmer, womit alle krankhaften Erscheinungen sofort und für immer verschwand¹⁾.

Trotz meiner Skepsis kam ich doch in diesem Falle den inneren Zusammenhang der Neurose mit dem Reize der Würmer nicht abzugeben und muss daher auch die Möglichkeit eines in convulsivischer Form sich geltend machenden Reflexes zugestehen²⁾. Aus diesem Grunde lässt sich auch gegen einen Versuch mit antihelmintischen Mitteln bei solchen Neurosen durchaus nichts einwenden, falls man nur nicht verabsäumt, recht sorgfältig nach etwa vorhandenen anderen Quellen der betreffenden Krankheit zu forschen. Selbst auch unter diesen Verhältnissen keine Würmer abgehen, so bleibt immer noch die mikroskopische Untersuchung des Koths übrig, in welchem sich wohl fast in allen Fällen von Helminthiasis mehr oder minder reichliche Beimischungen von Wurmresten finden. Man kann dass, je nach der Wurm-species ovalen oder runden kömigen Scheiben, sobald man ihre Charaktere einmal kennen gelernt hat, bald von anderen ähnlichen Dingen unterscheiden, und wo man sie findet, da ist man auch sicher, dass Helminthen vorhanden sind. Diese immerhin etwas unappetitliche und Vielen gewiss nicht zuzugende Untersuchung kann daher zur Diagnose der Helminthiasis auch in solchen Fällen führen, wo noch keine wirklichen Würmer in den Fäces aufgefunden waren. Schliesslichen Falls wird auch eine auf Gerathewohl, also ohne vorhergehende mikroskopische Untersuchung unternommene antihelmintische Cur, wenn sie sonst nicht contraindicirt ist, wenigstens keinen Nachtheil bringen.

Diese Behandlung besteht jetzt, seitdem man die Santonsäure kennen gelernt hat, vorzugsweise in der Anwendung dieses unter dem Namen Saantonin bekannten Mittels. Man giebt dasselbe gewöhnlich je nach dem Alter zu 0.05–0.1 3–4 mal täglich in Pulver oder Trochisciform 2 bis 3 Tage hintereinander, und lässt am dritten Tage ein Purgas (Ricinusöl, Inf. Sennae comp.) nehmen, um die durch das Santonin bewegungsunfähig gemachten Würmer schnell durch den Darm hindurch zu treiben. Die Santonsäure hat zwar vor der früher üblichen Anwendung der sie enthaltenden Semen Case den grossen Vortheil,

¹⁾ Beitr. zur Kinderheilk. N. F. S. 345.

²⁾ Ein von Guersmonprez (Gaz. méd. 1893, p. 34) mitgetheilte Fall spricht dafür, dass auch ein Complex von hysterischen Erscheinungen nach dem Abgange vieler Spatwürmer vollständig verschwinden kann.

dass man sie Kindern weit leichter beibringen kann; doch glaube ich fast, den früher mit dem Zittwersamen selbst erzielten Erfolgen den Vorzug geben zu müssen. Ich erinnere mich wenigstens mittelst der mehrere Tage hintereinander gebrauchten Störk'schen Wurmlatwerge oder dem Electuar, anthelminticum Ph. pusp. weit massenhaftere Wurmlatreibungen erzielt zu haben, als jetzt mittelst des Santonins, vielleicht nur aus dem Grunde, weil in jenen Latwergen die *Semina Cusae* gleichzeitig mit dem Purgans (*Rad. Jalapae*) gegeben wurden; man kann daher versuchen, auch das Santonin gleich in Verbindung mit einem Abführmittel, z. B. mit Calomel (0,05–0,1) oder mit Ol. ricin (50,0 mit Santonin 0,2 kinderlöffelweise) zu reichen. Dass das Santonin den Harn gelblich färbt und ausnahmsweise auch Gelbsuchen (*Xanthopsie*) erzeugen kann, ist eine bekannte Thatsache. Da aber auch andere toxische Erscheinungen, wie *Urticaria*, Erbrechen, selbst epileptiforme Krämpfe (zuletzt nach grösseren Dosen von 0,2–0,3) beobachtet wurden, so erscheint es schon aus diesem Grunde rathsam, das Mittel gleich mit einem Purgans zu verbinden, um es möglichst schnell aus dem Körper wegzuschaffen. Gegen die Spalwürmer wendet man sowohl den Zittwersamen, wie das Santonin nur innerlich an; handelt es sich um Ascariden, so muss man damit noch Klystire oder Eingiessungen in den Mastdarm verbinden, entweder mit einer Lösung von Hydrarg. muriat. corros. (0,015 auf 100,0 Aq. dest.) oder mit einem Infus. sem. Cusae (10,0 bis 20,0 : 100,0). Ein solches Klystir wird am besten gegen Abend applicirt und möglichst lange im Rectum zurückgehalten. Die viel benutzten Klystire mit einer Abkochung von Knoblauch oder von *Sapo medicatus* versagten mir sehr häufig die Wirkung, wie denn überhaupt alle angewendeten Mittel, Externa wie Internia, gar nicht selten im Stiche lassen. Ueber anderweitig empfohlene Klystire (Kalkwasser, Chinin 0,3–1,0 auf ein Klystir, Terebinth. laric, Gu. arab. ana 8,0; Inf. Chamemüll. 120,0) fehlt mir eigene Erfahrung. Bei sehr starkem Pruritus ani lasse ich ein paar Mal täglich etwas Ung. hydrarg. cinereum in die Aftergegend einreiben, oder auch Suppositoria (Ung. einer. 2 mit Ol. cacao 4, oder mit Sapo domest. pulv. 3) in den Anus einschieben. Beiläufig sei bemerkt, dass der Pruritus ani auch bei Kindern bisweilen ganz unabhängig von Würmern vorkommt, dann aber mehr bei Tage, als Abends. So beobachtete ich denselben bei einem 11-jährigen gesunden Knaben, welcher an hartnäckiger Stuhlverstopfung litt. Ein paar Wengläser Ofeuer Bitterwasser besänftigten mit der Obstruction auch jedesmal den Pruritus.

3) *Taenia*, Bandwurm. Obwohl an Frequenz weit hinter den Spalwürmern und Ascariden zurückstehend, wird doch die *Taenia* bei

Kindern fast ebenso häufig, wie bei Erwachsenen beobachtet. Die 33 Fälle, über welche ich früher¹⁾ berichtete, haben sich seitdem wohl auf das Dreifache gesteigert, und es vergeht kein Monat, in welchem nicht ein paar mit *Taenia* befallene Kinder in meiner Poliklinik erscheinen. Das Alter derselben ist natürlich sehr verschieden. Wenn ich auch bis jetzt noch keinen Fall von *Taenia* beim Fötus²⁾ oder bei einem 5 Tage alten Kinde³⁾ selbst erlebt habe, so sah ich doch zwei Kinder, welche erst ein Jahr alt waren, wiederholt Bandwurmfstücke entleeren. Weitans die meisten Kinder standen aber im Alter von 2—12 Jahren. Berücksichtigt man die bekannten Erfahrungen über die Metamorphose des *Cysticercus* in *Taenia*, auf welche ich hier nicht näher einzugehen brauche, so ist es schwer begreiflich, wie ein Bandwurm beim Fötus oder Neugeborenen entstehen soll, da doch eine Infection des Fötus durch das Blut der Mutter hier nicht angenommen werden kann. In allen Fällen von *Taenia*, welche wir selbst bei Säuglingen und Kindern im zweiten Jahre vorkamen, liess sich constatiren, dass dieselben bereits rohes Fleisch oder Wurst ausser der Milch-nahrung bekommen hatten. Seitdem Leuckart auch im Fleische des Kindes einen *Cysticercus* entdeckt hat, welcher sich in derselben Weise zur *Taenia mehozanellata* umwandelt, wie die Schweinecyste zur *Taenia solium*, können wir das Vorkommen des Bandwurms nach dem Genuss von rohem geschlachten Rindfleisch begreifen, während man noch vor etwa 30 Jahren, als Weiss in Petersburg nach der Anwendung des geschlachten Fleisches gegen *Diarrhoea abactatorum* *Taenia* entstehen sah, kein Verständniss für diese Beobachtung hatte.

Die meisten mit *Taenia solium* oder *mehozanellata* befallenen Kinder, welche ich zu behandeln hatte, boten gar keine krankhaften Erscheinungen dar; nur der von Zeit zu Zeit eintretende Abgang einzelner, noch bewegungsfähiger reifer Glieder (der sogenannten Proglottiden), oder auch grösserer oölschlanger Stücke machte die Mütter aufmerksam. Dieser Abgang erfolgte entweder mit dem Stuhlgange oder ganz unabhängig von denselben, so dass die Proglottiden in den Hosen oder in den Betten der Kinder gefunden wurden. Nur in verhältnissmässig seltenen Fällen wurde über Magen- oder Leidschmerzen, Uebelkeit, Zusammenlaufen von Wasser im Munde, Drang zum Stuhlgang, zu-

¹⁾ Beitr. zur Kinderheilk. S. 133; Abh. S. P. S. 327.

²⁾ BARRIS, maladies des enfants. II. p. 38.

³⁾ Oester. Jahrb. 1873. L. Abth. S. 106. — Jahrb. f. Kinderheilk. V. S. 444.

— Hirsch u. Virchow, Jahrbuch. I. 1872. II. S. 704.

weilen auch über kribbelnde oder taube Empfindung in den Beinen und sogar über erschwertes Gehen geklagt. Etwasere Symptome, zumal Chorea, Epilepsie, Katalapsie u. s. w., die von anderen Autoren der Taenia zugeschrieben werden, konnte ich bisher niemals mit Sicherheit auf diese zurückführen, so dass ich diese für die Gesundheit des Kindes gewiss nicht schädlicher halten kann, als die Spulwürmer und Ascariden. Uebigens beobachtete ich wiederholt, dass diese Würmer gleichzeitig mit dem Bandwurm in demselben Kinde vorkamen, ohne deshalb einen schlimmeren Einfluss auszuüben, als sonst. Wie bei Erwachsenen hatte auch bei Kindern der Genuss von Häringen und Walderdbeeren häufig den spontanen Abgang von Proglottiden oder grösseren Stücken zur Folge, und um diese Zeit wurde dann öfters, zumal bei kleinen Kindern, Verlust der Laune, Kolik und unruhiger Schlaf beobachtet. Auch im Verlauf einer acuten oder chronischen Diarrhoe sah ich mehrere Male Taeniastücke mit dem Stuhlgange abgehen, einmal auch während einer mit Diarrhoe verbundenen Dystrophie. In 2 Fällen wurde die beim Stuhlgange aus dem Anus theilweise herausgebrängte Taenia von den Müttern beim Versuch der vollständigen Extraction abgerissen, und konnte dann nicht mehr erreicht werden. Man sollte daher in solchen Fällen jedes Ziehen an dem herausgepressten Stücke der Taenia vermeiden, dasselbe vielmehr ausserhalb des Anus durch ein Klebeflasier festhalten und durch Abführmittel und Klystire den Wurm vollständig zu entfernen versuchen. Ob die empfohlene Injection von Chloroformdunst in den Mastdarm unter diesen Umständen den Abgang des Restes befördert, kann ich aus eigener Erfahrung nicht beurtheilen.

Unter den Bandwurmmitteln stelle ich bei Kindern das Kautschu obenan. Mir schien es immer noch am sichersten zu wirken, und wir behandeln daher alle in der Klinik vorkommenden Fälle zunächst mit diesem Mittel. Je nach dem Alter gebe ich Morgens 8,0–10,0 in zwei Portionen halbtündlich in Kaffee oder Milch. Wenn auch die zweite Portion Uebelkeit oder selbst Erbrechen erregte, so that dies doch der Wirkung oft keinen Eintrag. Giebt man dann eine Stunde später einen Löffel Ol. Ricini, so enthalten die im Laufe des Tages erfolgenden dünnen Stühle, wenn auch nicht immer, doch häufig grosse Massen von Taenia, oder auch die ganze Kette von Wurmindividuen mit ihrem Haftapparat, welche wir als „Wurm“ und „Kopf“ zu bezeichnen pflegen. In vielen Fällen wurde allerdings dieser „Kopf“ nicht aufgefunden, wohl aber der äusserst zarte bis nahe an denselben reichende Theil, und ich pflegte dann die Cur nach zwei Tagen zu wiederholen. Zweckmässig ist es auch, schon am Tage vor dem Einnehmen des Mittels den Darcanal

durch Ricinusöl zu entleeren und Abends Hirng essen zu lassen, am Tage der Cur selbst aber, nachdem die abführende Wirkung eingetreten ist, mindestens alle zwei Stunden ein Klystir von kaltem Wasser zu appliciren, um den Darm vorläufig nicht in Ruhe kommen zu lassen, und der durch Koussou betäubten Taenia keine Zeit zum Wiederausaugen an der Darinwand zu gewähren. — Minder sicher war im Allgemeinen die Wirkung der Granatwurzel und der Farnkrautwurzel, welche ich meistens in folgender Weise combinirte: Decoct. cort. rad. Granat. (30,0) 180, Extr. filic. mar. arth. 2,5—3,0, Syr. ros. aur. 20,0. M. S. halbstündlich in 3 Portionen zu nehmen. Nach einer Stunde giebt man einen Löffel Ricinusöl, und lässt nach eingetretener Wirkung die oben empfohlenen Wasserklystire stündlich appliciren.

XIV. Die acute und chronische Peritonitis.

Weit seltener als bei Erwachsenen wird Harn die acute Peritonitis im Kindesalter bezeugen, am häufigsten auch in Verbindung mit primären und septischen Processen bei Neugeborenen. Hier pflegen sich aber die Symptome, Aufblähung, Spannung, Empfindlichkeit des Unterleibs und Erbrechen derartig mit den Allgemeinsymptomen der Pyämie zu vermischen oder durch die letzteren maskirt zu werden, dass ein deutliches klinisches Bild der Krankheit nicht zu Stande kommt. Bei älteren Kindern beobachtete ich die acute Peritonitis vorzugsweise in Folge der Perityphlitis, jener unheilvollen Vorgänge, welche sich im Cecum und seiner nächsten Umgebung, zumal im Processus vermiformis abspielen. Mägen um diese Entzündungen von einer durch Kothmassen bedingten übermäßigen Spannung des Blinddarms, oder von der Reizung durch ein Kothconcrement im Wurmfortsatz ausgehen, immer zeigen sie ganz ähnliche Symptome, wie im spätern Lebensalter, die zulegt auf die Cecalgegend beschränkte, aber nicht über einen grösseren Theil des Peritoneum sich ausbreitende Schmerzhaftigkeit, die häufige Bildung eines nicht selten in Eiterung übergehenden, durch Exsudat bedingten Tumors, die wiederholten Resolven u. s. w. Ich beschränke mich daher an dieser Stelle auf einige therapeutische Bemerkungen, welche die Behandlung dieser Zustände mit Opium betreffen. Meine Erfahrungen sprechen auch bei Kindern entschieden zu Gunsten dieser Therapie. Ich lasse den Darm vollständig in Ruhe und gebe nur dann Ricinusöl oder Calomel, wenn sich von vorn herein grössere Faecalanhäufungen im Cecum durch das Bestehen einer längeren Verstopfung oder durch die Palpation nachweisen lassen. Sonst rathe ich, zunächst von der Anwendung der Abführmittel abzusehen, bei grosser Empfindlichkeit der

Coccalgegend je nach dem Alter 4–8 Blutegel (ohne Nachblutung) zu setzen und dann einen Eisbeutel dauernd auf diese Gegend zu appliciren. Innerlich gebe ich von einer Emulsio oleosa (100,0) mit Extr. Op. agut. 0,1–0,2 und Syr. emuls. 20,0 2stündlich einen Kinderlöffel, bis der spontane Schmerz aufhört und die Empfindlichkeit gegen Druck nachlässt. Sobald dies der Fall ist, pflegt sich auch der Stuhlgang spontan oder nach der Anwendung eines Klysma. eines Löffels Ricinusöl wieder einzustellen. Durch diese Behandlung gelang es mir fast in allen Fällen, wo sie rechtzeitig eingeleitet wurde, Heilung herbeizuführen, und da, wo sich schon ein Tumor durch Exsudat gebildet hatte, den Uebergang desselben in Eiterung zu verhindern, selbst bei Kindern, welche im Laufe einiger Jahre wegen eines Recidivs wiederholt in der Klinik Aufnahme fanden.

Die Exsudate, welche in diesen Fällen in der Umgebung des Coecum zu Stande kommen, bilden deutlich fühlbare und durch den matten Percussionsschall nachweisbare Harten, welche sich bis über die Mittellinie hinaus und aufwärts bis zum Niveau des Nabels hin erstrecken können. Kommt nun unter dem fortgesetzten Gebrauche des Eisbeutels die Resorption nicht zu Stande, nimmt vielmehr der Tumor und seine Empfindlichkeit unter Fortdauernden, abendlich exacerbierten Fieber noch zu, so geht man, um die Eiterung zu befördern, zu warmen Katalpasmen über, welche Tag und Nacht fortgesetzt werden müssen. Es kommt dann bisweilen zu einem spontanen Durchbruch des Abscesses nach aussen, in den Mastdarm, die Blase oder Vagina; häufig aber verzögert sich dieser Ausgang, und das fortdauernde Eiterungsfieber dröhlt die Kräfte zu erschöpfen. Man muss dann die künstliche Eröffnung des Abscesses vornehmen, welche durch die antiseptische Methode einen grossen Theil ihrer Gefährlichkeit verloren hat. Solche Peritonialabscess oder „Bauchempyeme“ können sich übrigens ganz unabhängig von einer Perityphlitis auch an anderen Stellen des Unterleibs, ohne drückliche Ursache, bisweilen aber in Folge einer traumatischen Einwirkung, bilden:

Ein 10jähriges Mädchen, welches am 11. September 1879 in meine Poliklinik kam, war im August von einem grossen Hunde, der sie niederriss und auf ihrem Busch herumtrampelte, unglücklich behandelt worden. Es entstand danach eine acute Peritonitis, welche Mitte September mit einem Eiterdurchbruch durch den Nabel ins Aeusserliche endete. Noch im November bestand an der Stelle des ehemaligen Nabels eine grossenbrunnige mit viel Geruchhaltigen belegte Wunde, aus welcher noch immer etwas Eiter abfloss.

M. L. Döhring, am 18. Decbr. 1876 zuerst von mir aufgenommen. Seit 14 Tagen Symptome von acuter Peritonitis, welche nach öfter erkennbare Ursache von der

linken Lins (oben am unteren Ende) Zwölfgelb Application von Blasegels, Eisessig). Ich fand einen diffusen, sehr empfindlichen, bei der Percussion test schalllosen Tumor, welcher den vorderen Theil des linken Bauchhalls bis über das Nabel das Nabel hin umschloß, während die rechte Seite vollkommen frei war. Dabei Schmerz während des Stuhlgangs und Urinansatz, zunehmender Fieber, große Schwäche. In den letzten Tagen sehr heftige kolikartige Schmerzanfälle mit lauten Geräusch und vorfallendem Gesicht, dazwischen ganz freie Intervalle. Therapie: Wärme Cataplasmen auf den Leib, Enalapne oben mit Keir, Opü. Am 20. wiederholter Anfall von Schreien und stürzender Elanigkeit aus dem Mastdarm, und in der Nacht zum 21. plötzlich 4–5 kleine, sehr reichliche stützige Stühle von der Farbe des Mischkaffee's. Am 21. Tumor und Schmerz gänzlich verschwunden, Fortfall des stützigen, sehr Flüssigkeit vermischten Auswurfes. Völlige Heilung nach wenigen Tagen. Wie ich später erfuhr, erfolgten im Laufe des nächsten Jahre noch zwei kleine Recidive an derselben Stelle, die zwar nicht den Ausgang in Eiterung nahmen, immerhin aber den Verdacht erregten, daß ein unbekannter localer Anlass des Peritonitis noch vorhanden sei.

In diesen beiden Fällen sehen wir also die Peritonitisabsonne sich durch den Nabel und Mastdarm externalen. Bedenkt man, dass der Nabel überhaupt der nachgiebigste Theil der Bauchwand ist, dass die Fascia hier fehlt, und nur die Hautnarbe, Frit und das Peritoneum die Bauchhöhle nach außen abschließt, so wird es begreiflich, dass bei allen Ausdehnungen des Unterleibs, sei es durch Gravidität, durch feste Tumen oder Flüssigkeit, Verdünnungen und hernach Hervortreibungen des Nabels so leicht zu Stande kommen, ganz besonders im Kindesalter, wo der Nabel noch weniger widerstandsfähig ist, als bei Erwachsenen. Wenn man von einigen Autoren¹⁾ behauptet wird, dass die meisten Fälle von Eiterdurchbruch durch den Nabel eigentlich keine Fälle von Peritonitis waren, dass vielmehr die Eiterung fast immer ausserhalb des Bauchhalls in dem sogenannten subserösen Gewebe stattgefunden habe, so muss ich zwar das Vorkommen dieser Absonne in den Bauchdecken, welche meistens einen traumatischen Ursprung haben und leicht als Peritonitis imponiren können, nach eigener Erfahrung zugeben, glaube aber doch, dass jene Autoren mit ihrer Behauptung zu weit gehen. Ich werde bald Gelegenheit haben, Ihnen einige Fälle mitzutheilen, in welchen bei einer durch die Section nachgewiesenen chronischen Peritonitis Durchbruch von Eiter, einmal auch von eitriger Flüssigkeit, durch den Nabel stattfand, und sehr keinen Grund, weshalb dasselbe Ereigniss nicht auch durch eine mehr acut im Peritonealraum entstandene Eiteransammlung herbeigeführt werden sollte.

¹⁾ Voss, Des piquants sous-peritoneaux de la paroi abdominale antérieure. Paris 1825. — Gauderon, De la peritonite épidémique aigue des enfants. Paris 1826.

Wie in dem zuletzt mitgetheilten Falle war auch noch in einem andern, welcher ein 12jähriges Mädchen betraf, die linke Rege die ursprüngliche Sitz der Peritonitis, welche hier ein unheilbares Exsudat bildete (Januar 1881). Dieser Fall zeichnete sich dadurch aus, dass nach der Beseitigung der acuten Entzündung durch Eisessig, Opium u. s. w., während der Exsudation fortbestand, im Verlaufe der nächsten Wochen 4—5 Anfälle eintraten, die man als Haux bezeichnen konnte (Obstruction alvi, häufiges grünliches Erbrechen, intensive Schmerzen im Laibe, massiges Fieber, Verfall der Gesichtsfarbe), Anfälle, welche 12—18 Stunden zu dauern pflegten und mit der Ausstossung eines festen Kothpfropfs, auf welchen dann reichliche scybalöse Ausleerungen folgten, ihr Ende erreichten. Ricinusöl und Klystire genügten nur beim ersten Anfall, später bedurfte es zeitlich wiederholter Eingiessungen von Eiswasser, um endlich die Ausstossung des Kothpfropfs zu erzielen. Innerliche Mittel wurden meistens erbrochen und deshalb ganz ausgesetzt, die Schmerzen durch Morphinumjecturen beseitigt. Erst Ende Februar war der Tumor verschwunden und seit dieser Zeit blieb die Gesundheit des Kindes ungestört. Offenbar handelte es sich hier um eine Compression oder Knickung der unteren Colonspartie durch das umlagernde Exsudat mit Stagnation und pfropfartiger Einklemmung von Fäcalmassen.

Acute Peritonitis durch Perforation eines Unterleibsorgans kommt, abgesehen von den erwähnten Ulcerationen des Processus vermiformis, nur ausnahmsweise bei Kindern vor, was sich aus der grossen Seltenheit milder Magengeschwüre und anderer zu Perforationen führender Krankheiten der Abdominalorgane in diesem Alter erklärt. Selbst der Hentypkus giebt, wie wir später sehen werden, nur höchst selten dazu Anlass. Wohl aber hatte ich ein paar Mal Gelegenheit, eine diffuse eitrige Peritonitis im Gefolge des Scharlachfiebers, zumal der secundären Nephritis zu beobachten, worauf ich bei der Betrachtung dieser Krankheit zurückkommen werde.

Wenden wir uns nun zu der chronischen Peritonitis, so können wir auch diese, abgesehen von ihrer überaus häufigen tuberkulösen Form, als eine sehr seltene Affectio bezeichnen. Wenn schon die bei Erwachsenen, zumal bei Weibern oft zu beobachtenden Adhäsionen der Abdominalorgane, besonders der inneren Genitalien, im Kindesalter zu den Ausnahmen gehören, so sind gar die Fälle, in welchen eine nicht tuberkulöse chronische Peritonitis aus ein wohl charakterisirtes klinisches Bild darbietet, so selten, dass ihr Vorkommen von einigen Autoren überhaupt gänzlich in Abrede gestellt wurde. Diese Ansicht ist indess nicht

geschickterigt, und der folgende Fall¹⁾ giebt ihnen dafür einen unwider-
leglichen Beweis:

ANNA S., 4-jährig, am 14. Sept. 1873 in die Klinik aufgenommen, soll bis
vor 8 Tagen gesund gewesen sein (?). Seit dieser Zeit will man eine Aufreihung
des Unterleibs bemerkt haben. Die Untersuchung ergab einen hochgradigen Ascites
mit beträchtlichem Nabel und deutlicher Ductaden. Schmerz und Empfindlichkeit
des Leibes absolut fehlend. Leberdilatation reicht bis zur 5. Rippe (Resp. 28—40),
wobei dyspnoisch, Rechts von der Scapula abwärts Dämpfung und schwaches
Abgesonmarch. Geringes Delirium gelöst, Ektremal., kein Fieber. Die am 16.
mit einer Probepunction vergrösserte Punction entleerte 2000 Ccm. einer grün-
lichen stark albuminösen Flüssigkeit, welche reichlich Eiterkörperchen, Fibrincoagula
und einzelne Fäden enthielt, die unter dem Mikroskop ein netz gefülltes
Fasernetz darboten, und deshalb den Verdacht einer Sarkomhülle im Unterleibe
suggerierten. Die Punction ergab jedoch nur eine 3—5 Ccm. Umbeverrägung
des anderen Leberastes, angeblich einen Tumor. Da aber nach 8 Tagen der Ascites
wieder denselbe wie vor der Punction war, so wurde diese am 24. mit demselben
Erfolge wie das erste Mal wiederholt, wobei jedoch keine einer Neubildung vergleich-
baren Elemente gefunden wurden. Bis zum 33. Decbr., also etwa 20 Tage lang,
blieb der Zustand ziemlich unverändert. Temp. Abends über 38.6 stieg an. Puls
96—140. Allgemeinbefinden sich merklich verschlechternd, Abmagerung zunehmend,
wiederholtes Erbrechen, meistentheils nach Diner. Bei einer indifferenten Behandlung
nahm auffallender Weise der Ascites ab, und am 13. Dec. konnte man durch die nun
wieder gewachsenen Bauchdecken hinreichend in der Nabelgegend deutlich durch-
sichtige, gelb strangartige Hüllen bilden, die an die Grenze des Hypogastriums
in einer gewissen Art unregelmäßigen Geflecht zusammen und keine Furchungen
der Bauchdecken, wie beim Druck, hier und da deutlich ein Reibungsgefühl dar-
boten. Stark durch reichliche bewusste Entlassungen kletterten nicht, so dass
die Diagnose einer Neubildung fast ganz genau. Bis zu dem am 21. unter zu-
nehmendem Collaps erfolgten Tode blieb der Zustand nahezu unverändert, und noch
am letzten Tage wurde folgender Status notirt: „Abdomen weich, leicht eindrückbar,
Entfernt Leberast 1—1½ Ccm. unter dem Rippenrandes tumor. Rechts von der
Lira alla von Leberast bis in die Flankalwärts bis in die Flankalwärts bis in die Flankalwärts
aus mehreren warfartigen unter sich zusammenhängenden Wällen bestehend,
etwa kirschenroter Tumor, der über das Niveau der Bauchwand sichtbar protrudiert.
Die anderen früher bildeten Tumoren weitestgehend palpabel als harte.“

Section: Im Abdomen etwa 2000 trüber Flüssigkeit. Sowohl das viscerale
wie das parietale Blatt des Peritoneums zeigt überall ziemlich breite und lange
Streifen fadenförmige bläulich-grün-gelbe Exsudate; die Öfen des Duodenums überall
durch dicken breiten und dichte gelblich-schwarze Schichten mit einander fest verwachsen,
so dass sie nur mit dem Messer von einander zu trennen sind. Die Paraw des
Darms durchweg stark verengt, röhren, knöchig, röhren und glänzend, auch an sehr
viele Stellen mit einem dicken schwarzen Gewebe und dem aufliegenden
Exsudat zu einem stielähnlich wässrigen, halb durchsichtigen, schleim-
artigen, ½—1 Ccm. dicken, unter dem Messer knirschenden Gewebe
organisiert. Membranen, röhren und kleine Nist stark gedrückt. Das ganze

Harthaut auffallend verhärtet, Schleimhaut glatt, Leber stark vergrößert, auf ihrer Oberfläche eine häufige Auflagerung (Perihepatitis hämorrhagica). Peritonitis constipata contra.

Hier haben Sie also einen Fall von sehr ausgebreiteter chronischer Peritonitis ohne Spur von Tuberkulose; vielmehr musste die Entstehung, wie sich später herausstellte, auf einen traumatischen Einfluss, nämlich auf einen Tritt, welchen das Kind einige Wochen zuvor von seinem barbarischen Vater in der Lebergegend erhalten hatte, zurückgeführt werden. Die hämorrhagische Entzündung der Leberkapsel, welche sich bei der Section gefunden wurde, eröffnete wahrscheinlich die Scene, und von hier aus hatte sich der Process allmählig auf das ganze Bauchfell und auch auf die rechte Pleura verbreitet. Daraus ergibt sich also, dass traumatische Einwirkungen auf den Unterleib nicht nur acute, sondern auch chronische Entzündungen des Peritoneum mit starken Verwachsungen der Darmschlingen unter einander und mit bedeutender seröser Ausschwitzung zur Folge haben können, und zwar so schleichend und latent, dass die Aufmerksamkeit erst durch den zunehmenden Ascites erregt wird. Auch auf die äusserst geringe Empfindlichkeit des Unterleibs und die meistens normale Darmentleerung trotz der unigen Adhäsionen der Darmschlingen unter einander mache ich Sie aufmerksam, weil wir dasselbe bei der tuberkulösen Form wiederfinden werden.

Eine besondere Beachtung verdient aber in diesem Falle die überaus starke schwielige Verdickung der Darmwände, welche während des Lebens die Form von Tumoren angenommen und mich um so mehr zur Diagnose einer Sarkombildung im Unterleibe bestimmt hatte, als auch das Mikroskop nach der ersten Punction auf die bildbaren Reibungsplattentumoren auf den vermeintlichen Tumoren diese Annahme zu stützen schienen. Man kann also aus diesem wichtigen Falle noch den Schluss ziehen, dass eine im weiteren Verlaufe der chronischen Peritonitis sich ausbildende schwielige Verdickung der Darmwände stellenweise einen so hohen Grad erreichen kann, um das täuschende Gefühl von Tumoren (zumal Sarkomen) zu erzeugen, dass ferner die Untersuchung der ascitischen Flüssigkeit in solchen Fällen mikroskopische Bilder ergeben kann, welche durch ihre alveoläre Structur die Annahme abgelöster Geschwulstketten möglich machen, während es sich nur um Fibrinflocken mit eingepflanzten Eiterkörperchen handelt.

Dies ist der einzige Fall von chronischer, nicht tuberkulöser Peritonitis im Kindesalter, welchen ich durch die Section constatiren konnte; dagegen kamen mir in der Privatpraxis mehrere Fälle vor, welche zwar

alle Symptome der beginnenden oder selbst völlig entwickelten Peritonitis chronica tuberculosa darbieten, und dennoch zu meiner Ueberraschung vollständig geheilt wurden. Die betreffenden Kinder waren zum Theil früher gesund, einige mit Otitis media oder anderen skrophulösen Symptomen behaftet. Sind diese Fälle in der That als geheilte tuberkulöse oder als einfache chronische Peritonitis zu betrachten? Ich kann diese Frage nicht entscheidend beantworten, wenn ich mich auch der letzten Anschauung anreige¹⁾. In der That lässt sich kein Grund anführen, weshalb das Peritoneum nicht ebenso gut wie die Pleura der Sitz einer, von Tuberkulose unabhängigen, chronischen Entzündung mit serösem Exsudat werden sollte.

XV Die Tuberkulose der Unterleibsorgane

Schon bei der Betrachtung der Meningeal- und Lungentuberkulose machte ich Sie auf das häufige Vorkommen von Miliartuberkeln oder käsigen Producten in den Abdominalorganen aufmerksam. Sehr oft finden Sie Tuberkel in der Milz und Leber, meistens in stromer Zahl, theils grosse, theils kleine, so dass sie kaum mit dem blossen Auge erkennbar sind; die Milz- und Lebertuberkel können aber auch die Grösse von Erbsen und darüber erreichen, und letztere zeigen dann öfters in ihrem Centrum eine mit käsigelichter Flüssigkeit gefüllte Höhle, das Lumen eines durchschnittenen Gallenganges, welcher rings von Tuberkeln umlagert ist. Fast ebenso häufig bildet das Peritoneum, das grosse Netz, der seröse Ueberzug der Leber und Milz, des Zwerchfells, des Darmkanals u. s. w., den Sitz zahlreicher miliärer Knötchen, die sich auch in den Nieren, am seltensten in den inneren Genitalien kleiner Mähdren finden. Dabei sind die Mesenterial- und anderen abdominalen Lymphdrüsen in der Regel noch oder weniger geschwollen und partiell oder gänzlich in käsige Masse umgewandelt. Alle diese Veränderungen bilden aber meistens nur zufällige Sectionsbefunde, welche sich bei nachweisbar tuberkulösen Kindern zwar mit Wahrscheinlichkeit vermuthen, aber nicht bestimmt diagnosticiren lassen.

Dagegen kann man in denjenigen Fällen, welche sich durch die vorwiegende oder gar ausschliessliche Entwicklung der Tuberkel in den Unterleibsorganen auszeichnen, während der Inhalt der Brust- und Schädelhöhle entweder nur unbedeutend, oder erst terminal von Tuberkulose befallen wird, allerdings eine Diagnose stellen. Wenn auch

¹⁾ Vergl. auch einen solchen von Stiller mitgetheilten Fall im Deutschen Archiv. 1875. XVI. S. 412.

die Leber- und Milztuberkel so selten von mir beobachteten Fällen sich einer sicheren Erkenntnis während des Lebens entziehen, und auch die käsige Degeneration der Mesenterialdrüsen sich nur ausnahmsweise mit Bestimmtheit feststellen lässt, so unterliegt doch die Diagnose der Peritonealtuberkel, wie wir bald sehen werden, in der Regel weit geringeren Schwierigkeiten. Bevor ich auf diese Dinge näher eingehe, habe ich noch einige Worte über die oben berührte Affection der Gekrösdrüsen vorausschicken.

Die Zeit, in welcher die Degeneration dieser Drüsen eine so vorwiegende Rolle spielte, dass fast alle atrophischen Zustände von einer den Chylusstrom hemmenden Anschwellung und „Verstopfung“ derselben begleitet wurden, ist längst vorüber. Die „Atrophia mesenterica“, (die „Drüsen im Unterleibe“, wie das Volk sagt), erweist sich vielmehr in den meisten Fällen als eine mehr oder weniger allgemeine, vorzugsweise aber auf den Unterleib concentrirte Tuberkulose, bei welcher die Mesenterialdrüsen erst secundär vom Peritoneum oder von der Darmschleimhaut her in Mitleidenschaft gezogen werden. Freilich können dieselben auch bei sonst gesunden Kindern, die an chronischen oder oft wiederholten Darmkatarrhen liden, hyperplastisch werden und unter ungünstigen Verhältnissen ebenso gut verkäsen, wie die Bronchialdrüsen in Folge chronischer Bronchialkatarrhe oder des Emphysems; weit häufiger aber geht die Erkrankung der Gekrösdrüsen von einer Tuberkulose des Darms und des Peritoneum aus, welche auf dem Wege der Lymph- und Chylusgefäße die Infektion der Drüsen vermittelt. Ich selbst sah wiederholt einzelne von tuberkulösen Darmpartien ausgehende, durch das Mesenterium zu verfolgende Lymphgefäße deutlich mit miliaren Tuberkeln besetzt. In den meisten Fällen erreicht nun die Anschwellung und Härte der Mesenterialdrüsen nur einen mässigen Grad und lässt sich durch die Palpation des Unterleibs nicht erkennen; ja selbst umfänglichere Anschwellungen (ich sah einzelne von Pflaumengröße) und Conglomerate lassen sich oft nicht durchfühlen, weil die Gasanreicherung der überliegenden Därme und die dadurch bedingte Spannung des Unterleibs dies verhindert. Aus diesem Grunde war ich z. B. bei einem 5jährigen, an chronischer tuberkulöser Peritonitis leidenden Mädchen wie im Stande gewesen, einen Tumor zu fühlen, obwohl die Section eine mehr als hühnerkopfgrosse Geschwulst ergab, welche nur aus tuberkulösen mit einander verschmolzenen Mesenterialdrüsen bestand. Wo aber die Gasauftreibung der Därme fehlt oder temporär nachlässt, da ist man allerdings öfters im Stande, die geschwollenen Drüsen als verschiebbare rundliche Knoten von verschiedener Grösse durch die erschafften Bauch-

decken durchzuföhren, wenn man auch dabei immer an die Möglichkeit einer Täuschung durch Faecalknothen denken muss.

Ein charakteristisches klinisches Bild giebt einzig und allein die Tuberkulose des Peritonaeum, aber auch nur dann, wenn es nicht bei einer bloßen Miliartuberkulose bleibt, sondern wenn in ähnlicher Weise, wie zu den Tuberkeln der Pia mater, eine Entzündung sich hinzugesellt. In der grossen Majorität der Fälle nimmt diese zwar einen schleichenden, chronischen Verlauf, doch muss man auch darauf gefasst sein, hier und da einer rascheren Entwicklung zu begegnen, unter welchen Umständen bei mangelhafter oder ganz fehlender Anamnese, zumal im Krankenbuche, sogar das täuschende Bild einer acuten Peritonitis entstehen kann. Und in der That handelt es sich dann auch um eine solche, die sich schliesslich zu einer bereits längere Zeit bestehenden Unterleibstuberkulose hinzugesellt, gerade wie die Meningitis zur Tuberkulose des Gehirns und der Pia, oder die Pericarditis und Pneumitis zu derjenigen des Herzsacks und der Pleura. Folle Fälle dieser Art schreien im Ganzen nur selten vornehmend:

Ich selbst erinner mich aus einer 60jährigen Krankheit, welches dass jede Anamnese am 29. Januar 1879 in die Klinik aufgenommen wurde. Derselbe war ziemlich wohl genährt, auch die Untersuchung des Thorax ergab nur abgelenkendes Abweichen im oberen Theile beider Lungen. Bei der bei Aufnahmestricheln stattfindenden Reibungstragen von Unterleibe, grossen Empfindlichkeit, Aufblähung und Spannung desselben, Erbrechen, Fieber wurden dabei auf eine solche Peritonitis, deren Ursache unbekannt blieb, hingewiesen. Nach dem am 18. im Collaps erfolgten Tode ergab aber die Section folgenden Befund:

Der stark aufgetriebene Peritonealsack enthält circa $\frac{1}{2}$ Liter stark wasserheller eitriger Flüssigkeit; beide Blätter des Peritoneum mit eitriger-Membranum Ektoderm bedeckt, alle Darmabschnitte mit einander verklebt. In der Serosa, von Theil auch in den tiefsten Schichten, der Darmwand viele miliäre und miläre Tuberkel, das untere Knie des Dünns wie bedeckt mit denselben, so dass hier das Peritoneum stark verdickt erscheint. An anderen Stellen sitzen die Tuberkel zerstreut, aber ebenfalls sehr dicht, in löcheriger Ausgestaltung. Im Rektum vereinigte Tuberkel. Im Mastdarm viele miliäre kirschkerngrosse Tuberkel der Schleimhaut und nekrotisirt-kirschkerngrossen Tuberkeln bis auf die Muscularis liegende Geschwüre, die sich weiter unten immer mehr häufen. Daneben auch einige klinge Pollenlargeschwüre, kurz vor dem Cecum ist die ganze Darmwand in eine starre Fläche verwandelt, auf welcher klinge zerstreute Tuberkel neben frischen grossen Knoten sichtbar sind. Duodenalklappe hat ganz durch Eitranten zerstört. Pank. verhält etwa um das Dreifache erweitert, am Antrum des Dünns liegt derselbe; das dilatirte Stück mit tiefen ulcusähnlichen Eitranten der Schleimhaut bedeckt. Auch im Colon bis zur Flexura liana hin sehr zahlreiche Eitranten. Leber fettig degenerirt. Überlappen beider Lungen schalenförmig, sehr oder wenig durch nässige Schrumpfung verdet, mit constanten künftigen Narben.

Es liegt nahe, in diesem Falle die Peritonitis von der Perforation

eines der zahlreichen tuberkulösen Darmsgeschwüre abzuheilen, doch liess sich eine solche nirgends constatiren, und auch das Bild der Krankheit, zumal der lange Verlauf, sprach nicht für diese Annahme. Wahrscheinlich handelte es sich um eine im Gefolge der alten ausgebreiteten tuberkulösen Enterophthisis entstandene, frische Miliartuberkulose des Bauchfells, welche sich mit acut eitrigen Erscheinungen combinirte. Dass unter diesen Umständen die letztere klinisch ganz zurücktreten, und das Krankheitsbild einen typhösen Charakter annehmen kann, lehrt der folgende Fall:

Johann S., 2½ Jahre alt, aufgenommen am 23. Jan. 1878, soll früher immer gesund gewesen und erst vor 8 Wochen mit Appetitverlust, Diarrhoe, grosser Mattigkeit und Fieber erkrankt sein. Dabei zunehmende Wölken, Blässe und Abmagerung. T. 38.2. Lippen und Zunge trocken und berbig, heftiger Durst, lehmfarbige Urin, sehr abführende Stühle, Milz nicht palpabel, wegen des starken Meteorismus nicht percussibel. Bauch steif gespannt, nirgends besonders schmerzhaft, tympanisch. Freie Pflanzigkeit in denselben nicht nachweisbar, im linken unteren Lungensappen katarrhalische Geräusche, sonst nichts Abnormes. Während des folgenden 6 Tage fortwährendes Fieber (Mg. 38.2; Ab. im 39.6), P. 120, immer heftiger werdend; zunehmender Meteorismus ohne erhöhte Empfindlichkeit des Leibes. Das Kind trat viel an Mund und Nase, so dass hier Kramponen entstehen. Zunehmender Collaps. Tod am 29.

Section. In dem aufgetriebenen Unterleibe etwa 100 Ccm. trüber brauner Flüssigkeit mit dicken Fibrinfäden. Ganze stark durch Gas ausgefüllt und durch Fibrin vielfach mit einander los verklebt. Secum an Hensen Stielen geröthet, sehr stark contractirt. An der Oberfläche der Därme, wie am Peritonaeum parietale sehr zahlreiche milchweisse Tuberkel. Herz und Lungen bis auf einen Bronchialkatarrh und einige Abscessen normal. Bronchial- und Mesenterialdrüsen ebenfalls normal, Leber exquisit verfetet. Darmmucosa nicht verändert.

Dieser Fall zeichnet sich durch die ausschliesslich auf das Peritonaeum beschränkte Tuberkulose aus. Kein anderes Organ, nicht einmal die Bronchial- und Mesenterialdrüsen waren ergriffen, und nur die Leber zeigte die bei Tuberkulosen so häufig vorkommende Verfettung. Die sorgfältigste Untersuchung ergab auch nirgends einen Käseherd, von welchem die Miliartuberkulose des Bauchfells ihren Ausgang genommen haben konnte. Von klinischer Bedeutung ist der verhältnissmässig rasche, etwa 4 Wochen dauernde Verlauf der Krankheit unter Erscheinungen, welche wohl eher an einen Ileotyphus, als an eine tuberkulöse Peritonitis denken liessen. Insbesondere merke ich Sie auf die sehr geringe Empfindlichkeit des meteoristischen Unterleibes aufmerksam, welche mit den durch die Section nachgewiesenen Erscheinungen wenig harmonirte.

Fälle, wie die oben erwähnten, treten indess an Häufigkeit weit gegen diejenigen zurück, welche chronisch verlaufen und das Abma-

sehe" Bild der tuberkulösen Peritonitis darboten. Der hervorstechendste Zug in diesem Bilde ist die ganz allmählig wachsende Volumszunahme des Unterleibs, welche anfangs für einfache Gasansammlung gehalten und wenig beachtet ward, mit der Zeit aber Reflexkationen erregt und die Eltern veranlaßte, ärztliche Hilfe nachzusuchen. Von den vielen Kindern, welche ich an dieser Krankheit zu behandeln hatte, war das jüngste $2\frac{1}{4}$ Jahr alt; die meisten standen im Alter zwischen 3 und 8 Jahren. Schon der erste Anblick des Abdomens muss dem Kundigen Bedenken erregen. Nachdem nämlich die Auftreibung des Leibes im Laufe einiger Monate stetig zugenommen hat, zeigt dieselbe endlich eine beträchtliche elliptische Wölbung, die Baustecken sind stark gespannt, selbst glänzend, und die Venae epigastricae zu blauerthoscheinenden Strängen erweitert. In sehr hohen Graden ist der Nabel verstrichen oder, was ich in mehreren Fällen beobachtete, sogar blasig hervorgetrieben. Gleichzeitig leidet der Appetit; die Kinder werden mager und welk, und bei voller Entwickelung des Leidens stehen mir immer der Contrast des halbkugelig hervorgetriebenen Unterleibs mit den abgemagerten unteren Extremitäten als etwas charakteristisches. Manche Kinder klagen auch von vorn herein über kolikartige Leibes Schmerzen und über Druckempfindlichkeit des Leibes, weit häufiger aber sah ich sowohl die spontanen, wie die durch Druck erregten Schmerzen vollständig fehlen, oder sich auf einzelne Partien des Abdomens beschränken. Bei hochgradiger Auftreibung des letzteren ergiebt die Untersuchung mittelst der Percussion und Palpation sehr häufig eine freie Flüssigkeitsansammlung (Ascites), wobei der Schall je nach der Lage der Kranken, wie bei jedem Ascites, wechselt und auch das Gefühl der Fluctuation wahrgenommen werden kann. Dies ist jedoch keineswegs constant, da oft nur wenig Flüssigkeit im Beckenraume vorhanden ist, und die Auftreibung des Abdomens dann größtentheils durch die von Gas stark ausgedehnten Därme bedingt wird, welche das Zwerchfell nach oben drängen und den Percussionsschall nicht nur am ganzen Unterleibe, sondern auch an der Seitenfläche des Thorax bis zur 5. Rippe hinauf tympanitisch machen können. Mitunter geben einige Theile des Unterleibs einen matten, andere einen tympanitischen Schall, ohne dass die Lage einen Einfluss darauf ausübt, was in der Absackung flüssigen Exsudats durch peritonitische Adhäsionen seine Erklärung findet.

Die Auftreibung des Abdomens ist so charakteristisch, dass ich sie selbst in zwei Fällen von chronischer Peritonitis, welche schließlich durch Meningitis tuberculosa zu Grunde gingen, bis zum Tode fortbauern sah, obwohl doch bei der letzteren das bedeutende Einsinken des Bauches

die Regel zu sein pflegt. Dennoch kommen auch hier Ausnahmen vor. Ich selbst beobachtete wiederholt im ganzen Verlaufe der Krankheit eine ungewöhnliche Flachheit oder gar Retraction des Abdomens, mit oder ohne Empfindlichkeit, und die Sectionen ergaben dann immer vollständigen Mangel von flüssigem Exsudat, Leere und Contraction des ganzen Darmkanals, und Adhäsion der Darmschlingen unter einander und mit dem Peritoneum parietale. In solchen Fällen bildete zwar die Peritonitis meistens nur ein Glied in der grossen Kette der allgemeinen Tuberkulose, und die Erscheinungen der letzteren waren so prävalirend, dass die Diagnose der Bauchfellaffection eben wegen des Mangels jeder charakteristischen Unterleibsschwellung erst auf dem Sectionstische gemacht werden konnte. Dennoch kann auch in denjenigen Fällen, in welchen die chronische Peritonitis tuberculosa das vorwiegende Leiden bildet, die Anschwellung fehlen. So fand ich z. B. bei einem 6jährigen Mädchen, welches der Tuberkulose verdächtig, lange an einem remittirenden Fieber gelitten und an terminaler Diphtherie gestorben war, eine chronische Peritonitis mit völliger Verwachsung der Därme unter einander und mit den Bauchdecken, und zahllosen Miliartuberkeln im Peritoneum und den neugebildeten Adhäsionen, ohne dass in irgend einem Theile, ausser in einigen Lymphdrüsen, etwas Tuberculöses gefunden wurde. Der Unterleib dieses Mädchens war im ganzen Verlaufe der Krankheit ungewöhnlich flach, derb und unempfindlich gewesen, so dass der Sectionsbefund in hohem Grade überraschte.

Fälle, wie der eben erwähnte, in denen die Tuberkulose sich ausschliesslich auf das Peritoneum oder wenigstens auf die Unterleibsorgane beschränkt, gehören nun keineswegs zu den Seltenheiten:

Kind von 2½ Jahren. Därme überall untereinander und mit den Bauchwänden verklebt. In den frei gebliebenen Räumen Ansammlung einer hell-cremefarbenen Flüssigkeit. Milz und Leber von derben bläulichen Schwarzton umgeben und mit ihren Nachbartheilen (Zwerchfell, Bauchwand u. s. w.) fest verwachsen. Im Peritoneum parietale, auf der Serosa der Baucheingeweide, im Netz zahlreiche Miliartuberkel. Beide Lungen, Bronchialdrüsen, Parenchym der Leber und Milz völlig frei von Tuberkeln.

Kind von 5 Jahren. In der Bauchhöhle keine Flüssigkeit. Alle Darmschlingen mit einander und mit der Bauchwand verwachsen, ebenso das grosse Netz, welches in einer 2 Ctm. dicken harten Masse entartet ist. Zwischen allen diesen Theilen und tieflich käsige bröckelige Massen eingelagert. Auf der freien Fläche des Peritoneum zahlreiche Miliartuberkel. Milz klein, sehr derb, in feste Schwarzton eingehüllt und nach allen Richtungen verwachsen. Ihr Grösste, wie das der Leber und Lungen, frei von Tuberkeln. Bronchialdrüsen käsig.

Otto T., 2¼ Jahr alt, aufgenommen am 6. Mai 1879 mit Macie, kugelförmiger Aufreibung des Leibes, palpabler Vergrößerung der Leber unter dem Rippenrande,

die auch in der Chlorenchenarrose deutlich constatirt wurde. Daneb bereits 6 Monate, ohne Fieber und ohne ein Symptom von Erkrankung anderer Organe. Tod am 19. durch Collaps und Oedema pulmonum. Section: Darmschlingen vielfach mit der Bauchwand und unter einander verbacken. Beim Durchschneiden bemerkt man in stark vascularisirten dunkelrothen Pseudomembranen massenhafte grau-gelbe Miliartuberkel, die auch im Netz und auf der untern Fläche des Zwischfells sichtbar sind. Im Darm an vielen Stellen tuberkulöse Geschwüre mit grauen Kalkstein auf der entsprechenden Serien. Leber fettig entartet, Milz normal, ebenso die Lungen und Pleura frei von Tuberkeln. Oedema pulmonum. Bronchial- und Mesenterialdrüsen käsig degenerirt.

Sie finden also in allen diesen Fällen die Organe des Thorax, mit Ausnahme der 2mal käsig entarteten Bronchialdrüsen, vollkommen intact, und nur das Peritoneum und allenfalls die Darmschleimhaut und die Gekrösdrüsen tuberkulös erkrankt. Diese Eigenthümlichkeit der abdominalen Tuberkulose erklärt nun auch die Thatsache, dass solche Kinder im ganzen Verlaufe ihrer Krankheit, welcher sich 6–12 Monate hinziehen kann, Ihnen keine andern Symptome darzulegen brauchen, als die vorher geschilderte halbkugelige, stark gespannte, von Venen-netzen durchzogene Anschwellung des Unterleibs, mit oder ohne Schmerzhaftigkeit, Anorexie, zunehmende Schwäche und Abmagerung, wobei gewöhnlich unregelmässige Temperaturerhebungen in den Abendstunden (bis 39,5) beobachtet werden, die Morgen Temperatur aber normal oder subnormal (36,7 bis 35,8) erscheint. Der Tod erfolgt entweder durch eine zufällige Complication oder durch völlige Erschöpfung, nachdem in Folge der zunehmenden Hertschwäche schliesslich noch Oedem der unteren Extremitäten und des Scrotum hinzutreten sein kann.

In vielen Fällen gesellt sich zu den genannten Erscheinungen noch Diarrhoe, welche allen Mitteln trotzt, oder nach kurzer Pause immer wiederkehrt und durch tuberkulöse Darmgeschwüre bedingt wird. Je ausgebreiteter aber die Tuberkulose ist, um so mehr compliciren sich auch die Symptome, und die physikalische Untersuchung der Lungen, der hartnäckige Husten und das remittirende Fieber stellen dann in Verbindung mit den localen Erscheinungen der chronischen Peritonitis jenes Bild dar, welches ich Ihnen früher bei der Lungenphthisis (S. 374) zu entwerfen versuchte. Auf die Anschwellung der Inguinaldrüsen, welche mir in einzelnen Fällen diagnostisch bedeutsam schien, lege ich jetzt keinen Werth mehr, da dieselbe bei Kindern ausserordentlich häufig ist, und gerade in einigen Fällen von Peritonitis chronica fehlte oder wenigstens nur in sehr geringem Grade vorhanden war.

Eine specielle Schilderung der anatomischen Erscheinungen werden Sie mir mit Rücksicht auf die (S. 514 ff.) mitgetheilten Sectionsbefunde,

welche ihnen ein anschauliches Bild derselben gewähren, erlassen. Erwähnt sei nur noch, dass ich fast nie eine mehr oder weniger entwickelte Fettentartung der Leber vermisse, wiederholt auch parenchymatöse Nephritis als Complication beobachtete.

Bisweilen kommt es im letzten Stadium der Krankheit noch zum Durchbruch nach aussen, indem sich in der Bauchwand ein Abscess bildet und öffnet. Was dabei entleert wird, ist entweder der mit dem Inhalte eines abgesackten Peritonealexsudats vermischte Abscess oder auch dünne Fäcalflüssigkeit. Ich beobachtete diesen Durchbruch in zwei Fällen, und zwar beide Mal durch den Nabel, durch welchen, wie schon (S. 496) erwähnt wurde, neben den Fäces auch Spulwurm austraten. In dem einen Falle, welcher zur Section kam, fand sich eine Communication der äusseren Abscessöffnung mit einer am Nabel festgeheilten perforirten Dünndarmschlinge, neben allen Erscheinungen der hochgradigsten tuberkulösen Peritonitis. Bei einem anderen Kinde, welches eine Menge freier Flüssigkeit in der Bauchhöhle erkennen liess, traten einige Tage vor dem Tode plötzlich sehr reichliche eiterartige Durchfälle ein, wobei das Volumen und die Empfindlichkeit des Leibes sich rasch verminderten. Die Section ergab gar keine Flüssigkeit mehr in der Bauchhöhle, aber in der hinteren Wand des Peritonealsackes, entsprechend der Fossa iliaca dextra, eine ulceröse Lücke von 3 Linien Durchmesser, durch welche die Sonde in einen gewundenen, gegen das Rectum hin führenden Kanal gelangte. Obwohl nun die directe Communication mit dem letzteren nicht deutlich nachzuweisen war, kann man doch nicht daran zweifeln, dass hier ein Durchbruch der Flüssigkeit durch den Mastdarm stattgefunden hatte.

Wie bei jeder Tuberkulose, kann auch bei der abdominalen der Tod durch eine terminale Meningitis tuberculosa herbeigeführt werden, wofür ich Ihnen folgendes aus mehreren ähnlichen ausgewählte Beispiel mittheile:

Ein 8jähriger Knabe, im Sommer 1878 an Pericarditis (S. 420) in der Klinik behandelt, wurde am 3. October von neuem aufgenommen. Derselbe bot zu dieser Zeit einen so hochgradigen Anorexie dar, dass nur Linderung der Dyspnoe die Function des Unterleibes gemacht werden musste, wobei 2600 Gramm einer grünliehen, trüben, stark albuminösen Flüssigkeit entleert wurden. Die Untersuchung ergab nun eine bedestende Prominenz der Leber unter dem Epigastrium, deren scharfer Rand deutlich zu fühlen war. Der Verdacht, dass eine Leberkrankheit hier die Ursache des Jactans sei, schien am so mehr gerechtfertigt, als weder am Harn noch in den Nieren Abnormitäten aufgefunden wurden, auch nirgends eine Spur von Oedem vorhanden war. Urin immer frei von Albumen; spec. (350—400 Grm. täglich), mit starken karmoisinen Sedimenten. Die Anschwellung des Unterleibes nahm bald nach der Purrie wieder zu und erreichte schon am 18. October die frühere Höhe, wobei

die Hautwunden sich immer mehr erweitern, aber niemals Schmerzen, weder spontan noch beim Druck, beobachtet wurden. Eine zweite Punction am 11. Novbr. entleerte wiederum 3800 Grm. kühler albuminöser Flüssigkeit, die sich indess bald von neuem ansammelte. Der Knabe wurde dabei immer magrier und anämischer, konnte aber trotz seines warmen Aszites im Zimmer umhergehen, war bei gutem Appetit und ganz ohne Fieber. So vergingen ein paar Monate, bis gegen Ende Februar 1879 aus dem blaugig hervorstechenden Nabel von Zeit zu Zeit klares Serum auszusickern anfing, ein Vorgang, der sich von nun an häufig wiederholte und durch einen Druck auf den Leib befördert wurde. Ende März spaltete sich die Nabelgegend zu, sickerte sich etwas und liess einen bevorstehenden Durchbruch vermuthen, welcher indess nicht erfolgte; das erwähnte Ausströmen von Serum aus dem Nabel dauerte vielmehr fort und die Spannung des Leibes vermehrte sich merklich. Vom 16. April an entwickelte sich aber Fieber (T. Ab. bis 38,5) ohne deutliche Ursache. Die Lungen erschienen bei der Untersuchung normal. Der Eintritt cerebral Symptome (Apathie, Somnolenz, Vomitus, Kopfschmerz) klärte bald die Sache auf, und am 7. Mai erfolgte unter wiederholten Convulsionen der Tod.

Section: Sowohl das peritoneale wie das viscerale Blatt des Peritoneum, besonders das letztere, dicht besetzt mit grauweiss durchscheinenden Knötchen, die fast sämmtlich mit schiefen Haken umgeben sind. Im Umfange der Leber sowie am Mesenterium sind diese Tuberkel bis zu halbgrossen Nüssen coalescirt und bilden kirscheigrothe Knollen. Das Netz samt als ein breiter 3 Ctm. dicker Wulst zum Theil am Colon transversum, zum Theil verwachsen mit einzelnen Dünndarmklingen, und enthält erbsengrosse Kysten. In der Bauchhöhle etwa 100 Grm. ganz klarer leicht gelblicher Flüssigkeit. Bls und Nieren normal. Leber sehr gross, 20 Ctm. lang, 15 Ctm. breit, 7 Ctm. hoch, stark fettig entartet mit verstreuten birse- und kirschenrothen Tuberkeln. Die ganze linke Pleura costalis dicht mit Tuberkeln besetzt, weniger die pulmonale. Beide Lungen hyperämisch, mit buntigen Infarctationen, aber frei von Tuberkeln. Pericardiumhöhle durch totale Synechie völlig obliterirt, so dass das Herz rings von einem dichten schieligen Gewebe umgeben ist. Die Muskelschichten der Vorderfläche des rechten Ventrikels fast durchweg schwammig entartet, sonst alles normal. Am Gehirn hochgradige Meningitis tuberculosa, sowohl der Basis wie der Convexität. Gehirn wolkenartig, Ventrikel stark erweitert und mit Serum gefüllt. Tels. obsoletes tuberculosa.

Dieser in vieler Beziehung wichtige Fall lehrt wiederum, dass

1) eine hochgradige chronische Peritonitis tuberculosa ohne jeden Schmerz bestehen und sich lediglich durch die Erscheinungen des Ascites, zunehmende Abmagerung und Cachexie kundgeben kann;

2) dass unter diesen Umständen eine durch fettige Entartung bedingte Prominenz der Leber unter dem Rippenrande zur falschen Annahme eines durch eine Leberkrankheit verursachten Ascites verleiten kann;

3) dass bei sehr grosser Spannung der Bauchdecken der mehr und mehr sich verflühende Nabel durch seine Einrisse dem in der Bauchhöhle angehäuften Serum einen Ausweg gestatten kann.

Zugleich ergibt sich aus der in diesem Falle zweimal ohne irgend

einen Nachtheil vorgenommenen Punction des Unterleibs, dass man die operative Behandlung eines durch chronische Peritonitis bedingten Ascites nicht mehr zu scheuen hat, als die jeder anderen Bauchwassersucht. Man muss sich nur zuvor durch recht sorgfältiges Percutiren von der freien Beweglichkeit des Wassers überzeugen, um nicht mit dem Troicart in Adhäsionen oder gar in Darmschlingen hineinzustechen. Gerade bei diesem Kranken überstieg ich mich von der Nützlichkeit eines leisen Peritonitis, welches an der Stelle, die ich dann zum Einstich wählte, einen matten Schall ergab, während jedes stärkere Anschlagen des Plessimeters einen fast tympanitischen Klang weckte. Dass die Punction hier nur palliativ zur Linderung der Dyspnoe angewendet werden kann, brauche ich kaum hinzuzufügen. Was die anderweitige Behandlung der tuberkulösen Peritonitis betrifft, so kann ich mich leider keiner Erfolge rühmen. Consequent viele Wochen fortgesetzte hydropathische Fomentationen, Soolbäder und Einspinzelungen der Bauchhaut mit Jodtinctur oder Jodoformcollodium blieben ebenso erfolglos, wie der innere Gebrauch des Leberthrans, des Jodeisens und des Jodkalk, welches ich gerade im letzten Falle Monate lang fortbrauchen liess. Wenn in einzelnen Fällen meiner Privatpraxis durch diese Mittel eine Besserung, ja selbst eine Heilung herbeigeführt wurde, so glaube ich, dass es sich dabei nicht um eine tuberkulöse, sondern um eine einfache chronische Peritonitis handelte, worauf ich schon oben (S. 508) aufmerksam machte. Jedenfalls ergibt sich aus diesen, wenn auch nur seltenen Fällen, dass man bei der Diagnose einer tuberkulösen Peritonitis sich nicht beruhigen und die Hände in den Schoos legen, sondern immer noch therapeutische Versuche machen sollte. Die Einspinzelungen mit Jod dürfen übrigens nie in zu grosser Ausdehnung vorgenommen werden; vielmehr theile ich die Bauchdecken durch zwei am Nabel sich kreuzende Linien in 4 Quadranten, und lasse täglich einen derselben mit Jodtinctur oder Jodoformcollodium bepinseln. Man kann damit Wochen lang ohne Nachtheil fortfahren, namentlich liess sich Albuminurie, welche nach französischer Autoren sehr häufig eine Folge der Einspinzelungen von Jodtinctur bei Kindern sein soll, in keinem dieser Fälle nachweisen, obwohl wiederholt darauf untersucht wurde. —

Ich erwähnte bereits, dass in einer Reihe von Fällen die chronische tuberkulöse Peritonitis von hartnäckiger Diarrhoe begleitet wird, welche wohl immer als die Folge tuberkulöser Darmgeschwüre aufgefasst werden muss. Wir begegnen diesen Ulcerationen, welche entweder mehr vereinzelt, oder in Form dicht gedrängter Gürtelgeschwüre die Schleimhaut zerstören, oft auch bei Kindern mit nahezu normalem Bauchfell,

bei vorwiegender tuberkulöser Lungenphthisis. Oft sieht man schon von der Serosa aus zahlreiche, schieferige, das ganze Darmlumen umgreifende, reich mit Tuberkeln besetzte Stellen, manche mit starker Verengung des Darmes, welchen auf der Schleimhaut tief greifende Gürtelgeschwüre entsprechen. An diesen kann das Lumen dergestalt stenosirt sein, dass die Darmschleife nur mit Mühe durchgleitet. Uebrigens stimmt das ganze Bild sowohl klinisch, wie anatomisch, mit der gleichen Affection Erwachsener so überein, dass ich mich hier auf wenige Details, welche das Kindesalter betreffen, beschränken kann.

Bei vereinzelt tuberkulösen Darmschwüren kann die Diarrhoe ebenso gut fehlen, wie bei sparsam vorhandenen katarrhalischen Geschwüren, und dann ist eine bestimmte Diagnose nicht möglich. Bei einem 6jährigen marastischen Knaben (Section am 28. Febr. 1881) fanden wir neben einer allgemeinen Tuberkulose auch vielfache tuberkulöse Darmschwüre, deren eins sogar perforirt war und eine schnell lethal gewordene purulente Peritonitis angefaßt hatte, ohne dass während seines 10tägigen Aufenthaltes in der Klinik jemals Diarrhoe beobachtet worden war. Andererseits wissen wir, dass eine chronische Diarrhoe, welche ohne deutliche Zeichen von Tuberkulose anderer Organe, aber doch mit zunehmender Abmagerung, Erschöpfung und einem remittirenden Fieber einhergeht, oft durch einen chronischen Darmkatarrh mit folliculären Ulcerationen bedingt wird (S. 464). Die tuberkulöse Darmverschwörung lässt sich also nur da mit annähernder Sicherheit diagnostizieren, wo eine mehr oder minder reichliche und hartnäckige Diarrhoe sich mit bestimmten Zeichen von Tuberkulose anderer Theile, sei es der Bauch- oder Brustorgane, verbindet. Aber selbst in diesen Fällen hat man zu bedenken, dass bisweilen eine Combination tuberkulöser und folliculärer Prozesse im Darmkanal vorkommt, wobei entweder die eine oder die andere Form prävaliren kann:

Max H., 3½jährig, aufgenommen am 1. April 1873. mit etwas aufgeregtem und gegen Druck empfindlichem Unterleibe, welcher normale Percussionsergebnisse ergab; leidet von 3 Monaten an starkem, immer wiederkehrenden Durchfällen. Stuhlgang 3—4mal täglich, immer sehr dünn, gelbbraun, schleimig, oft von Kollik angekündigt und begleitet. Unverminderung der Brustorgane sensal. Kein Fieber, aber zunehmende Mager und Schwäche. Am 6. Oedem des linken Unterschenkels, welches schon nach 2 Tagen verschwindet; dafür am 16. Oedem des Gesichts, welches anhielt und sich nach einigen Tagen wieder mit Oedem des linken Unterschenkels verbindet. Diarrhoe trotz der angewandtesten Mittel (Colombo, Cascarella u. s. w.) in derselben Weise fortdauernd, zuweilen mit Prodigiosa anxi. Zunehmender Collapse. Tod am 8. Juni. Section: In beiden Lungen viele sehr kleine peribronchitische Käseherde. Käseige Entzündung der Bronchial-, Tracheal- und Mesenterialdrüsen; Fettleber; Stenose im Recken und Oesophagus. Auf der zwölften Peyer'schen

Plaques bedeckte sich ein grobgerichtetes unregelmäßiges Geschwür, in dessen Randern noch einzeln vergrünerte, im Centrum verkrüdete Follikel sichtbar sind; auf der entsprechenden Seite einzelne subcutane furchenförmige graue Knötchen. Von der Ileoscaalclappe an beginnt eine sehr bedeutende Anschwellung der Dickdarmfollikel und der ganzen Darmwandung; sehr bald treten Geschwüre auf, die je weiter nach unten, desto zahlreicher werden, schließlich confluiren und im Colon desc. und Rectum nur noch einzelne kleine Partien hyperplastischer Schleimhaut zwischen sich lassen.

Das Hauptleiden bildete hier eine chronische Dysenterie mit Ulceration der Follikel. Da dieselbe in einem zu tuberkulös-käsigem Processus disponirten Kinde sich entwickelte, so hat ihre zufällige Combination mit dem käsigem Geschwür einer Peyer'schen Plaque, welches seinerseits wieder eine Miliartuberkulose der nächsten Umgebung bedingt hatte, nichts Auffällendes. Klinisch bemerkenswerth ist, dass diese enorme Verschwörung der Darmschleimhaut fast ganz ohne Fieber verlief, und nur ausnahmsweise eine den Normalgrad etwas überschreitende Temperatur beobachtet wurde, eine Erscheinung, welche offenbar mit der schon wiederholt hervorgehobenen Tendenz junger Kinder zum Collaps zusammenhängt. In anderen Fällen kommt aber ein ausgebildetes hektisches Fieber vor, wobei sich die Morgentemperatur beweißen Wochen lang um 2 bis 3° niedriger fand, als die abendliche (z. B. M. 36,5 bis 35,8; Ab. 39,5). — Auch das im letzten Falle wiederholt auftretende Oedem des linken Unterschenkels und des Gesichts, welches weder durch eine Nierenaffectio erklärt wurde, noch allein in der Schwäche des Herzmuskels begründet sein konnte, verdient hier erwähnt zu werden. Das locale Oedem des linken Unterschenkels konnte nur durch eine Thrombose im Stromgebiete der linken Schenkelvene bedingt sein, deren stauender Einfluss sich zwar nach der Herstellung einer collateralen Circulation verlor, im weiteren Verlaufe aber von neuem geltend machte; denn eine venöse Stauung in Folge einfacher Herzschwäche hätte ein Oedem beider Füße herbeiführen müssen. Leider wurde bei der Section die Schenkelvene nicht untersucht, doch gehören bekanntlich die „marantischen“ Thrombosen derselben bei phthisischen Erwachsenen und Kindern keineswegs zu den Seltenheiten, können sogar, wie im folgenden Falle, bis hoch in die Vena cava inferior hinaufreichen und dann durch ihre vorwiegenden Symptome die zu Grunde liegende Krankheit ganz in den Hintergrund drängen:

Knab M. 7jährig, aufgenommen am 12. Februar 1878, seit einem im vorigen August überstandenen Schiffschiffeler Krankleid, leidet seit immer an Diarrhöe und ist stark abgemagert. Seit Anfang Februar Oedem beider Beine, des Scrotum und Penis, starke Erweiterung aller subcutanen Bauchveuen, Unruhe normal,

Urin sparsam, ohne Albumen. In beiden Lungen Rassel; unterhalb der linken Scapula von kugelförmigen Charakter. Diarrhoe 5—6mal täglich. T. Ab. 39,0; M. normal. Zerkleinerter Marasmus. Odem auch über Bauch und Lumbalgegend sich verbreitet, Venen bis zu den Füßen herab immer mehr sich erweiternd. Vom 22. an Gangrän des Scrotum und des rechten Fesselhüfens. In den letzten Tagen Prominenz der Leber unter den Rippen. Tod am 2. März. Section: Vollständige Thrombose der Vena cava inf. bis dicht unterhalb des Abganges der Lebervenen; abwärts setzt sich dieselbe in die Venae iliacae, femorales und sogar in die Hautvenen beider Ober- und Unterschenkel fort. Leber verfettet und voluminös. Im Dünndarm markstückgroße tuberkulöse Geschwüre, anfangs nur vereinzelt, im Ileum aber nahe aneinander gedrückt, theilweise confluirend und handbreite Strecken der Schleimhaut einnehmend. Mesenterium rindlich, tuberkulös. Auch im Colon und Rectum viele flache Ulcerationen. In der rechten Niere ein haselnußgroßer käsiger Herd und miliäre Tuberkel. In unteren Lappen der linken Lunge eine große Caveme mit käsigem Inhalt. Bronchialdrüsen geschwollen und käsig.

Für die Behandlung der tuberkulösen Darmphthisis stehen uns keine anderen Mittel, als diejenigen, welche ich Ihnen gegen den chronischen Darmkatarrh und die katarrhalischen Darmschwüre (S. 466) empfahl, zu Gebote, doch werden Sie wohl kaum einen Erfolg derselben erwarten dürfen. Früher oder später gehen die Kinder an Erschöpfung durch die fortdauernde Diarrhoe, die begleitende Tuberkulose anderer Organe und die Febris hectica zu Grunde.

XVI. Die Krankheiten der Leber.

Für die Beurtheilung dieser Affectionen ist vorzugsweise die Thatsache von Wichtigkeit, dass der untere Leberrand bei Kindern, zumal in den ersten Lebensjahren, tiefer steht, als bei Erwachsenen. Mit dieser Thatsache muss man rechnen, wenn man sich nicht diagnostischen Fehlschlüssen in Bezug auf das Volumen der Leber aussetzen will. Ueber die Ursachen dieses tieferen Standes der unteren Lebergrenze geben die neuen Untersuchungen von Sahli¹⁾ interessante Aufschlüsse. Aus diesen ergibt sich nämlich, dass die Beschaffenheit der kindlichen Leber selbst, zumal die gewöhnlich angeschuldigte relativ stärkere Entwicklung derselben, diesen Tiefstand nicht erklärt, dass vielmehr das von Henke hervorgehobene Verhalten der Rippen viel dazu beiträgt. Indem nämlich beim Kinde die Rippen gegen die Seiten zu weniger steil abwärts verlaufen, als beim Erwachsenen, lassen sie die Leber in grösserer Ausdehnung unbedeckt und der Rand derselben kommt daher unter sonst gleichen Verhältnissen tiefer unter den Rippenrand zu stehen.

Die Leber wird im Kindesalter bei weitem seltener, als bei Erwach-

¹⁾ Sahli, Die topographische Ferrassur im Kindesalter. Bern 1882. S. 122.

senen von Krankheiten heimgesucht. Die bei den letzteren so häufige interstitielle Entzündung mit Ausgang in Cirrhose gehört im Kindesalter zu den Ausnahmen¹⁾, vielleicht deshalb, weil ihre häufigste Ursache, der Abusus spirituosorum, hier in Wegfall kommt. Mir selbst ist die Cirrhose in völliger Entwicklung, d. h. also die granulirte atrophische Leber, noch nie bei Kindern vorgekommen, wohl aber öfters eine mässige Hyperplasie des interstitiellen Bindegewebes mit gleichzeitiger Fettentartung der Leberzellen, welche sich vor dem Tode nicht erkennen liess, also kein klinisches Interesse darbietet²⁾, oder eine mit olivengrüner Färbung des Parenchyms einhergehende stärkere Vermehrung jenes Bindegewebes, welches überall in Form weisslicher Stränge die Acini umgab und bereits eine leichte Granulirung der Ober- und Schnittfläche erzeugt hatte. Diese Fälle betrafen zwar vorzugsweise Kinder mit nachweisbarer hereditärer Syphilis (S. 96), kamen aber auch hier und da vor, ohne dass eine solche Beziehung mit Bestimmtheit constatirt werden konnte, und gaben sich klinisch durch einen mehr oder minder beträchtlichen harten Lebertumor und Icterus, bisweilen auch durch eine palpable Milanschwellung (Hyperplasie und Stauung) kund, während Magen- und Darmblutungen oder Ascites, welche bei Erwachsenen so häufig sind, wahrscheinlich wegen des leichteren Grades der Krankheit in meinen Fällen durchweg fehlten. Nur ausnahmsweise hatte ich Gelegenheit, unter diesen Umständen bei Kindern von 6 bis 12 Jahren unter dem consequenten Gebrauche der Carlsbader Quellen ein Schwinden des Icterus und allmählig eine totale Zurückbildung des Lebertumors zu beobachten. Doch ging aus diesen Fällen unzweifelhaft hervor, dass es sich hier, so gut wie bei Erwachsenen, um eine von Syphilis durchaus unabhängige chronische Hepatitis handelt, welche, so lange noch keine interstitielle Bindegewebswucherung vorliegt, einer Heilung durch die alkalischen Thermen fähig ist.

Eben so selten kommen Abscesse³⁾ und maligne Tumoren der

¹⁾ Unterberger, *Jahrb. f. Kinderheilk.* Bd. IX. 1876. S. 390. — Fox, *ibid.* Bd. XIII. 1878. S. 404. — Neurentier, *Oester. Jahrb. f. Pädiatrik.* Bd. VIII. 1877. S. 14.

²⁾ In diese Kategorie gehört auch der grösste Theil der von Neurentier beobachteten 15 Fälle, von denen nur 3 während des Lebens diagnostizirt wurden.

³⁾ Abscesse in der Leber, welche durch Einwanderung von Spulwürmern erzeugt waren, sind bei Kindern nur 3mal beobachtet worden. Schonthausen, welcher den dritten dieser Fälle mittheilt (*Jahrb. f. Kinderheilk.* XIII. S. 65), betrachtet dieselben nicht als wahre Eiderbeulen, sondern als klapf verfallende Stellen, welche theilweise keine Würmer, sondern nur Eier derselben enthielten, woraus er

Leber bei Kindern vor. Einem von West schon im achten Lebensmonate beobachteten Falle von medullarem Sarkom kann ich den folgenden anreihen:

Kind von $2\frac{1}{2}$ Jahren, aus gesunder Familie stammend, Anfangs Februar 1878 in der Poliklinik vorgestellt. Bis Weihnachten 1877 immer gesund, seitdem Zunahme des Leibes, ohne erkennbare Ursache. Bei der Untersuchung zeigt sich die Leber stark vergrößert. In den nächsten Wochen rapide Zunahme; auf der Oberfläche des linken Lappens im Epigastrium fühlt man deutlich eine feste, weiche, fast fluctuirende Prominenz, welche indess nicht empfindlich scheint. Venenverwiderung am Unterleibe und am unteren Theil des Thorax. Zunehmende Abmagerung und Schwäche, leichter Icterus. Tod am 28. März. Section: Leber um das Dreifache vergrößert, leberisch gefärbt, enthält an ihrer Peripherie wie im Innern sehr zahlreiche, gelblich-weiße, weiche Tumoren von Haselnuss- bis Wallnussgröße und darüber, welche zum Theil an der Oberfläche prominent, zumal am im linken Lappen kräftlicher grünerer Tumor, Gallenblase cystenartig ausgefüllt, mit trüber bläulicher Flüssigkeit angefüllt. Ductus cysticus durch einen Tumor comprimirt. Alle anderen Unterleiborgane normal, nur leberisch. Die anderen Höhlen darüber nicht geöffnet worden.

Ein ähnlicher Fall, welcher ein 17 Monate altes Kind betraf, wird von Affleck *) als „Lebercarcinom“ beschrieben. Da auch in dem einzigen, welcher unter sehr ungünstigen Verhältnissen zur Section kam, die mikroskopische Untersuchung der Tumoren mangelt, so kann ich nur nach der äußeren Beschaffenheit derselben auf Sarkom schließen. Das rapide Wachsthum des Lebertumors, welches sich von Woche zu Woche deutlich verfolgen ließ, glaube ich noch besonders hervorheben zu müssen.

Häufiger hat man Gelegenheit, Echinococcencysten bei Kindern von 8—12 Jahren zu beobachten, welche in jeder Beziehung mit denen der Erwachsenen übereinstimmen. Ich gedenke nur eines Falles, der mir wegen des anscheinend guten Erfolgs der Punction bemerkenswerth scheint:

Ein 11-jähriger Knabe, am 15. Juli 1878 aufgenommen, ist weiter nichts Krankhaftes dar, als eine Aufreibung des rechten Hypochondriums. Die Leber überragte palpabel etwa 2 Querfinger den Rippenrand, und liess zwischen Nabel und Proc. xiphoidaeus eine prall elastische halbkugelige, etwa apfelgroße Prominenz fühlen, bei deren Betöhrung und Percussion indess kein Schwingen wahrgenommen wurde. Am 19. entleerten wir aus diesem prallen Tumor mittelst eines feinen Treikants etwa 300 Grm. einer breiigen klaren Flüssigkeit und legten gleich darauf einen Druckverband an. Die Flüssigkeit war frei von Etwas und konnte,

auf eine Rückwanderung der Lumbrici aus diesen Herden gegen den Ductus cholechaeus hin abzielen.

*) Centralblatt f. Kinderheilk. II. 3. 46.

obwohl sie wider Ektasienzuständen noch Darmstenosen enthält, doch augenscheinlich nur aus einer solchen, wahrscheinlich streifen Cyste stammen. Der weitere Verlauf war so befriedigend, dass Pat. bereits am 27. (also 9 Tage nach der Function) entlassen wurde. Von der elastischen Prominenz war keine Spur mehr wahrzunehmen und auch der letzte Lebertest war noch wenig fühlbar. Ob freilich die Heilung eine dauernde war, bleibt dahingestellt, ist aber nach der Analogie ähnlicher Fälle wohl möglich. —

Weit häufiger als die bisher genannten Affectionen kommt die amyloide Degeneration der Leber im Kindesalter vor. Die glatte, wenig oder gar nicht empfindliche Anschwellung des Organs erreicht bisweilen einen so bedeutenden Umfang, dass sie die ganze Oberbauchgegend einnimmt, und auf der rechten Seite bis unter die Spina scolis herabreicht. Die Diagnose beruht hier, abgesehen von dem grossen Volumen, besonders auf der Theilnahme der Milz und der Nieren an der amyloiden Entartung, indem man den Tumor der ersteren bisweilen im linken Hypochondrium palpiren, die Nierenaffection aber durch die Albuminurie constatiren kann. Seltener aber auch diese Complicationen fehlen, so können doch die Verhältnisse, unter welchen die Anschwellung der Leber vorkommt, Aufschluss geben, da bekanntlich die amyloide Entartung fast immer im Gefolge einer Cachexie oder Dyskrasie auftritt. Bei Kindern giebt besonders eine langwierige Knochenvereiterung zu einer solchen Cachexie Anlass. Wiederholt sah ich bei Spondylitis, Coxitis und anderen cariosen Affectionen der Knochen und Gelenke Leber und Milz palpabel anschwellen und Albuminurie eintreten, welche die Section als Folgen amyloider Processus nachwies. Dagegen kann ich mit denen, welche der Rachitis einen gleichen Einfluss zuschreiben, nicht übereinstimmen. Trotz der enormen Zahl rachitischer Kinder, welche alljährlich in der Klinik und Poliklinik behandelt werden, erinnere ich mich keines einzigen uncomplirirten Falles, in welchem ich eine amyloide Degeneration klinisch oder anatomisch hätte nachweisen können. Wo dies der Fall war, da bestanden immer noch andere wichtige Krankheitszustände, wie Caries, Tuberkulose, welche die Kräfte erschöpften. Wohl aber kann auch bei Kindern die Syphilis amyloide Prozesse hervorrufen, und zwar nicht die hereditäre Form in ihrer ersten Entwicklung, deren Einfluss auf die Erregung einer interstitiellen oder gummosen Hepatitis wir früher (S. 96) besprochen haben, sondern die veraltete Lues, mag sie nun einen hereditären Ursprung haben oder später erworben sein;

Agnes Z., 11 Jahre alt, aufgenommen am 12. Januar 1875, soll früher an den „Drüsen“ gelitten haben. Die Mutter hatte zur Zeit ihrer Entbindung einen „Aus-
schlag“ am Körper, welches indess ohne besondere Cur verschwand sein soll. Vor

einem Jahr Anschwellung der Nase, stinkender Ausfluss (*Ozaena*) aus denselben, Extractio melioris Knochenmarkes, Emigratio des Nasenrückens. Seit 3 Monaten Schmerzen im linken Oberarm und in beiden Schenkelbeinen, starke Abmagerung, Zurückbleiben der ganzen körperlichen Entwicklung bei geistiger Fröhlichkeit. Beide Tibiae vorn, besonders oben, mit harten diffusen Auflagerungen bedeckt; untere Epiphyse des linken Humerus stark geschwollen, Bewegung des Arms erschwert und schmerzhaft, Musculatur weniger entwickelt als am rechten Arm. Stirnhaut an der Glabella aufgetrieben. Zähne vielfach cario. die Krone der Incisoren ohne auffallende Einkerbungen, die untere linke Schneidezahn erheblich grösser, als der zweite. Lymphdrüsen am Hals mässig geschwollen, linke Tonsille vergrößert. Uvula ganz fehlend. Leberdämpfung beginnt oben am unteren Rande der 4. Rippe, überragt den Rippenrand in der Linea mamill. um 4 Ctm., in der Parasternallinie um $3\frac{1}{2}$ Ctm. die Basis des Proc. xiphoi. um 3 Ctm. Unterer Leberrand deutlich fühlbar, ebenso wie die den Rippenrand überragende Milz, deren dumpfer Schall bis zur 8. Rippe reicht. Im Urin eine mässige Menge Erweiss, Cylinder nicht nachweisbar. Therapie: Kali jodat. 5:100, 3mal täglich ein Kistöl. Nach Verbrauch von 100 hatten die Knochenschmerzen ganz aufgehört, die Auflagerungen der Knochen sich vermindert, die Beweglichkeit des Arms war gesteuert. Die Behandlung wurde 3 Monate lang fortgesetzt, und bei einer zweiten Aufnahme des Kindes im Laufe des folgenden Jahres auch eine Schmerzens 2 Wochen lang ohne wesentlichen Erfolg angewendet. Nase, Leber, Milz und Nieren blieben in allen Zuständen, während die Knochenschmerzen und Auflagerungen sich gänzlich verloren. Aber schon einige Monate nach der Cur traten auch Schmerzen wieder ein, und so sah man denn das jetzt 15-jährige Mädchen von Zeit zu Zeit immer wieder in der Poliklinik erscheinen und sich Jodkali erbitten, weil nur dies Mittel im Stande war, die schmerzhaften Schmerzen im Arm und in den Schenkelbeinen zu heilen.

Bertha B., 12 Jahre alt, aufgenommen am 2. December 1875, soll als Kind an „Drüsen“ und an ständigen „Geschwürchen“ am rechten Knie und Oberschenkel gelitten haben, deren Narben noch sichtbar sind. Dysenterie oder langwierige Diarrhöe soll nie bestanden haben. Seit mehreren Jahren kann das Kind den Stuhlgang nicht halten, indem häufiges Drängen und Schmerz im After sehr häufig eintritt, und dabei selbst eine dünne, missiger blutige Aussonderung erfolgt. Angina tonsillaris soll häufig bestanden haben, und soll 14 Tagen öfter wieder Schlingens brechwerden und heftige Schmerzen im Hals, namentlich auf der linken Seite denselben statt. Das sehr kleine schwächliche Mädchen zeigt eine starke Trübung der linken Cornea, eine dicke Nase und Koryza, einen grau-gelben beschaltenden Belag der Zungenschleimhaut, theilweise auch der Wangenschleimhaut, heftige Husten und der Urin, welche stark entkalkt erscheint. Von dem Arm liegt ein bohnengrosser Hämorrhoidalknötchen. Lungen bis auf einen Bronchialkatarrh normal. Leberdämpfung am unteren Rande der 4. Rippe beginnend, reicht bis zur Nabelhöhe, wo auch der untere Rand deutlich fühlbar ist. Oberfläche der Leber sehr hart, glatt, das Abdomen sichtbar aufgetrieben. Milz nicht fühlbar, auch bei der Percussion nicht vergrössert. Urin hellgelb, klar, albuminös, ohne Cylinder, nach demselben auch später wiederholt ohne Erfolg gesucht wurde. Der Stuhlgang zeigte im Verlaufe der Krankheit grosse Verschiedenheiten; meistens normal geformt, erfolgte er doch häufig mit Tenesmus, auch ehe das Kind den Topf erreichen konnte, und zwar in Gemisch einer geringen Menge skatolartiger, braunlicher, mit klar gestreuter Flüssigkeit. Häufig fand auch eine ganz fruchtloser Tenesmus mit heftigen Schmerzen im Anus

statt. Die am 8. vorgenommene Localasternschau mit dem Finger und Spiegel ergab eine sehr freie, marte Beschaffenheit, starke Weitung und Rötze der Mastdarmschleimhaut, oberhalb des Sphinkter internus eine ringförmige Stricture, die weniger deutlich zu sehen als zu fühlen war. Der Complex dieser Erscheinungen, zu denen noch mäßliche Gliederschmerzen und kleine multiple Anschwellungen der Inguinal- und Cervicaldrüsen kamen, sprach für Syphilis, und die eingeleitete Behandlung mit Jodkali zeitigt Befriedigung der erkrankten Mand- und Kachetische mit einer 1proc. Lapislösung wirkte schon im Laufe einer Woche auf die letztere Affectio, wie auf den Schnupfen und die Gliederschmerzen sehr günstig ein. Dagegen bestanden die Mastdarmbeschwerden und die mit normalen abwechselnden krankhaften Ausdehnungen fort, und manche Nächte wurden durch den häufigen Tenesmus schlaflos. Vom 8. an wurde täglich eine Alkarslösung (5 : 200) mit temporärem Erfolg in den Mastdarm gegeben, bei deren gewaltsamer Auspressung am 11. ein etwa 2 Cms. langer Prüllipf des Rectum erfolgte. Das vorgefallene Stück erschien dabei ausserst verhärtet, nützig, seiner normalen Schleimhaut beraubt. Da bis zum 20. der Zustand ziemlich unverändert blieb, so wurde eine Schmerzcur (anfangs 1.0, später 2.0 Ung. einzeln) verordnet. Aber auch nach der Einnahme von 30.0 war Alles beim Alten geblieben, und das Kind wurde am 7. März wegen einer Keratitis des rechten Auges auf die Augenstation verlegt. Bei der Wiederaufnahme desselben in meine Abtheilung (24. Mai) hatten Kachexie und Nuclei noch erhebliche Fortschritte gemacht, der Leberumfang noch zugenommen, sowohl nach oben (Hauptung beginnt an der 2. Rippe) wie nach unten, wo man den schiefen Band in der Axillarlinie unterhalb der Spina ossis Ili, in der Parasternallinie etwa 2 Finger oberhalb des Ligam. Prop., in der Medianlinie am Nabel deutlich fühlen konnte. Druck auf die Leber war etwas schmerzhaft. Alles Andere unverändert. Die 3—6mal täglich, oft mit Tenesmus und starker Kolik erfolgenden dünnen Stühle enthielten Eiter- und Blutstreifen, der spätere Urin immer noch reichlich alkalisch. Misanthie wurde auch fast reines Blut aus dem Anus entleert. Dabei Fieber (38.2—39.2 in den Abendstunden), schlauer Darm, Anorexie und Unbehalt. Weder die wiederholten Alkarsinjektionen, noch die gegen die häufigen Durchfälle verordneten Mittel (Bismuth. nigrum, Tannin mit Opium u. s. w.) bewirkten dauernde Besserung, höchstens eine temporäre Ermässigung der Diarrhoe, wozu dann auch immer das Allgemeinbefinden und der Kräftezustand sich besserten. So dauerte die Krankheit noch mehrere Monate. Erst Mitte October liess der zunehmende Kräfteverfall ein baldiges Ende erwarten. Tod am 26. November.

Section. Knochen Altsagerung. Lungen normal. Herz klein und weich, Muskelsubstanz blaue, grau-roth. Lachen normal; nur auf dem obersten Theil der hinteren Larynxwand, da wo der Schlund in den Oesophagus übergeht, sitzt eine hirsekorngrosse, weissliche, auf der Schleimhaut bewegliche, ziemlich feste Geschwulst (Gumma). Leber um das Doppelte vergrößert, überall amyloid entartet. Milz ebenfalls klein, ergiebt bei der mikroskopischen Untersuchung ebenfalls eine Amyloid-entartung der Pulpa, ebenso wie die ziemlich grossen Nieren, die Magen- und Darmmucosa. An der Gonna des Uterus und Jovum ein hirsekorngrosses Geschwür mit unregelmässigen gewulbten Rändern und reinem Grunde. Nirgends Tuberkel. Im weiteren Verlauf ist die Darmmucosa stark geröthet und geschwollen. Peyer'sche Plaques hervorragend; kurz vor dem Coecum ein ähnliches kleines Geschwür, wie das oben erwähnte. Mesenterium und sämtliche Darmmucosallagen stark blaus verdrückt, letztere vielfach durch lange, sehr dünne, derbe Pseudomembranen furt. Leber und Zwölffinger stielich adhärent. Von der Plicata li-

nalis Coll an beginnt die Schleimhaut sich unregelmäßig zu verdicken und zu rillen. Dann folgen neben oberflächlichen Substanzverlusten tiefergehende, tiefe Geschwüre mit gerüstigem Grunde bis zum Rectum hinab, wo nur noch hochkörnige Schleimhautreste intact sind. Colica stark verdickt und geschwungen; Rectum bis an den After erheblich verengt.

Wenn auch in beiden Fällen die Annahme unsicher blieb, so ist Syphilis unzweifelhaft als die Basis des ganzen complicirten Symptomencomplexes zu betrachten. Leber, Milz, Nieren zeigten amyloide Entartung, im zweiten Fall auch die gesammte Darmmucosa, welche mit zahlreichen Ulcerationen bedeckt und namentlich im Rectum fast ganz zerstört war. In Folge der schwierigen Schrumpfung des letzteren verbanden sich mit den Symptomen der Entersphthisis noch die einer ulceroßen Stenose des Mastdarms. Die chronische adhäsive Peritonitis muss wohl als die Folge einer von der Schleimhaut her auf die Serosa übertragenen Reizung, nicht als eine specifisch syphilitische Affection angesehen werden. Von grosser Bedeutung erscheint der Befund der Gümmigeschwulst zwischen Larynx und Schlund, weil diese, im Verein mit den während des Lebens beobachteten krankhaften Erscheinungen an der Mund- und Rachenschleimhaut und den amyloiden Entartungen der Abdominalorgane dafür spricht, dass auch die Ulcerationen und die Schrumpfung des Darmkanals, zumal des Mastdarms, in der That auf syphilitischem Boden entwickelt waren.

Leider verunsicherten aber beide Fälle auch die Wirkungslosigkeit der specifischen Behandlung in diesem tertiären Stadium der Krankheit. Jodkali und Schmierer konnten nur einen Theil der Symptome beseitigen oder lindern; die amyloiden Prozesse und die Ulcerationen des Darmkanals blieben dabei unverändert, ein Umstand, den wohl kein Erfahrener gegen die hiesige Natur dieser Zustände geltend machen wird. Glücklicher in der Therapie war Seiler¹⁾, in dessen beiden Fällen freilich das anatomische Verhalten der Leber (ob Amyloid, ob interstiële Hepatitis?) zweifelhaft blieb. —

Unter allen Krankheiten der Leber wird im Kindesalter die fettige Entartung am häufigsten beobachtet, freilich weit öfter auf dem Sectionstische, als in klinisch erkennbarer Weise. So finden wir dieselbe mehr oder weniger entwickelt in sehr vielen Fällen schwerer Infectionskrankheiten, zumal nach Diphtherie und Scharlach, ferner bei tuberkulösen, phthisischen oder durch chronische Diarrhoe erschöpften Kindern. Die Leber erscheint dabei verdickt, graubraun, hell-

¹⁾ Seiler, *Atrom* im kindlichen Alter. *Ber. Mitt. Wochenschr.* 1881. 89, 26.

oder granig, teigig, eindrückbar, und ihre Zellen zeigen unter dem Mikroskop eine starke Füllung mit kleinen und grösseren Oeltröpfchen. Das Organ ist dabei oft nicht erheblich angeschwollen. Wiederholt konnte ich bei solchen Kindern in der Rückenlage den unteren Abschnitt der Leber deutlich unterhalb des Rippenrandes palpiren oder durch Percussion nachweisen, war aber überrascht, bei der Section die Fettleber von nahezu normaler Grösse, nur unbedeutend geschwollen zu finden, eine Thatsache, welche durch den oben (S. 521) erwähnten relativ tiefen Stand des unteren Leberrandes im Kindesalter zu erklären ist. Jede, auch die geringste Vergrösserung der Leber erscheint dadurch bei der Palpation viel bedeutender, als sie in Wirklichkeit ist. Weit seltener war das Organ erheblich geschwollen und füllte dann einen mehr oder weniger grossen Theil des rechten Hypochondriums und der Oberbauchgegend aus.

Ob die Fettleber auch im Kindesalter in Folge einer unzureichenden Ernährung, ähnlich wie bei Erwachsenen, zu Stande kommen kann, lasse ich dahingestellt. Jedenfalls sind die Bedingungen derselben, übermässiger Genuss von Fett und Spirituosen bei mangelhafter Körperbewegung, bei Kindern nur ausnahmsweise anzutreffen, und ich selbst disponire nur über einen Fall, welchen man allenfalls in diese Kategorie bringen könnte:

Richard M., 2 $\frac{1}{2}$ jährig, aufgenommen am 10. Januar 1875, soll vor längerer Zeit (2) die Mägen gehabt haben und schon seit Monaten an Diarrhoe leiden. Gleichzeitig besteht Tassio cereulera. Trotz des jungen Alters soll das Kind schon lange viel lazarisches Bier trinken und verlangte noch in der Klinik immer Bieressig. Bei der Untersuchung fand sich eine feine Abschuppung der Epidermis auf der Haut des Rumpfes und geringes Oedem der Füsse und Augenlider, so dass sich der Verdacht einer Nephritis chronica oder nephrica aufdrängte. Der Urin war indess völlig normal, ohne Spur von Eiweis. Im Unterleibe etwas Flüssigkeit, Leber vergrössert, bis zum Nabel reichend, die Linea alba nach links um 2 $\frac{1}{2}$ Ctm. überragend. Mit nicht nachweisbar. Dabei täglich 4–6 sehr dünne, braune, wässrige Stühle, zuweilen Erbrechen, kein Fieber, Lungen und Herz normal. Schon in den nächsten Tagen sichtbarer Verfall, Verschwinden des Oedems, Erweiterung der subcutanen Hauchreizen und sichtbares Vorwölben des Leberrandes in der Nabelgegend; Sinken der Temperatur (36.0–35.8). Abmagerung, grosse Schwäche des Pulses, Apathie, Somnolenz, Eitertropfen auf der Conjunctiva und Cornea. Tod am 17. Januar.

Section. Herzmuskel blass grau-rot, fettig intarirt, rechter Vorhof mit Fibrinergüssen peß gefüllt. Leber beträchtlich vergrössert, durchweg grau-grün. Die Fingerindrücke glieben sich nur sehr langsam aus. Das Mikroskop zeigt eine ausgebreitete fettige Degeneration der Leberzellen. Binsomialsdrüsen etwas geschwollen. Blass. Darmachinhaut durchweg sehr blass, ihre Zotten bei sehrig aufstehendem

Licht sehr deutlich erkennbar (ausgesprochener Fettsinn nicht sicher). Nervenendigungen in der Corticalsubstanz stark verfatet.

Ob die ausgedehnte Steatose der Leber, der Nieren und des Herzens in diesem Falle mit dem ganz ungewöhnlichen Biergenuss in einem so frühen Alter in Verbindung zu bringen ist, lasse ich dahingestellt. Bemerkenswerth ist der anhaltende Durchfall, welcher alles Mittels Trotz bot, ohne dass bei der Section eine wesentliche Veränderung der Schleimhaut gefunden wurde. Leider wurde die mikroskopische Untersuchung der angeschwollenen Darmmitten verabsäumt, deren Beschaffenheit ebenfalls für eine Verfettung sprach. —

Fast ebenso häufig wie bei Erwachsenen, zu manchen Zeiten sogar in einer fast epidemischen Weise, begegnet man auch im Kindesalter jenem Icterus, welcher durch einen Catarrh des Duodenums und der Gallengänge bedingt wird. Wenn auch die meisten dieser Kinder das dritte Lebensjahr schon überschritten hatten, fehlt es mir doch nicht an Beispielen, in welchen diese Gelbsucht auch viel jüngere Kinder befiel, z. B. ein erst 8 Wochen und ein 5 Monate altes Kind. Anorexie, nicht selten bei reiner Zunge, in den ersten Tagen auch wohl Uebelkeit und Erbrechen, entfärbte graue oder lehmfarbige stühle Darmausleerungen, welche bisweilen sehr frequent und häufig, häufiger sparsam waren, galliger Urin, Mattigkeit und Verstimmung, Neigung zum Schlaf waren constante Begleiter. Fieber fehlte fast immer oder war höchstens im Beginn des Icterus in massigem Grade vorhanden. Meine schon früher¹⁾ mitgetheilte Erfahrung, nach welcher beim Icterus der Kinder die bekannte Verlangsamung des Pulses auf 50 und noch weniger Schläge mir niemals vorkam, hat sich wiederum bestätigt. Die Pulszahl schwankte immer zwischen 100 und 120, und ich muss daher annehmen, dass die grössere Reizbarkeit des kindlichen Nervensystems, besonders die Furcht während der ärztlichen Untersuchung, im Stande ist, den hemmenden Einfluss der Gallensäuren auf die Herzbewegung zu compensiren. Dafür spricht die umgekehrte Beobachtung von Traube²⁾, welcher den durch Icterus oder grosse Digitalisosen verlangsamen Puls Erwachsener sofort an Frequenz beinahe um das Doppelte zunehmen sah, wenn die Kranken sich aufsetzten oder anderweitig bewegten. Bei sehr ruhigen Kindern mit Icterus wird man daher wohl auch Pulsverlangsamung beobachten können, was mir selbst aber noch nicht gelungen ist. Ein

¹⁾ Beitr. zur Kinderheilk. X. F. S. 142.

²⁾ Traube, Die Symptome der Krankheiten des Respirations- und Circulations-Apparats. Berlin 1867. S. 29.

palpables, durch Gallenstauung bedingtes starkes Hervorragen der Leber unter dem Rippenrande ist selten, eher kann man dasselbe durch Punction nachweisen. Sämmtliche Fälle nahmen nach 8—14tägiger Dauer einen günstigen Ausgang, und nur einer bietet durch den wiederholten Eintritt heftiger Fieberbewegungen ein besonderes Interesse dar:

Gustav K., 8jährig, aufgenommen am 15. December 1875 wegen einer traumatischen Nekrose des Humeri während, des richen Stützens, welche noch eine 2 Ctm. lange, auf den Knochen führende Fistel im Perineum unterhält. Am 18. Januar 1876 Erweiterung der Fistel durch Larvacur, Auskratzen des nekrotischen Knochens, antiseptischer Verband. Dem 30 Tage später, am 29. Icterus mit hohem Fieber, 40.4. Puls 112, keine pyämischen Frosts: reinsteig. Kopfsch. Leber etwas vergrößert. Ab. 39.8. In den nächsten Tagen Icterus zunehmend bis zur Bronchialstauung, Urin gelb, ohne Albumen, ohne Leucin und Tyrosin: Stuhl entleert, festschl. Dieser Zustand dauerte fast unverändert bis zum 21. März, also volle 7 Wochen, während welcher Zeit die Wunde, die stets ein gutes Aussehen hatte, noch allmählig schrumpfte. Das am 29. Januar den Icterus begleitende Fieber dauerte nur zwei Tage, worauf ein sehr kurzer Zeitraum von 31. Januar bis zum 2. Februar folgte. An diesem Tage trat von neuem Fieber ein (M. 38.4. Ab. 39.0), welches anfangs mit hoher Abendtemperatur (z. B. 40.1 am 4. Februar), dann allmählig abnehmend, mit fast normaler Morgen Temperatur (37.6—38.2), aber noch immer beträchtlichen Steigerungen in den Abendstunden (38.5—39.2) bis zum 21. dauerte, am Abend dieses Tages noch einmal 41.0 erreichte, dann abnahm und am 21. März völlig verschwand, während gleichzeitig Icterus und Leberanschwellung sich zurückbildeten, und Urin und Faeces ihre normale Beschaffenheit wieder annahmen. Nachdem der Knote in der Klinik noch das Schmelzfieber durchgemacht, wurde er am 18. Juni mit geschlossener Fistel genau entlassen. Während des Icterus waren Purgantia, Salzwasser, Wülfinger und Vichy-Wasser angewendet worden. Chlorin (0.5 auf einmal) hatte auf das Fieber gar keinen Einfluss gehabt.

Der sich anfangs anbahnende Verdacht, dass das heftige Fieber und der Icterus von der Knochenaffection aus durch einen pyämischen Process bedingt sein könnte, wurde sowohl durch den vollständigen Mangel der Frostanfälle, wie besonders durch den weiteren günstigen Verlauf entkräftet. Auch sprach die Beschaffenheit der Faeces entschieden für einen hepatogenen, durch Gallenretention entstandenen Icterus, dessen Aetiology freilich dunkel war. Gegen eine Obstruction der Gallengänge durch Concremente, welche bisweilen solche Fieberstürme erregen, liess sich, abgesehen von der enormen Seltenheit derselben bei Kindern, der gänzliche Mangel von Schmerzempfindungen geltend machen, und es blieb daher nur übrig, einen intensiven hartnäckigen Catarrh der Gänge, der sich weit in die Verästelungen derselben hinstreckte, anzunehmen. Der glückliche Verlauf nach fast zweimonatlicher Dauer unter der beharrlichen Anwendung eines lauen Natronwassers spricht zu Gunsten dieser Diagnose. Immerhin bleibt das andauernde, bisweilen 40.0 und

sogar 41.0 erreichende Fieber unter diesen Umständen eine beachtenswerthe Erscheinung.

Die Behandlung des katarrhalischen Icterus, welche sich nur am besten bewährte, war die folgende. In den ersten zwei bis drei Tagen der Krankheit Purgantia (Calomel 0.06–0.01 2stündlich. Inf. Senae comp., Inf. rad. rhei F. 30), später Salzsäure (F. 3), welche beim Vorhandensein von Diarrhöe schon von vorn herein zur Anwendung kam. Strengste Ruhe und Diät, auch wenn gar kein Fieber stattfand; Vermeidung aller Fleischspeisen, ausser Bouillon, sonst nur schleimige Suppen, Zwieback, Gries, oder weich gekochter Reis, Compot. Zum Getränk täglich eine halbe Flasche Wildunger Wasser, um das in den Harnkathälchen ausgeschiedene Gallenpigment rasch zu entleeren. In zwei sehr hartnäckigen, aber fieberlosen Fällen, wo ausser den oben empfohlenen Mitteln auch Carlsbader- und Vichywasser erfolglos geblieben waren, sah ich von reichlichen Injectionen kühlen Wassers in den Darm mittelst des Irrigators eine überraschende Wirkung¹⁾. —

Der unter Cerebralsymptomen tödtlich verlaufende Icterus, welcher durch die acute Leberatrophie bedingt wird, kommt bisweilen auch bei Kindern vor. Ich selbst habe ihn in 3 Fällen beobachtet, von denen indess nur einer zur Section kam. Weder in klinischer noch anatomischer Beziehung bieten diese und andere von den Autoren mitgetheilten Fälle etwas für das Kindesalter Charakteristisches dar.

XVII. Die Krankheiten der Milz.

Die häufigste Erkrankung der Milz im Kindesalter ist die Tuberkulose, welche, wie schon erwähnt wurde, nicht nur den serösen Ueberzug und die Pulpa in Form mehr oder minder zahlreicher miliärer und submiliärer Knötchen befällt, sondern auch mitunter recht ansehnliche, über erbsengrösse, graugelbe, von dem dunkelrothen Parenchym lebhaft absteckende Knoten bilden kann. Da dieselben aber, so weit meine eigene Erfahrung reicht, niemals bestimmte Symptome zur Folge haben, so kann man sie auch nicht diagnosticiren, sondern nur aus dem Vorhandensein anderer tuberkulöser Organerkrankungen vernuthen.

Ueberraupt lassen sich die Affectionen der Milz nur dann mit Sicherheit erkennen, wenn dieselbe eine den linken Rippenrand mehr oder weniger überragende, palpable Geschwulst bildet. Ich sage ausdrücklich eine „palpable“ Geschwulst, weil ich der Percussion allein kein absolutes Vertrauen schenke, am wenigsten bei Kindern, die sich während

¹⁾ Reuß, *Beit. zur. Wundheilk.* 1877, S. 159.

der Untersuchung gern sträuben und durch Muskelcontraction leicht percussorische Täuschungen herbeiführen. Aus diesem Grunde betrachte ich alle Krankengeschichten, in denen der Stand der Milzspitze täglich nur auf Grund der percussorischen Resultate angegeben wird, mit entschiedenem Misstrauen. Man bedenke nur, wie einflussreich hier auch Veränderungen im Stande des Zwerchfells oder Gasauftreibungen des Darmkanals werden können! Die „fühlbaren“ Tumoren der Milz findet man aus, wie bei Erwachsenen, vorzugsweise bei gewissen Infektionskrankheiten, beim Heutypus, bei der Febris recurrens und wiederholten Anfällen der Febris intermittens, seltener bei der acuten Miliartuberkulose und der Meningitis cerebro-spinalis¹⁾; dagegen war es mir bisher nie möglich, beim Scharlach, den Masern, dem Erysipelas oder gar, was Anderen gelingen sein soll, bei katarrhalischen Anginen einen solchen palpablen Tumor nachzuweisen, wenn er nicht eben von früher her bereits bestand.

Unter den chronischen Krankheiten ist es zunächst die im Gefolge von Knochenarros und Syphilis sich ausbildende amyloide Degeneration der Milz, welche einen fühlbaren Tumor derselben erzeugen kann, obwohl auch Fälle von Amyloidmilz mit normalem oder selbst verringertem Volumen des Organs nicht selten vorkommen. Alles, was ich Ihnen oben (S. 524) über die amyloide Entartung der Leber mittheilte, gilt auch für diejenige der Milz, und ich werde mich daher gleich zu denjenigen Tumoren, welche auf einer einfachen Hyperplasie der Milz beruhen und besonders bei Kindern in den ersten Lebensjahren zu den keineswegs seltenen Erscheinungen gehören. Man erkennt diese Krankheit gewöhnlich schon an der eigenthümlichen gelblich weissen, aus bestem dem weissen Wachse vergleichbaren Färbung der Haut, zumal des Gesichts. Wiederholt bestimmte mich dieses charakteristische Colorit sofort zur Untersuchung der Milz, und ich täuschte mich nur ausnahmsweise in meiner Vermuthung. Nur in drei Fällen von Milztumor fand ich das Colorit nahezu normal, so dass mich der Befund in höherm Grade überraschte, während bei einem anderen Kinde die Hautfärbung mit derjenigen des Morbus Addisoni grosse Aehnlichkeit hatte. Fast immer überragte die Milz den linken Rippenrand als eine harte glatte Geschwulst, und füllte nicht selten die linke Hälfte der Bauchhöhle fast gänzlich aus, so dass ihr vorderer scharfer, mit Einkerbungen versehener Rand bis an den Nabel oder über denselben hinausreichte und bei schlaffen Bauchdecken deutlich zu umgreifen oder sogar sichtbar

¹⁾ Siehe einen Fall dieser Art S. 291.

war. Zuweilen liess sich der Tumor auch etwas verschieben, besonders wenn derselbe nur mässig oder schon in der Rückbildung begriffen war. Empfindlichkeit gegen Druck scheint gar nicht oder nur in geringem Maasse vorhanden zu sein. Starke Spannung der Bauchmuskeln, namentlich beim Schreien, kann die Palpation kleiner Tumoren erschweren, und man muss dann ruhigere Pausen abwarten, in welchen das Herabsteigen des Zwerchfells während der Inspirationen die Milz deutlicher fühlbar macht. Im ganzen Umfange des palpablen Tumors ist der Percussionsschall selbstverständlich matt und leer, während derselbe auch der oberen Grenze hin in der Regel keine wesentliche Veränderung zeigt. Der Grund dafür liegt wohl in der bedeutenden Schwere des Tumors, welche ihn abwärts zieht und durch die anhaltende Zerrung der Milzligamente eine erhebliche Dislocation des Organs hervorbringen kann. So fand ich z. B. bei einem 1 $\frac{1}{2}$ -jährigen Kinde, welches ich über ein Jahr zu beobachteten Gelegenheit hatte, die Geschwulst, welche anfangs im linken Hypochondrium fühlbar war, schliesslich in der Fossa iliaca sinistra liegend und ziemlich leicht verschiebbar.

Zu diesen Hauptsymptomen, dem Tumor und der charakteristischen Hautfarbe, gesellen sich aus als häufige, aber nicht ganz constante Begleiter Oedeme der Füsse und Augenlider, besonders aber kleine Blutextravasate in der Haut, welche meistens in Form sparsamer Petechien an verschiedenen Stellen der Haut sichtbar sind. Auch Blutungen aus Schleimhäuten¹⁾, selbst eine tödtliche Hämorrhagie aus kleinen Impfschnitten wurde beobachtet²⁾. Die Untersuchung des Blutes ergab wenigstens in meinen Fällen nur ausnahmsweise eine deutlich ausgesprochene Leukämie; in der Regel fand ich das Verhältniss der rothen zu den weissen Blutkörperchen nicht wesentlich von der Norm abweichend, wobei natürlich die meistens vorhandene Abnahme der rothen Körperchen, welche mit der hochgradigen Anämie zusammenhing, und die schon bei gesunden Kindern bemerkbare Vermehrung der weissen Körperchen in Betracht gezogen wurde. Eine auffällige Vermehrung der letzteren, also eine wirkliche Leukämie, gehörte, wie gesagt, zu den Ausnahmen. Will man nun diese Hyperplasie der Milz in die Kategorie der sogenannten „Pseudoleukämie“ einreihen, wie es Manche thun, so ist mit dieser Bezeichnung nichts gewonnen, welche ich auch deshalb für nicht geeignet halte, weil ich in keinem dieser Fälle Anschwellungen der

¹⁾ Billiet und Barthez, II. 36.

²⁾ Pott, *Das Wochenschr.* 1879, S. 655.

Lymphdrüsen constatiren konnte, die bei der „Pseudoleukämie“ sonst eine grosse Rolle spielen.

Die aetiologischen Verhältnisse blieben fast in allen von mir beobachteten Fällen dunkel. Nur selten liess sich nachweisen, dass eine Feteis intermittens von mehrwöchentlicher oder gar mehrmonatlicher Dauer vorausgegangen war, und in einem Falle behauptete die Mutter, während der Schwangerschaft mit dem betreffenden Kinde wiederholt an Wechselfieber gelitten zu haben¹⁾. Bisweilen waren häufige dyspeptische Störungen, Diarrhoe und Erbrechen, vorausgegangen, meistens aber fehlten auch diese, und die Mütter waren erst durch die zunehmende Blässe der Haut und den wachsenden Umfang des Unterleibs auf eine Erkrankung aufmerksam geworden, welche sich mit einer sonst ungetriebenen Euphorie des Kindes vertrag. Daher kommt es, dass die meisten dieser Kinder schon mit einem stark entwickelten Tumor dem Arzte vorgeführt worden. Appetit und Stuhlgang waren dabei oft ganz normal, und erst nach längerer Zeit pflanzte sich Abmagerung und Welkheit bemerkbar zu machen. Was die vielfach behauptete Beziehung zur Rachitis betrifft, so konnte ich bei der unendlich grösseren Mehrzahl rachitischer Kinder keinen Milztumor nachweisen, wenigstens keinen palpabel, der für sich allein Werth hat. Dass aber ein kleiner Theil der von mir beobachteten Milztumoren in der That bei rachitischen Kindern vorkam, wird Niemand Wunder nehmen, der die enorme Frequenz der Rachitis hier in Berlin, namentlich in dem klinischen und poliklinischen Material, in Betracht zieht. In einem Falle, welcher ein 2½-jähriges Kind betraf, litt die Mutter gleichzeitig an einem Leber- und Milztumor mit leichtem Icterus; doch war es mir nicht möglich, einen Zusammenhang, etwa durch Malariafection, nachzuweisen. Bemerkenswerth ist, dass auch ein später geborenes Kind derselben Mutter einen Milztumor zeigte, und erinnert dies an die Fälle von Senator, Biermer u. A.²⁾, welche Leukämia splenica bei Zwillingen oder bei Geschwistern überhaupt beobachteten.

Bei dieser Unklarheit der aetiologischen Bedingungen werden Sie die Prognose immer mindestens zweifelhaft stellen müssen, absolut schlecht aber nur in den seltenen Fällen, wo die Blutuntersuchung gleichzeitig eine ausgesprochene Leukämie ergiebt. Die Erfahrung lehrt, dass die Mehrzahl der mit einem chronischen Milztumor befallenen Kinder

¹⁾ Ein ähnlicher Fall wurde schon von Playfair (Schmidt's Jahrb. f. 1888, II, S. 338) mitgetheilt.

²⁾ Berl. klin. Wochenschr. 1882. S. 533.

unter zunehmender Anämie, Abmagerung, Anasarca und schliesslich auch Hydrops der Höhlen zu Grunde geht, wenn nicht eine zufällige Complication, z. B. eine Bronchopneumonie dem Leben schon vor der Zeit ein Ende macht, und die Sectionen ergeben dann eine einfache Hyperplasie der Milz, d. h. nur eine massenhafte Vermehrung ihrer zelligen Elemente und allenfalls des Bindegewebes. Der äusserst derbe resistente Tumor, dessen Kapsel bisweilen verdickt und mit den Nachbartheilen verwachsen ist, erscheint auf dem Durchschnitte blässerth. bräunlichgrau oder dunkelbläuerth. mit mehr oder weniger deutlich entwickelten Malpighischen Körperchen. In manchen Fällen findet man auch vielfache weissliche Einsprengungen, welche durch massenhafte Anhäufung lymphatischer Zellen gebildet werden.

Es fehlt indess keineswegs an Beispielen von völliger Rückbildung auch sehr umfangreicher Milzgeschwülste, an deren Heilung man bereits verzweifeln zu müssen glaubte. Von der Naturheilung allein haben Sie hier nichts zu erwarten, vielmehr bedarf es einer zweckmässigen, mit grosser Konsequenz viele Monate lang durchgeführten Behandlung. Mir selbst sind mehrere Fälle dieser Art, von welchen aber keiner mit wahrer Leukämie verbunden war, vorgekommen:

Marie K., 1 $\frac{1}{2}$ Jahr alt, am 14. Jan. 1847 in die Koenig'sche Poliklinik gebracht, mit hochgradiger Atrophie, wachstümlicher Farbe, colossalem Milztumor, Ödem der Gesicht, der Hände und Füsse. Behandlung mit Eisen, Selt- und Bismuthe. Am 30. Juli, also nach einem halben Jahr, wurde zuerst eine Verkleinerung der Milz constatirt, am 2. November Verkleinerung um die Hälfte; nach einem Jahr, am 12. Januar 1848, übertraf die Milz nur noch 2 Querfinger breit den Rippenrand, am 29. Mai war nichts mehr zu fühlen. Vollständige und dauernde Heilung!).

Nur in diesem Falle sollten nach Aussage der Mutter, die freilich sehr unbestimmt gehalten war, im Sommer 1846 überhäufte Anfälle mit Sch weiss stattgefunden haben. In den folgenden wurden diese entschieden in Abrede gestellt.

Adolf N., 1 $\frac{1}{2}$ Jahr alt, reichlich, am 8. Mai 1865 vorgestellt. Seit 4 Monaten zunehmender Milztumor, der den Raum zwischen Rippenrand, Spina ili und Nabel ausfüllt. Keine Leukämie, Warbfarbe. Behandlung mit China und Eisen. Schon am 19. Juni bedeutende Verkleinerung, Ende Juli völliges Schwinden des Tumors und blühendes Aussehen.

Georg H., 1 $\frac{1}{2}$ jährig, am 19. Mai 1878 in der Poliklinik vorgestellt, abgemagert, wachstümlich, Milztumor wie im zweiten Falle. Behandlung mit China und Eisen 5 Monate lang. Im November war nur noch ein kleiner Streifen unter dem Rippenrande fühlbar, Ende December war auch dieser verschwunden.

Elmso fand ich bei einem 10 Monate alten Kinde (Sept. 1881 vorgestellt) schon nach 2 Monaten den sehr grossen Tumor um die Hälfte verkleinert, die Hautfarbe bedeutend geteigert und alle Functionen in voller Ordnung, während bei einem

!) Koenig und Henock, Klinische Wahrnehmungen und Beobachtungen. S. 100.

11jährigen Kinde, welches im October 1881 mit einer grossen Milzgeschwulst in Behandlung kam, diese schon im Januar 1882 bis auf einen etwa $1\frac{1}{2}$ Querfinger unter dem Rippenrande vorspringenden Streifen geschrumpft war. Jetzt nur angedeutet wir links neben dem Nabel eine leicht bewegliche, in der Rückenlage mehr nach links und hinten stehende, musliche, unempfindliche anseits Geschwulst, welche von dem Milzstumpf durch eine breite, bei der Percussion normal schallende Zone getrennt war, sich sehr leicht ganz nach hinten und oben zurückziehen liess, und ohne Zweifel als eine bewegliche Niere bezeichnet werden musste. Bis jetzt ist mir nur dieser eine Fall von beweglicher Niere im Kindesalter vorgekommen, und ich lasse es dahin gestellt, ob die Milzveränder, vielleicht durch mechanische Zerrung, hier als Ursache einer Dislocation und Beweglichkeit der linken Niere gewirkt hat.

Jedenfalls sieht man aus diesen Fällen, dass man den Muth nicht verlieren darf und eine Verbindung von Chinin mit Eisen (F. 40) recht beharrlich, viele Monate und selbst Jahre lang nehmen lassen sollte. Eine zweckmässige Ernährung durch die Mutterbrust, späterhin durch gute Milch, Brule und Wein ist dabei unerlässlich, und laue Salzäder (1 bis 4 Pfund Salz auf ein Bad) sind als ein wirksames Unterstützungsmittel zu empfehlen. Den mitgetheilten glücklichen Fällen stehen allerdings andere gegenüber, in welchen diese Behandlung entweder ganz erfolglos blieb, oder höchstens das Allgemeinbefinden und Aussehen günstig beeinflusste, den Tumor aber unberührt liess. Da indess auch andere gerühmte Mittel (Bromkali, Jodeisen, Arsenik) hier gänzlich unwirksam blieben, so kann ich Ihnen die Behandlung mit Chinin und Eisen immer noch als diejenige empfehlen, welche wenigstens nach meiner Erfahrung die meisten Erfolge aufzuweisen hat. Ueber die Wirksamkeit des von Botkin u. A. bei Erkrankungen versuchten inducirten Stroms fehlen mir eigene Erfahrungen. Jedenfalls ist diese Methode unschädlich, während die von Meslor vorgeschlagenen parenchymatösen Einspritzungen von 2 pCt. Carboläurelösung und Solut. Foxlen (1 : 10 Wasser), zumal bei kleinen Kindern, Bedenken erregen müssen.

XVIII. Die Geschwülste der Bauchhöhle.

Abgesehen von den eben erörterten Anschwellungen der Leber und Milz, können ausnahmsweise, wie ein S. 507 mitgetheilter Fall ergibt, auch schwierige Verdickungen der Darmwände in Folge von chronischer Peritonitis Tumoren im Unterleibe darstellen. Häufiger, wenn auch immer noch selten genug, begegnen wir Geschwülsten, welche durch Neubildungen, besonders sarkomatöser Art, bedingt werden, und von verschiedenen Theilen der Bauchhöhle her ihren Ausgang nehmen können. Am seltensten geschieht dies wohl vom Peritoneum aus, wie ich es bei einem 11jährigen Knaben beobachtete. Hier fühlte man neben einem

inermes Aszites an verschiedenen Stellen des Unterleibs hockerige Stränge und Geschwülste, welche sich bei der Section als zahllose grosse und kleine Sarkome im Netz, Mesenterium, Mesocolon und in der Section des Darmkanals auswiesen. Häufiger entwickeln sich die Sarkome von dem Bindegewebe und den Drüsen her, die sich im Becken oder hinter dem Peritoneum vor der Wirbelsäule befinden, und wachsen dann zu kolossalen Tumoren heran, welche den analogen Neubildungen der Erwachsenen nichts nachgeben. Ein solches Beispiel dieser Art bietet der folgende Fall¹⁾:

Bei einem 5jährigen Knaben, welcher abgesehen vom Knochenbau immer gesund gewesen war, trafen die Volumszunahme des Unterleibs und ungewöhnliche Verblieslichkeit die ersten auffallenden Symptome. Später traten Ödem des Gesichts, der unteren Extremitäten und der Genitalien, Schmerz im Leibe, Narkose und Abmagerung hinzu. In der Regio hypogastrica fühlte man einen festen, beim Druck empfindlichen unelastischen Tumor, welcher schliesslich bis zum Nabel hinaufragte und sich mit seitlichen Ausläufern in beide Weichenregionen erstreckte. Am 29. Decbr. 1862, etwa 3 Monate nachdem man die Anschwellung zuerst bemerkt hatte, Tod an Erschöpfung.

Section. Aus der Tiefe des kleinen Beckens, in dem sie förmlich eingeklebt war, wachsende eine grau-weiße, stellenweise hyperämische, vielfach gelappte und zerklüftete harte Geschwulst hervor, welche mit dem rechten Darmstein, dem Netz und einigen Darmzirklingen leicht verwachsen war. Därme und Netz nach oben gedrängt hatte und die ganze Bauchhöhle unterhalb des Nabels ausfüllte. Aeusserlich nicht vorhanden, war ein grosser Eistüffel gelblichen Serums im Beckenraum. Die epigastrischen Drüsen, sowie diejenigen des Mesocolon und theilweise auch des Mesenterium waren ähnlich entartet und zum Theil central erweicht. Auch das linke Ende der rechten Niere zeigte dieselbe Degeneration, während in der Capsula der linken ein kirschenrother Knoten eingebettet war. Alle übrigen Organe normal. Die Geschwulst, in deren Centrum sich eine kirschenrothe, mit blasser Jauche gefüllte Höhle befand, erwies sich als ein Sarcoma medullare cysticum (bestand aus aus kernhaltigen kleinen Zellen und spärliches Bindegewebesiges) und schien von den retroperitonealen Lymphdrüsen ausgegangen zu sein.

Während in diesem Falle die Nieren erst secundär und in einer klinisch nicht erkennbaren Weise ergriffen waren, finden wir gerade bei Kindern die Nieren und Nebennieren verhältnissmässig oft als den Sitz einer Sarkombildung, welche zu enormen Tumoren der Bauchhöhle Veranlassung geben kann. Die Form ist gewöhnlich die des Medullar-, Myxo- und Cytosarkoms, in welche Kategorie auch die meisten der von den Autoren beschriebenen „Nierencarcinome“ hineinfallen. Der von Cohnheim²⁾ in zwei Fällen nachgewiesene Befund quergestreifter

¹⁾ Brütz, zur Kinderheilk. N. F. 8. 337.

²⁾ Eberth, Virchow's Arch. Bd. 55. S. 518. — Cohnheim, l. cit. Bd. 65.

Muskelfasern in diesen Sarkomen beweist, dass wenigstens ein Theil derselben schon congenital angelegt ist, und daraus erklärt sich auch das verhältnissmässig häufige Vorkommen derselben bei sehr jungen Kindern, die sich noch im ersten oder zweiten Lebensjahre befinden. Da die Neubildung nur höchst selten beide Nieren betrifft, vielmehr fast immer einseitig auftritt, so kann man diese Tumoren je nach ihrer Lage auf der rechten oder linken Seite leicht mit Anschwellungen der Leber oder Milz verwechseln, zumal wenn dieselben schon einen grossen Umfang erreicht, bis an die vordere Bauchfläche gelangt sind und den Darmkanal nach der anderen Seite hinübergelängt haben, wobei natürlich der Percussionsschall über dem Tumor matt und leer werden muss. Die Untersuchung des Urins, welche bei so kleinen Kindern ohnehin ihre Schwierigkeiten hat, giebt hier in der Regel gar keine Aufschlüsse, vielmehr bietet der Urin fast niemals eine auffallende Abnormität dar, weil die gesunde Niere noch normal functionirt, die kranke aber mehr oder weniger vollständig in der Neubildung untergegangen, und der Ureter mit in dieselbe hineingezogen ist, so dass von hier aus gar kein Urin mehr in die Blase gelangt. Nur in einzelnen Fällen war der Urin blutig¹⁾. Unter diesen Umständen sind der gewöhnlich sehr schnell wachsende Tumor, die allgemeine Anschwellung und Spannung des Abdomens, die Erweiterung der subcutanen Venen, die zunehmende Schwäche und Abmagerung der Kinder die für die Diagnose allein verwertbaren Symptome. Auf eine Beteiligung der Niere kann eben nur dann geschlossen werden, wenn man die Entwicklung der Geschwulst von Anfang an verfolgen, d. h. ihr allmähliges Emporwachsen aus der Tiefe eines der beiden Hypochondrien beobachten konnte. Ganz sicher wird aber auch dann die Diagnose nicht sein, weil auch andere, nicht von der Niere selbst, sondern von ihrer unmittelbaren Umgebung ausgehende Tumoren sich ganz ähnlich verhalten können, und bei der Unheilbarkeit aller dieser Geschwülste ist dieser diagnostische Zweifel auch in praktischer Hinsicht ohne Bedeutung. Der unglückliche Ausgang einiger kühn unternommenen Exstirpationen fördert wenigstens nicht zur Nachahmung auf.

Meine eigene Erfahrung beschränkt sich auf eine kleine Zahl von Fällen. Zwei derselben betrafen Kinder im ersten Lebensjahre, und in beiden handelte es sich um ein von der rechten Niere oder Nebenniere ausgegangenes Medullarsarkom, welches eine gänseei- bis orange-grosse

S. 64. — Landsberger, Elis. Wochenschr. 1877. S. 408. — Kother u. Langhaus, Jahrb. f. Kinderheilk. XIII. 1879. S. 152.

¹⁾ Paterson, Progrès médical. 1875. — Baginsky, Deutsche Wochenschr. 1876.

markige, von vielfachen Hämorrhagien durchsetzte Geschwulst in der rechten Seite des Abdomens bildete. In einem dritten Falle, der einen älteren Knaben betraf, hing das Sarkom zwar fest mit der linken Niere zusammen, schien aber von den retroperitonealen Drüsen seinen Ausgang genommen zu haben¹⁾.

Max K., 6jährig, am 19. April 1879 in die Klinik aufgenommen, früher gesund. Am 24. September 1878 Fall von einer Stange mit starker Quetschung des linken Beins. Dasselbe schwellte rasch an und wurde nach wiederholter Funktion am 12. October im städtischen Krankenhaus extirpirt. Entlassung am 28. Seit dieser Zeit oft Schmerzen in der linken Seite, hervorgerufen durch stoßartige Intermittenz. Am 12. März 1879 in der Poliklinik vorgestellt. Untersuchung ohne Resultat. Erst Ende März übte man in der linken Regio hypogastrica einen empfindlichen Tumor, der schnell zunahm und die Aufnahme in die Charité veranlaßte. Die Geschwulst erstreckte sich bereits 2 Ctm. über die Linea alba nach rechts, und war nach oben durch eine 3 Querfinger breite Furchung vom Rippenrande getrennt. Hautverien über derselben stark erweitert, Peritonäum matt, Ascites nicht zu constatiren. Die Geschwulst wuchs rapide, so daß sie schon nach 5 Tagen (am 24. Apr.) die Linea alba um 6 Ctm. überschritt. Punktion am 25. Mai. Die Nadel drang leicht etwa 8 Ctm. in ein weiches Gewebe, und bei der Aspiration wurde nur eine kleine Menge reinen Eiters entleert. Allgemeinzustand leidlich, Urin normal, fortwährende Abmagerung. Tumor ragte an Umfang vornehmlich, bald den größten Theil der Bauchhöhle ausfüllend. Kräfteverfall trotz reichlichen Appetits. Anfangs Mai Fieber (Ab. etwa 38°), selten höher. Schließlich Dyspnoe, Cyanose, Ödem der unteren Extremitäten, starke Diarrhoe. Tod am 27. Mai.

Section. Das peritoneale Blatt des Peritonäum in grosser Ausdehnung mit einem kirschkopfgrössen Tumor verklebt, welcher unmittelbar auf der Vena cava und Aorta aufliegt und nur schwer mobilisirt ist. Die linke Niere sitzt dem oberen und hinteren Theile des Tumors auf, ohne jedoch in denselben überzugehen ihr Parenchym, sowie das der rechten Niere, durchaus normal. Die Geschwulst wog 3000 Grm., zeigte auf dem Durchschnitt eine theils markige, theils faserige und gallertige Beschaffenheit, und im Centrum eine faserige, glasige Gallertmasse. Die nähere Untersuchung ergab ein Myosarkom. Die retroperitonealen Drüsen bis zu der Gervasis herab stark vergrößert. In Ketten zahlreiche bis thalergrosse diploclitisch belegte Uterindrüsen. Beide Ureters fingerförmig erweitert, mit bläuer Flüssigkeit gefüllt (Resultat der Compression). In den übrigen Organen keine wesentliche Abnormität.

Weitere Nachforschungen ergaben, dass die am 12. October extirpirt Hohlgeschwulst ein Spindelzellensarkom gewesen, welches hier also aus einer traumatischen Ursache hervorgegangen und secundär den Drüsentumor zur Folge gehabt hatte. Klinisch interessant ist besonders das rapide Wachsthum des Tumors. Am 12. März konnte ich noch keine Spur desselben bei der Palpation entdecken, und schon nach etwa 6 Wochen füllte er den größten Theil der Bauchhöhle aus.

¹⁾ Jurebasch, Charité-Analen. V. 1878. S. 481.

Gerade dieser Umstand erweckte den Verdacht, dass es sich um eine kolossale Eiteransammlung handeln könnte, welcher jedoch durch das Resultat der Probeponction alsbald widerlegt wurde. Ganz ähnlich verhielt sich ein vierter Fall (8jähriges Mädchen), bei welchem der Tumor fast die ganze Bauchhöhle ausfüllte, und bei der ersten Untersuchung wieder von der Niere, von welcher nur etwa ein Dritteltheil aus der Sarkommasse heraustragte, ausgehen schien. Eine nähere Prüfung ergab indes, dass die rechte Niere selbst nur comprimirt und theilweise atrophisch, aber von der Geschwulstmasse, welche wahrscheinlich von den retroperitonealen Drüsen ausging, dicht unlagert war¹⁾.

Siebenter Abschnitt.

Krankheiten der uropoëtischen Organe.

I. Die entzündlichen Affectionen der Nieren.

Diejenige krankhafte Veränderung der Nieren, welche man bei den Sectionen von Kindern am häufigsten antrifft, ist der unter dem Namen der „trüben Schwellung“ bekannte Zustand, d. h. eine mässige Volumszunahme der Nieren, welche auf dem Durchschnitt eine mehr oder weniger verbreiterte, ins Graue spielende Corticalsubstanz zeigt. Diesen durch eine Quellung und körnige Trübung der corticalen Epithelien bedingten Zustand, welcher schliesslich zu einer fettigen Degeneration derselben führen kann, beobachteten wir sehr häufig bei Kindern, die an den verschiedensten Krankheiten gestorben waren, ohne irgend ein Zeichen von Nierenkrankung dargeboten zu haben. Wenn ich auch zugeben muss, dass der Urin in vielen dieser Fälle nicht auf Etwas untersucht worden war, so war dies doch in einem Theil derselben, und zwar ohne positiven Erfolg, geschehen. Besonders häufig zeigte sich die trübe Schwellung bei kleinen atrophischen Kindern, demnächst bei solchen, die an erschöpfenden und mit reichlichen Wasserverlusten eingelegelten Krankheiten, wie Cholera, chronischer Darmerkrankung, Enterophthis, Dysenterie, allgemeine Tuberkulose u. s. w. gestorben waren, woraus hervorgeht, dass es sich hier um eine bis zur Fettdegeneration

¹⁾ Dieser Fall ist in der Dissertation eines meine Schüler, Dr. ARNDT, „Ueber einen Fall von primärem retroperitonealem Sarcom“, Berlin 1882, ausführlich beschrieben. — Vergl. NISHIMOTO, Ueber das primäre Nierensarcom. Deutsch. Arch. f. Klin. Med. 1882. Hft. 3 u. 4.

fortschreitende Ernährungsstörung der Epithelien handelte. Dass die letztere aber auch auf andere Weise, z. B. in Folge hoher Fiebertemperatur zu Stande kommen kann, beweist das nicht seltene Vorkommen der „trüben Schwellung“ bei Kindern, welche an schweren acuten Krankheiten, Pneumonie, Typhus, Scharlach, Recurrens gestorben sind, unter welchen Verhältnissen ja auch andere Zellen, zumal die der Leber und die Muskelfasern des Herzens, sehr häufig dem gleichen Schicksal verfallen. Einer Diagnose sind indess diese elementaren Veränderungen nicht zugänglich, wenn ihnen auch ein ungünstiger Einfluss auf den Verlauf der Grundkrankheiten zukommen mag.

Der Uebergang der „trüben Schwellung“ zu jenem höheren Grade, welchen man mit dem Namen der acuten parenchymatösen Nephritis zu bezeichnen pflegt, ist ein unmerklicher. Die körnig und fettig entarteten Epithelien der gewundenen Harnkanälchen verfallen zum Theil in einen fettigen Detritus, welcher, vermischt mit abgestorbenen noch erhaltenen Epithelien, mit weissen und rothen Blutkörperchen und cylindrischen hyalinen Gebilden das Lumen der Kanälchen füllt. Die einfache Ernährungsstörung steigert sich also hier zu einer entzündlichen Form, welche sich noch durch Anlagerungen rundlicher lymphatischer Zellen in dem interstitiellen Bindegewebe und um die Glomeruli herum, so wie durch Kernwucherung in dem letzteren (Glomerul-Nephritis nach Klebs) kennzeichnet. Wir werden alsbald eine Reihe von Reizen kennen lernen, unter deren Einfluss diese exsudativen Vorgänge und die mit ihnen verbundenen Degenerationen der Epithelien zu Stande kommen. Makroskopisch geben sich dieselben durch eine mehr oder weniger pralle, mitunter walzenförmige Schwellung der Nieren, durch leichte Ablösbarkeit ihrer Kapsel und deutlicheres Hervortreten der Venenarterie auf der blässeren Oberfläche zu erkennen; auf dem Durchschnitt contrastirt die stark verbreiterte, oft über dem Niveau etwas vorquellende, gelblich graue Rindenschicht mit der hyperämischen dunkelrothen Marksubstanz, von welcher nur die Papillenspitzen oft blass erscheinen. Seltener zeigt auch ein Theil der Cortisubstanz lebhafte Injection und kleine oder grössere Hämorrhagien, welche dann im Verein mit der injicirten Oberfläche das anatomische Bild etwas modificiren. In diesen Fällen von hämorrhagischer Nephritis können die enorm geschwellenen Nieren derartig mit Blutextravasaten durchsetzt sein, dass sie breiartig weich erscheinen. Die Uebereinstimmung der anatomischen Verhältnisse der acuten diffusen Nephritis bei Kindern und Erwachsenen ist übrigens eine vollständige, und ich glaube daher um so eher über diese Dinge hinweggehen zu können, als ich mich nicht für berufen erachte, in die auch nicht ge-

schlichteten Streitigkeiten über die feineren Veränderungen des Nierengewebes, zumal des interstitiellen und der Glomeruli, einzugehen¹⁾.

Um so mehr interessiert uns das klinische Bild der Krankheit, weil sich dasselbe gerade im Kindesalter überaus häufig, und zwar im Gefolge des Scharlachfiebers darbietet.

Man kann dreist behaupten, dass mit Ausnahme einer verschwindenden Minorität alle Fälle von diffuser Nephritis bei Kindern scarlatinöser Natur sind. Mit dieser Form werden wir uns daher zunächst beschäftigen, denn fast alles, was für diese gilt, behält auch für die nicht scarlatinösen Fälle seine Gültigkeit. Die Zahl meiner Beobachtungen, welche sich viele Hunderte beläuft, wird mich, wie ich glaube, in den Stand setzen, Ihnen diese Krankheit möglichst vollständig zu schildern.

Die nephritischen Processus bilden, wenigstens vom klinischen Standpunkte aus betrachtet, in den meisten Fällen eine Nachkrankheit der Scarlatina, welche sich in der Regel gegen den 12. bis 14. Tag, häufig erst im Anfange der 3. Woche nach dem Ausbruche des Exanthems einstellt²⁾. Worauf die Häufigkeit dieser Nachkrankheit beruht, wissen wir nicht. Die Ansicht, welche Viele auch heute noch verfechten, dass sie die Folge einer „Erkältung“, einer „unterdrückten Hautperspiration“ sei, theile ich keineswegs, denn fast alle meine Fälle entstanden trotz der sorgfältigsten Pflege, und nur wenige Kinder hatten schon einige Tage zuvor das Bett verlassen. Viel wahrscheinlicher ist, dass der unbekannte Infectiösesstoff des Scharlachfiebers diesen spezifischen Keim auf die Nieren ausübt, den wir aber noch nicht ohne weiteres als einen „bakteriellen“ anzusprechen berechtigt sind.

Der leichteste Grad der Krankheit erscheint in der Form einer rasch vorübergehenden Albuminurie. Untersucht man um die erwähnte Zeit und während der ganzen dritten Woche täglich den Urin, auch wenn kein besonderes Symptom dazu auffodert, so findet man

¹⁾ Klein, *Microtomy of scarlatina*. Lancet 1877. I. 571. Friedländer (Arch. f. Physiologie. Jahrg. 1881) hält bei der Nephritis scarlatinosa, ähnlich wie Klebs, die Veränderung der Glomeruli für die Hauptsache (Vollstehnahme und Verengung der Kerne an den Schlingen, Verdickung und Trübung der Capillarende mit Verlegung des Lumens der Schlingen). — Vergl. auch Litten, Beitr. zur Kenntniss von Scharlach. Charité-Annalen. VII. 1882. S. 107. und Cohnheim, Vorlesungen über allgem. Pathologie. II. S. 325, 329.

²⁾ Bei sorgfältiger Untersuchung findet man oft schon im Blüthenstadium des Scharlachs etwas Erythra und spärliche hyaline Cylinder im Urin, auch wohl letztere allein, worauf ich bei der Betrachtung der Scarlatina zurückkommen werde. Nur ausnahmsweise sah ich schon in der ersten Woche der Krankheit Nephritis auftreten, wozu auch Litten (l. c. 353) ein paar Beispiele anführt.

nicht selten erwartet eine kleinere oder grössere Menge von Eiweiss in demselben, welche schon am Nachmittag desselben Tages oder am anderen Morgen für immer verschwunden sein kann, zuweilen aber sich ebenso vorübergehend wiederinstellt, ohne dass das Allgemeinbefinden dabei irgendwie gestört ist. Man kann daher fragen, ob es sich hier wirklich um eine, wenn auch nur ganz leichte Nephritis, oder nur um eine Albuminurie handelt, die von anderen, das Durchtreten von Blutsarum fördernden Einflüssen abhängt. Jedenfalls ist eine weitere Entwicklung der Krankheit aus so unbedeutenden Anfängen keineswegs selten — und da andererseits, wie wir bald sehen werden, in der Leiche Nephritis gefunden werden kann, ohne dass während des Lebens Eiweiss im Urin vorhanden war, so rathe ich ihnen, auch die Fälle von schnell vorübergehender Albuminurie immer ernst zu nehmen, die Kinder im Bette zu halten, eine milde Diät anzudeuten und die Urinsecretion durch diuretische Mineralwässer (Biliner, Wülflinger Wasser) zu fördern.

Dies wird um so mehr nöthwendig sein, wenn die Albuminurie nicht nur vorübergehend auftritt, sondern permanent wird. Es können mehrere Wochen vergehen, ohne dass eine andere krankhafte Erscheinung, als höchstens eine zunehmende Blässe des Hautcolorits sich geltend macht. Der Urin ist während dieser Zeit fast sparsam, fast reichlicher, enthält öfters viel harnsaure Salze, aber fast immer Albumen, sparsame hyaline Cylinder, Lymphekörperchen und abgelassene Epithelien, welche man bisweilen nur bei genauer und wiederholter Untersuchung findet. Ich sah z. B. in einem solchen Falle die Albuminurie vom 5. Februar bis zum 10. März, also über einen Monat dauern, wobei das Kind sich, abgesehen von einer dyspeptischen Diarrhoe, ganz wohl befand, insbesondere keine Spur von Oedem darbot. Ein 4 Wochen lang fortgesetzte Ruhe im Bette, Liqueur Kali acet., laus Bäder, schliesslich Eisen bewirkten hier, wie in anderen ähnlichen Fällen völlige Heilung. Diese angetrübte Euphorie der Kinder kann sogar 8 bis 14 Tage lang bestehen, obwohl die Menge des Albumens so bedeutend ist, dass fast die Hälfte des Urins im Reagensglase beim Kochen coagulirt. Ja selbst bei sparsamem und stark mit Blut vermischem Urin sah ich den Appetit und die gute Laune soebenlang ungestört bleiben, und es ergibt sich daraus die Regel für den Arzt, in jedem Falle von Scharlach vom Ende der zweiten Woche an täglich den Urin auf Albumen zu untersuchen.

Weit häufiger geben endlich gewisse Krankheitserscheinungen zu dieser Untersuchung Anlass. Die Kinder fühlen sich unbehaglich, werden verlässlich, blass, verlieren den Appetit, klagen über Kopfschmerzen,

Der Urin wird auffallend sparsam und trübe, lagert auch oft ein gelbröthliches Sediment ab, welches sich beim Kochen auflöst und dadurch seinen Bestand aus harnsauren Salzen bekundet. Diese Beschaffenheit des Urins sah ich nicht selten einige Tage lang der Albuminurie vorausgehen. Mitunter eröffnete auch eine tödlige Anurie, welche 24 Stunden dauerte, die Scene, oder es wurden in dieser Zeit nur einige Esslöffel eines trüben Urins entleert. Gleichzeitig mit dieser sparsamen Harnausscheidung, oder auch noch vor dem Eintritt desselben, kann ein partielles Oedem die Aufmerksamkeit der Eltern erregen, doch ist dies keineswegs nöthwendig, vielmehr kann, worauf ich Sie besonders aufmerksam mache, das Oedem während des ganzen Verlaufs der Krankheit fehlen. In den meisten Fällen macht sich indess früher oder später, also nicht immer von vorn herein, ein Oedem bemerkbar, welches an Intensität und Ausdehnung sehr verschieden sein kann. Bei vielen werden nur die Augenlider, allenfalls noch die Fussrücken und Knöchel in geringem Grade oedematös, und zwar mit wechselnder Intensität (von einem Tage zum andern); bei vielen nehmen aber auch andere Stellen der Haut, besonders das Scrotum und der Penis, welcher dabei eine gewundene Form bekommt, Theil, oder es wird der grösste Theil der Haut von allgemeinem Anasarca befallen, wobei die gedunsenen Augenlider kaum geöffnet werden, und die stark geschwellenen Oberschenkel da, wo sie sich gegenseitig und mit dem blasig aufgetriebenen Scrotum berühren, von einer erythematösen Rötze (Intertrigo) überzogen werden können. Ich sah bei solchen Kindern bisweilen die aufs äusserste gespannte Epidermis der unteren Extremitäten vielfach platzen, und aus den Rissen derselben, besonders an den Beugeseiten, Serum tropfenweise hervorquellen, so dass schliesslich die ganze Oberhaut macerirt wurde, sich abliess und ausgeleimte Excoriationen blosslegte. Unter diesen Umständen, welche immer als sehr ungünstige zu betrachten sind, nehmen die Haut, zumal das Gesicht, und die sichtbaren Schleimhäute eine anämische wachsbleiche Farbe an. Häufig ist die eine Hälfte des Gesichts oder des Körpers stärker als die andere geschwellen, was sich aus der Verleibung des Kindes, auf jener Seite zu liegen, erklärt. Bei starker Spannung wird die Haut auch empfindlich, und jeder Druck auf dieselbe ruft dann Schmerzäusserungen hervor.

Mag nun das Oedem nur äusserst gering und beschränkt, oder weit verbreitet sein, oder auch ganz fehlen, die Beschaffenheit des Urins, welche uns von dem Zustande der Nieren Kunde bringt, bleibt davon unberührt. Die Menge desselben ist fast immer sparsam, nicht selten bis auf 100 Ccm., oder gar nur auf wenige Esslöffel in 24 Stunden ge-

sunken, während an anderen Tagen eine grössere Quantität gelassen wird, die aber nur ausnahmsweise das Normalmaass erreicht. Schmerzen beim Urinlassen konnte ich nie, ungewöhnlich häufigen Drang dagegen, wobei immer nur kleine Mengen von Urin entleert wurden, öfters beobachten. Derselbe reagirte stets sauer; sein spezifisches Gewicht schwankte zwischen 1006 bis 1024, betrug im Durchschnitt 1010 — 1012. Die meistens trübe, röthlich gelbe, fleischwasserartige Farbe wechselte in demselben Falle sehr häufig, ist bald heller, bald dunkler, und wandelt sich so in eine kirsch- oder grauröthe, braune oder schwärzliche um, welcher auch das auf dem Boden des Uringlases sich ablagernde Sediment entspricht. Diese mehr oder weniger ins Rother und Braune spielenden Färbungen werden durch eine stärkere Beimischung von Blut bedingt, und man pflegt dann wohl von einer Nephritis hämorrhagica zu sprechen. In der That ergiebt das Mikroskop hier einen viel bedeutenderen Gehalt des Urins an rothen Blutkörperchen, wie in der gewöhnlichen Form der Nephritis; aber gerade im dunkelsten, schwärzlich braunen Urin erscheinen dieselben ganz ausgeblut, wie kleine blasser Ringe, oder sie sind in seltenen Fällen grösstentheils zerstört, und der Urin enthält statt derselben fast nur das frei gewandene und dunkler gefärbte Hamatin (Hämoglobinurie). Ausser diesen Befunden enthält der nephritische Urin immer eine grössere oder geringere Menge weisser Blutkörperchen (Lymphzellen), abgestossene Nierenepithelien und längere oder kürzere hyaline, mit weissen und rothen Blutkörperchen oder mit Epithelien besetzte Cylinder. Ich brauche kaum hinzuzufügen, dass alle diese morphologischen Elemente deutlich nur im Sediment zu sehen sind, dass es daher nöthig ist, den Urin gut zu filtriren und den auf dem Filtrum gebliebenen Rückstand zu untersuchen. Nebenher findet man auch sehr häufig karnsaure Krystalle und bei längerer Dauer der Krankheit verfettete Epithelien, freies Fett und körnigen Detritus, welche den Cylindern oder ihren Trümmern anhaften und von der fortschreitenden Degeneration der Nierenepithelien Kunde bringen. Der Gehalt an Eiweiss schwankt, wie schon erwähnt wurde, ebenso wie die Färbung des Urins und die Menge der gelösten Elemente. An manchen Tagen gering, kann sie an anderen fast den ganzen im Reagensglase enthaltenen Urin beim Kochen zur Gerinnung bringen. Zuweilen fand ich den Abendurin trübe und beäunlich roth, stark eiweiss- und bluthaltig, während der Morgenurin blassgelb und fast klar erschien; bei einem 9jährigen Mädchen war derselbe am Morgen nach der starken Wirkung eines Abführmittels stets eiweissfrei, während er Nachmittags wieder deutlich Albumen zeigte.

In einer Reihe von Fällen beschränkt sich das ganze Kranksein auf die bisher erwähnten Symptome, d. h. auf das Oedem und die Veränderungen des Urins, oder auch nur auf die letzteren. Das Allgemeinbefinden wird dabei kaum gestört, und bei einer gehörigen Pflege und Behandlung nehmen die krankhaften Erscheinungen allmählig ab, um nach Ablauf von 2—3 Wochen gänzlich zu verschwinden. Dabei muss man aber immer auf Nachschübe gefasst sein, welche den Urin plötzlich wieder Blut- oder eitrighaltig machen und auch das schon verschwundene Oedem von neuem hervorrufen können, wenn auch meistens nur auf einige Tage und ohne andere schlimme Folgen, als dass die Krankheit um eine oder mehrere Wochen verlagert wird und die Kinder in der Reconalescenz noch mässiger aussehen. Dennoch rathe ich Ihnen, auch bei so mildem Verlauf stets auf der Hut zu sein, und die Prognose in keinem Falle absolut günstig zu stellen, weil ganz unerwartet inmitten einer scheinbaren Euphorie bedenkliche Symptome, zumeist Urämie, auf welche ich bald näher eingehen werde, auftreten können. Auch lehrt mich die Erfahrung, alle Fälle von Nephritis, die von vorn herein mit ausgedehntem und rapide zunehmendem Anasarca auftreten, mit Misstrauen zu betrachten, besonders wenn die Urinsecretion dabei sehr sparsam ist. Selbst in Fällen, wo nur wenige Esslöffel Urin entleert werden oder sogar eine vollständige Anurie tagelang fort dauert, kann das gute Allgemeinbefinden den Unerfahrenen über den Ernst der Lage täuschen. In der Literatur fehlt es nicht an Beispielen dieser Art, und ich selbst beobachtete mehrere Fälle, unter denen der folgende besonders merkwürdig ist:

Carl T., 9 Jahre alt. Zwei Wochen nach dem Ausbruch des Scharlach plötzlich Anurie. Später wurde gar kein Urin entleert, mit dem Katheter einiges Tropfen, nur mässig von Hämorrhoiden voll, welches beim Kochen völlig coagulirt. Die Anurie dauerte volle 7 Tage, ohne eine Spur von Oedem; mit 80—96 F. Eine in den ersten Tagen bemerkbare Seigurg zum Schlammern schwand bald unter dem Gebrauch von Fargasterien, aber weder diese, noch Harnflossungen und andere Mittel vermochten die Urinsecretion in Gang zu bringen. Die Euphorie war fast vollständig, bis am 7. Tage plötzlich urämische Anfälle und der Tod eintraten.

Aber nicht allein die Möglichkeit der Urämie ist hier ins Auge zu fassen, sondern in jedem anscheinend noch so leichten Falle müssen Sie darauf gefasst sein, den Hydrops, welcher, wenn er überhaupt vorhanden ist, gewöhnlich als Anasarca auftritt, auch in den Höhlen des Körpers sich entwickeln zu sehen. Am häufigsten beobachtet man dann Ascites mit grösserer oder geringerer Anschwellung des Abdomens und den charakteristischen Erscheinungen bei der Percussion, während seröse Ansammlungen im Pleuraraum oder im Pericardium seltener, und

meistens erst in der letzten Periode tödtlich endenden Fälle auftreten. Ist Ascites allein vorhanden, so kann, wie ich öfters beobachtete, das Allgemeinbefinden noch ziemlich gut bleiben, höchstens durch die Beschränkung des Thoraxraums dyspnoetische Athmung entstehen:

August B., 31 $\frac{1}{2}$ Jahr alt (October 1874). Oedeme des Gesichts und der Füße. Harn spärlich, sehr trübe, albuminös und etwas hämorrhagisch. Mässiger Anstoss und starker Meteorismus mit Hochstand des Zwerchfells. Dyspnoe, 60 bis 70 B. in der Minute. Kein Fieber, Respirations- und Circulationsorgane durchaus normal. Unter Behandlung mit Purgantien und Kali acet. vollständige Heilung nach 3 Wochen.

Viel früher wird sofort die Prognose, wenn zum Ascites sich noch Hydrothorax hinzugesellt. Es kommt dann zu einer sich mehr und mehr steigenden Dyspnoe, welche bisweilen in Form asthmatischer Anfälle auftritt und die Kinder zwingt, Tag und Nacht in einer vornübergebeugten Stellung im Bett oder auf einem Stuhl zu sitzen; nur höchst selten sah ich Oedem und Hydrothorax ohne Ascites auftreten, wie z. B. in folgendem Falle, welcher auch geeignet ist, den Muth für die Behandlung anscheinend verzweifelter Fälle zu beleben:

Marie Sch., 10jährig, kam im Mai 1877 mit Septämie south. in meine Behandlung. Erbin sehr spärlich, enthält nur wenig, enthält gar kein Etwas, kein Blut. Starkes Oedem des Gesichts, der Füße, des Rückens und der Lendengegend, aber keine Spur von Anstoss. Blasse Aussehen, übriges Wohlbefinden. Von der Mitte der zweiten Woche an dyspnoetische rasche Respiration, 30–40 in der Minute. Bei der Untersuchung zeigt sich hinten beiderseits bis zur Spitze der Scapula hinaufreichend Dämpfung des Schalls und schwaches Atmen, welche sich im Laufe der 3. Woche aufwärts bis zur Mitte des Schallfeldes erstrecken. Dabei treten mehrmals täglich heftige asthmatische Anfälle mit cyanotischer Verfärbung, Kälte der Extremitäten und der Nacktpartie von, welche mehrere Stunden dauern. Kein Fieber. Durch eine consequente Behandlung zuerst mit Abführmitteln, dann mit einem Inf. lob. digital. und Kali acet., sehr schneller Applikation von trockenen Schöpfkugeln und Senfteigen, völlige Heilung binnen 4 Wochen.

Am schnellsten wird der Tod durch die plötzliche Entwicklung von Lungenodem, seltener von Oedem des Pharynx, der Ligam. aryepiglottica und ihrer Umgebung (*Oedema glottidis*) herbeigeführt. Orthopnoe und Cyanose, im ersten Falle von weit verbreiteten knisternden Rasselgeräuschen, im zweiten von einem stertorischen In- und Expirationsgeräusch begleitet, charakterisiren diesen Ausgang, welcher nicht nur in Fällen mit sehr ausgebreitetem Hydrops der Haut und der Höhlen vorkommen kann, sondern auch in solchen, welche ganz ohne Wassersucht oder mit nur sehr geringen Oedemen verlaufen.

Zu den häufigsten Symptomen der scarlatinösen Nephritis gehört auch ein mehr oder minder oft wiederkehrendes Erbrechen der ge-

nassen Nahrungsmittel, zähen Schleims oder wässriger Flüssigkeit. Das Erbrechen hatte meiner Erfahrung nach keineswegs immer die schlimme „urämische“ Bedeutung, welche Viele ihm zuschreiben, zeigte sich vielmehr oft genug entweder gleich im Beginn oder auch im weiteren Verlaufe der Krankheit, ohne dass diese einen ungünstigen Charakter annahm, und konnte dann nur als eine Reflexerscheinung aufgefasst werden, wie sie auch bei anderen Nierenkrankheiten, z. B. bei Lithiasis renalis, nicht selten vorkommt. Unter diesen Umständen fehlten auch alle Erscheinungen, welche dem „urämischen“ Erbrechen seine drohende Bedeutung geben, besonders Kopfschmerz und Schlämmerucht. Der Stuhlgang war in den meisten Fällen verstopft; weit seltener fanden mehr oder minder reichliche Diarrhöen, bisweilen auch häufig wiederkehrende Kolikschmerzen statt. Ob diese dünnen Ausleerungen, welche sich ein paar Mal durch einen äusserst fauligen Geruch auszeichneten, nur eine zufällige Complication bildeten, oder durch eine Ausscheidung von Harnbestandtheilen seitens der Darmschleimhaut (Treitz) bedingt waren, bleibt dahingestellt. Immerhin übete ich noch mit Rücksicht auf diese Möglichkeit, die Diarrhoe durch stopfende Mittel schnell zu sistiren. Bei einem 8jährigen Knaben mit Ascites und leichtem Pleuraerguss beobachtete ich, ohne dass Diarrhoe bestand, einen fast anhaltenden Tenesmus, gegen welchen nach fruchtloser Anwendung von Ricinusöl kleine subcutane Morpholinjectionen und der Gebrauch von Extr. opi (0.005 3 Mal täglich) sich wirksam erwiesen. Die Erfahrung, dass im Gefolge der Nephritis bisweilen diphtheritische Entzündungen der Darmschleimhaut gefunden werden, welche sich im Leben nicht oder weniger latent verhalten (S. 469), mahnt in diesen Fällen zur Vorsicht in der Prognose.

Ueber die Verhältnisse des Fiebers bei der Nephritis scarlatinosa sind die Ansichten der Autoren getheilt. Dass die Krankheit, wenn nicht eine Complication besteht, immer fieberlos verlaufe, ist eine falsche Annahme. Ich gebe allerdings zu, dass in einer Reihe von zum Theil recht ernsten Fällen, mag nun der Urin hämorrhagisch sein oder nicht, das Fieber vollständig fehle, und die Temperatur sogar dauernd etwas subnormal (37.0, 38.8) sein kann, dass ferner bei Anderen ein mehr oder minder heftiges Fieber von gleichzeitig vorhandenen anderen Nachkrankheiten des Scharlach, insbesondere von Otitis, nekrotisirender Pharyngitis, Phlegmonen des Halsbindegewebes oder Synovitis abhängen kann. Es fehlt mir aber nicht an Fällen, welche beweisen, dass die Nephritis allein im Stande ist, einen fieberhaften Zustand von verschiedener Höhe und Dauer anzufachen. Während bisweilen

auf ein initiales Fieber von 38—39° bestand, welches schon nach wenigen Tagen für immer verschwand, sah ich in anderen Fällen eine Abendtemperatur von 38,5—39,0 zwei bis drei Wochen lang bei nahezu normaler Morgentemperatur fortauern, oder bei einem im Allgemeinen fieberlosen Verlaufe ganz unerwartete, aber nur ephemere Temperatursprünge auf 39,0, selbst 40,0 und darüber auftreten, mit denen bisweilen Erbrechen und eine Zunahme des Eiweisses oder Blutes im Urin Hand in Hand ging. In allen diesen Fällen bestand, was ich nochmals hervorhebe, die Nephritis ganz für sich allein, da trotz einer wiederholten sorgfältigen Untersuchung keine Complication nachzuweisen war.

Nun ist es aber gerade eine beachtenswerthe Eigenthümlichkeit der Nephritis, entzündliche Complicationen in verschiedenen Organen hervorzurufen, welche ihrerseits Fieber erzeugen oder dasselbe, wo es schon vorhanden ist, steigern müssen. Diese Complicationen, welche in jedem Falle eintreten können, mag er nun von vorn herein mit einem rasch zunehmenden Hydrops oder anscheinend leicht auftreten, betreffen am häufigsten die Respirationsorgane. Pneumonie, Bronchitis, Pleuritis, selbst doppelseitige, traten in vielen Fällen auf, und wurden wiederholt die Ursachen des lethalen Ausganges, während leichtere Bronchialkatarrhe, die zu den gewöhnlichsten Begleitern der Nephritis gehörten, deren Verlauf in keiner Weise ungünstig beeinflussten. Bei einem 4jährigen Knaben mit ausgedehnter Hepatisation der rechten Lunge nahm der bis dahin noch gelbe trübe Urin unter dem Einfluss der Lungenverdichtung eine exquisit hämorrhagische Färbung an. Bei einem anderen Kinde, welches nach dem Scharlach Synovitis und darauf Nephritis bekam, entwickelte sich zuerst eine Pneumonie des rechten Unterlappens, und in Folge derselben ein die ganze rechte Brusthälfte füllendes pleuritisches Exsudat (Pneumopleuritis), welches eiterig wurde und in der 6. Woche durch die Radicaloperation glücklich geheilt wurde. Auch Pericarditis und Endocarditis können sich im Verlaufe der Nierenaffection einstellen, und die letztere zumal in so latenter Weise, dass ohne die Untersuchung des Herzens ihre Existenz ganz verborgen bleiben würde (S. 417).

Bei dieser Gelegenheit mache ich Sie darauf aufmerksam, dass im Verlaufe der scarlatinösen Nephritis der Puls nicht selten verlangsamt und selbst unregelmässig wird, ohne dass man einen bestimmten Grund dafür nachweisen kann. Bei einem 12jährigen Mädchen ging der Puls sogar auf 48 Schl. in der Minute herunter und wurde dabei sehr unregelmässig, ohne dass am Herzen eine Anomalie bemerkbar oder das

Allgemeinbefinden wesentlich gestört war. Erst nach einigen Tagen hob sich der Puls wieder auf 60, bald auf 96, wurde regelmässig, und nach einer Woche war auch die Nephritis vollständig geheilt. Ähnliche Vorlaufsmanöver auf 80, 64, mit oder ohne Unregelmässigkeit, kamen mir wiederholt vor, aber nur in einem Fall ergab die Untersuchung dabei eine Abnormität der Herztöne.

Knabe von 10 Jahren, am 18. November 1874 mit Schudach in die Klinik aufgenommen. Nach 14 Tagen Nephritis. Puls fast immer zwischen 112—124 schwankend, sank plötzlich auf 88, wurde unregelmässig, in der Minute wohl 10—15 mal intermittierend, während gleichzeitig an der Herzspitze ein lautes systolisches Rausen, welches den ersten Herzton nicht völlig verdeckte, gehört wurde. Schon am folgenden Tage war das letztere spurlos verschwunden, Puls wieder 96—100, vollkommen regelmässig. Vollständige Heilung.

Wie soll man nun diese Erscheinung erklären? Ich bekenne offen, dass mir gerade der letzterwähnte Fall wegen seiner ephemeren Dauer durchaus räthselhaft blieb. Keinesfalls kann es sich hier um eine materielle Erkrankung einer Klappe gehandelt haben; ebenso wenig liess sich eine anatomische oder urämische Grundlage nachweisen. Ich hebe das letztere besonders hervor, weil ich in einigen Fällen, welche mit mehr oder minder ausgesprochenen Zeichen der Urämie einhergingen, ähnliche oder sogar collapsartige Störungen der Herzthätigkeit ohne nachweisbare Structurveränderung beobachtet habe. So wurde bei einem 8jährigen Mädchen mit hämorrhagischer Nephritis der bis dahin ganz normale Puls auffallend langsam (72—68) und unregelmässig, als sich Kopfschmerzen, Uebelkeit, Erbrechen und Schlämmersucht einstellten, mit deren Verschwinden auch der Puls wieder zum Normalzustande zurückkehrte. Bei einem anderen Kinde stellte sich nach einem urämischem Anfall, welcher eine ganze Nacht hindurch dauerte, hochgradige Herzschwäche ein; kleiner, schneller, dabei unregelmässiger Puls und Herzschlag, kühle Extremitäten, frequente oberflächliche Athmung (60—70 in der Minute), während die locale Untersuchung nur einen gespaltenen ersten Herzton (Galopphythmus) ergab, welcher sich noch in der Convalescenz lange erhielt. Ganz ähnliche Symptome mit fast aufhällbarem Pulse, Cyanose und äusserster Kraftlosigkeit machten sich bei einem 7jährigen Mädchen mit hämorrhagischer Nephritis scarlatinaea geltend, welches am Tage zuvor einen mehrere Stunden dauernden urämischen Anfall überstanden hatte. Unmittelbar nach demselben war die exakte Kleinheit des Pulses aufgefallen, welche mich lebhaft an die Collapszustände in Folge von Diphtherie erinnerte. Bei der Neigung der nephritischen Kinder zu serösen Ausschwitzungen ist diese Herzschwäche besonders zu fürchten, weil die durch die letztere veranlasste Stauung im

kleinen Kreislauf dann, um so leichter ein Oedema pulmonum herbeiführen kann, an welchem das zuletzt erwähnte Kind in der That zu Grunde ging. Bei einem 9jährigen Knaben endlich bestand eine anhaltende Verlangsamung (68—52 Schl.) und Arrhythmie des Pulses mit wiederholtem Erbrechen, beinahe 14 Tage lang, bevor sich urämische Convulsionen einstellten, mit deren Beginn der Puls sofort auf 120 und mehr heraufging. Die Section ergab hier, wie in einigen anderen von mir beobachteten Fällen, eine mässige Hypertrophie und Dilatation des linken Herzens, und seitdem hat C. Friedländer¹⁾ gefunden, dass diese anatomische Veränderung fast in keinem Falle von Nephritis variolosa fehlen soll. Ähnliche Beobachtungen werden von Silbermann²⁾ und Riegel³⁾ mitgetheilt, und man muss daher wohl annehmen, dass bei acutem Verlaufe der Nephritis eine Hypertrophie oder eine acute Dilatation des Herzens ebenso gut zu Stande kommen kann, wie im Gefolge der Nephritis chronica. Auf die Art und Weise aber, wie dies geschieht, mag ich hier um so weniger eingehen, als die Meinungen der Autoren über diese Beziehungen unter noch wesentlich von einander abweichen und ich verweise den Leser deshalb auf die Arbeit von Silbermann, welcher sich mit der Deutung jenes Zusammenhangs ausführlich beschäftigt. Die vorwiegende Betheiligung der Glomeruli und die dadurch bedingte starke Verminderung der Wasserausscheidung scheint hier vorzugsweise in Betracht zu kommen, indem gerade diese Verhältnisse die Spannung im Aortensystem abwärts zu steigern geeignet sind. Je höher der Grad der Glomerulonephritis und je sparsamer die Urinsecretion, um so eher wird man also die Entwicklung einer excentrischen Hypertrophie zu erwarten haben, während sie in leichteren Fällen ausbleiben kann. Die pathologische Anatomie ist meiner Ansicht nach nicht befugt, allein über diese Frage zu entscheiden, weil sie es natürlich nur mit schweren Fällen zu thun hat. Aber auch einzelne klinische Beobachtungen, in welchen die Dilatation und Hypertrophie des Herzens unter diesen Verhältnissen während des Lebens nachgewiesen und ihre Rückbildung verfolgt wurde, reichen nicht aus, um die Allgemeingültigkeit der Friedländer'schen Befunde zu beweisen. Da sehr grosse Anzahl der variolösen Nephritiden, welche ich glücklich verlaufen sah, und in welchen ich das Herz nach Jahren vollkommen gesund fand, spricht gegen dieselbe; man müsste denn annehmen, dass

¹⁾ Archiv f. Physiol. 1881.

²⁾ Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. XVII. S. 178.

³⁾ Mitt. k. k. Wochenschr. 1882. No. 23.

in allen diesen Fällen eine allmähliche Wiederausgleichung stattgefunden habe, was doch sehr unwahrscheinlich ist.

Ich glaube daher nicht, dass die oben (S. 549) erwähnte Retardation und Unregelmässigkeit des Pulses bei der Nephritis scarlatinosa immer von einer Hypertrophie des linken Ventrikels abhängt, wie es besonders Riegel annimmt. Ich konnte auch keineswegs eine vermehrte Spannung des Pulses in allen meinen Fällen finden, und glaube, dass der S. 550 mitgetheilte Fall, in welchem die Puls- und Herzphänomene kaum 24 Stunden dauerten, noch auf andere Ursachen dieser Erscheinung hindeutet. Gerade bei einem 8jährigen Knaben, bei dessen Section der linke Ventrikel stark hypertrophisch und dabei festig entartet erschien, hatte ich im Leben weder Verlangsamung noch Arrhythmie des Pulses beobachtet. Vielleicht handelt es sich hierbei um eine Innervationsstörung des Vagus, die mitunter mit nervalischen Vorgängen zusammenhängt, aber auch unabhängig von diesen auftreten kann. —

Dass auch das Peritonäum hier und da der Sitz einer entzündlichen Complication werden kann, lehren ein paar, zum Theil bereits früher¹⁾ von mir mitgetheilte Fälle:

In dem ersten (9jährigen Knabe) traten während der Nephritis plötzlich heftiges Fieber, Krammigkeit, Aufschreie, Spannung und äusserste Empfindlichkeit des Unterleibs, Uebelkeit, Erbrechen, Verstopfung auf. Durch topische Blutentleerung, warme Fomentationen und Mercurialien gelang es, in wenigen Tagen die Gefahr zu beseitigen. Im zweiten Fall, welcher einen 8jährigen Knaben betraf, wurde nach einer vorangegangenen Gelenkaffection während der hämorrhagischen Nephritis eine eitrige Suppuration von Eitelföhlchen, deren Hülle beschattet, zunächst eine acute Hydropsie mit fast grosser, durchsichtiger, sehr praller und empfindlicher Geschwulst des Sperm, weicht nach einem heftigen artemischen Anfall acute Peritonitis, wenige Tage darauf linksseitige Pleuritis mit bedeutendem Exsudat. Bei der Section fand sich ausser diesem auch in der Bauchhöhle eine beträchtliche Menge hellgelber seröser Flüssigkeit, und die Serosa des Dünndarms durch äusserst feine Injection rosenroth gefärbt. — Ein dritter Fall betrifft einen am 24. Mai 1876 mit heftigem Scharlach aufgenommenen 6jährigen Knaben. Während der darauf folgenden Nephritis entstand am 13. Juni bedeutende Schmerzhaftigkeit und Aufschreie des Unterleibs, und die durch eine Otitis bis dahin unterhaltenen mässigen Fiebertemperatur stieg sofort auf 40,9. Schon nach wenigen Tagen erfolgte Collaps, Kühle der Extremitäten (T. 38,4—37,2), P. kaum hörbar. Im Unterleibe liess sich eine Ansammlung von Flüssigkeit deutlich nachweisen, deren Menge stetig wuchs, während die Schmerzhaftigkeit sich verminderte. Tod am 18. in Collaps. Section: Peritonitis purulenta universalis. —

Unter den bedenklichen Erscheinungen, auf welche man an jedem Tage der Nephritis gefasst sein muss, nehmen die der Urämie gewiss

¹⁾ Beitr. zur Kinderheilk. N. F. S. 353 u. 381.

die erste Stelle ein. Obwohl ihnen in der Regel eine auffallende Verminderung der Urinsecretion oder gar eine vollständige Anurie vorausgeht, so fehlt es doch auch mir nicht an Beispielen, in welchen die Menge des Urins nicht erheblich vermindert war, oder wo die früher sehr verminderte Secretion bereits wieder in Gang gekommen war, und dennoch Urämie eintrat. Mitunter ohne alle Vorboten, in anderen Fällen nach vorausgegangenem Erbrechen, Kopfschmerz, Somnolenz, Verlangsamung und Arrhythmie des Pulses, brechen epileptiforme Convulsionen aus, welche sich rasch hintereinander stundenlang wiederholen, und in deren Intervallen entweder vollständiger Sopor oder wenigstens ein somnolenter Zustand fortbesteht. Auch heftige Aufregung, Geschrei und wüthende Delirien kamen mir während der Intervalle ein paar Mal vor. In den Anfällen selbst hob sich die Temperatur meistens beträchtlich, selbst bis auf 40,0 und darüber, während bald nach dem Aufhören der Convulsionen ein starker Abfall, zuweilen bis auf 36,2 mit Kühle der Extremitäten und ausserer Kleinheit des schnellen Pulses eintrat. In diesen Fällen kann der Tod sehr schnell eintreten, z. B. bei einem 5jährigen Knaben, welcher bald nach dem ersten nur drei Minuten dauernden convulsivischen Anfall *puddus* wurde und schon im zweiten schnell darauf folgenden zu Grunde ging. Die Intensität und Ausdehnung der Convulsionen ist verschieden, bald nur auf einzelne Muskelgruppen oder auf eine Körperhälfte beschränkt und mässig, bald allgemein verbreitet und sehr stürmisch, stets aber mit völliger Bewusstlosigkeit verbunden. Nicht selten bleiben Sinnesstörungen, z. B. Taubheit, besonders aber Amblyopie und Amaurose zurück, welche jedoch nicht nachhaltig zu sein, vielmehr nach einigen Stunden oder Tagen wieder zu verschwinden pflegen. Weit selbener geht, wie Sie gleich sehen werden, die Amblyopie dem urämischen Zustande voraus.

Paul R., 9 Jahre alt, aufgenommen am 6. Jani 1878 mit Nephritis scarlatinaea, zeigte mehrere Tage lang einen irregulären und langsamen Puls (bis auf 52 Schläge starkend) bei normaler Temperatur. Am Morgen des 18. Erbrechen und plötzlich epileptiforme Convulsionen, welche sich innerhalb 5 Stunden 7 mal wiederholten. Der erste Anfall betraf nur die rechte Gesichtshälfte und den rechten Arm. Unmittelbar nach demselben vollständige Amaurose, welche bald wieder verging, so dass Patient die umstehenden Personen erkannte. Aber nach dem zweiten, die ganze Körpermusculatur ergreifenden Anfall von neuem eintrat. Nach dem dritten Anfall erkannte Patient wieder den Schmerz der Niere, und Nachmittags war das Sehvermögen ganz normal geworden. Gegen 5 Uhr trotz Chloroformirung wiederholte epileptiforme Anfälle, Delirien, Tod im Collaps. Section ergab neben reichlichem Hydrope des Hingewebes und aller Höhlen auch Oedema cerebri, Nephritis parenchymatosa, mässige Hypertrophie und Dilatation des Herzens, besonders des linken Ventrikels.

Conrad K., Kjöking. Nephritis scarlatinea mit starkem Anasarca. In der Nacht vom 13. zum 14. December 1864 wiederholtes spontanes Erbrechen, am 13. Mittags grosse Indolenz, Kopfschmerz und sehr undeutliches Sehen, so dass Pat. seine Umgebung kaum noch erkannte. P. 96—100, klein. Noch während einer typischen Hämaturieung erfolgten heftige Convulsionen und Sopor. Nach zwei Stunden unter dem Gerausche kalter Umschläge Wiederkehr des Bewusstseins, am nächsten Tage Sensorium frei, Schvermögen völlig normal, P. voller, 68 und unregelmässig. Später Tod an Pleuritis und Peritonitis ohne Wiederkehr der urämischen Symptome.

Kerst K., 12jährig. In der 3. Woche nach Scharlach Nephritis. Im Anfang der 4. (4. Januar 1876) nach vorausgegangenem Erbrechen Urämie. Innerhalb 12 Stunden wahl 12 epileptiforme Anfälle, theils partiell im Gesicht, theils halbseitig, theils allgemein verbreitet. Behandlung mit Hitzegels, Einhülle, Purgantien. Am 5. Sensorium vollkommen frei, aber fast vollständige Anasarca. Nur ein Lichtschimmer ist noch sichtbar, sonst nichts. Am 6. Urin reichlich, nicht mehr albuminos. Schvermögen seit dem Morgen wieder hergestellt.

Wodurch diese Störung des Schvermögens bedingt wird, ist uns ebenso unbekannt, wie die Ursache der „Urämie“ überhaupt. Noch immer ist der Streit darüber nicht geschlichtet, ob eine Retention von Harnbestandtheilen oder ein durch verstärkten Druck vom linken Ventrikel her sich bildendes Oedema cerebri die gefährlichen Cerebralsymptome veranlasst. Wenn auch der erste der eben mitgetheilten Fälle und noch einige andere bei der Autopsie ein Oedem des Gehirns ergaben, so möchte ich darauf noch keinen besonderen Werth legen, weil dergleichen Befund nirgends auch da constatirt wurde, wo im Leben keine „urämischen“ Erscheinungen stattgefunden hatten. Deshalb hat auch die Vermuthung v. Gräfe's, dass die Anasarca durch mehr oder minder flüchtige Oedeme bestimmter Hirntheile bedingt würde, keinen sicheren Boden. Die Reaction der Pupillen gegen das Licht war in meinem letzten Falle normal, ob auch in den beiden anderen (lethalen), kann ich nicht mehr angeben. Ophthalmoskopisch wurden diese Fälle nicht untersucht¹⁾. Auch andere Störungen des Nervensystems, Aphasie und Hemiplegie bleiben in seltenen Fällen nach der Heilung der Urämie zurück. Bei einem 3jährigen Knaben, welcher im Februar 1881 eine Scharlachnephritis mit urämischen Anfällen überstanden hatte, war nach 24stündigen Convulsionen eine vollständige Paralyse der linken Körperhälfte und des linken Facialis eingetreten, welche nach Ende April nicht vollständig verschwunden war. Auch geringe Schwäche, Ataxie, epilepti-

¹⁾ Münster soll ein Oedem der Schiervonpapille stattgefunden haben, in anderen Fällen, z. B. in einem von Selberg und v. Gräfe beobachteten, dardurch keine Abweichung bemerkt worden sein (Dorrich und Virchow, *Jahresber.* f. 1887. II. 2. 179).

forme Zufälle wurden hin und wieder als Residuen beobachtet¹⁾; doch fehlt uns bis jetzt die Kenntniss der anatomischen Veränderungen, welche diesen Symptomen zu Grunde liegen. Jedenfalls steht fest, dass die „Urämie“ bei acuter Nephritis auch trotz der hinstretenden amaurotischen oder paralytischen Erscheinungen heilbar ist, und ich kann als das Resultat eigener und fremder Beobachtung hinzufügen, dass gerade in der scharlachförmigen Form die urämischen Symptome eine günstigere Prognose als sonst gestatten. Ich beobachtete sogar wiederholt, dass, sobald nur die Urämie glücklich überwunden war, die Nephritis überhaupt rascher heilte, als es sonst zu geschehen pflegt. Freilich geschieht dies nur in einem Theil der Fälle, während ein anderer Theil lethally endet, oder nach dem Verschwinden der urämischen Symptome fortbesteht.

Aus dieser Schilderung der Nephritis scarlatinosa könnten Sie umschliessen, dass nichts leichter sei, als die Diagnose dieser Krankheit, und in der That verheiss das vorausgegangene Scharlachfieber, die chemische und mikroskopische Beschaffenheit des Urins selbst dann, wenn die Wassersucht vollständig fehlen sollte, keinen diagnostischen Zweifel aufkommen lassen. Aber auch hier, wie überall in der Medicin, gilt der schlimme Satz: „Keine Regel ohne Ausnahme.“ Es giebt unzweifelhafte Fälle, in welchen trotz widerholter Untersuchung des Urins weder Eiweiss noch mikroskopische Elemente der Nephritis in demselben nachzuweisen sind. Das Auffinden der letzteren kann zwar durch starke kohlensaure Salimate, welche auf dem Filtrum zurückbleiben, bedeutend erschwert werden, doch besteht für mich kein Zweifel, dass sie, ebenso wie das Albumen, zeitweise ganz fehlen können, und bisweilen erst in den letzten Lebenstagen, zumal beim Eintreten urämischer Symptome, plötzlich gefunden werden. Und doch ergiebt dann die Section alle Zeichen einer diffusen stark entwickelten Nephritis. Ich verfüge jetzt mindestens über ein halbes Dutzend solcher Fälle, in welchen die Albuminurie entweder durchweg oder wenigstens mehrere Tage lang vermisst wurde. Allerdings bediente ich mich immer nur der allgemein üblichen Untersuchungsmethode (Kochen mit Zusatz von Essig- oder Salpetersäure), und man könnte daher einwenden, dass eine feinere Methode doch wohl minimale Mengen von Eiweiss nachgewiesen haben würde. Aber selbst dann bliebe es immer unerklärlich, weshalb bei ausgebildeter Nephritis doch nur so kleine Spuren von Eiweiss, dass man sie mit der gewöhnlichen Methode nicht nachweisen kann, im Urin aufzufinden sind. Der völlige Mangel der Albuminurie ist übrigens auch

¹⁾ Hajak, Arch. f. Kinderheilk. Bd. u. H. 11. Jhft. 1880.

von Litten bei der amyloiden Nierendegeneration Erwachsener¹⁾ und in einem Fall von hämorrhagischer Scharlachnephritis beobachtet worden, und Sie ziehen daraus, dass gerade dass wichtigste diagnostische Kriterium der Krankheit uns gänzlich im Stich lassen kann. Herr Dr. Litten war so gütig, mir den eben erwähnten Fall²⁾ zur Disposition zu stellen, und ich glaube Ihnen denselben um so weniger vorenthalten zu dürfen, als er durch die Genauigkeit der Untersuchung im Leben und nach dem Tode über jedem Zweifel erhaben ist:

Ida K., 21 Jahre alt, in die Universitätsklinik aufgenommen am 24. Mai 1879. Vor 4 Tagen mit Fieber und Angina erkrankt. Seit gestern Schielachenzustand über den ganzen Körper verbreitet. T. 39.2, Ab. 38.7. Verlauf ziemlich regelmäßig, nur wurde das Fieber durch einen Bronchialkatarrh und leichte Pleuritis über die Norm hinaus unterhalten. Eiweiss im Urin nie gefunden. Am 5. Juni morbi Oedem des Gesichts ohne Albuminurie. Gleichzeitig wieder gesteigerte Pharyngitis mit schwarzen Belägen und Fieber (39°). In den nächsten Tagen pericardiales Reiben, wiederholtes Erbrechen, subcutane Plegmons. P. 50, R. 60—70. In der Nacht vom 11. zum 12. plötzliches Tod.

Der täglich untersuchte Urin war stets frei von Eiweiss, enthielt aber hin und wieder vereinzelte hyaline Cylinder; nur in der Nacht, in welcher die Kranke starb, war Blut in demselben. Urinmenge dauernd normal, niemals verringert; spec. Gew. 1012—1015. Die Section ergab totalen, eine intensive Nephritis hämorrhagica. Beide Nieren 17 Ctm. lang, 9 Ctm. breit, fast 5 Ctm. dick (einen grossen Theil des Gewebes aus fast homögen ductalreiferen Coarctant. Schon an der Oberfläche sehr zahlreiche punktförmige Hämorrhagien. Rindensubstanz sehr breit und trübe. Litten fand die Hämorrhagien auch in grosser Zahl im Nierengewebe, und zwar sowohl in den Interstitien, wie in den Harnkanälchen (letztere wahrscheinlich erst kurz vor dem Tode eingetreten), daselbst vereinzelte circumscripte Entzündungsherde, besonders dicht unter der Kapsel und um die Glomeruli herum, kernlose Zellen in einer Anzahl gewundener Harnkanälchen und starke Epithelabstossung innerhalb der Bowman'schen Kapseln.

Litten fügt seiner dankenswerthen Mittheilung hinzu: „Es bestand somit eine sehr schwere Form der hämorrhagischen Nephritis, ohne dass sich dieselbe intra vitam durch irgend ein Symptom (Albuminurie, Verminderung der Harnsecretion u. s. w.) verrathen hätte.“ Nur das Oedem des Gesichts und die spärlich auftretenden hyalinen Cylinder im Urin konnten Verdacht erregen.

Dass im Verlauf der Nephritis scarlatinosa Schwankungen des Eiweissgehaltes vorkommen, dass heute mehr, morgen weniger Albumen im Urin gefunden wird, dass ferner öfters, wenn man den Fall für geheilt ansieht, plötzlich wieder Albumen und Blut mit oder ohne Fieber

¹⁾ Berl. klin. Wochenschr. 1878, No. 22, 23.

²⁾ Litten, Charité-Annalen. Jahrg. VII. S. 162.

im Urin auftreten, auch wieder Nachschübe des Oedems sich einstellen können, wurde bereits erwähnt. Fast niemals ist man im Stande, eine bestimmte Ursache für diese Schwankungen aufzufinden, doch beobachtete ich ein paar Mal, wo der Urin nur noch sehr wenig oder gar kein Eiweiß mehr enthielt, nach heftigen Schreien und Toben, sowie nach starken Körperbewegungen (Laufen, Springen) der Kinder jedesmal eine erhebliche Zunahme desselben, wahrscheinlich unter dem Einflusse einer vermehrten Blutfülle der Nieren. Unerklärlich bleiben aber Fälle, wie der Litten'sche und die folgenden, in denen wenigstens mehrere Tage hindurch absolut kein Albumen im Urin nachgewiesen werden konnte:

Otto S., 12jährig, aufgenommen am 22. Juli 1873 mit *Oedema faciei et scroti* nach Scharlach. Kein Fieber. Urin sparsam, stark sauer, sedimentierend, enthält weder Eiweiß, noch nephritische Elemente, vielmehr nur ansäurehaltige Sedimente, welche sich beim Kochen auflösen. Auch an den beiden folgenden Tagen dasselbe negative Untersuchungsergebnis. In der Nacht vom 24. zum 25. urämisches Anfälle, am Morgen Cyanose, Stinken des Pulses, völlige Bewusstlosigkeit. Der nachts mit dem Katheter entleerte Urin enthält nur Massen von Eweiss und zahlreiche mit vielen Körnern besetzte Cylinder. Tod am 27. durch Collapse und Lungenödem, nachdem das Bewusstsein völlig klar geworden war.

Section: Exiguus parenchymatöser Nephritis, Peritonitis, *Oedema pulmonum*, Bronchopneumonie.

Paul Sp., 4jährig, aufgenommen am 8. März 1876. Nach Angabe der Mutter vor 2 Monaten Schwellung, darauf Nephritis mit stichigem Oedem der Augenlider, später nach Purpura singula, Oedem wachsend, Haut weiß, nirgends Oedem, Schleimhäute sehr anämisch. Auf der Haut des Thorax eine Anzahl kleiner Purpuraefloren. Stürmische Brechfälle, P. 136, Herz und Lungen ohne physikalische Abnormität. Mässige Diarrhoe. Der nur in geringer Menge entleerte Urin ist klar, strohgelb, ohne Spur von Eiweiß. Während der drei folgenden Tage heftiges Fieber (zwischen 38,2 und 40,2 schwankend), R. 36—40, P. 128—136, leichte Delirien, heftiges Erbrechen, mässige rote Purpuraefloren im Gesicht, Urin trübe durch feibliche karmoisine Salze, ohne Spur von Eiweiß. Cylinder und andere Farnementen nicht deutlich nachweisbar. Tod am 11.

Section: Starke doppelreihige Nephritis haemorrhagica. Nieren stark vergrößert, schlaff und fast homogen weich. Oberflächlich durchsetzt von dicht aneinanderliegenden punktförmigen und linsengrossen dunklen Hämorrhagien. Auf dem Durchschnitt erscheint die peripherische Zone der rechten Capsula durch zahllose kleine Hämorrhagien fast gleichmässig roth. Derselbe Beschaffenheit zeigen die Colossae Basium, während das zwischen beiden Zonen liegende Kapselgewebe gelblich-grün und durchscheinend ist. Die geraden Harnkanälchen mit Harnsäure gefüllt. Leber theilig entartet. Chronischer Darmcatarrh.

Während hier die Albuminurie bis zum Tode fehlte, stellte sie sich im ersten Fall erst mit dem Eintritt der urämischen Erscheinungen ein, nachdem 3 Tage lang, und wie ich später erfähr, auch schon vor der

Aufnahme des Kniens in die Klinik der Urin ohne positives Resultat untersucht worden war. Und doch bewies hier der mikroskopische Befund in den letzten Tagen, sowie die Section, dass die Nephritis schon längere Zeit bestehen musste. Diese zur Zeit unerklärbaren Fälle sind wohl geeignet, uns in der Annahme eines Hydrops scarlatinosus ohne Nierenaffection vorsichtig zu machen. Nicht nur einzelne Fälle, sondern ganze Epidemien dieser Art wurden beschrieben (Philipp). Schon Legendre meint, dass in solchen Fällen der frühere Eiweißgehalt des Urins zur Zeit der Untersuchung bereits verschwunden sein könne, und mir kamen öfters Oedeme und selbst Ascites nach Scharlach vor, bei welchen der wiederholt, einmal sogar eine ganze Woche lang zweimal täglich untersuchte Urin vollständig eiweissfrei war. Aber fast alle diese Fälle endeten glücklich, und in dem einzigen lethalen wurde die Section, welche vielleicht doch eine Nephritis ergeben haben würde, verweigert. Ueberdies kommen hier und da Oedeme der Füße nach einem schweren, sich Wochen lang hinschleppenden Scharlachfieber vor, welche mit den Nieren überhaupt nichts zu thun haben, sondern nur als Folgen von Schwäche und Anämie aufzufassen sind und unter einer tonisirenden Behandlung bald verschwinden. Endlich können auch bei sehr heftiger scarlatinöser Hautentzündung unmittelbar nach dem Erblässen der Röthe leichte Oedeme des Gesichts und der Füße als locale Producte der Hautentzündung zurückbleiben. Solche Fälle müssen hier ebensogut ausgeschlossen bleiben, wie die Oedeme des Gesichts, welche im Verlaufe des Scharlach durch eine Phlegmone der Unterkiefergegend oder durch eine starke Rhinitis hervorgerufen werden. Trotzdem sind die Acten über diesen Gegenstand noch nicht geschlossen ¹⁾.

Die Dauer der scarlatinösen Nephritis beträgt auch in den günstigsten Fällen fast immer zwei bis drei Wochen, oft auch viel länger. So sah ich z. B. bei einem 12jährigen Mädchen erst nach Ablauf der zehnten Woche das Oedem des Gesichts, das Eiweiss und die Cylinder im Urin abnehmen, aber erst mehrere Wochen später vollständig verschwinden, und ein 8jähriges Mädchen, welches im Januar 1875 Scharlach überstanden hatte, zeigte noch Ende Mai wechselnden Albumengehalt und am 2. Juni noch Trümmer körniger Cylinder im Urin. Die Gefahr des Uebergangs in eine chronische Nephritis ist daher keineswegs ausgeschlossen, obwohl ich selbst nur wenige Fälle dieser Art

¹⁾ Quincke (Berl. klin. Wochenschr. 1882, No. 27) beschreibt 3 Fälle „einfacher“ Scharlachnierenentzündung, welche 3 Geschwister betrafen, aber nicht ansteckend sind, weil in einem derselben der Urin Spuren von Eiweiss enthält.

beobachten konnte. Bei zwei Mädchen von 7 und 9 Jahren wurde noch ein resp. zwei Jahre nach Ablauf der Krankheit zwar nicht täglich, aber von Zeit zu Zeit Eiweiß im Harn (ohne Cylinder) gefunden, wobei das Allgemeinbefinden sonst durchaus ungestört war, und bei einem 8jährigen Knaben, welches sich längere Zeit auf meiner Abtheilung befand, liess sich eine ausgesprochene Nephritis chronica mit starken Oedemen und charakteristischem Urin auf eine vor einem Jahr überstandene und nach wenigen Monaten rückfällig gewordene Nephritis scarlatinosa zurückführen. Ueberhaupt scheint die überstandene Nephritis scarlatinosa die Niere zu einem vulnerablen Organ zu machen, da ich wiederholt noch Jahre lang nach derselben durch Erkältung (z. B. im Seebade) neue Schübe beobachtet habe.

Die Ansichten der Aerzte über die Behandlung sind sehr getheilt, Bc und fast möchte man sagen, dass jeder Arzt sich seine eigene Methode zurechtgelegt hat, was immer ein Beweis dafür ist, dass die Naturheilkraft mehr leistet, als unsere Kunst. Ich will Ihnen daher nur diejenige Behandlung erörtern, von welcher ich persönlich nach vielfachen Versuchen immer noch die besten Erfolge gesehen habe. Vor allem rathe ich, sobald Sie Erkranken, und sei es nur ganz temporär, im Urin finden, das Kind ins Bett zu legen, und eine strenge Diät, welche hauptsächlich aus Milch und Milchspeisen besteht, anzuordnen. Diese Diät scheint mir auch bei der mehr entwickelten Krankheit dringend geboten zu sein. Allenfalls gestatte ich noch Beuillon, niemals aber Fleischspeisen, welche ich hier und da ausdrücklich verordnet fand, um die bei hämorrhagischer Nephritis stattfindenden „Blutverluste möglichst rasch zu ersetzen“. Bedenken Sie wohl, dass Sie es hier nicht mit einer einfachen Nierenblutung, sondern mit einer Entzündung zu thun haben, welche durch Fleischdiät entschieden gefördert wird. Wo nicht Diarrhoe vorhanden ist, eröffne ich die Cur innere mit einem Purgans (F. 7) und lasse dies zwei bis drei Tage lang fortsetzen. Wo gleichzeitig Diarrhoe besteht, rathe ich zunächst expectative zu verfahren, da ich ein paar Mal unter diesen Umständen spontane Heilung eintreten sah, z. B. bei einem 2jährigen Knaben, welcher nur mit Wismuth und abstrugreichen Darminjectionen behandelt wurde, und dessen Nephritis mit der Diarrhoe zugleich nach einigen Wochen verschwand. Nach dem Abklingen mittelgebe ich das allbekannte Kali acetatum (F. 41), welches bei sehr schwächlichen und anämischen Kindern mit einem Decoct. Chinæ (F. 42) verbunden werden kann. Dabei lasse ich Wildunger Wasser zu 3—4 Weingläsern täglich trinken. Von diesen Mitteln habe ich einen ungünstigen reinenden Einfluss auf die Nieren beobachtet, sobald

nur die Dosis des Kalisales nicht zu hoch gegriffen wird. Dasselbe gilt von der Digitalis, welche ich allein oder in Verbindung mit Kali aceticum (F. 22) sowohl in fieberhaften, wie in fieberlosen Fällen sehr häufig mit gutem Erfolg in Gebrauch zog.

Zur Application von 5—10 trockenen oder gar künftigen Schröpfköpfen auf die Nierengegend sah ich mich verhältnissmässig selten veranlasst, nämlich nur dann, wenn die Urinentleerung äusserst sparsam oder gar Anurie vorhanden war, und stärkeres Fieber sich entwickelt hatte. Für solche Fälle empfahl man früher (Heim, Romburg) als bestes „Dureticum“ den Aderlass (von etwa einem Tassenkopf Blut), und ich selbst erinnere mich aus der Zeit, in welcher ich Assistent in der Klinik des letzteren war, einzelner, zumal mit Entzündungen innerer Organe complicirter Fälle, in welchen diese Methode einen überraschenden Erfolg zu haben schien. Vielleicht hätte ich manches Kind gerettet, wäre ich nicht, angesteckt von der Blutscheu unserer Zeit, vor 20 Jahren ganz von dieser Methode zurückgekommen. Aber die meisten schweren Fälle sind wegen der bedeutenden Anämie nicht dazu angethan, allgemeine Blutentleerungen zu indiciren, und ich würde daher immer rathen, sich unter den oben erwähnten Umständen auf den Versuch mit trockenen und bei kräftigen Kindern auch mit blutigen Schröpfköpfen zu beschränken. Ganz unbestreitbare Erfolge habe ich indess, um ganz offen zu sein, von diesen Applicationen niemals beobachtet.

Einer grossen Beliebtheit erfreuen sich bei sehr vielen Aerzten die warmen Bäder von mindestens 28° R. und die darauf folgenden Einwickelungen in wollene Decken. Auch ich habe dieselben recht häufig angewendet und muss ihnen, wenn sie in der That den beabsichtigten starken Schwäiss erregen, eine entschieden günstige Wirkung zuerkennen. Bei starkem Oedem bleibt indessen die Diaphoresis gewöhnlich aus, oder ist wenigstens sehr ungenügend, und selbst da, wo der Hydrops fehlte oder nur unbedeutend war, blieb doch eine ganze Reihe solcher Bäder nicht selten wirkungslos. Ja, in manchen Fällen von Nephritis haemorrhagica beobachtete ich nach jedem Bade eine Zunahme des Blutes im Urin, so dass ich die Bäder absetzen musste. Ich möchte dieselben daher immer nur als einen Versuch betrachten, dessen Erfolg man abwarten muss und den man auch in complicirten Fällen nicht scheuen sollte. Nach meinen neueren Erfahrungen sollte wenigstens die Complication mit Pneumonie keine Contraindication gegen die Schwitzbäder abgeben, da ich mehrere Fälle dieser Art gerade unter dem fortgesetzten Gebrauch derselben heilen sah. Minder empfehlenswerth erschienen mir die hydropathischen Einsackungen, von denen ich mehr und mehr

zurückgekommen bin. Was endlich die in neuerer Zeit, besonders von Dezanne gerühmten subcutanen Einspritzungen von *Pilocarpinum muriaticum* betrifft, so kann ich in das Lob desselben auch nicht unbedingt einstimmen. Um eine reichliche Schweißsecretion zu erzielen, mussten wir die Dosis bisweilen von 0,01 auf 0,02 erhöhen und beobachteten dann immer, oft auch schon bei 0,01, wiederholtes Erbrechen, ein paar Mal auch drohende Collapsymptome, wenn auch zuvor ein Löffel starken Weins verabreicht war. Wiederholt war ich genötigt, von diesem Verfahren, welches eine gefährliche Depression der Herzenergie in Aussicht stellte, abzuziehen. In anderen Fällen aber, wo die Einspritzungen ohne Gefahr eine Woche und länger fortgesetzt werden konnten und immer reichliche Diaphoresen, meistens aber nur geringen Speichelfluss bewirkten, sah ich allerdings den Hydrops sich schnell vermindern und die Menge des Urins zunehmen, den Eisengehalt desselben aber nahezu unverändert bleiben. Eine Abklärung des Verlaufs im Ganzen glaube ich daher durch das *Pilocarpin* nie erzielt zu haben, wohl aber öfters eine Zunahme der Urinsecretion und ein rascheres Schwinden des Hydrops, womit man ja auch schon zufrieden sein kann, sobald nur nicht die erwähnten ungünstigen Nebenwirkungen auftreten. Im Allgemeinen gebe ich daher den Schwitzbädern unbedingt den Vorzug vor dem *Pilocarpin*.

Die bisher empfohlenen Mittel müssen mindestens 10–14 Tage lang beharrlich fortgebraucht werden, und erst dann rathe ich ihnen, wenn die Heilung nicht fortschreiten will, einen Versuch mit den Abstringentien zu machen. Ich pflege zunächst das *Acidum tannicum* anzuwenden, und gebe nur dann dem *Ergotin* den Vorzug, wenn der Urin einen starken Blutgehalt zeigt. Beide Mittel scheinen mir die Wasserausscheidung aus den Nieren keineswegs zu beschränken, eher zu fördern (F. 44 und 45). Bleiben dieselben nach 7–10tägigem Gebrauch erfolglos, so gehe ich zum *Liquor ferri sesquichlorati* über (F. 45), welcher besonders in der hämorrhagischen Form passt, aber auch zur Beseitigung der nach der Heilung zurückbleibenden Anämie, wie jedes andere Eisenpräparat, empfohlen werden kann. Auf eine ganz sichere und besonders rasche Wirkung darf man aber bei allen diesen Mitteln nicht rechnen. Oft genug vergingen trotz der beharrlichsten Anwendung derselben viele Wochen bis zur vollständigen Heilung.

Entzündliche Complicationen werden ihrer Natur nach behandelt. Bei drohender oder entwickelter „*Urämie*“ leisteten mir blutige Schröpfköpfe im Nacken, 5 bis 6 Blutegel hinter den Ohren oder an den Schläfen, deren Wunde man nicht nachbluten lässt, ein Erstgehilf auf

dem Kopf, dabei ein starkes Purgans aus Inf. sennae comp. mit Symp. terrin. (F. 7), und wenn dasselbe ausgebrochen wurde, Klystire von gleichen Theilen Essig und Wasser wiederholt vorzügliche Dienste. Ich wende daher diese antiplogistische Methode mit Vorliebe an, aber nur bei kräftigen Kindern mit vollem gespanntem Pulse, und so lange keine Symptome von Collapse sich bemerkbar machen. Ich kann versichern, unter diesen Verhältnissen überraschende Resultate von dieser Behandlung erlebt zu haben. Will man bei grosser Intensität und Dauer der artemischen Convulsionen noch Chloroforminhalationen, wie bei anderen epileptiformen Krämpfen, versuchen (S. 148), so lässt sich dagegen nichts einwenden. Dagegen erfordert der Eintritt von Collapsesymptomen (Verfall und Blässe des Gesichts, kleiner unregelmässiger Puls, Kühle der Extremitäten u. s. w.) sofort die Anwendung von Reizmitteln, besonders reichliches Einfüssen von Wein und subcutane Einspritzungen von Campher (F. 14). Seit der neuesten Empfehlung des Pilocarpins gegen Urämie durch Prentiss¹⁾, dessen Erfolge indes nicht sehr ermutigend sind, habe auch ich dasselbe wiederholt angewendet. In 3 Fällen (Pilocarpin 0,005 bis 0,01 2mal täglich injicirt) sah ich unter einer reichlichen Diaphoresis Heilung eintreten, die Mehrzahl aber ging bei dieser Behandlung, die auch hier fast immer Erbrechen bewirkte, zu Grunde, und ich habe daher keine Ursache, dieser Methode das Wort zu reden. —

Die scarlatinöse Nephritis tritt, wie ich schon bemerkte, fast immer als Nachkrankheit des Exanthems auf, wenigstens in ihrer klinischen Erscheinung. Wenn auch bei Sectionen von Scharlachkranken, welche in der ersten oder zweiten Woche der Krankheit unter malignen Symptomen zu Grunde gingen, fast immer trübe Schwellung der Nierenzinde oder auch höhere Grade von Nephritis parenchymatosa gefunden werden, so verschwinden doch die Symptome derselben in dem allgemeinen färblichen Krankheitsbilde. Nur die Untersuchung des Urins kann in solchen Fällen Aufschluss geben. So fand ich z. B. bei zwei Kindern von 6, resp. 9 Jahren schon am 4. Tage des mit „diphtheritischer“ Pharyngitis und typhösen Symptomen einkergehenden Scharlach einen trüben, sehr spärlichen, reichlich Eiweiss- und Lymphkörperchen enthaltenden Urin und nach dem Tode eine intensive Nephritis parenchymatosa. Bei einem 11jährigen Mädchen entwickelte sich sogar schon am 5. Tage der Scarlatina gleichzeitig mit einer Bronchopneumonie ein starkes Oedem und rasch zunehmender Ascites mit reichlich albuminösem Urin, wodurch schon im Beginn der 2. Woche der Tod herbeigeführt wurde. In schweren

¹⁾ Jahrb. f. Kinderheilk. XV. 1890. S. 525. — Deutsch. Med. Woch. XVI. S. 369.

Fällen kommt es bisweilen schon in den ersten Tagen zu einer 12- bis 24stündigen Anurie, welche mit der sparsamen Entleerung eines stark blüthaltigen Urins abschliesst. Unter diesen Umständen handelt es sich wohl mehr um eine von vorn herein sich geltend machende Nierenreizung durch das scarlatinöse Virus, als um eine sonst zunehmende rapide und hochgradige Exacerbation jener „trüben Schwellung“, welche im Gefolge sehr hoher Fiebertemperaturen auftritt (S. 340), meistens aber sich wieder zurückbildet und keineswegs die Belästigung, dass es zu einer nephritischen Nachkrankheit kommen muss, rechtfertigt. Denn in mehreren Fällen von Scharlach, welche von Blüthenstadium sehr hohe Temperaturen und ein paar Tage lang Albuminurie darboten, sah ich die Biontalescenz doch ganz ungestört verlaufen.

In sehr schweren Scharlachfällen, die von Anfang an mit den Symptomen grosser Herzschwäche auftreten, kann die Albuminurie meiner Ansicht nach auf eine Stauung in den Nierenvenen, welche die Folge der Herzschwäche ist, zurückgeführt werden:

Paul P., 7jährig, wurde am 24. Januar 1873 von Scharlach befallen. Schon am 25. war der Puls (140 Schl.) sehr klein, am folgenden Tage sehr unregelmäßig und kaum fühlbar; Hände und Füsse kühl, Schmeibkautschlag mit Mundschleimhaut cyanotisch, Urin sparsam, dunkel und albuminös. Durch continuirliche Mistel (Wein, Moschus) war die Puls schon am 28. wieder deutlich fühlbar und gleichmässiger, das Exanthem mehr blassroth geworben, am 29. der Puls gehoben, 120, Ausschlag wieder von normaler Farbe, Urin reichlicher und ohne Eiwass. Die Albuminurie musste also, wie die Opacität des Urins und der Mundschleimhaut, als das Resultat einer vorübergehenden Stauung in den Nieren betrachtet werden, denn alle diese Erscheinungen verschwanden gleichzeitig, als sich die normalen Circulationsverhältnisse wieder herstellten. —

Die acute diffuse Nephritis ist im Kindesalter so überwiegend häufig eine Folge der Scarlatina, dass Sie in allen Fällen derselben zuerst an diese Krankheit denken müssen, nützen auch die Angehörigen sie in Abreife stellen. Oft genug werden leichte Fälle von Scharlach mit geringer und flüchtiger Hautröthe ganz übersehen, und erst später, wenn sich eine Nephritis ausbildet, erinnern sich die Eltern auf Befragen des Arztes, dass das Kind vor 2—3 Wochen einige Tage gefiebert und über den Hals geklägt, auch wohl „rothe Flecken“ oder „etwas Priesel“ gehabt habe. In diesen Fällen geben uns auch die Reste der Desquamation, besonders an den Füssen und Händen, oft noch den Beweis, dass es sich in der That um Scharlach gehandelt hat.

Inbess ist das Scharlachfieber keineswegs die einzige Ursache der kindlichen Nephritis. Nächst demselben spielt die Diphtherie eine wichtige Rolle, welche oft schon während ihrer Dauer, seltener in der

Reconvalescenz nephritische Symptome hervorruft, deren Schilderung ich mir für später, wenn von der Diphterie die Rede sein wird, vorbehalten. Seltener kommen die Masern als Ursache der Nephritis in Betracht. Mag auch eine tiefe Schwellung oder parenchymatöse Nephritis, wie bei allen intensiven Infektionskrankheiten, auch bei den Sectionen von Masernkranken öfters vorkommen (Reimer fand sie unter 51 Fällen 12 Mal), so geüet doch ihre klinische Manifestation im Laufe oder als Nachkrankheit der Morbilla zu den grössten Seltenheiten¹⁾. Ich selbst konnte nur zwei Fälle sicher constatiren, die ich vom Beginn der Masern an beobachtet hatte; einige andere sind mir nicht ganz zureichend, weil ich mich dabei auf die Aussagen der Angehörigen verlassen musste, welche gar nicht selten Masern und Scharlach mit einander verwechseln. Dass aber eine Nephritis, und sogar eine hämorrhagische, schon in den ersten Tagen der Masern auftreten kann, ist durch die Beobachtungen von Malmström bewiesen.

Sehr selten wird auch die Nephritis als Folge eines Wechsel-Fiebers beobachtet. Bei einem 6jährigen Mädchen, welches nach drei Anfällen einer Intermitteus quetiana durch Chinin geheilt wurde, enthielt der eine Woche später entleerte spärliche dunkelbräunliche Urin reichlich Albumen, hyaline Cylinder und Blutkörperchen; nahm aber unter fortgesetztem Chiningebrauch schon nach 8 Tagen wieder seine normale Beschaffenheit an. Ganz ähnlich verlief ein zweiter Fall, und ein dritter, an dessen Behandlung ich Theil nahm, wird von C. Kuster²⁾ beschrieben:

Mädchen von 4 Jahren. Ende Novemb. 1879 Masern, auf welche eine Otitis media mit Perforation der Trommelfelle folgte. Mitte December Intermittens quotidianus mit sehr hoher Temperatur (bis 41°), welche durch Chinin (0,3–0,4 Vermittags) zwar gemildert wird, aber bis Ende December fort dauert. Am 27. December Urin spärlich, von röthlicher, ins Oligurische schillernder Farbe, enthält Eiweiss, Blutkörperchen und Cylinder. Nach einigen Tagen schreitet Besserung von 30. December bis 1. Januar 1880 wieder stürzende Fieberanfälle, und mit dem Eintritt derselben Urin wieder stark hämorrhagisch. An diesen Tage sah ich das Kind zum ersten Mal. Chinin in grossen Dosen besänftigte die Fieberanfälle schnell, Urin sodort heller, am 3. Januar schon frei von Albumen und Blut. Vollständiges Heilung.

Nur in einem Falle beobachtete ich ähnliche Erscheinungen als Nachkrankheit einer Angina parotidea:

Clara S., 6 Jahre alt, gesund, bekam im Abklingstadium der Keuchhusten

¹⁾ Kassinowitz, *Dokter. Jahrb. L. Pödal.* 1874, I. 80.

²⁾ *Berl. klin. Wochenschr.* 1880, No. 25.

eine Parotitis. Eine Woche nach Ablauf gewöhnlichen Oedem des Gesichts, blutiger, albuminöser Urin. Bei meiner ersten Untersuchung (20. April 1869) bestanden diese Erscheinungen noch fort. Abends geringes Fieber bei völliger Esphorie. Urin reichlich, grünlich-trüb, mit spärlichem, etwas Mithaltigem Sediment, enthielt ziemlich viel Albumen, Eizkörperchen und Epithelien. Cylinder nicht aufzufinden. Nach einer ständigen Bekämpfung mit Alkalmien, Mithellin und Kafe in Betheiligung Besserung.

Da ich bei einem in meiner Klinik behandelten Kinde im Verlauf eines Keuchkustens Oedem des Gesichts und der Füße mit Albuminurie gesehen hatte, welches bald wieder verschwand, ausserdem aber noch bei einem 10jährigen russischen Knaben eine seit 2 Jahren bestehende Nephritis beobachtet hatte, deren Beginn unmittelbar nach einer Pertussis stattgefunden haben sollte, so musste ich mir die Frage vorlegen, ob die im obigen Falle stattgehabte Albuminurie mit dem Keuchhusten oder mit der Parotitis in Beziehung stand. Die beträchtliche venöse Stauung, welche während der heftigen Hustenanfälle in allen Theilen, also auch in den Nieren Platz greift, kann gewiss als ein zur Gefässerweiterung und zu exsudativen Vorgängen disponirendes Moment gelten; da aber der Keuchhusten schon stark in der Abnahme begriffen war, als die Nierensymptome traten, so wird die Abhängigkeit derselben von der Parotitis fast zur Gewissheit. Ich werde daher künftig nach dem Ablaufe jeder Parotitis den Urin untersuchen, um über diesen Punkt ins Klare zu kommen.

Weit häufiger entsteht die Nephritis bei Kindern in Folge einer starken Erkältung oder Durchnässung. So sah ich ein 9jähriges Mädchen nach einem Sturz ins Wasser bei erhöhtem Körper, einen 8jährigen Knaben nach einer völligen Durchnässung durch einen starken Gewitterregen, welcher ihn auf dem Wege zur Schule überrascht hatte, erkranken. Der letztere nahm in den nassen Kleidern noch den ganzen Vormittag am Unterrichte Theil, und schon 4 Tage darauf wurde Anasarca, Fieber und stark albuminöser bluthaltiger Harn beobachtet. Ein 3jähriges Kind bekam eine hartnäckige Nephritis, nachdem es während des Schlafes in einem kalten Zimmer (Oct. 1881) nach Abstreifen der Bettdecke bloss gelegen hatte, so dass es Morgens ganz kalt gefunden wurde. Wahrscheinlich müssen noch andere Fälle, in welchen ich keinen bestimmten Anlass auffinden konnte, auf ähnliche unbekannt gebliebene, wohl auch absichtlich verschwiegene Vorfälle zurückgeführt werden¹⁾.

Ernst L., 9jährig, aufgenommen am 10. Juli 1876. Seit Pflanzten täglich kalte Pflanzbäder. Vor 3 Wochen plötzlich Oedem der Füße, später des Schenkel

¹⁾ Vergl. die Versuche von Lazar, Virchow's Archiv. Bd. 79. Heft 1.

und Morgagni auch der Augenhäuter. Seit 8 Tagen Katarrh mit abendlichem Fieber, sonst Euphorie. Urin klar, albuminös, enthält hyaline Cylinder. Behandlung mit Purgativen und Kalisulfat. Vollständige Besserung bis zum 20. Juli.

Gustav B., 39 Jahre alt, aufgenommen am 4. Mai 1873. Seit heute Mitternacht plötzliche Erkrankung mit Frost, Hitze, Zittern, Kopfweh, Erbrechen und Appetitverlust. T. 40.4, P. 126. In der Nacht Hiesenschmerz; am nächsten Morgen klares Serum, Urin in der Augenhäuter. T. 39.9, von da ab auf 37.6—37.8 herabgesunken und nach einigen Tagen ganz heber. Urin spärlich, blass, enthält Eiweiss, Bluthörperchen, hyaline Cylinder u. s. w. Im weiteren Verlauf auch leichte Müdigkeit. Dauer der Krankheit etwa 4 Wochen; in der Convaleszenz schwerer febriler Albumengehalt, der mehrere Tage ganz fehlt und dann wieder eintritt. Bläder und Eingeweidekrämpfe erzeugen keinen Schmerz. Behandlung mit Purgativen, später mit Tannin und Eisen. Am 6. Juni geheilt entlassen.

Anna P., 23jährig, aufgenommen am 1. Mai 1873. Vor 14 Tagen plötzlich Geschwulst der rechtsseitigen Augenhäuter, die nach 3 Tagen wieder verschwand, vor einigen Tagen aber wiederkehrte. Bei der Aufnahme erscheint sich dieselbe als starkes Oedem, das Auge selbst gesund. Sonst nirgends Oedem. Unterleib rechtsseitig geschwollen und sehr empfindlich beim Druck auch bei Bewegungen (Peritonitis). T. 39.5, P. 116. Urin kaffebraun, stark albuminös, Bluthkörperchen, hyaline Cylinder und Epithelien reichlich. Nach reichlichem Purgiren ist den nächsten Tagen Schwanden des Fiebers. Unter hydropathischen Einwirkungen Abnahme des Oedems und der Schwellung des Leibes. Albumengehalt des Urins fortwährend, teilweise auch nützliche Färbung derselben durch Bluthkörperchen; Cylinder nur sehr spärlich, Lymphekörperchen zahlreich. Erst nach 21 Tagen ist der Urin wieder vollkommen normal. Behandlung mit Purgativen und Tannin.

Schließlich lenke ich Ihre Aufmerksamkeit noch auf eine Art von „artificieller“ Nephritis, welche sich in Folge gewisser therapeutischer Eingriffe entwickelt. Dass der innere Gebrauch starker Diuretika, besonders des Terpenthins und der Causthariden, Albuminurie und selbst Nephritis erzeugen kann, ist bekannt, und dasselbe wird von Vielen, ich weiss nicht, ob mit Recht, auch von grossen Dosen des Chlorkali behauptet. Viel weniger beachtet wird aber die Thatsache, dass auch der äussere Gebrauch solcher Medicamente eine analoge Wirkung ausüben kann. Bei einem 10jährigen epileptischen Mädchen, welches seit 4 Wochen ein täglich mit Unguent, cantharidum verbundenes Vesicator trug, fand ich im Urin Eiweiss und hyaline Cylinder, und schon wenige Tage nach dem Weglassen des Verbandes verschwanden diese abnormen Bestandtheile. Besonders aber achte man auf diejenigen Fälle, in denen gegen chronische Hautkrankheiten balsamische Mittel oder Theer in Form von Einreibungen angewendet werden. Je sorgfältiger man in solchen Fällen den Urin untersucht, um so häufiger wird man nach längerer Zeit, meistens erst nach einigen Wochen oder noch später, Eiweiss und morphotische Elemente in demselben nachweisen können. In mehreren Fällen von Ekzema chronicum, welche in der Klinik mit Theer-

nörungen (Pix liquid. 1: Vaseline 10/0) behandelt worden waren, hatten wir Gelegenheit, diese Erfahrung zu machen¹⁾. Dagegen zeigten sich die Einpustungen der Jodtinctur, welche nach der Angabe französischer Aerzte²⁾ bei Kindern sehr schnell einen ähnlichen Einfluss ausüben sollen, und zwar auch dann, wenn sie nur auf ganz beschränkten Hautpartien vorgenommen werden, in dieser Beziehung fast immer unschädlich. Nur in einem Fall, in welchem die Jodtinctur 4 Mal auf ziemlich ausgedehnte wunde Hautstellen gepustet wurde, entwickelte sich nach etwa 14 Tagen eine starke Nephritis mit Ödem, reichlich albuminösem, cylindrischen und epithelienhaltigen Urin und dochenden urämisches Symptomen, wiewohl nicht unerwähnt bleiben darf, dass vorher eine Behandlung mit Thiermilcheinreibungen stattgefunden hatte. Zweimal hatte ich auch Gelegenheit, das Auftreten nephritischer Symptome 8 bis 14 Tage nach der Heilung der Scabies durch Einreibungen von Balsam. peruvianus³⁾ zu beobachten:

Emma H., 6jährig, am 10. Mai 1873 unmittelbar von der Kratzen auf meine Abtheilung verlegt. Ödem der Augenlider, Urin spärlich, albuminös, enthält Cylinder, Epithelien, Blat- und mehrere Lymphkörperchen. Nephritis mit einer mäßigen Fieber (bis 38.6). Behandlung mit Abführmitteln und Tannin. Schon am 22. Urin normal, Ödem geschwunden.

Adolf U., 6jährig, aufgenommen am 27. Mai 1873 mit Ödema faciei und pedum, welches etwa 2 Wochen lang besteht, nachdem das Kind eine Woche zuvor eine Krätze mit Perubalsam ausgekratzt hatte. Ekzem an den Füssen noch sichtbar. Fieber (Ab. 38.4—39.8). Uränie, Anämie, leichter Kotarrh. Urin klar, hellgelb, ziemlich viel Albumen und Epithelien reichlich; sehr spärliche Cylinder. Behandlung mit Kali acetum, später Tannin. Vom 11. Jod an kein Fieber mehr, Ödem verschwunden, während der Urin abwechselnd mehr oder weniger Erstickt zeigt, namentlich auch tagelang ganz frei davon ist. Vom 20. an völlige Heilung.

Auch nach der äußerlichen Anwendung der Kohlensäure in Form von Verbänden, Umschlägen und Ausspülungen kann neben der Schwärzung des Urins Albuminurie und wirkliche Nephritis auftreten. Mir selbst kam bisher nur ein Fall dieser Art vor, welcher aber hinreichte, mich zur Vorsicht bei der Anwendung dieses Mittels in der Kinderpraxis zu mahnen:

Agnes S., 6jährig, aufgenommen am 14. Juni 1873 mit Ekzema chronicum der ganzen linken Vorderarm; sonst gesund, Fermentationen des Arms mit einer 3procent. Carboläurelösung, welche 4 Tage lang ununterbrochen fortgesetzt wurden. Vom 29. an wurden nur Vaselineeinreibungen, später ein Opporverband

¹⁾ Janubasch, Charité-Annalen. Bd. VI.

²⁾ Radix. De l'iodoformie résistante aux applications de la teinture d'iode chez l'enfant. Thèse. Paris 1876.

³⁾ Litzen, l. c. S. 129.

apptiert, um das Kratzen zu vermeiden. Am 7. Juli kassirt sparsame Urinsecretion; in 24 Stunden wurde kaum ein Beengenglas voll Urin entleert, welcher reichlich Eiweiss, wenig rothe Bluthkörperchen und hyaline, zum Theil mit Körnchen besetzte Cylinder enthält. Am 10. Oedem der Füsse und der Bauchhaut, kein Fieber, Eupnoe. In den nächsten Tagen auch Oedem des Gesichts. Behandlung mit Abführmitteln, dann Tannin und hydropathische Erweichelungen, nach welchen jedesmal starker Schwinn erfolgte. Nach zwei Wochen (den 28.) wurde der reichlicher flüssende Urin wieder normaler, aber erst Anfangs August völlige Heilung.⁷⁾ —

In einer Reihe von Fällen wird es Ihnen aber trotz aller Bemühungen nicht möglich sein, die Ursache der Nephritis mit Bestimmtheit nachzuweisen. Besonders blieben mir die wenigen Fälle, welche ich bei Neugeborenen und ganz jungen Kindern zu sehen Gelegenheit hatte, etiologisch vollkommen dunkel. Schon früher (S. 17) machte ich Sie darauf aufmerksam, dass bei Neugeborenen, wenigstens temporär, etwas Eiweiss im Harn gefunden werden kann, wobei es dahin gestellt blieb, ob der Reiz des harnsauren Infarkts der Tubuli urinaferi als Ursache anzulagen ist. Wenn nun auch dieser äusserst geringe Eiweisgehalt nach den ersten 10 Tagen des Lebens zu verschwinden pflegt, so kommen doch hiernächst auch Fälle vor, in denen schon im zartesten Alter eine Nephritis mit schlimmen Folgen sich entwickelt. Ich meine hier nicht die bei den Sectionen kleiner atrophischer Kinder sehr oft zu beobachtenden „trüben Schwellungen“ der Nierenrinde, welche als Folge einer Ernährungsstörung der Epithelien zu betrachten sind, sondern klinisch erkennbare Krankheitsbilder, wie z. B. in dem folgenden Falle:

Catharina K., 5 Wochen alt, aufgenommen in die Klinik am 24. März 1874 wegen Inferturgo. Missgep. Atrophie. Am 25. starkes Oedem des Gesichts und der Extremitäten (T. 36.4). Nervöser Stuhlstanz. Urinsecretion äusserst sparsam; sowohl mit dem Katheter, wie mittelst eines vor der Urethra angebrachten reinen Schilfwurms liess sich nur wenige trübe Tropfen, die zu einer Untersuchung nicht zu benutzen sind, gewinnen. Am 27. Athessath, Cyanose, Dünstfang im unteren Theil beider Thoraxhälften; Tod am 29. Die Section ergab diffuse parathyriale Nephritis und grosses Transsudat in den Pleurahöhlen; im Herzentheil sind im Unterleib.

Auch in einigen anderen Fällen von chronischer Nephritis, welche mir bei Kindern im ersten und zweiten Lebensjahre vorkamen, war die Ursache nicht aufzufinden. Ein Zusammenhang mit Syphilis, der hier und da erwähnt wird, liess sich niemals sicher nachweisen, und in einem verdächtigen Falle, welcher antisypilitisch behandelt wurde, blieb die Cur durchaus erfolglos. Trotzdem rathe ich Ihnen mit Rück-

⁷⁾ Vergl. die Experimente von Lassar in Virchow's Archiv, Bd. 77, 1879, welche durch die oben mitgetheilten Fälle eine klinische Bestätigung erhalten.

sicht auf einen von Bradley¹⁾ glücklich behandelten Fall dieser Art, die Möglichkeit einer löslichen Grundlage immer im Auge zu behalten. Das Hauptsymptom der chronischen Nephritis war auch in diesem zarten Alter immer das Oedem, welches bei einem 7 Monate alten Kinde nur auf dem linken Handrücken und am linken Fusse bemerkbar war, die rechte Seite aber ganz versohnte. Ueberhaupt zeigte die chronische Form weder in den ersten Lebensjahren, noch bei älteren Kindern wesentliche Differenzen von demselben Leiden der Erwachsenen, und ich kann um so eher darüber hinweggehen, als Kinder im Allgemeinen weit seltener von dieser Krankheit beimgesucht werden. Ich zweifle auch nicht, dass viele Fälle von chronischer Nephritis, welche bei tuberkulösen, skrophulösen, durch Malaria-ochtham oder Syphilis erschöpften Kindern vorgekommen sein sollen, falsch aufgefasst worden sind und eigentlich der amyloiden Degeneration der Nieren angehören, deren schon an einer früheren Stelle (S. 524) gedacht wurde. Die Diagnose derselben ist leicht, wenn die Leber oder Milz deutlich angeschwollen sind, und eine bedeutende Cachexie durch Laes, Knochenveränderungen, Tuberkulose u. s. w. mit Oedem verschiedener Körpertheile und Albuminurie zusammenströmt. Fehlt dieser Symptomencomplex, besonders aber die Albuminurie, was ja bisweilen vorkommt, so kann nur von einer Vermuthung, nicht von einer Diagnose die Rede sein. —

Ich benutze diese Gelegenheit, um noch einige Worte über die hydropischen Erscheinungen hinzuzufügen, welche bei Kindern auftreten können, ohne dass der Urin Eiweiss oder mikroskopische Zeichen von Nephritis darbietet. Schon bei der Schilderung des Oedema neonatorum (S. 48) lernten wir eine Reihe verschiedener Ursachen kennen, welche dasselbe bedingen können. Ebenso verhält es sich nun mit den bei älteren Kindern auftretenden Oedemen. Besonders häufig sah ich Kinder in den beiden ersten Lebensjahren von einem Oedem der Hand- und Fussrücken, der Unterschenkel, der Wangen und Augenlider befallen werden, mitunter in dem Grade, dass die ersteren sich wie ein pralles Polster anfühlten. Dass nun solchen Fällen eine Nephritis oder eine angeborene Entartung der Nieren zu Grunde liegen kann, wurde eben erwähnt. In meinen Fällen aber bei der Urin nur sehr selten diese Charaktere dar; umgekehrt häufiger war er ganz frei von Eiweiss, wenn auch immer sehr sparsam und oft reich an harnsauren Salzen. Ich würde daher die Annahme einer Nephritis ganz ausschliessen, wenn mich nicht die über das Fehlen der Albuminurie bei dieser Krankheit (S. 555)

¹⁾ Hirsch-Virchow, Jahresber. f. 1871. II. S. 178.

gemachten Erfahrungen bedenklich gemacht hätten. In der That findet wir in einem solchen Falle, wo ein ausgebreitetes Oedem der Hautdecken und auch Ascites bestanden, der Urin aber nie albuminös gewesen war; demnach beide Nieren sehr derb, und ihre Corticalsubstanz durch massenhafte Neubildung von Bindegewebe indurirt, und hieran schlossen sich zwei von Dicksen¹⁾ bei ganz jungen hydropischen Kindern beobachtete Fälle von Nephritis der Tubulärsubstanz, in welchen der Urin ebenfalls nie Eiweiss enthalten hatte. Man wird sich also hier nicht mit dem Aussehen der Nieren begnügen dürfen, sondern eine mikroskopische Untersuchung derselben vornehmen müssen, und desshalb kann ich auch diejenigen Fälle, in welchen die letztere unterlassen wurde, nicht als massgebende betrachten, wenn auch das makroskopische Bild der Nieren aus völlig normal erschien. Ich hebe dies um so mehr hervor, als bei einem dieser Kinder auch die Leber durch Fettablagerung und interstitielle Bindegewebswucherung vergrößert erschien.

Ausser diesen, wie Sie sehen, noch nicht sprechenden Oedemen kommen nun bei Kindern, wie bei Erwachsenen, nicht selten solche vor, welche ganz unabhängig von einer Nierenaffectio durch erschöpfende Krankheiten bedingt werden, besonders durch Phthisis, langwierige Diarrhoe und Dysenterie, oder auch durch hochgradige Erkrankungen des Blutes, Leukämie und Pseudoleukämie. In einem grossen Theil dieser Fälle ist die Herabschwäche und die von dieser abhängende Stauung im Venensystem die nächste Ursache des Oedems, welches durch „marantische“ Thrombosirung grösserer Venen auf einzelne Theile, z. B. eine untere Extremität, beschränkt werden kann. Auch die zahlreichen Atelektasen des Lungengewebes, welche gerade bei erschöpften kleinen Kindern in Folge der herabgesetzten Inspirationskraft und der complicirenden Bronchialkatarrhe sich so leicht bilden, müssen durch die Stauungen, welche sie im Körpervenensystem veranlassen, die Entwicklung von Oedemen begünstigen. In dieselbe Kategorie gehört der Hydrops, welcher die Krankheiten des Herzens bei Kindern ebenso häufig begleitet, wie im späteren Alter.

Dass auch entzündliche Krankheiten der Haut, insbesondere Erysipelas, ein Oedem hinterlassen kann, wurde bereits (S. 42) erwähnt, und dasselbe beobachtete ich hierneben im Gefolge von Urticaria oder Erythema multiforme. Dabei kann die vorausgegangene Hautaffectio ganz unbedeutend geblieben sein, und erst die nachfolgende Anschwellung der Augenlider oder anderer Theile erweckte die Besorgniss der Eltern.

¹⁾ Hirsch-Virchow, Jahresber. C. 1871. II. S. 175.

Mitunter fehlt aber jedes ursächliche Moment, auf welches man das Oedem beziehen könnte, und man pflegt dann auf den gewöhnlichen Lückenbüsser, die Erkältung, zurückzukommen, die sich fast niemals sicher nachweisen lässt:

Georg Sch., 9jährig, aufgetrieben am 8. Oct. 1878 mit Oedem des Gesichts, des Scrotum und der Ynchaul, welches erst 24 Stunden bestehen soll. Vollständige Euphorie, sowohl zuvor, wie bei der Aufnahme. Ursache ganz unbekannt. Urin in jeder Beziehung normal. Nach der Application eines warmen Klistorkörpers auf das stark gespannte Scrotum hatte sich das Oedem derselben schon am 10. beträchtlich zurückgezogen; auch das Gesicht schwellte bei stetem Aufenthalt im Bett ohne irgend eine Medication schnell ab. Entlassung am 28. Der wiederholt erkrankte Fall war sonst normal geklärt.

Zuweilen treten solche Oedeme periodisch auf. Ich beobachtete dies z. B. bei einem 4jährigen Mädchen, welches im Laufe von etwa 3 Monaten 3—4mal oedematöse Anschwellungen der Füsse, Rücken, auch wohl der Hände und des Gesichts dazw. Diese bestanden jedesmal etwa eine Woche und waren mit einem allgemeinen Unbehagen, Verstimmung, einmal auch mit Erbrechen verbunden, ohne dass die wiederholte Untersuchung im Urin oder in irgend einem Organ etwas Abnormes ergab. Da die Ätiologie völlig dunkel war und die Blässe des Kindes an Anämie denken liess, so gaben wir Eisen und Chinin, letzteres wegen der Möglichkeit (?) einer Malariaeinwirkung, und erzielten damit rasche Heilung, deren Bestand ich indess nicht verbürgen kann.

Unter den localen Anlässen des Oedems ist noch die Compression einzelner Venen zu nennen, wie sie z. B. im folgenden Falle stattfand:

Kind von 1½ Jahren, stirbt am 7. April 1878. Während des Lebens starke Oedemate, Gaste Anschwellung vor und hinter dem rechten Ohr, wodurch daselbst ähnlich wie bei carcosen Erkrankungen der Schilddrüse, vom Kopfe abgedrängt wurde. Die Section ergab eine Milzarterienknochen des rechten Hirs, des Nies, Leber und Lungen, Verklebung der Bronchialdrüsen und eine Compression der rechten Vena jugularis externa durch ein verhärtetes Lymphgefäß. Nach dem Tode war das Oedem abgelaufen.

II. Störungen der Harnexcretion.

Abgesehen von der acuten Nephritis diffusa und den Tumoren der Niere (S. 537) bieten die Krankheiten dieser Organe im kindlichen Alter nichts Charakteristisches dar. Ich kann mich deshalb hier darauf beschränken, einige Worte über krankhafte Störungen der Excretion des Urins hinzuzufügen, welche uns gerade bei Kindern ungewöhnlich häufig entgegen treten. Ich gedenke zunächst der angeborenen Hydronephrose, welche durch eine congenitale Obliteration der Ureteren bedingt wird,

fast immer einseitig auftritt und nur ausnahmsweise klinisch erkennbar ist. Zu den seltensten Fällen dürfte wohl der eines 3wöchentlichen Kindes gehören, welches mit zwei grossen fluctuirenden und matt schallenden Geschwulsten beider Hypochondrien in meine Klinik aufgenommen wurde. Urin fehlte seit etwa 10 Tagen vollständig, sollte aber in der ersten Zeit des Lebens gelassen worden sein. Durch die Punction entleerte ich aus der linksseitigen Geschwulst eine Menge hämorrhagisch seröser Flüssigkeit, und die Section ergab, dass es sich um eine doppel-seitige Hydrocephale und markige Obliteration beider Uteren an der Austrittsstelle aus dem Nierenbecken handelte. Diese Obliteration konnte wenigstens auf der einen Seite erst nach der Geburt erfolgt sein, weil sonst eine Urinsecretion in den ersten Lebenstagen unmöglich hätte stattfinden können. Die bei der Punction entleerte Flüssigkeit stammte übrigens nicht aus der Hydrocephale selbst, sondern aus einer die ganze Niere umkapselnden, mit blutigem Serum gefüllten Cyste, in welche der Triebart hineingeralhen war, wahrscheinlich das Product eines im Fötusleben entstandenen peritonealen Hämatoms.

Etwas länger möchte ich Ihre Aufmerksamkeit für die durch Lithiasis bedingten Störungen in Anspruch nehmen.

Der harnsaure Infarct der geraden Harnkanälchen, welcher beim Neugeborenen constant vorhanden ist, wird zwar in der Regel innerhalb der ersten Lebenswochen ausgeschwemmt, ohne weitere Nachtheile zu hinterlassen; doch geschieht dies bisweilen nur sehr langsam, und ich fand sogar bei einigen Kindern von 7 bis 8 Wochen noch Reste des Infarcts, welche theils im Lumen der Tubuli, theils an den Papillen haften, oder auch wohl als kleine eitrliche Bröckel im Nierenbecken lagen. Der Reiz dieser kleinen Concremente kann ein schon sehr frühzeitig zu Beschwerden beim Urinlassen Anlass geben, welche anfangs unbeachtet bleiben, jedenfalls aber schwer zu deuten sind, weil die Untersuchung des Urins in diesem Alter überaus schwierig ist. Nicht selten werden Ihnen Kinder in den ersten Lebensmonaten zugeführt, welche beim Urinlassen oder vor demselben jedesmal heftig schreien, trotz starken und oft wiederholten Dringens immer nur wenige Tropfen entleeren und grosse Unruhe zeigen, so dass man an dem Vorhandensein von Schmerzen nicht zweifeln kann, während in den Intervallen das Allgemeinbefinden ungestört sein kann. Lässt man sich die Windeln zeigen, so findet man öfters die vom Urin durchflässen Stellen dunkeler als im Normalzustande gefärbt und ihre Ränder ins Röthliche spielend, mitunter auch sparsame sandkornartige gelbrothe Bröckelchen auf denselben. Auch kann der Urin unter diesen Umständen durch seine Säure nicht nur Brennen beim

Durchgang durch die Urethra erzeugen, sondern auch die Verkaustmung und die innere Fläche der Laben auf ihre Umgebung rüthen. Ganz dieselben Erscheinungen kommen nicht selten bei älteren Kindern vor, bei denen es sich wohl schwerlich noch um die verspätete Excretion des harnsauren Infarcts, sondern um ungebildete harnsaure Concremente (Gries) handelt, welche meistens als die Folge einer verkehrten Ernährungsweise anzusehen sind.

In allen Fällen, wo man es mit einer Dysurie junger Kinder zu thun hat, geräth man leicht in Verlegenheit, wie man sich dieselbe erklären soll. Nur da, wo kleine Harnsäureconcretionen in den Windeln, oder bei älteren Kindern im Urin selbst gefunden werden, steht die Diagnose ausser Zweifel, und es kommt dann, wie bei Erwachsenen, bisweilen zu einer katarthalischen Reizung des Nierenbeckens, welche ihrerseits wieder die Bildung des harnsauren Grieses begünstigt und zu Erscheinungen führen kann, welche denen der Pyelitis calculosa des späteren Lebensalters völlig entsprechen:

Frida R., 5 Monate alt, am 10. Januar 1874 in der Poliklinik vorgestellt. Vor 14 Tagen Kränkung mit Krämpfen und mähmähnten Zuckungen in allen Extremitäten. Einiges Aussetzen, Schweißhaufen Schreien vor und bei der Entleerung, welche trotz des heftigen Drängens nur tropfenweise erfolgt. Urin blaugelb, sehr trübe, enthält reichlich Albumen, keine Cylinder, aber massenhafte, das ganze Urinmahl bildende Eiterkörperchen, ausserdem nennlich zahlreiche punktförmige und stachelköpfige, zingeförmige, brüchige Concremente, welche unter dem Mikroskop als krystallinische harnsaure Bildungen erscheinen. Weiterer Verlauf nicht bekannt.

Schon früher (S. 170) theilte ich Ihnen den ähnlichen Fall eines 5 Monate alten Kindes mit, welches unter starker Dysurie kleine Concretionen entleerte und dabei an reflectorischen Ekranpiefanfällen und Contracturen vieler Muskelgruppen litt. Bei längerer Dauer dieses Zustandes kann sich der Katarth des Nierenbeckens allmählig durch die Ureteren auf die Blasen Schleimhaut verbreiten, und da bekanntlich der Blasenkatarrh die Steinbildung begünstigt, auch zur Entstehung einer Lithiasis vesicalis Anlass geben. Im Vergleich mit dem späteren Lebensalter kommen Blasensteine bei Kindern, und zwar schon während der ersten Lebensjahre, keineswegs selten vor, und es ist daher nothwendig, in jedem Falle von chronischer Dysurie, mag sie nun mit Blasenkatarrh verbunden sein oder nicht, eine Untersuchung der Harnsäure und der Blase in der Chloroformnarkose vorzunehmen. Die Entleerung des Urins ist dann bisweilen vollständig gehemmt, und trotz des heftigsten Drängens, wobei nicht selten Prolapsus ani stattfindet, werden nur wenige Tropfen entleert. Ich beobachtete sogar 36—48stündige Urin-

verhaltenen, wobei die Blase enorm ausgedehnt, oberhalb der Symphyse palpabel war und mit dem Katheter entleert werden musste, während zu anderen Zeiten statt dessen ein continuirliches Abtröpfeln des Urins aus der Urethra stattfand. In diesem Falle war die Umgebung der Genitalien anhaltend durchnässt, und der sich zersetzende Urin verbreitete nicht allein einen widerlichen Geruch, sondern versetzte auch durch seinen Reiz die Vorhaut, den Penis und das Scrotum in einen entzündlich-oedematösen Zustand. Bei älteren Kindern finden Sie dabei den Penis ungewöhnlich lang und entwickelt, wahrscheinlich in Folge der vielfachen Manipulationen, welche die Kinder mit demselben vornehmen, häufig auch eine schon (S. 489) erwähnte Neigung zum Mastdarmverfall, welche ich als ein nicht zu unterschätzendes Symptom der Lithiasis vesicalis in diesem Alter betrachte. Bisweilen wird durch ein in die Urethra gelangtes und hier stecken gebliebenes Concrement eine völlige Urinverhaltung mit Erythem und oedematöser Anschwellung der Genitalien hervorgerufen:

Alexander L., 2jährig, aufgenommen am 28. Nov. 1877, ziemlich gut genährt, aber stark. Seit 2 Tagen vollständige Urinverhaltung, tieble Röthung und starkes Oedem des Penis, Scrotum und Perineum. Vorhaut wegen einer Phimose nicht zurückzuziehen. Unterleib aufgetrieben, hart und empfindlich, indem die prallgefüllte Blase ein paar Finger breit die Symphyse überragt. Um den Katheter einführen zu können, musste zunächst die Phimose operirt werden, wobei aus dem Urethra urethra ein dunkel glänzend rötlichbrauner erbsengrosser Stein von schwefelgelber Farbe und kieseliger Beschaffenheit entzogen einer Sonde entfernt wurde. Der in die Blase eingeführte Katheter entleerte eine Menge trüben Urins. Das Oedem schwand unter Blutwasserumhüllungen rasch, aber in der Nacht vom 29. zum 30. Bruchstichfall mit schnellem Collaps. Tod am 1. Dec. Section: In der Blase ein kieselige ganz ausfüllender, hühnereigrosser, concentrisch geschichteter, schwefelgelber Stein mit einem Defect, welcher dem aus der Urethra entleerten Bruchstück entspricht. In den Kelchen der linken Niere ganz ähnliche erbsen- bis bohnen-grosse Steine; rechte Niere normal. —

Auch im Kindesalter kommen Dysurien vor, welche mit einer wirklichen Concrementbildung in den Nieren oder der Blase nichts zu thun haben. Schon der Durchtritt eines sehr sauren concentrirten Urins durch die Urethra, z. B. bei hochgradigem Fieber, kann Schmerzen bei der Harnentleerung zur Folge haben, welche sich durch Geschrei, bei älteren Kindern durch bestimmte Klagen kund geben. Durch einen mit harnsauren Salzen überladenen Harn können ferner Zufälle entstehen, die an die Nierenkolik Erwachsener erinnern. Bei zwei Kindern von 3—4 Jahren sah ich heftige, mitunter sogar von etwas Frost und Hitze begleitete Schmerzanfälle im Unterleibe auftreten, welche mehrere Stunden anhielten, bisweilen Tage lang hintereinander wiederkehrten und

jedesmal mit der Secretion eines trüben, mit kohlensauren Salzen überladenen und deutlich eiweißhaltigen Urins endeten, während in den oft Monate langen Intervallen der Anfälle das Wohlbefinden ungestört und der Urin vollständig normal war. Da während der Anfälle auch Uebelkeit und Stuhlverstopfung stattfand, so hatte man die Diagnose zunächst auf Darmkolik gestellt, bis endlich die Beschaffenheit des Urins Aufmerksamkeit erregte und die Untersuchung veranlasste. Wirkliche Gichtauscheidungen, die bei Erwachsenen wie bei Kindern eintreffende Prozesse im Nierenbecken und wohl auch im Parenchym hervorrufen können, wurden hier nie beobachtet; um so bemerkenswerther ist das Auftreten einer vorübergehenden Albuminurie im Schmerzanfalle, welche doch nur durch den Reiz des krankhaft veränderten Urins veranlaßt sein konnte. Der längere Gebrauch der Mineralwässer von Vichy, Wildungen, Idill, oder einer Lösung von Natrium bicarbonatum (3:100) leistete mir hier dasselbe gute Dienste, wie es unter ähnlichen Umständen im späteren Lebensalter der Fall zu sein pflegt.

Dass Sie in keinem Falle von Dysurie beim Kinde die Untersuchung der äusseren Genitalien vernachlässigen dürfen, brauche ich wohl kaum hinzuzufügen. Nicht selten werden Sie dabei eine Phimose finden, welche die Entleerung des Urins mehr oder weniger hemmt und Reste desselben hinter der Vorhaut zurückhält, welche sich hier ansetzen und einen entzündlichen Zustand des Präputium, Balanitis und schmerzhaftes Dysurie hervorrufen können. Auch einen völlig entwickelten Tripper mit heftiger Dysurie, welcher durch Manipulationen von Seiten eines anderen Knaben entstanden, so sehr schön, beobachtete ich bei einem 3jährigen Kinde. Weit seltener findet man angeborene Anomalien der Urethralmündung. So sah ich bei einem 7 Monate alten Knaben an Stelle der letzteren nur eine schwache Furche, während der Urin aus 3 punktförmigen Oeffnungen, welche sich neben dieser Furche befanden, in drei dünnen Strahlen hervorspritzte. Für alle solche Fälle kann natürlich nur eine operative Behandlung in Betracht kommen. Dasselbe gilt von der bei kleinen Mädchen hie und da vorkommenden Adhäsion der beiden kleinen Schamlippen, welche, wie die ähnliche Verwachsung der beiden Vorhautplatten bei Knaben, in der ersten Lebenszeit fast constant ist, mitunter aber auch bis ans Ende des ersten Jahres und länger sich hinzieht, gewöhnlich mit dem Stiel des Scapells trennbar ist, und nur selten eine Incision erfordert. In einzelnen Fällen schien mir diese Adhäsion die Ursache von Dysurie zu sein, welche sich nach der Trennung der Labien von einander alsbald erledigte; in anderen entdeckte man bei der Untersuchung eine eintreffliche Röhre des Introitus

und der Urethralmündung mit vermehrter Schleimsecretion, welche die Urinsecretion schmerzhaft machte.

Bei weitem häufiger aber, als durch die bisher erwähnten Störungen, wird ihre Hülle durch eine andere, die Eltern beunruhigende Affection in Anspruch genommen werden. Ich meine die Enuresis, und zwar besonders die nächtliche. Nicht bloss Kinder in den ersten Lebensjahren, sondern auch solche, welche die zweite Dentition bereits überschritten haben und sich der Pubertät nähern, leiden nicht selten an diesem Uebel, über dessen Ursachen wir so wenig wissen, dass der Zweifel, ob man es hier mit einem krankhaften Zustande oder mit einer Angewohnheit zu thun hat, nicht ohne Berechtigung ist. Das „Bettpissen“, welches fast ebenso oft bei Mädchen wie bei Knaben vorkommt, erfolgt entweder schon während der ersten Stunden des Schlafes, oder erst später, selbst gegen Morgen, ein- oder mehrere Mal in der Nacht, bald allmählich, bald mit tage- oder selbst wochenlangen Pausen, welche man besonders während des Verlaufs acuter Krankheiten zu beobachten pflegt. Schon die verschiedenen Ansichten der Aerzte von der Natur dieses Uebels, besonders aber die Menge und Verschiedenheit der empfohlenen Mittel bekunden, dass es sich hier nicht immer um eine und dieselbe Ursache handeln kann. Vor allem rathe ich Ihnen, in keinem Falle die Untersuchung des Urins zu vernachlässigen, weil Fälle von Diabetes mellitus, auch von chronischer Nephritis bekannt sind, welche sich zuerst durch Enuresis nocturna ankündigen. Mir selbst ist indess bis jetzt kein solcher Fall vorgekommen, und ich muss daher diese Ursache der Enuresis für eine äusserst seltene halten. Der nächste Grund des Leidens liegt entweder in einer Atonie des Sphinkter vesicae oder in einem Krampf des Detrusor urinae, welcher die im Schlaf minder kräftige Contraction des Schliessmuskels zu überwinden vermag. Die erste Art scheint mir die seltenere zu sein und sich, wenn auch nicht constant, doch zeitweise mit einer Enuresis diurna zu verbinden. Wo dies der Fall ist, liegt immer der Verdacht einer Lithiasis vesicalis nahe, und die Untersuchung der Blase sollte dann nie verabsäumt werden. Bei sonst gesunden Kindern hat in der That die Annahme einer lediglich auf den Sphinkter vesicae beschränkten Atonie immer etwas Gezwungenes, und nur in einzelnen Fällen, wo ein erheblicher Schwächestand, z. B. nach einem überstandenen Typhus oder einer anderen schweren Krankheit, oder ein materielles Leiden des Rückenmarks vorliegt, scheint mir diese Annahme gerechtfertigt zu sein. Besonders in letzterem Falle findet mitunter ein continuirliches Akröpfeln des Urins statt, und nur selten gelingt es den Patienten, denselben in der Blase

zu sammeln und in einem Strahl zu entleeren. Ein charakteristisches Beispiel dieser Art von Enuresis, und zwar von der Kindheit an, bot mir ein 13jähriger Knabe, welcher am untersten Theil der Lumbalwirbelsäule eine dicke, teigige, etwa hühnerreiznasse Geschwulst zeigte, in deren Mitte ein Defect der Prost. spinos. deutlich fühlbar war, wahrscheinlich der mit Fett und Granulationsgewebe ausgefüllte Sack einer Spina bifida¹⁾. Derselbe Knabe litt auch an unfreiwilliger Defecation, sobald der Stuhlgang nicht ganz fest war. Nur für solche „atonische“ Fälle passt die vielfach empfohlene Behandlung mit tonisirenden Mitteln (Eisen), mit Ergotin und Strychnin (innerlich oder subcutan), Mittel, von denen ich selbst aber noch keinen Erfolg gesehen habe. Jedenfalls beweist dies die grosse Seltenheit dieser „atonischen“ Enuresis. Auch die in neuester Zeit wieder gerühmte Elektricität, welche direct auf den Mastdarm applicirt wurde, um von da aus reflectorisch den Sphinkter vesicae anzuregen²⁾, wirkt, wenn überhaupt, wohl mehr durch den psychischen Eindruck, worauf ich bald zurückkommen werde.

Anders verhält sich die gewöhnliche Enuresis nocturna, bei welcher der Urin immer im Strahl, und zwar ausschließlich während des Schlafes oder im halbawachen Zustande entleert wird. Hier scheint in der That ein Reflexreiz auf den Detrusor stattzufinden, der um so kräftiger wirkt, als der Willenseinfluss auf den Sphinkter während des Schlafes beseitigt ist. Daher ist es vor allem die Aufgabe des Arztes, die Stätte, von welcher dieser Refleximpuls ausgeht, aufzufinden, und in der That gelingt es hinwieweil, eine congenitale Phimose, eine Stricture der Urethra, den Reiz von Ascariden, eine Fissur des Mastdarms, auch wohl Onanie oder eine Vulvitis aufzufinden, welche das Leiden veranlassen, und mit deren Beseitigung auch die Enuresis wehrt. Ebenso können Nieren- und Blasensteine, ja schon die Überladung des Urins mit Lithias, oder Phosphaten einen solchen Reiz ausüben, und es muss dann der Versuch mit einer Behandlung dieser Absonderungen gemacht werden. Leider wird es Ihnen aber in der Mehrzahl der Fälle nicht gelingen, die oben erwähnten krankhaften Zustände nachzuweisen, oder durch die Behandlung derselben die Enuresis zu heben. Man behält sich dann gewöhnlich mit der Annahme einer Hypersecretion des Collum vesicae oder der ganzen Blasenwand, ähnlich wie in vielen Fällen von Pollutionen Erwachsener, mit welchen die Enuresis nocturna auch nach dem Uebersand

¹⁾ Aehnliche Fälle theilt Blake, Amer. Journ. f. Urolog. 1878, p. 146 mit. In dem einen derselben war die Exstrophie angeblich bis auf eine normalere Functionsfähigkeit der Blase und des Rectums.

²⁾ Ullmann, Central-Ztg. f. Kinderk., J. No. 22.

gemein hat, dass sie vorzugsweise in der Rückenlage erfolgt und häufig durch Traumbilder, welche direct auf den Detrusor zu wirken scheinen, ausgelöst wird. Für alle solche Fälle glaubte man den sedativen Mitteln, zumal der Belladonna (Extr. bellad. 0.005—0.01) Vertrauen schenken zu dürfen, welches ich nach meinen Erfahrungen nicht theilen kann. Andere empfehlen das häufige Einführen von Bougies in die Harnröhre oder die Kauterisation des Blasenhalbes, um die Empfindlichkeit desselben abzustumpfen. Ich will die Möglichkeit eines Erfolgs dieser Mittel keineswegs bestreiten und glaube, dass sie in sehr hartnäckigen Fällen immer eines Versuches werth sind, nur vergesse man nicht, dass dabei der psychische Eindruck, den diese Manipulationen und der erregte Schmerz auf die kleinen Patienten machen, mit in Betracht kommt, zumal da die Möglichkeit einer Angewöhnung doch nicht absolut auszuschliessen ist. Den Beweis dafür lieferten mir ein paar Fälle von Incontinenz der Fäces, welche überraschend schnell geheilt wurden:

Im October 1879 wurde ein 5-jähriger Knabe in der Poliklinik vorgestellt, der schon seit 2 Jahren, besonders aber nach einem vor Jahreszeit überstandenen Typhus seinen Stuhlgang nicht halten konnte, sondern täglich mehrere Mal, aber nie während der Nacht, denselben in die Hosen entleerte. Urinexcretion normal. Allgemeinbefinden ungestört. Die Untersuchung des Rectum ergab keine Abnormität, auch einen fast schliessenden Sphincter an. Nach fruchtloser Anwendung der Nux. vomica wurde Ergotin 0,1 neben dem Aase salicatum injicirt, und schon die erste Injection hatte vollen Erfolg. Nach drei Tage darauf war die Defecation normal, und ich empfahl der Mutter, beim Wiedersinntritt der Incontinenz sich sofort wieder zu melden, was indess nicht geschah.

Ganz ähnlich verhielten sich drei andere Fälle, welche auf dieselbe Weise, aber erst nach der zweiten Injection geheilt wurden, zu welcher indess, der Probe wegen, nur destillirtes Wasser genommen wurde. Durch ein paar energische Schläge auf die Nates wurde die Cur wesentlich unterstützt.

Dass hier nur der psychische Eindruck der Injection, d. h. die Furcht vor dem Einstechen der Spritze und der darauf folgenden Application von Schlägen, wirkte, wird wohl Niemand bestreiten, und ich glaube daher, dass auch manche Fälle von schneller Heilung einer Enuresis nocturna durch schmerzhaftes Eingriffe oder Paraisation in gleicher Weise zu beurtheilen sind. Unter allen Umständen ist eine Beschränkung des Trinkens vor dem Schlafen und möglichsame Vermeidung der Rückenlage anzurathen, zu welchem Zwecke man das Umkleiden einer Bürste, deren Borsten die Haut des Rückens berühren, empfiehlt. Viele Fälle leiden auch vergeblicher Anwendung verschiedener Mittel schliesslich

von selbst, manche erst zu einer Zeit, wo bereits die Pubertätsentwicklung vor sich geht.

III. Krankheiten der äusseren Genitalien.

Bei der grossen Seltenheit von Affectionen der inneren Geschlechtsorgane, z. B. der Ovarialtumoren, im Kindesalter, und bei der grösstentheils der Chirurgie anheimfallenden Natur der äusseren Erkrankungen, kann ich mich hier auf wenige Mittheilungen beschränken. Zunächst komme ich auf eine schon (S. 575) berührte Thatsache zurück, welche trotz der Arbeiten von Bokai und Schweigger-Seidel¹⁾ vielen Aerzten noch ganz unbekannt zu sein scheint. Ich meine die Verklebung der inneren Platte des Präputium mit der Eichel durch ein mehr oder weniger straffes Gewebe, welches auch da, wo keine Spur von Phimose vorhanden ist, die Zurückschiebung der Vorhaut nur theilweise gestattet. Versucht man dies, so stösst man bald auf ein Hinderniss und überzeugt sich, dass die innere Platte der Vorhaut mit der Oberfläche der Glans verachsen ist, und zwar um so länger und ausgedehnter, je jünger die Kinder sind. Diese Adhäsion, welche in der ersten Zeit des Lebens als der Normalzustand zu betrachten ist, kann noch bei Kindern von 4—5 Jahren, ja noch später vorkommen, wenn sie auch mit dem zunehmenden Alter immer beschränkter und schlaffer wird. Die verklebende Schicht besteht aus gewöhnlichen polymorphen Epidermiszellen, und kommt wahrscheinlich dadurch zu Stande, dass die aus dem Rete Malpighi an die Oberfläche tretenden Zellen nicht in normaler Weise verhornen, sondern mit Protoplasma gefüllt bleiben und die Verklebung der beiden Flächen vermitteln. Die bei weiblichen Kindern bisweilen vorkommende Verklebung der kleinen Labien, welche ich schon oben (S. 575) als Ursache von Dysurie berührte, muss wegen ihrer Seltenheit wohl mehr als ein pathologischer Vorgang aufgefasst werden, der zwar auf dieselbe Weise zu entstehen scheint, wie die Adhäsion der Vorhaut, aber nur dann, wenn die kleinen Schamlippen ihrer ganzen Länge nach sich gegenseitig berühren²⁾.

Nicht ganz selten (etwa 10mal unter 100 Neugeborenen) beobachtet man die Kryptorchie, d. h. den Mangel eines, seltener beider Hoden im Scrotum. Im normalen Zustande passiert der Hoden den Inguinalkanal im 2. Monate des Fötuslebens; zuweilen geschieht dies aber erst nach der Geburt, so dass man erst am 2. oder gar am 30. Lebenstage

¹⁾ Virchow's Arch. Bd. 27, Heft 2. — Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. V, 1. Heft.

²⁾ Bokai, Jahrb. f. Kinderheilk. 1872, S. 163.

den Vorgang beendet sieht. Eine ungewöhnliche Enge des Leisteninges oder entzündliche Prozesse, welche Adhäsionen des Hodens herbeiführen, können nun das Herabsteigen des letzteren verhindern, wenn er entweder in der Bauchhöhle oder vor dem Annulus inguinalis fixirt bleibt, und zwar bisweilen fürs ganze Leben, ohne dass daraus Nachteile für die Functionen der Genitalien erwachsen. Die Diagnose der Kryptorchie ist leicht: Sie finden das Scrotum klein, auf einer oder gar auf beiden Seiten leer, während der Hoden meistens von natürlicher Grösse, zuweilen aber durch serösen Erguss im Scheidenkanal bis zur Grösse eines Tauberezes und darüber geschwollen, vor oder hinter dem Leisteninge bald mehr bald weniger deutlich fühlbar, auch wohl bei loserer Fixirung etwas verschiebbar ist. Im Allgemeinen soll der rechte Hoden häufiger, als der linke, im Scrotum fehlen. Verzögert sich das Herabsteigen desselben ungewöhnlich lange, z. B. bis ans Ende des ersten Lebensjahrs, so ist dabei wohl immer die Bildung eines Inguinalbruchs zu fürchten. Nur selten kommt es bei Kryptorchie zur Einklemmung des Hodens im Leistenkanale mit sehr heftigen Schmerzen und consecutiver Entzündung, welche eine absolut ruhige Lage und die Anwendung antiphlogistischer Mittel (Eis, Blütegel) erheischt; gegen die Kryptorchie lässt sich nichts thun. Schliesslich sei noch erwähnt, dass im normalen Zustande bei sehr straffer Contraction des Scrotum die Testikel durch den Cremaster so hoch hinaufgezogen werden können, dass man sie vor dem Annulus inguinalis fühlt und erst, wenn das Scrotum erschlafft, sich davon überzeugt, dass Kryptorchie nicht vorliegt.

Krankheiten des Hodens kommen, abgesehen von der häufigen Hydrocele, bei Kindern nur selten vor. Ich erinnere Sie hier an die früher (S. 95) erwähnten Anschwellungen im Gefolge der hereditären Syphilis, die nach meiner Erfahrung häufiger zu sein scheinen, als die hier und da beobachteten und mit denen der Erwachsenen ganz übereinstimmenden Mollarsarkome und Echinodrome. Auch die Tuberkulose und käsige Entartung des Hodens ist im Verhältnisse zu der enormen Frequenz dieser Prozesse in anderen Theilen immerhin selten, wenigstens als klinischer Befund. Mir selbst kamen nur wenige Fälle dieser Art bei Kindern zwischen 1½ und 7 Jahren vor. Die Schwellung betraf gewöhnlich den einen oder beide Nierenhoden, welche dabei hart und höckerig erschienen, und zog nur selten den Testikel selbst schliesslich in ihren Bereich, wobei dann knötige Tumoren von Wallnuss- bis Apfelgrösse entstanden, welche durch den Hinzutritt einer Hydrocele noch vergrössert wurden, von Zeit zu Zeit sich entzündeten, aufbrachen und einen käsigen Eiter entleerten. Fast immer war dabei Tuberkulose

andere Organe, Caries verschiedener Knochen, einmal auch chronische Peritonitis mit Durchbruch am Nabel nachweisbar. Eine locale Behandlung (Incision und Kataplasmen) kann nur im Falle der Eiterung Platz greifen, während man sich sonst auf die Anwendung von Opium, Jodessenz und Salzbadern beschränken muss.

Bei kleinen Mädchen beobachtet man bisweilen schon in den ersten Lebenstagen sparsame oder etwas reichlichere Vaginalblutungen, welche mit der um diese Zeit stattfindenden reichlichen Epithelabstossung zusammenhängen scheinen und ohne Nachtheil ertragen zu werden pflegen. Frühzeitige Menstruation im 11. — 12. Lebensjahre ist nicht gerade selten, der Eintritt derselben vor diesem Termin, z. B. schon im 8. oder 7. Jahre³⁾ gehört indess zu den Ausnahmen. Uebrigens muss man sich hüten, jede Blüthe aus den Geschlechtstheilen kleiner Mädchen als ein Zeichen frühzeitiger Menstruation aufzufassen. Die Quelle derselben liegt vielmehr, wie die Untersuchung ergibt, bisweilen in Papillomen der Vulva und Vagina, oder in einer polypösen Wucherung der Urethra. Aus der Mündung derselben drängt sich dann ein dunkelrother, leicht blutender Wulst hervor, welcher so gross werden kann, dass er die Schamgasse auseinander treibt. Der dabei oft stattfindende Urindrang wird leicht übersehen, während erst die Blüthe die Aufmerksamkeit der Mütter erregt. In zwei Fällen dieser Art, welche auf meiner Klinik bei Mädchen von 7 resp. 10 Jahren beobachtet wurden, erzielten wir durch Excision der gewucherten und prolapsirten Urethralabschleimhaut nach einigen Wochen Heilung.

Die häufigste Erkrankung der Genitalien kleiner Mädchen bildet unstreitig die Vulvitis. In der Regel werden diese Kinder ihnen zugeführt, wenn bereits seit einigen Tagen oder Wochen ein schleimig-eitriger Ausfluss aus den Geschlechtstheilen bemerkt worden ist, und bei der Untersuchung sehen Sie dann eine purulente Flüssigkeit aus den Genitalien hervorquellen, welche an der inneren Fläche der Labien und Oberschenkel öfters zu dünnen Borken vertrocknet und, wie der Fluss albus der Erwachsenen, zu den Waschen steife, grünlich gelbe Flecken macht. Die Schleimhaut des Introitus vaginae ist dabei in verschiedenen Grade geröthet, auch wohl leicht erodirt, und die grossen und kleinen Labien sind nicht selten etwas angeschwollen und empfindlich. Häufig ist Dysurie damit verbunden, und manche Kinder wollen nicht mehr

³⁾ Osterr. Zeitschr. f. Päd. 1877. VIII. Bd. I. S. 26. — Deutsche Zeitschr. f. prakt. Med. 1878. S. 457.

gehen, weil ihnen die untermittelliche Reibung der entzündeten Theile Schmerzen verursacht.

Man ist sehr geneigt, in solchen Fällen sofort an den Versuch eines Stuprum zu denken, und meine eigene Erfahrung lehrt mich leider, dass dieser Verdacht beweilen begründet ist. Ich verfüge über eine ganze Reihe von Fällen bei 4 bis 11-jährigen Kindern, welche als Opfer der Rohheit, Entsittlichung oder eines gewissen Aberglaubens gefallen waren, sei es nun, dass wirklich ein gewaltsamer Versuch, das Penis einzuführen, oder unrichtige Manipulationen mit den Fingern stattgefunden hatten. Bisweilen musste sogar ein älterer Bruder, der mit dem Kinde zusammenschief, als der schuldige Theil angesehen werden. Eine Zerreissung des Hymen fand dabei nur selten statt, da die Enge der Theile kein vollständiges Eindringen des Penis gestattete. Aber trotz dieser Erfahrungen rathe ich ihnen, mit der Annahme eines Stuprum recht vorsichtig zu sein, weil es nicht selten vorkommt, dass die Mütter, welche diese Ursache angeben, sich selbst täuschen oder den Arzt hintergehen, um von diesem ein zu unlauteren Zwecken verwendbares Attest zu erlangen. Nur in ganz unzweifelhaften Fällen dürfen Sie auf dies Verlangen eingehen, da ausser dem gewaltsamen Versuch des Coitus doch auch andere Ursachen der Vulvitis in Betracht gezogen werden müssen. Schon die Unreinlichkeit, die stete Anhäufung von Sebum zwischen den Labien kann einen Reizzustand herbeiführen; noch intensiver wirken die häufigen Manipulationen der Kinder selbst oder ihrer Gespielen an den Genitalien, und der Reiz von Ascariden im Rectum, welcher zum häufigen Kratzen des Anus und seiner Umgebung antreibt (S. 493). Wo diese Anlässe fehlen, kann man wohl auch an die Möglichkeit einer localen Erkältung denken, welche indess fast niemals sicher nachzuweisen ist. Eine Ansteckung durch Tripper oder Fluor albus der Angehörigen, wie sie Pott¹⁾ für die grösste Zahl dieser Fälle von Vulvitis annimmt, lag, so weit meine Erfahrung reicht, nur selten vor; doch gebe ich gern zu, auf diesen Punkt nicht durchweg aufmerksam gewesen zu sein.

Zu den bisher erwähnten Symptomen der Vulvitis treten nicht selten noch Erosionen und Ulcerationen der kleinen oder grossen Schamlippen, welche den Verdacht einer syphilitischen Infection zu verstärken geeignet sind. In den meisten Fällen aber, wo sogar ein Stuprum unser Zweifel stand, war der Eindruck der Kranken doch nur derjenige einer traumatischen, durch äussere Gewalt erzeugten Entzündung, und

¹⁾ Jahrb. f. Kinderheilk. XIX. 1832. S. 71.

nur sehr vereinzelte Fälle von wirklichen Schankern bei 11–13jährigen Mädchen, welche bereits der *Venus vulgivaga* opferter, machten davon eine Ausnahme. Sonst handelte es sich immer nur um oberflächliche Substanzverluste, welche der *Maceration* durch das eitrige Secret und der Reibung zugeschrieben werden mussten. Bisweilen kam es auch zum Ausbruch vieler gruppenweise auf den gerötheten grossen Labien beisammensiehender Herpesbläschen, die ganz wie Zoster aussahen, aber doppelseitig auftraten und sich über das Perineum bis zum Anus hinogen.

Die Behandlung, welche wir gegen die *Vulvitis* in Anwendung brugen, bestand, abgesehen von den sehr seltenen syphilitischen Fällen, in einer absolut ruhigen Lage, blassigen Fomentationen mit Bleiwasser, und wo diese nicht bald wirkten, in Einspritzungen desselben, sowie von Tannin oder Alann (5:100), *Zincum sulphuricum* (2:100) und *Argent. nitricum* (1:100) in die Vagina. Nicht selten war es nöthig, den Kindern das Kratzen an den Genitalien durch Einwickeln der Hände unmöglich zu machen. Trotzdem vergingen oft viele Wochen, bevor das Uebel als gänzlich gehoben betrachtet werden konnte. Pott empfiehlt als sehr schnell wirkendes Mittel, Jodoform (5 Th. und 1 Th. Gummi arab.) mit einem Gummigebläse durch ein dünnes Speculum in die Scheide hineinzublasen, oder Jodoformbeleges von 5–8 Ctm. Länge und von der Dicke eines dünnen Bleistifts in der Vagina schmelzen zu lassen. Der Eiternussfluss soll dadurch mit einem Mal *expiri* werden.

In einer anderen Reihe von Fällen handelt es sich nicht bloss um eine entzündliche Affection der Schleimhaut, sondern von vorn herein bildet sich eine umfängliche, mehr oder weniger harte und entzündliche Anschwellung einer grossen Schamlippe, welche gewöhnlich auf diese beschränkt bleibt, seltener auf die andere und selbst auf den *Mon. venerea* übergreift. Dabei kann die Schleimhaut des Introitus und die äussere Haut der Schamlippen ganz intact und das Allgemeinbefinden ungestört sein, und nur einmal bei einem 3jährigen Mädchen sah ich gleichzeitig *Urticaria* auftreten. Die Ursache dieser Anschwellungen konnte ich niemals sicher constatiren. Unter fortgesetzten Fomentationen mit lauem Bleiwasser bildeten sie sich entweder innerhalb 8 bis 14 Tagen zurück, oder gingen unter zunehmender Röthe und Schmerzhaftigkeit in Abscess über, welche frühzeitige Incisionen erforderten.

Von diesen einfach entzündlichen Anschwellungen muss man eine andere weit bedenklichere Art unterscheiden, welche eine starke Neigung zum gangränösen Zerfall der betroffenen Theile zeigt. Der Brand der Vulva kann zwar schon aus einer einfachen, sehr harten

Anschwellung des Labium bei intacter Schleimhaut und Ötis hervorgehen, häufiger aber ist er die Folge einer von der Oberfläche der Schamlippe mehr und mehr in die Tiefe dringenden und mit diphtheritischen Auflagerungen bedeckten Ulceration. In die erste Kategorie gehört der folgende Fall:

Maria K., 2jährig, aufgenommen am 26. Februar 1874, von tödlichem Aussehen. Seit 4 Tagen zunehmende Rote Anschwellung der linken grossen Schamlippe, welche nacheinander dunkelroth erscheint und an der inneren Fläche einen höhligen Rand grünen mit einem völlig schwarzen Rande umgebenen Substanzverlust zeigt, welcher erst seit 1½ Tagen bemerkt worden sein soll. Dabei blasser Puls (Ab. 40/3; P. 100—120). Sonst alles normal. Kräftige Application des Glüh Eisens auf die heftigste Partie und ihre Umgebung. Schon am folgenden Tage Puls bereits normal (Mg. 36/8; Ab. 38/3; P. 116). Am 4. März Abklemmung des Esmarch'schen unter Zurücklassung einer neuen Wundfläche. Vollige Heilung nach kurzer Zeit.

Die schnelle Wirkung des Glüh Eisens, sowohl auf das Fieber, wie auf den localen Process spricht entschieden für eine rein örtliche, vielleicht traumatische Ursache des letzteren, welche schnell eine ausgebreitete starke Infiltration der ganzen Schamlippe und Nekrose derselben herbeiführte. Häufiger beobachtet man die zweite Form, bei welcher zuerst eine dunkle livide Röthe des Labium und der benachbarten Schleimhaut auftritt, die Epidermis sich in Blasen abhebt oder sternförmig abstösst, und schliesslich schmutzig grau oder blauschwarz Ulcerationen, besonders an der inneren Fläche beider Labien zu Stande kommen. Die letzteren sind induratis, oder steinhart infiltrirt und geschwollen. Die Geschwüre bedecken sich sehr bald mit einer gelblich grauen oder schwärzlich grünen bröcklichen Beaufschicht und greifen rasch in die Tiefe, so dass nicht bloss ganze Stücke der Schamlippe weggerissen werden, sondern auch ein Uebergreifen des Brandes auf die Schleimhaut der kleinen Labien und die Vaginalöffnung stattfinden kann. Sie finden hier also eine völlige Analogie mit dem Noma der Wange, welches, wie ich (S. 434) erwähnte, sowohl von der Schleimhaut wie von der Dicke der Wange selbst ausgehen kann. Auch die Ursachen der Gangraena vulvae stimmen mit denen des Noma fast durchweg überein, allgemeine hochgradige Cachexie verkommener Kinder, vorausgegangene Infectionskrankheiten (besonders Miasm, Scharlach und Typhus) und gangränöse Processen in anderen Körpertheilen. Das letztere beobachtete ich z. B. bei einem 12jährigen phthisischen Mädchen, bei welchem sich Langenbrand und schliesslich gangränöser Zerfall der Schamlippen entwickelte¹⁾. Unter diesen Umständen ist natürlich von vorn herein eine

¹⁾ Charité-Analen. Jahrg. I. S. 618.

ganz schlechte Prognose zu stellen, während in minder ungünstigen Verhältnissen die Hoffnung nicht aufgegeben werden sollte. Wir fomentirten und verbanden die brandigen Partien mit Carbonsäure (2–3 pCt.), *Vinum camphoratum*, Chlorzinklösung (0,3 : 100,0). Im Nothfall muss aber auch hier das Glüheisen applicirt werden¹⁾. Bei starker Härte und Geschwulst des Lohms dürften auch tiefe Incisionen zu empfehlen sein, um die Spannung zu heben und den Uebergang in Nekrose zu verhüten. Wenigstens sah ich bei einem 3jährigen Mädchen, dessen rechte, mit einem pfennigstückgrossen Geschwür bedeckte Schamlippe sehr voluminös und steinhart geworden war, nach 3 Einschnitten, welche nur Blut, aber keinen Tropfen Eiter entleerten, die Härte rasch abnehmen und binnen wenigen Tagen ganz verschwinden.

Achter Abschnitt.

Die Infektionskrankheiten.

Meinem Princip getreu, werde ich mich auch bei der Schilderung der Infektionskrankheiten lediglich auf die für die ärztliche Praxis bedeutsamen und durch die Erfahrung sicher gestellten Thatsachen beschränken, so nahe es auch liegt, sich gerade hier über diese feste Grenze auf das unichere Gebiet der Hypothese hinauszuwagen. Unleugbar lassen Befunde wie die Sporellen der *Bacillus* oder die Bacillen des Milcheandes und der Tuberculose²⁾ auch für andere Infektionskrankheiten etwas Analoges vermuthen; bis jetzt aber fehlt jede sichere Beobachtung, und das Wesen des Infektionsstoffes, welcher Krankheiten, wie die Masern, das Scharlachfieber, die Diphtherie, producirt, ist uns vorläufig unbekannt. Die Sicherheit, mit welcher viele, besonders jüngere Aerzte sich über die Bakterien der Diphtherie aussprechen, erscheint mir im hohen Grade irthümlich. Denn ganz abgesehen von der nicht über jeden Zweifel erhabenen Pilznatur aller jener feinkörnigen Massen, welche man als „Diphtheriespilze“ beschreibt, muss man doch zugeben, dass die in der Atmosphäre stets massenhaft verbreiteten Keime kleinsten

¹⁾ Farrel (*Revue de med.* 16. Mars 1881) empfiehlt die brandigen Partien dick mit Jodoform zu bestreuen, Charcot darauf zu liegen und diesen Verband alle 24 Stunden zu erneuern.

²⁾ Die Untersuchungen über die Stäbchenbakterien des Typhus sind wohl noch nicht als abgeschlossen zu betrachten.

Organismen sich auf kranken, mit Zersetzungsprodukten imprägnirten Theilen am schnellsten entwickeln und vervielfältigen werden, und dass sie von hier aus durch den Lymph- oder Blutstrom auch leicht in tiefer gelegene, selbst entfernte Theile gelangen können. Ich denke dabei immer an einen in meiner Klinik vorgekommenen Fall von Diphtherie des Pharynx, in welchem die Section sowohl in den Lungen, wie auf den Herzklappen Conglomerate jener „kleinsten Organismen“ nachwies, welche offenbar von den tief gelegenen Tonsillen her durch den Lymphstrom importirt waren. Hängen aber diese Vorgänge mit dem Wesen der Krankheit selbst in der That zusammen? mit demselben Rechte kann man wohl behaupten, dass die letztere nur die Eingangspforten, durch welche jene Elemente in den Körper eintreten können, eröffnet. Möge immerhin, wer da will, meine Skepsis verhöhnen, ich werde mich, so lange nicht entscheidendere Beweise als bisher vorliegen, nicht darin beirren lassen und am so kühler bleiben, als, wie wir bald sehen werden, die „bakterientödtenden“ Mittel in der Therapie der Infektionskrankheiten bis jetzt gar keine Erfolge zu verzeichnen haben. —

Bevor ich auf die einzelnen Krankheitsprozesse näher eingehe, will ich einen Punkt berühren, welcher bis auf die neueste Zeit vielfach Controversen angeregt hat, ich meine das gleichzeitige Auftreten verschiedener acuter Infektionskrankheiten in einem und demselben Individuum. Am häufigsten sehen wir acute Exantheme, besonders die Masern, weit seltener Diphtherie sich im Verlaufe eines Keuchstosses entwickeln und gleichzeitig mit diesem bestehen, der doch ohne Zweifel auch zu den infectiösen Krankheiten gerechnet werden muss. Die Literatur hat aber auch eine Reihe von Fällen aufzuweisen, in welchen zwei verschiedene acute Exantheme nebeneinander in demselben Körper bestanden und ein nicht leicht zu deutendes Krankheitsbild darstellten. Wenn auch gewiss nicht alle Beobachtungen dieser Art vor einer strengen Kritik Stand halten dürften, manche vielmehr auf einer Verwechslung mit recidivirenden Scharlach- oder Masernexanthemen oder mit Erythemen zu beruhen scheinen, so bleibt doch noch immer eine Anzahl von sicher constatirten Fällen übrig, zu welchen ich auch einige von mir selbst beobachtete zählen zu dürfen glaube:

FRANZ K., 9 Jahre alt, aufgenommen am 4. März 1875 mit Variöellen, welche seit zwei Tagen bestehen. Der ganze Körper ist mit den charakteristischen, zum Theil gefüllten Bläschen bedeckt, einzelne sind auch am harten Gaumen sichtbar. T. 38.0; Ab. 38.5. Am folgenden Tage kam es auch zu einzelnen Nachschüben auf den anderen Extremitäten, während ein Theil der Bläschen sich eintrocknete, ein anderer eintrocknete. Am 7. tritt kein Fieber, aber Klagen über Schmerz beim Schlucken, Angina. Abends Ausbruch von Scarlatina mit 40.0, welche am folgen-

den Tage sich diffus entwickelte, und nur das interessante Bild einer starken Hautröthe darbot, auf welcher die theils eingetrockneten, theils noch mit Eiter gefüllten Variolen gestirnt sich abhoben. Der weitere Verlauf normal. Entlassung am 11. April.

Die Ansteckung des Knaben mit Scharlach war hier wahrscheinlich in der Klinik erfolgt, wo er 36 Stunden lang in der für Infectionskrankheiten bestimmten Abtheilung, die zum Theil mit Scharlachkranken belegt war, gelegen hatte. Nehmen wir auch nur ein ganz kurzes Incubationsstadium des Scharlach von einem bis zwei Tagen an, so würde doch die Infection mit demselben immer noch in die Zeit fallen, in welcher der Varioloprozess noch nicht völlig abgelaufen war und das Fieber noch fortlustand.

OTTO W., 7 Jahre alt, aufgenommen am 31. October 1876 mit Spondylitis und einem Osgooderkrankten auf der rechten Seite des Lumbalwirbels. Oedem des obern und unteren Verstandes. Am 21. Novbr. Ausbruch von Scharlach mit starker Angina und heftigen Fieber. Am 5. Dec. beginnende Abschuppung, Exantheum rückwärts; am folgenden Tage tritt gesteigertes Fieber rechts oben vorn und hinten Dämpfung, unbestimmter Athmen und Kriechen, R. 45, T. 40,1. Am 7. auf dem Gesicht, den Armen und Unterschenkeln Ausbruch eines neuen flockig-papulösen Exantheum mit allen Charakteren der Masern. Körper mit starkem eitrigen Schweiß besetzt, starker Urin, Schweiß, unregelmäßiger Husten und stenosirte Athmung. Tod in der Nacht. Section: Pharyngitis und Laryngitis diphtheritica, Oedem des Trachea und grossen Bronchien, chronisches Trauma des rechten Ober- und Mittelfingers.

Alexander S., 8 Jahre alt, aufgenommen am 16. Februar 1877 mit Prolapsus ani. Am 27. unter starkem Fieber Eruption von Scharlach mit mässiger Pharyngitis; Beginn der Abschuppung im Gesicht am 4. März, Exantheum verschwindend. Am 5. unter erneuten starkem Fieber (40,2) am sich nach von oben nach unten vertheilender papulöser Maserneruption mit reichlichem Haut- und katarrhalischen Geräuschen. In den nächsten Tagen fortwährendes heftiges Fieber, Dyspnoe, R. 54, hinten beiderseits fröhlicher Rassel. Tod am 15. Section: Bronchitis capillaris, Bronchiectasien, Peritonitis. Fettsige Erhaltung der Leber.

Dass es sich in diesen beiden Fällen um wirkliche Masern, nicht um eine Scarlatina recidiva handelte, bewies nicht nur die Form des Exantheum, sondern mehr noch die begleitende Affection der Athmungsorgane. Da nun das Incubationsstadium der Masern mindestens 12 Tage beträgt, so musste die Infection mit demselben entweder gleichzeitig oder selbst noch vor derjenigen mit Scharlach erfolgt sein.

München von 5 Jahren, aufgenommen mit Masern, welche am 14. Nov. 1881 erschienen waren. Nach der Eruption Peridauer des Fiebers. Während 6 Tagen treppenförmiger Ausdehnung die Temperatur bis zu 40,0 in den Abendstunden, aber dass die Unterbrechung ein kesselförmiges ergibt. Am 21. Hysterie fähig, am 22. erste Rassel auf Brust und Bauch. Apathie, Diarrhoe, stark belegte Zunge. Typhus abdominalis, welcher ansehnlich seinen gewöhnlichen Lauf nimmt.

Nach der bekannten Dauer der Incubationsstadien musste das Kind also fast gleichzeitig mit beiden Contagien infectirt worden sein.

Mag man sich aus den Infectiousstoff in einer Form denken, welche man will, immer erscheint es merkwürdig, dass zwei ganz verschiedene Contagien gleichzeitig in demselben Individuum ihre Wirkungen entfalten, eine Thatsache, die jedenfalls auf ein recht freundschaftliches Verhältniss der Bakterien zu einander schliessen lässt.

Weit häufiger als diese Fälle sind diejenigen, in welchen zwei oder mehrere acute Infectiouskrankheiten nicht gleichzeitig, sondern successiv nach verhältnissmässig kurzen Intervallen ein und dasselbe Individuum befallen. Meine Abtheilung in der Charité, deren Räume leider keine genügende Trennung der verschiedenen Infectiouskrankheiten von einander gestatten, liefert ein besonders reiches Material für solche Beobachtungen. Häufig wurden Remittascenten von den Masern schon nach wenigen Tagen vom Scharlach ergriffen und umgekehrt; Kinder, die wegen Diphtherie und Croup tracheotomirt wurden, bekamen bald Scharlach u. s. w. Bisweilen folgten sogar 3 oder 4 solcher Krankheiten rasch auf einander:

Bertha W., 5jährig, aufgenommen am 29. Sept. 1876 mit Keuchhusten, am 1. Dec. Ausbruch der Masern, mit denen das Kind schon ausserhalb des Krankenhauses infectirt sein musste; am 4. febril. Am 11. waren Fieber, in der Nacht Scharlach mit nachfolgender Septämie. Heilung. Während der ganzen Zeit bestand der Keuchhusten unverändert fort.

Anna Th., 5jährig, aufgenommen am 10. März 1875 mit Keuchhusten und Diphtherie. Vollige Aphonie, welche Croup befürchten liess und das Glimmen der Pharyngealgefässe in einem heftigen Stillschweigen verwandelt. Albuminurie. Vom 14. an Besserung, Heilung am 20. — Vom 10. April an Fieber, schon am 12. reichlicher Masernausbruch mit starkem Barockkatarth und Ängsten. Heilung. — In den ersten Tagen der Malaria febrilis Erkrankung. Ausheilung eines Hæmorrhoids, welches nach regelmdssigen Verlauf binnen 3 Wochen glücklich heilte.

Fälle dieser Art kommen natürlich in der Privatpraxis nur ausnahmsweise vor. In Kinderspitälern lassen sie sich nur dadurch verhindern oder wenigstens erheblich beschränken, dass man Baracken baut, welche durch ihre Einrichtung gestatten, die mit Masern, Scharlach und Diphtherie befallenen Kinder in drei ganz von einander getrennten und mit einem besondern Wartepersonal versehenen Räumen unterzubringen. Ich befinde mich leider noch nicht in der glücklichen Lage, über eine solche Einrichtung zu disponiren.

I. Das Scharlachfieber.

Die Scarlatina gehört, wie jeder Arzt weiss, zu den gefährlichsten und zugleich heimtückischsten Feinden des Kindesalters. Meiner Ansicht nach müsste und könnte für die Abwehr und Bekämpfung dieses Feindes von Seiten des Staates weit mehr geschehen, als dies bis jetzt der

Fall ist. Während man gegen die immer nur in grossen Pausen auftretenden Epidemien der Cholera, der Pest, des Flecktyphus, der Pocken die strengsten Massregeln verordnet, steht die Scharlatina, welche das Kindesalter fast ununterbrochen decimirt, nicht einmal unter ausreichender polizeilicher Controlle. Vor allem müsste man jedem Kinde, in dessen Familie auch nur ein Fall dieser Krankheit vorkommt, den Schulbesuch streng untersagen, um eine Verschleppung der Krankheit in die Schulen, diese Brutstätten gewisser Infektionskrankheiten, möglichst zu verhüten. Man sollte daher die Eltern und den behandelnden Arzt zur Anzeige jedes Scharlachfalls verpflichten und im Unterlassungsfall mit einer Strafe belegen, eine Strafe, welche nur derjenige missbilligen wird, der die tatsächliche Verwüstung der Kinderwelt durch diese Krankheit nicht aus eigener Anschauung kennt. Was hilft es, die Schulen zu schliessen, wenn die Ausbreitung der Krankheit zu einer milderischen Epidemie schon ihre Akme erreicht hat! Der Umstand, dass eine Menge von Fällen mehr oder weniger leicht verlaufen, kann gewiss nicht gegen die empfohlene strenge Absperrung geltend gemacht werden, denn ganz abgesehen von der wechselnden Mortalität der verschiedenen Epidemien, lässt sich auch im einzelnen Falle, mag er Anfangs noch so leicht erscheinen, weniger wie in irgend einer anderen Krankheit voraussagen, zu welchen Erscheinungen es überhaupt noch kommen und wie das Ende sein wird. Sie werden aus der folgenden Schilderung, welche auf Hunderten von mir selbst beobachteten Fällen beruht, bald ersehen, dass ich in keiner Weise übertreibe.

Das Scharlachfieber befällt die Kinder gewöhnlich inmitten völliger Gesundheit. Noch am Abend gesund zu Bett gebracht, erwachen sie am Morgen mit den Vorboten der Krankheit, oder kehren mit denselben aus der Schule, von einem Spaziergange heim. Mit den gewöhnlichen Vorläufern jeder fieberigen Krankheit, Verstopfung, Anorexie, Schlaflosigkeit, mehr oder weniger heftigem Kopfschmerz, verbindet sich fast immer ein- oder mehrmaliges Erbrechen, bald auch Schmerz im Halse beim Schlucken, der nur selten fehlt, fühlbar erhöhte Hautwärme und gesteigerter Durst. Die Dauer dieser Prodromalsymptome ist verschieden, jedenfalls aber viel kürzer, als bei allen anderen Infektionskrankheiten, da im Durchschnitt schon 24, weit seltener erst 36—48 Stunden nach dem Auftreten der ersten Krankheitserscheinungen, häufig aber schon früher, das Exanthem hervorbricht. Man vergleiche z. B. den folgenden Fall, dessen Entwicklung auf der Klinik beobachtet wurde:

Kind von 2 Jahren. Abends zuvor gesund. Morgens Miesmuth, Anorexie, schlaflos; T. 38.0; P. 144. Alle Organe reaktionslos normal. Mittags 12 Uhr

Erbrechen. Nachmittags 4 Uhr heftige Röhre auf Thorax und Abdomen. T. 39,7; P. 136. Pharyngitis mit punktförmigen Erysipeloiden des Velum, Diphtherie u. s. w.

Mitunter eröffnet ein Schüttelfrost, welchen ich sogar bei einem zjährigen Kinde beobachtete, oder ein plötzliches schamachtähnliches Zusammenbrechen die Scene, worauf sofort eine sehr hohe Temperatur constatirt wird; weit seltener leitet ein epileptiformer Anfall, den ich wenigstens nur ausnahmsweise gesehen habe, die Krankheit ein. Die Ansicht, dass je kürzer und heftiger das Prodromalstadium auftritt, insbesondere je rapider die Temperatur in die Höhe geht, um so schwerer der weitere Verlauf sich gestalten werde, halte ich nicht für gerechtfertigt. Bei dieser Krankheit ist eben alles unberechenbar.

Das Scharlachexanthem erscheint gewöhnlich zuerst am Halse und auf dem Thorax, einige Stunden später auf den Armen, zumal an die Ellenbogen herum, selten im Gesicht, und dehnt sich im Laufe eines Tages über den Rumpf und die unteren Extremitäten aus. Es nimmt also nicht den regelmässig vom Gesicht nach unten fortschreitenden Gang, wie die Masern und Pocken. In seiner Erscheinung zeigt es so grosse Verschiedenheiten, dass eine für alle Fälle zutreffende Schilderung ganz unmöglich ist. Im Allgemeinen prävaliren die mittleren Grade, wobei die Haut aus einiger Entfernung gesehen, eine diffuse mehr oder weniger intensive Scharlachröthe darbietet, während die nähere Betrachtung ergibt, dass diese Röthe aus unzähligen dicht beisammen stehenden rothen Punkten besteht, welche durch ganz kleine blassere Hautstellen von einander getrennt sind. Die dunkeler gerötheten Punkte scheinen den Haarbürgen zu entsprechen; wenigstens konnte ich hier, wie bei den Masern, beobachten, dass wenn der Ausschlag das Abdomen überschritten hatte, an den Haarwurzeln der unteren Extremitäten bereits eine dunklere Färbung und leichte Schwellung bemerkbar war. Im Gesicht sind nur die Wangen und die Stirn geröthet, oft nur sehr mässig, während die Nase und ihre nächste Umgebung, die Oberlippe und das Kinn auffallend blass, ins Gelbliche spielend erscheinen. Wie bei allen Exanthemen bieten auch hier die einem Druck ausgesetzten Theile, zumal der Rücken und besonders die Nates, die stärkste und diffuseste Röthe dar, oft auch die Brust- und Bauchhaut, während an den Extremitäten die Röthe milder stark oder in grossen, durch hellere Partien unterbrochenen Flatschen auftreten kann. Bei stärkerer Schwellung der Haarbürgen erscheint die Haut rauh. Auf Fingerdruck schwindet die Röthe momentan, um sofort wiederzukehren. Führt man mit dem Fingernagel oder einem Griffel rasch über die geröthete Haut weg, so entsteht alsbald ein entsprechender weisser Strich, welcher mehrere Minuten lang

deutlich sichtbar bleibt, so dass man im Stande ist, auf dieser Haut zu schreiben und die Züge einige Zeit sichtbar zu erhalten. Diese „raies scarlatineuses“, denen in Frankreich eine Bedeutung beigelegt wurde, kommen aber auch bei Urticaria, ja selbst auf gesunder Haut vor, haben also für den Scharlach nichts Charakteristisches. Wichtigere erscheint mir die wechselnde Intensität des Exanthems, welches Abends in der Regel stärker hervortritt, aber auch an verschiedenen Tagen ein wechselndes Erlöschen und Wiederauflammen zeigen kann, welches mit den Schwankungen des Fiebers nicht immer harmonirt.

Mit dem Ausbruche des Exanthems steigt das Fieber, und dauert ununterbrochen fort, so lange der Ausschlag auf der Haut steht, d. h. im Durchschnitt 4 bis 6 Tage. Fast in allen, auch von wichtigen Complicationen freien Fällen beobachten wir eine hohe Continua, deren abendliche Exacerbationen 39,8 bis 41,0 erreichen, während die Morgentemperaturen höchstens einen Abfall von 1° zeigt. Nur sehr selten beobachtete ich während einiger Tage den sogen. Typus inversus, wobei die Morgentemperatur 1—1½° höher war als die abendliche¹⁾. Mit dem hohen Fieber contrastirt oft die auffallend helle Farbe des Urins, der indess bei starkem Gehalt an harnsauren Salzen auch dunkel gefärbt sein kann. Mit dem Erlöschen des Exanthems, also etwa nach 4 bis 6 Tagen tritt eine allmähliche Defervescenz ein, wobei die Abend- und Morgentemperatur gleichmässig heruntergeht und mit dem Verschwinden des Ausschlags am 6. bis 7. Tage ihren Normalstand wieder erreicht. Bei thermometrischer Untersuchung findet man aber öfters, dass selbst nach der völligen Erlösung des Exanthems und beim Fehlen jeder Complication die Abendtemperatur noch mehrere Tage 38 bis 39° beträgt, der letzten Ausläufer des Infectionsfiebers, wie wir sie regelmässig beim Hnityphus antreffen. Um diese Zeit kommt es oft zu starkem, besonders nächtlichen Schwitzen, oder auch zu Eruptionen von Herpes labialis oder nasalis. Während dieser ganzen Zeit richtet sich das Allgemeinbefinden vorzugsweise nach dem Verlaufe des Fiebers. Bei leichteren Graden desselben, welche die Maximaltemperatur von 40,0 in den Abendstunden nicht überschreiten, können die Kinder, abgesehen von Anorexie und vermehrtem Durst, sich heilich befinden, während bei höheren Temperaturen fast immer grosse Unruhe oder Hang zum Schlummern und Delirien sich bemerkbar machen. Die Frequenz des Pulses entspricht zwar im Allgemeinen der Höhe der Temperatur, doch darf man sich gerade beim Scharlach, selbst bei älteren Kindern,

¹⁾ Chamo-Analen. III. 1878. S. 513.

durch eine Frequenz bis zu 144 Schlägen in der Minute nicht zu sehr fernabzuhalten lassen, wenn nur die Qualität des Pulses eine gute bleibt, d. h. wenn die Spannung der Arterie normal ist und die einzelnen Schläge deutlich markirt sind.

Die meisten Kinder klagen von Anfang an über Schmerzen im Halse, besonders beim Schlucken, und die Untersuchung ergibt constant eine lebhafte, hellere oder dunklere Röthe und Anschwellung der Mandeln, des Velum und der hinteren Pharynxwand, wodurch der Isthmus faucium mehr oder weniger verengt und das Schlucken beeinträchtigt wird (*Angina s. Pharyngitis scarlatinosa*). In einzelnen Fällen beobachtete ich schon in den ersten Tagen auf der gerötheten Gaumenschleimhaut kleine Blutextravasate, und die durch Räuspern entleerten Sputa erschienen dann etwas blutig gefärbt. Weit häufiger sind die gerötheten Theile hier und da mit eitrigen Schleim bedeckt, welcher sich leicht abstreifen lässt, oder man sieht auf den Mandeln jene kleinen Eiterpunkte, von denen früher (S. 486) die Rede war, und vor deren Verwucherung mit einem diphtheritischen Belag ich Sie nochmals warne. Die Mundschleimhaut ist fast immer durchweg geröthet, pflegt auch wohl bei stärkerer Berührung zu bluten, und die Zunge, welche in den ersten beiden Tagen meistens einem gelbweissen Belag mit rothen Rändern zeigt, pflegt denselben vom dritten Tage an abzustreifen, und bekommt dann eine gleichmässig dunkelrothe Farbe, wobei die mehr oder weniger geschwellten und prominenten Papillen die Aehnlichkeit mit einer Himbeere vervollständigen (*Scharlachzunge*). Zwar ist diese Beschaffenheit der Zunge nicht ganz constant, aber doch immer so häufig, dass ihr eine charakteristische Bedeutung für die *Scarlatina* zukommt. Stark vermehrte Speichelausscheidung begleitet bisweilen die Mandelaffection. Mit dem Erlassen des Exanthems verschwindet auch allmählig die Entzündung der Mund- und Rachenschleimhaut, und nur ein paar leicht geschwellene Lymphdrüsen unter den Kieferwinkeln pflegen als Folgen derselben noch einige Zeit zurückzubleiben. Vom Ende der ersten Woche an befindet sich das Kind in voller *Reconvalescentia*. Um diese Zeit beginnt am eine Abschuppung der Epidermis, und zwar um so früher, je intensiver die Hautröthe war; besonders am Gesicht konnte ich dieselbe oft schon am 4. oder 5. Tage der Krankheit wahrnehmen. Die Epidermis stösst sich bald mehr kleinfleckig, bald in grösseren Lamellen und Fetzen los. Während am Rumpf und an den Oberschenkeln die Desquamation oft nur wie ein Schmutzbelag erscheint, lösen sich von den Fingern, den Händen und Fusstämfen förmliche Lappen ab; dasselbst beobachtete ich aber bisweilen auch auf den Nates, auf der Bauchhaut

den Fusssohlen, ja bei einem Kinde wurde der äussere Gehörgang durch die abgestossene Epidermis so verstopft, dass das Gehör darunter litt, und die angehäuften Massen durch Einspritzungen von lauem Wasser entfernt werden mussten. In einem anderen Fall sah ich schon am 6. Tage nach Abstossung der Epidermis am Kreuzbein, Knie und Ellenbogen grosse nassende Excoriationen entstehen. Das Ausfallen der Haare und Nägel, oder gar die Entfärbung der wiederwachsenden Haare, welche hier und da beobachtet wurde, habe ich selbst nie gesehen. Die Desquamation pflegt in der Regel einige Wochen zu dauern, und während dieser Zeit wird, wie ich bereits (S. 542) erwähnte, nicht selten ein vorübergehender Eiweissgehalt des Urins beobachtet. Nur ausnahmsweise kommt es zu einer wiederholten, und dann um so länger dauernden Abschuppung.

Leider passt das eben entworfene Bild der Krankheit nur auf einen Theil der Fälle, die man als normale bezeichnen kann, während Varietäten sowohl der einzelnen Symptome wie des ganzen Verlaufs so häufig und in so mannigfaltiger Form vorkommen, dass es kaum möglich erscheint, dieselben in bestimmte, der Natur wirklich entsprechende Kategorien zusammenzufassen. Diese Abweichungen vom normalen Verlauf tendiren weit seltener nach der guten Seite hin, als nach der schlimmen. Betrachten wir zunächst die ersteren, so kann auch hier, wie bei allen Infektionskrankheiten, das Fieber nur einen mässigen Grad erreichen, oder wenigstens in den Morgenstunden bedeutende, um 2° sinkende Remissionen machen. Unter diesen Umständen pflegt auch das Exanthem nur blassroth und die Angina nur geringfügig zu sein. In meiner Arbeit über das Scharlachfieber¹⁾ sind mehrere Fälle dieser Art mitgetheilt, in welchen die Temperatur während des ganzen Verlaufs Morgens 38 oder gar 37,8, und Abends 38,0 oder 39° nicht überstieg, höchstens ein- bis zweimal 40,0 erreichte, um am nächsten Morgen wieder der niedrigen Temperatur Platz zu machen. Unter den andern von mir beobachteten Fällen dieser Art wähle ich noch die folgenden aus:

Kind von 3 Jahren mit Scharlach. Beginn am 2. April.

	M.	A.	P.
3. April		38,5	144
10.	38,0	39,1	152
11.	38,0	38,5	152
12. -	38,0	38,0	

Vom 13. an Auschlag und Fieber verschwunden.

Bei einem 12-jährigen Mädchen erhob sich die Abendtemperatur nie über 38,5

¹⁾ I. u. S. 314.

(M. von 37,6), und war schon vor dem Verschwinden des Exanthems auf 36,8 und 37,0 gesunken.

In solchen Fällen verläuft sogar nach einem heftigen Initialfieber die ganze Krankheit absolut fieberlos:

Max P., am 19. März 1875 mit einem Abscess über dem rechten Testiculus major in die Klinik aufgenommen. Intelligenz und optischer Verstand. Am 21. und 22. geringes Fieber (38,1—38,5) bei völliger Euphorie. Am Abend des 22. plötzlich 40,2; P. 136, starke Röthe auf den Armen, den Oberschenkeln und im Gesicht. Am folgenden Tage diffuses Scharlachexanthem, lebhaftes Angina. T. 40,0 bis 37,6; P. 132. Diese Temperatur stieg am 24. Abends auf 37,8, sank aber dann schnell auf 37—36,0, während das Exanthem verschwand. Am 2. April beginnende Abschuppung, welche etwa 12 Tage dauert. Keine Nachkrankheit.

Bei diesem Kinde hatte sich also das Infektionsfieber mit der vollendeten Eruption am Morgen des 23. März erschöpft, gerade so wie wir es bei den normal verlaufenden Masern zu sehen gewöhnt sind. Wahrscheinlich kommen solche Fälle öfters vor, als man glaubt, werden aber, besonders im Proletariat, wegen der ephemeren Fiebererscheinungen und des schwachen oder schnell verfließenden Exanthems ganz übersehen, und erst die später nachfolgende Nephritis oder die Spuren der Desquamation bekünden, dass das Kind wirklich Scharlach überstanden hat. Man erfährt dann häufig, dass die Eltern gar keine ärztliche Hilfe nachgesucht, oder es nicht einmal für nöthig gehalten haben, die Kinder im Hause zu halten.

Am seltensten kommt es vor, dass das sehr hohe (40,0 und darüber betragende) Fieber nach wenigen Tagen plötzlich in Form einer Krise abfällt und die Krankheit trotz des noch deutlich festbestehenden Exanthems nun ganz fieberlos abläuft, oder dass der Ausbruch des Exanthems ohne Fieber vor sich geht, und dass erst nach der völligen Entwicklung des Ausschlags eintritt:

Kernik K., 2jährig, am 25. April 1878 mit Rachen in die Klinik aufgenommen. Am 29. wird eine Befängung des grössten Theils der Haut beobachtet, am nächsten auf der Kopfhaar, den Rücken und Abdomen. T. 37,5, P. 96. Erst gegen Abend mit der Ausbreitung der Röthe über die unteren Extremitäten T. 38,2, P. 100; dabei leichte Tonsillitis. In den nächsten Tagen remittirendes Fieber (Abends bis 39,5). Am 4. Mit allgemeiner Abschuppung, später noch Koryza und Adenitis submaxillaris.

Auch die Beschaffenheit des Exanthems bietet nicht selten Abweichungen dar, welche sich mit einem sonst normalen und günstigen Verlaufe der Krankheit durchaus vertragen, z. B. eine bereits erwähnte nicht völlig diffuse, sondern in grossen Platschen auftretende Röthe, oder das Erscheinen miliärer, gelblicher oder weisser, von der rothen Haut sich scharf abhebender Bläschen (Sc. miliaris, Scharlachfriesel), welche

entweder nur stellenweise, z. B. am die Handgelenke herum, auftreten, oder fast am ganzen Körper sichtbar sind. Ein paar Mal beobachtete ich diese miliare Form bei allen Mitgliedern einer Familie, z. B. im December 1878 bei einer Frau und ihren drei Kindern. Die miliaren Bläschen können hier und da grösser werden, wie beim Herpes, oder gar varicellenartige und pemphigoides Formen annehmen, welche letztere aber immer nur sehr vereinzelt auftreten. So beobachtete ich bei einem 8jährigen Knaben mit sehr starkem Exanthem nur eine einzige markstückgrosse Blase an der Beugeseite des rechten Vorderarms. Hautgangrän in Folge dieser Blase, von welcher hier und da berichtet wird, habe ich selbst nie beobachtet. In anderen Fällen schliessen hirsut- bis erbsengrosse dunkelrothe Knotten auf der diffus gerötheten Haut auf, welche sich nach einigen Tagen verflachen, oder punktförmige Quaddeln, wie bei Urticaria, brechen hier und da hervor, um nach wieder zu verschwinden. Alle diese Formen sind nur die Producte einer gestörten Dermalitis, und haben in und für sich ebensowenig eine able prognostische Bedeutung, wie die mitunter auftretenden kleinen, höchstens liniengrossen Blutextravasate, welche den starken Hyperämie der Hautcapillaren ihre Entstehung verdanken. Dagegen schien es mir, dass eine sehr unregelmässige Vertheilung des Exanthems, die sogen. *Scarlatina variegata*, wenn auch nicht ausschließlich, doch vorwiegend in ungünstig verlaufenden Fällen auftritt. Hier erscheinen neben einer mehr diffusen Rötze einzelner Körpertheile an vielen anderen nur fleckige, durch normale oder äusserst schwach geröthete Intervalle getrennte Empfinden. Kommt es unter diesen Umständen gar zum Aufschlagen papulöser Hervorragungen, welche ich besonders auf den Händen, Vorderarmen und Unterschenkeln wiederholt beobachtete, so können dadurch Blüthen entstehen, welche eine Verwechslung mit der confluenten Form der Masern nahe legen. Auch diese Formen können übrigens im weiteren Verlaufe der Krankheit sich verändern und ein mehr diffuses Ansehen bekommen. Bei sehr starker Rötze beobachtet man hiwieweil auch ein leichtes Oedem der Haut, Füsse und Augenlider, ähnlich wie bei Erysipelas, wobei die Haut hart und gespannt erscheint und nach dem Erlöschen sich ritzelt. Nur in diesen hohen Graden der Dermalitis pflegen die kleinen Patienten über Jucken der Haut oder über Brennen in den Fingerspitzen zu klagen, während sonst das Exanthem keine Beschwerden macht.

Von grösserer Bedeutung für die Prognose, als die Formverschiedenheiten des Exanthems, ist das Fortbestehen des Fiebers über die normale Periode hinaus, d. h. nach dem Verschwinden des Ausschlags.

Allerdings bleibt mitunter die Hautröthe ungewöhnlich lange, z. B. 8 bis 9 Tage sichtbar, und in diesen Fällen hat auch die Fortdauer des Fiebers nichts Auffälliges. Auch kann, wie ich schon (S. 591) bemerkte, ein abendliches Fieber als letzter Ausläufer der Infection noch mehrere Tage nach dem Verschwinden des Ausschlags fortbestehen. Wo aber das Fieber, wenn auch nur in mässigen Grade und stark remittirend das vollständige Verschwinden des Exanthems bis in die zweite Woche hinein und länger überdauert, da hat man immer Ursache, eine Complication oder Nachkrankheit anzunehmen, deren Natur man nicht immer sogleich feststellen kann. Meiner Erfahrung nach wird das Fieber am häufigsten durch drei krankhafte Zustände unterhalten:

1) Die Fortdauer der Pharyngitis, welche dann immer den bald zu beschreibenden „nekrotisirenden“ und ulcerösen Charakter zeigt. Dieser Localprocess kann bei sonst ziemlich ungestörtem Befinden sich zwei bis drei Wochen hinziehen und ein in den Morgenstunden stark remittirendes Fieber unterhalten. Doch sah ich auch bisweilen den pharyngitischen Process noch fortauern, nachdem das Fieber bereits gänzlich erloschen war.

2) Die Entwicklung einer glandulären und phlegmonösen Entzündung unter dem Kiefer, welche zu den häufigsten Complicationen selbst gutartiger Scharlachfälle gehört. Schon in den ersten Tagen der Krankheit schwellen die submaxillären Lymphdrüsen mehr oder weniger an, am stärksten da, wo die Angina einen nekrotisirenden Charakter hat. Bei manchen Kindern bilden sich diese Anschwellungen später vollständig zurück, während sie sich bei vielen anderen während der zweiten oder dritten Woche bedeutend vergrössern und in eine diffuse harte Infiltration des Bindegewebes übergehen. Durch ein collaterales Oedem kann diese Anschwellung einen bedeutenden Umfang erreichen, sich aufwärts bis zum Ohr und abwärts über den Hals verbreiten, wobei die beiderseitigen Anschwellungen unter dem Kinn bisweilen coalesciren. Fast alle diese Phlegmonen gehen in Eiterung über, in der Regel erst am Ende der zweiten oder in der dritten Woche, ja selbst noch später, und so lange dieser Process dauert, pflegt auch ein remittirendes Fieber mit nicht unbedeutenden Abendtemperaturen fortzubestehen. Mit der Entleerung des Eiters durch eine Incision schwindet das Fieber schnell (ich sah die Temperatur von 40,0 nach der Incision sofort auf 37,8 herab sinken und dann normal bleiben) oder allmählig, wird aber nicht selten durch die fortwährende Eiterung und dadurch in ∞ Länge gezogen, dass die Phlegmonen der anderen Seite noch längere Zeit braucht, um incisionsreif zu werden. So können Wochen vergehen, in wel-

ehen die Kinder durch Fieber und Eiterung beträchtlich mageremmen werden.

Diese submaxillären Abscesse, welche in manchen Epidemien fast alle Kinder treffen, können aber noch eine Quelle anderer Gefahren werden. Wird die Incision zu lange hinausgeschoben oder ungenügend unternommen, so kann sich der Eiter sowohl unter der Haut wie in dem zwischen den Halsmuskeln befindlichen Bindegewebe abwärts senken und eine ganze Seite des Halses bis zum Schlüsselbein herab vollständig unterwählen: ja in einzelnen Fällen sahen wir uns genöthigt, tief unten über dem *Foramen majus* Gegenöffnungen zu machen. Die unterminirte Haut kann dabei in grosser Ausdehnung nekrotisiren, und im Grunde des Substanzverlustes sieht man dann die Halsmuskeln wie präparirt hiesliegen. In einem Falle kam es, wie die Section ergab, zu einer Eitersonnung bis zur Spitze des rechten Pleurasackes, welche vom Eiter bespült wurde, in dem folgenden zur Perforation des Pharynx:

Löwke K., 1½ Jahre alt, am 6. Februar 1877 aufgenommen. Vor 14 Tagen Scharlach, seit 8 Tagen Phlegmone der linken, seit 4 Tagen auch der rechten Submaxillargegend. Dabei Nephritis und Fieber (Temper. 39,4). Bei der Incision der linksseitigen Geschwulst ergoss sich ein äusserst stinkender Eiter, ebenso ein paar Tage später aus der rechtsseitigen, woraus auf eine Communication der Abscess mit der äusseren Luft, also auf eine Perforation des Pharynx geschlossen wurde. Dasselbe wurde nach dem am 15. Februar erfolgten Tode durch die Section nachgewiesen.

Ist auch in solchen Fällen die Heilung noch keineswegs ausgeschlossen, so muss doch im günstigsten Fall die viele Wochen dauernde und von Fieber begleitete Eiterung die kleinen Patienten in hohem Grade entkräften. Andere gehen marastisch oder durch Complication zu Grunde, besonders plötzlich durch ulceröse Atresie der Venae jugulares, nur selten der Carotis, unter erschöpfenden Blutungen aus der Abscessöffnung, wovon ich selbst zwei Beispiele erlebte. Nicht minder gefährlich ist der Uebergang einer Phlegmone des submaxillären Gewebes in eine rapide fortschreitende, diffuse, steinharte Infiltration der gesamten Unterkiefergegend bis zum Schilddrüsencorpus in der Form der sogen. Angina Ludwig. Ich sah diese das Gesicht entstellende, starrte Infiltration, welche den Kopf fast unbeweglich macht, einmal schon am Ende der ersten, häufiger aber erst in der zweiten Krankheitswoche auftreten, und zwar immer begleitet von anderen drohenden Symptomen der Malignität, Stomatitis, leichten Delirien, Klontheit und hoher Frequenz des Pulses. Die Tendenz zur Eiterung ist dabei äusserst gering, um so grösser diejenige zu einem dem Carunkel ähnlichen brandigen Zerfall, welcher durch die Starrheit des Infiltrats und die Verödung der Gefässe

bedingt zu werden scheint. In einem dieser Fälle entstand schon in der Mitte der zweiten Woche ein Brandstich von schwärzlicher Färbung an dem hervorragendsten Theile der rechtsseitigen Gesichtslast, während zwei andere Kinder, bevor es noch zur Nekrose der Haut gekommen war, an Collaps zu Grunde gingen. Nicht nur diese starren Infiltrationen des Halsbindegewebes, sondern auch die zuvor geschilderten Phlegmonen können übrigens noch dadurch das Leben gefährden, dass sie sich in die Tiefe bis in die nächste Umgebung des Kehlkopfes ausbreiten und eine entzündliche Infiltration des Larynxeinganges herbeiführen, welche unter den suffocatorischen Erscheinungen des Oedema glottidis lethal endet (S. 315). Auch Thrombose der Vena jugularis, welche inmitten der Phlegmone lagert, Zerfall der Thromben, embolische Processe und Tod unter den Erscheinungen der Septicämie habe ich unter diesen Umständen beobachtet. Sie ersehen daraus, mit welchen Gefahren die submaxillären Phlegmonen, die zu den häufigsten Complicationen des Scharlachfiebers gehören, verbunden sein können.

In seltenen Fällen scheint sich die Entzündung vom Rachen aus auch auf die Muskeln des Nackens und Halses zu verbreiten. Schmerzhaftigkeit und Steifigkeit derselben mit erschwerter Beweglichkeit, oder mit den Symptomen eines Caput obstipum, kamen mir bisher in 3 Fällen vor, von denen zwei unter anhaltenden warmen Umschlägen und Mercuraleinreibungen binnen 14 Tagen allmählig heilten, der dritte aber schließlich in Eiterung überging und incidirt werden musste.

3) Als die dritte, sehr häufige Quelle eines über die Norm sich hinausziehenden Fiebers ist die Otitis zu bezeichnen. Wenn auch die scarlatinöse Hautentzündung von der Ohrmuschel aus in den äußeren Gehörgang eindringen und eine Otitis externa mit furunculösen Abscessen herbeiführen kann, so ist diese doch viel seltener, als die Otitis media, welche vom Rachen her als Ausstrahlung der Pharyngitis durch die Tuba Eustachii entsteht. Diese Form der Otitis, welche häufig doppelseitig auftritt, trifft in manchen Epidemien mehr als die Hälfte aller Fälle und verläuft, zumal bei kleinen Kindern, welche ihre Schmerzen nur durch Schreien kundgeben, oft so heftig, dass nur das scheinbar unmotivirte Fieber den erfahrenen Arzt zur Untersuchung des Ohrs veranlasst. Selbst ältere Kinder klagen nicht immer über Schwerhörigkeit und über Ohrenschnitzen, welche dann beim Druck auf den Tragus oder auf die Gegend hinter dem Ohr zuzunehmen pflegen.

Mit dem Eintritt einer eitrigen Otorrhoe aus einem oder beiden Ohren erreichen die Schmerzen, aber nicht immer das Fieber, ihr Ende, und die Untersuchung mit dem Ohrspiegel ergiebt eine Perforation des

Trennmitteln, über welche man sich nicht allzusehr beunruhigen darf. Der grösste Theil dieser Perforationen pflegt unter einer einfachen Behandlung binnen wenigen Wochen wieder zu vernarben und fast nie eine merkliche Gehörstörung zu hinterlassen. Weit seltener verläuft der entzündliche Process so stürmisch, dass schon am Ende der zweiten Krankheitswoche absolute Taubheit vorhanden ist, und der faulige Geruch des reichlichen Secrets die Umgebung des Kindes verpestet. In der Armenpraxis werden solche Otorrhöen sehr oft vernachlässigt, aber auch unter der besten Pflege kann die Krankheit von der Paukenhöhle aus auf den Knochen übergreifen und Caries des Felsenbeins herbeiführen. Nicht selten werden Sie Kinder mit angeschwollener und von fistulösen Oeffnungen durchdrörter Pars mastoidea, mit nekrotischen Sequestern im Meatus auditorius oder hinter demselben, und mit Paralyse des N. facialis (S. 215) antreffen, deren Leiden auf ein vor Jahren überstandenes Scharlachfieber zurückzuführen ist. In einzelnen Fällen sah ich die Caries des Felsenbeins, welche die Section documentirte, sogar äusserst stürmisch, binnen 2—3 Wochen zu Stande kommen und, wie die hinzutretende Paralyse des N. facialis lehrte, bis in den Fallopi'schen Canal dringen. In Folge dieser Caries und der Atresie des Sinus petrosus soll es hiezu kommen zu Blutungen aus dem äusseren Ohr, welche einen tödtlichen Ausgang nehmen, gekommen sein. Ein paar Mal beobachtete ich auch eine Abscessbildung hinter dem äusseren Ohr, deren Zusammenhang mit einer Otitis interna nicht sicher nachgewiesen werden konnte, und wohl auf eine Peristitis des Felsenbeins bezogen werden musste:

Max K., Hülfling, aufgenommen am 3. December 1873 von Scharlach. Schon am 5. Tage Erythem und Angina vernehmbar, Euphorie. Deutlich harrte das Fieber drei Wochen lang mit Temp. von 38,5 bis 39,9 Grad. Am 11. Krankheits-tage Schmerz und Anschwellung hinter dem rechten Ohr. Die von einer Peristitis der Pars mastoidea abzuhängen scheint. Mittliche Gei., Stuhl normal. Trotz der Application von Blattelektrolyt Abscessbildung. Am 28. Tage Durchbruch des Eiters in den äusseren Gehörgang. Schnelle Heilung.

Dieser Durchbruch kann bei allen in der nächsten Umgebung des Meatus audit. externus sich bildenden Abscessen, nicht nur beim Scharlach, sondern auch beim Typhus und bei einfachen Phlegmonen vorkommen, und hatte in den von mir beobachteten Fällen niemals dauerhafte Nachteile zur Folge, wenn man nur für einen guten Eiterabfluss, am besten durch eine Gegenöffnung an der tiefsten Stelle des Abscesses, sorgte. —

Ausser den genannten Ursachen (Angina, Phlegmon und Otitis), welche oft in einem und demselben Falle mit einander combinirt sind,

kann das Fieber noch durch verschiedene, zum Tode gefährliche Complicationen unterhalten werden. Zunächst richte man seine Aufmerksamkeit auf die serösen Häute. Bei der Section schwerer Scharlachfälle findet man hiaweilen entzündliche Erscheinungen am Pericardium oder an der Pleura, von welchen man während des Lebens keine Ahnung hatte, weil sie entweder latent verliefen, oder durch die überwiegenden Symptome der Malignität, von denen bald die Rede sein wird, verdeckt wurden. Da aber auch in solchen Fällen von Scharlach, denen die eigentliche Malignität abgeht, Entzündungen gewisser seröser Häute vorkommen, so ist es die Pflicht des Arztes, sobald das Fieber andauert, die Respirations- und Circulationsorgane wiederholt sorgfältig zu untersuchen, auch wenn keine subjectiven Klagen dazu auffordern sollten. Man ist hiaweilen sehr überrascht, die physikalischen Symptome einer Endocarditis zu finden, welche sich nur durch einen fortbestehenden Fieberzustand kündigt. Einen geheilen Fall dieser Art habe ich bereits früher (S. 417) mitgetheilt, der folgende ist durch den bestätigenden Sectionsbefund noch instructiver¹⁾.

Willy R., 10 Jahre alt, aufgenommen am 5. Mai 1888 mit diffusem Scharlachauschlag, mässiger Pharyngitis, hohem Fieber (39.9). Delirien, Somnolenz, häufiges Durchfallen, drohender Collaps. Nach 5 Tagen erwartete Besserung bei fortwährend hohem Fieber, starke Infiltration beider Submaxillargegenden und Schwellhaftigkeit des linken Ellenbogengelenks, bald auch der Knie-, Schulter- und Hüftgelenke ohne Anschwellung. F. nie über 120. Die Incision der rechteckigen Halspneumonie löst ohne Einfluss auf das Fieber. Vom 20. Mai (dem 17. Krankheitstage) an Steigen der Pulsfrequenz auf 144 mit Abnahme der Spannung. Am Herzen war bisher nichts Abnormes wahrnehmbar gewesen. Das mässige remittirende, Abends immer noch bis gegen 40° steigende Fieber, die gelbbraune Diarrhoe, die Druckschmerzhaftigkeit des unpaarigen Unterleibs, die Apathie und Schwäche des Kindes und eine personlich anstrengende Vergrößerung der Milz erregten den Verdacht eines sich an die Scharlach anschliessenden Hestypheus. Erst am 24. Mai (also am 20. Krankheitstage) erschien der erste Herdton unrein, aber nicht von einem eigentlichen Geräusch begleitet. Dennoch stellte ich mir die Diagnose auf Endocarditis rheumatica (Entstand auf die Herzgegend, s. obige Notizen). In den nächsten Tagen wurde der Herztone von 2. bis 5. Intercostalraum nach unten von der Mamilla sichtbar und die Dämpfung ging eines Fingers breit über dieselbe hinaus. Allmählig traten die typhösen Symptome immer mehr hervor, so dass am 26. Mai das Bild des Hestypheus völlig ausgeprägt war: hohes Fieber, Delirien, Somnolenz, schwärzliche Lippen und Zähne, Diarrhoe, Catarrh in beiden unteren Lungenlappen. Am 30. Auftraten köthlicher fetschichtiger bis limonengrosser Hämorrhagien auf der Brust und dem Unterleibe, bald auch im Gesicht, auf den Augenlidern und der Conjunctiva bulbi. Am Herzen immer noch Unreinheit des ersten Tons, niemals ein deutlicher Nebengeräusch. Tod am 31. Mai im Collaps.

¹⁾ Charité-Annalen. VII. S. 649.

Section. Herz, besonders Internum, erweitert mit leicht verdicke-ter Wand. Die drei Aortenklappen bis auf kleine warzige Reste zerstört, mit reichlich schaffenden Blutgerinnseln. Massenhafte Bakterienanhäufung in den Klappen und in ihrer trüben Umgebung. Beide Ventrikel in schlaffe Eiterhöhlen umgewandelt. Hyperplasie der cervicalen Lymphdrüsen. Milz um das Dreifache vergrößert, Haarröth, die Aeste der Arter, theils fast alle durch perforire, bis und da noch feste Entzündungsmasse verstopft. In den Nieren ebenfalls in Eiterung übergehende Infarcte, Eindicksubstanz trübe, Leber leicht geschwellen und getrübt.

Trotz der enormen abscessösen Zerstörung der Aortenklappen fanden wir hier erst am 20. Tage der Krankheit nur eine Unreinheit des ersten Tons, niemals ein wirkliches Geräusch. Dass in solchen Fällen die Endocarditis übersehen und mit Typhus verwechselt werden kann, beachtet ein. Diese typhösen Erscheinungen und das hohe Fieber scheinen durch die begleitenden embolischen Vorgänge (hier fanden sich diese in der Haut und Conjunctiva, in der Milz und den Nieren) bedingt zu werden, und sind daher am ausgeprägtesten in der abscess-bakteriellen Form, mit der wir es auch in unserem Falle zu thun hatten. Gerade diese schwere Form aber, die bei Erwachsenen häufiger zur Beobachtung kommt¹⁾, habe ich bei Kindern im Gefolge des Scharlachfiebers nur selten gesehen, und ich werde bald bei Gelegenheit der Scharlatina häufiger darauf zurückkommen. Häufiger handelte es sich um eine gutartige Endocarditis, die sich nach einigen Wochen zurückbildete oder der Ausgangspunkt einer chronischen Klappenentartung wurde. Der eben beschriebene Fall bietet auch ein Beispiel für die acut entstandene Dilatation des Herzens bei Endocarditis, von welcher früher (S. 422) die Rede war.

Seltener als die Entzündung des Endocardium wird Pericarditis im Gefolge des Scharlach beobachtet, am so häufiger aber Pleuritis, welche fast immer eine purulente Exsudat setzt. Man muss an diese Complicationen um so mehr denken und daher um so sorgfältiger untersuchen, wenn im Verlaufe des Scharlach die Synovialmembranen der Gelenke ergriffen werden, eine ziemlich häufige Complication, für welche die Bezeichnung *Synovitis scarlatinosa* wohl passender ist, als der alte Name „*Inflammation scarlatinosa*“. Diese Affection, welche bisweilen schon am Ende der ersten, meistens aber erst in der zweiten Krankheitswoche auftritt, manifestirt sich in ihrer höchsten Form nur durch Schmerzen in den Gelenken ohne Anschwellung und ohne erhebliche Störung der Bewegungen, bald nur auf einzelne Gelenke be-

¹⁾ Litten, über septische Erkrankungen. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. II, Heft 2.

schränkt, bald über mehrere, besonders über die Hand- und Fußgelenke verbreitet:

Bei einem 7jährigen Mädchen bestanden diese Schmerzen nur im rechten Handgelenk, und zwar nur einen Tag lang (den 8. der Krankheit). — Ein 12jähriges Mädchen bekam am 9. Tage, nachdem das Fieber schon aufgehört hatte, plötzlich Schmerzen in beiden Handgelenken, am folgenden Tage auch in den Fußgelenken, besonders bei Bewegungen, welche zwei Tage dauerten und mit Fieber (38,5—39,4) verbunden waren. — Bei einem 10jährigen Knaben traten vom 7. Tage an heftigste Schmerzen in den Hand-, Ellbogen-, Knie- und Fußgelenken, ohne Anschwellung und Störung der Motilität auf (Temp. Ab. 39,0). Nachlass nach Climen und ihrem Bälern (27¹). — Bei einem 6jährigen Mädchen Schmerzen in beiden Kniegelenken erst am 14. Tage der Krankheit ohne Schwellung. Fieber Ab. No 40,4. Dauer einer allmählig Deferrescens etwa eine Woche. Anhaltende Application von Eucalyptus auf die Kniegelenke.

In einer anderen Reihe von Fällen gewalt sich zu den Schmerzen Anschwellung und erschwerte Beweglichkeit der Gelenke, ähnlich wie beim acuten Rheumatismus, fast immer mit erhöhtem Fieber, und gewöhnlich, wenn auch nicht immer, combinirt mit anderen ungünstigen Krankheitserscheinungen, mit nekrotisirenden Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut, drohendem Collaps, entzündlichen Affectionen anderer seröser Häute, der Pleura, des Peri- und Endocardium, selbst des Peritoneum. Auch hier können diese Entzündungen, zumal diejenigen der Pleura und der Herzinnenhäuten, so latent verlaufen, dass nur die locale Untersuchung Aufschluss giebt, und wo diese nicht vorgenommen wurde, nach Ablauf der acuten Periode zur größten Ueberraschung ein pleuritisches Exsudat oder ein Klappenfelder gefunden wird, von dessen Existenz man keine Ahnung gehabt hat.

Die scarlatinöse Synovitis nimmt fast immer einen günstigen, auf wenige Tage oder eine Woche beschränkten Verlauf, worauf die durch seröses Exsudat bedingte Anschwellung der Gelenke sich durch Resorption wieder zurückbildet. Selten zieht sich die Affection länger hinaus, wie z. B. in einem Falle, wo ein Hydarthros des Kniegelenks mit springender Patella wochenlang fortbestand. Weit ungünstiger gestaltet sich die Sache in den viel selteneren Fällen, wo es zur Eiterung in den Gelenkhöhlen kommt, ein Ausgang, den Billiet und Barthex¹⁾ nie beobachtet haben, der mir aber wiederholt begegnet ist. Nach meinen Erfahrungen kommt die Synovitis purulenta beim Scharlach auf zweifache Weise zu Stande.

1) Am seltensten durch den Uebergang der gewöhnlichen Synovitis

¹⁾ 1. c. III. S. 231.

in Eiterang in ähnlicher Weise, wie dies auch zuweilen bei der Polyarthrititis rheumatica geschieht. Die Eiterang beschränkt sich unter diesen Umständen fast immer auf einzelne Gelenke und kann auch chronisch werden; so mancher Fall von *Conitis* oder *Gonitis suppurativa* lässt sich auf ein vor längerer Zeit überstandenes Scharlachfieber zurückführen:

Karl Sp., 16 Jahre alt, aufgenommen am 20. Septbr. 1876. Vor einem Jahre Scharlach, im Verlauf desselben schmerzhafte Anschwellung des rechten Kniegelenks mit Entzündung des Gelenks. Nach mehreren Wochen Aufbruch, Entleerung von Eiter aus zwei Öffnungen, später auch von kleinen Knochenstücken. Bei der Aufnahme *Gonitis suppurativa*.

2) auf embolischen Wege im Gefolge allgemeiner Septicämie. Diese Form zeichnet sich durch die Schwere der Symptome, das hohe aufsteigende Fieber, die zunehmende Prostration, die bis zum Sopor sich steigende Benommenheit des Bewusstseins aus, befällt eine ganze Reihe von Gelenken und endet wohl immer mit dem Tode. Als Quelle der Septicämie findet man in der Regel eine ausgedehnte, meist doppelseitige Vereiterung des maxillären Bindegewebes (S. 598), oder nekrotisierende Prozesse in der Rachshöhle. In einem dieser Fälle¹⁾ fand ich die von der Phlegmone der linken Unterkiefer- und Halsgegend umflossene Vena jugularis von der Entzündung ergriffen und in weiter Strecke thrombosirt, ein Vorgang, welcher bald ein pyämisches Fieber mit Metastasen in der Pleura, den Nieren, Hamerkugeln in der Haut, Milztumor und eine peridontale Synovitis an beiden Hand-, Fuss- und Ellenbogengelenken zur Folge gehabt hatte. In allen Fällen dieser Art fand ich während des Lebens die betroffenen Gelenke geschwollen, sehr schmerzhaft, unbeweglich, ihre Hülle ordentlich; nach dem Tode in ihren Höhlen einen Erguss von rahmigem, grünlich-weißem Eiter, die Synovialmembran stark getrübt, sonst aber unverändert.

Zuweilen kommt es im Verlaufe der Scarlatina auch zur Bildung periartikulärer Abszesse, welche schliesslich in die Gelenkhöhle durchbrechen und dann Synovitis herbeiführen. In diese Kategorie gehören, wie ich glaube, die folgenden Fälle:

Max P., 5jährig, aufgenommen am 28. Mai 1876 mit Nephritis nach einem vor 4 Wochen bestandenen Scharlach. Am linken Flusse an die Kniekehle herum *Quartanrende Abzesse*, welche nicht heilen wollen (stumpfschmerzhafter Verlauf). In den nächsten Tagen bildet sich ein grosser Abscess über dem linken Ellenbogengelenk, welcher am 6. Juni geöffnet wird; am 10. ein neuer Abscess am rechten Fingergelenk, in welchem deutlich *Crepitation* wahrnehmbar ist. Dasselbe kündigt sich später (am 24.) im linken Kniegelenk an, während sich ein neuer Abscess über dem rechten

¹⁾ *Charité-Analen*: VII. 1882. S. 642.

bildete. Durch die anhaltende Eiterung, die Schmerzen in den betroffenen Gelenken und das hektische Fieber bedeutende Emaciation. Am 27. Juli wurde der Knabe auf Wunsch der Eltern entlassen, nachdem er sich unter einer intensiven Behandlung wesentlich erholt hatte. Zustand der Gelenke gänzlich unverändert.

Frant M., 5jährig. Vor drei Wochen Scharlach. In der 2. Woche Anschwellung am oberen Theile des linken Humerus mit scharfer Abgrenzung. Bei der Aufnahme drei Pustelöffnungen am oberen Drittel des Arms; durch eine derselben dringt die Sonde 7 Ctm. weit bis ins Schultergelenk, dessen Bewegungen wesentlich beschränkt sind. Abscess in der Dicke des rechten Oberschenkel und an der rechten Halsseite. Nephritis mit tödlichem Ausgang.

Bei einem 1jährigen Kinde sah ich 3 Wochen nach dem Scharlachausschlag Abscesse am Ellenbogen- und Handgelenk rechtsseits entstehen, welche trotz der Incision im Durchbruch des ersten Eiters. Tod an Pneumonie der linken Lunge.

Ueber die Betheiligung der Gehirnhaute am Scharlachprocess fehlen mir eigene Erfahrungen. Die bedeutenden Cerebralsymptome, welche in schweren Fällen der Krankheit auftreten und bald unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen werden, hängen, so weit meine Beobachtung reicht, nicht von einer Meningitis ab; höchstens finden wir eine stärkere Hyperämie oder ein leichtes Oedem der Pia und der Hirnsubstanz, wie sie unter den verschiedensten Verhältnissen beobachtet werden. Es handelte sich hier meistens um Stauungserscheinungen in Folge gesunkener Herenergie, wodurch auch Thrombosen einzelner Sinus bedingt werden können, wie aber um wirklich eitrige Producte. Dass dieselben im Gefolge der Scarlatina auftreten können, will ich im Vertrauen auf fremde Beobachtungen, besonders von Kälmer¹⁾, nicht bestreiten; ihre klinischen Erscheinungen dürften aber von denjenigen der „Malignität“ kaum zu unterscheiden sein. Nur in einem Falle konnte die Beschaffenheit des Pulses und die schnelle Wirkung der Antiphlogose den Verdacht einer in der Entwicklung begriffenen Meningitis rechtfertigen:

Kind von 2½ Jahren. Im März 1865 Scharlach. Normaler Verlauf bis zum 4. Tage, dann Erlassen des Einschlafens, Somnolenz, aus welcher das Kind aber leicht zu wecken war, Puls verlangsamt und unregelmäßig, wiederholtes Erbrechen, Stuhlverstopfung, sehr spärlicher Urin ohne Albumen. Application von 3 Blutegeln am Kopf, Salind. Catemet, 0,06. Am folgenden Tage grössere Mattigkeit. Symp. spin. cervic. um die Anstrengungen zu unterstützen. Am 8. Tage nur noch Kopfschmerz; Apothia verschwand; P. 120, regelmäßig. Völlige Genesung.

Dagegen werden die Schleimhaut der Bronchien und das Lungengparenchym beim Scharlach häufiger entzündlich afficirt, als man gewöhnlich annimmt. Nicht bloss Catarrhe, sondern auch mehr oder

¹⁾ Jahrb. f. Kinderkrankh. 1870. X.

einander ausgebreitete Bronchopneumonien kommen in der ersten und zweiten Krankheitswoche vor, werden aber häufig übersehen, weil gleichzeitig eine Reihe schwerer Symptome von „typhöser“ Art sie maskiert und die Aufmerksamkeit des Arztes vollständig in Anspruch nimmt. Bronchitis und Bronchopneumonie fanden wir fast in allen schweren Fällen, welche zur Section kamen, wiederholt auch schon während des Lebens¹⁾. Seltener kam die fibrinöse Form der Pneumonie zur Beobachtung:

Fall 8., 5 Jahre alt, aufgenommen am 20. August 1875 mit Ekzemen, erkrankte am 29. an Scharlach. Während der ganzen ersten Woche heftig Fieber (Ab. 40,5—41,5) und quälende Angina. Am 7. Sept. starker Husten und Dyspnoe, links hinten bis zur Spize mangelhafte Bildung von Consolidationen. Am 11. phthisischer Collaps; T. 37,8. P. 166, labilernig, allgemeine Cyanose, kühle Extremitäten. Am 12. Tod. Section: Hämorrhagien des ganzen linken Unterlappens und doppelseitige fibrinöse Pleuritis.

Die Complication des Scharlach mit Broncho- oder Pleuropneumonie ist zwar immer eine heftigere, aber keine absolut letale, da ich mehrere Fälle dieser Art günstig verlaufen sah. Die Prognose wird hier besonders durch die begleitenden Erscheinungen, vor allem durch den Zustand der Herzkraft bedingt, deren Bedeutung schon für die primäre Pneumonie so erheblich ist, noch weit mehr aber für die mit der korymbösen Scharlach complicirte. Wir berühren hier die für die Pathologie und Prognose wichtigste Eigenschaft dieser vielseitigen Krankheit, welche wir mit dem Worte „Malignität“ zu bezeichnen pflegen. Wie mannigfaltig auch die Manifestation dieses heftigen Zustandes sein kann, so treten aus doch in dem Gesammtbilde desselben zwei Züge als die herausragendsten entgegen, die eminente Tendenz der Krankheit zu nekrotisirenden Entzündungen und die spezifische Einwirkung des Virus auf das Herz.

1) Die nekrotisirenden Entzündungen. Ich ziehe diese Bezeichnung der oblichen „diphtheritisch“ aus dem Grunde vor, weil meiner Ansicht nach nichts der richtigen Anschauung von dem Wesen dieser Processse mehr geschadet hat, als diese Benennung. Nachdem Bretonneau²⁾ unter dem Namen „Diphtherie“ ein fast erschöpfendes klares Bild dieser spezifischen Infektionskrankheit aufgestellt hatte, brachte die pathologische Anatomie dadurch eine neue Verwirrung hervor, dass sie diesen klinischen Begriff in einen anatomischen umsetzte, und mit dem Namen „diphtheritisch“ alle Prozesse bezeichnete,

¹⁾ Siehe die von mir in den *Charité-Annalen*, Bd. III, S. 529 mitgetheilte Fälle.
²⁾ *Traité de la diphthérie*. Paris 1826.

welche sich durch Einlagerung käseförmiger Exsudate in die Schleimhäute oder auch in die äussere Haut mit nachfolgender Nekrose charakterisiren. So kam es, dass die Aerzte, welche bereitwillig dieser Lehre folgten, bald bei den verschiedensten Krankheiten, in welchen sich die oben erwähnten Prozesse vorfinden, eine Complication mit „Diphtherie“ annehmen, und dass diese Verwirrung auch auf das Publicum übergrief. Ganz besonders gilt dies nun in Bezug auf das Scharlachfieber, in welchem jene Prozesse überaus häufig, namentlich im Pharynx auftreten. Man spricht daher noch jetzt allgemein von „Scharlach und Diphtherie“, ohne sich daran Rechenschaft zu geben, ob denn die spezifische Krankheit, welche wir Diphtherie nennen, wirklich dabei im Spiel ist. Die „nekrotisirende Entzündung“, wie ich sie achte, kommt bei ganz verschiedenen Krankheitsprocessen vor, am häufigsten bei der wirklichen Diphtherie und beim Scharlach, demnächst auch bei den Masern, dem Typhus, der Dysenterie, der Pyämie, der Cholera &c. &c. Aber die Aehnlichkeit der anatomischen Producte beweist noch nicht die Identität der Krankheitsprocessen. Wie das Bild der „Pocke“ ebenso gut durch die Variola wie durch Vaccine und durch Einwirkung von *Tartarus stibiatus* erzeugt werden kann, wie das anatomische Substrat des Croup, die Pseudomembran, ebenso gut durch Atzungen mit Jod, wie durch den Einfluss der Hitze, Kälte oder denjenigen der wahren Diphtherie zu Stande gebracht wird — ebenso kann das von den Anatomen als „diphtherisch“ beschriebene Exsudat durch verschiedene Ursachen, welche wir oben namhaft machten, erzeugt werden. Man ist daher nicht befugt, überall wo dasselbe auftritt, von einer „Diphtherie“ zu sprechen, und that besser diesen Namen für die spezifische Infektionskrankheit, welche seit Bretonneau denselben trägt, zu reserviren. Diese von mir seit Jahren in meiner Klinik vertreten und auch veröffentlichte Ansicht gewinnt jetzt mehr und mehr Anhänger (Demme, O. Heubner) und wird nicht am wenigsten durch die Thatsache unterstützt, dass die betreffende Scharlachform keineswegs vor einer baldigen Erkrankung an Diphtherie schützt. So sah ich unter andern einen 2jährigen Knaben, welcher Scharlach mit starker Pharyngitis necrotica glücklich überstanden hatte, 4 Wochen später an wahrer Diphtherie erkrankte und durch Croup zu Grunde gehen. Fälle dieser Art kommen in meiner Klinik durchaus nicht selten vor.

Die nekrotisirende Entzündung befällt beim Scharlach immer zuerst die Rachenschleimhaut, welche überhaupt schon der Sitz eines eitrigen Processes ist. Gewöhnlich bemerkt man erst zwischen dem dritten und vierten Tage der Krankheit auf beiden gewölbten und geschwellenen

Mandeln, besonders auf den einander zugewendeten Flächen, gelblich- oder grauweiße Plaques von verschiedener Ausdehnung, und eine Anschwellung der entsprechenden submaxillaren Lymphdrüsen. Oft bilden sich auch ähnliche Streifen auf dem Rande des Gaumensegels und der Uvula, oder strahlen von den Mandeln abwärts gegen den Zungengrund aus. Die Schlingenschmerzen brauchen dabei nicht heftiger als sonst zu sein, richten sich vielmehr vorzugsweise nach dem Grade der entzündlichen Spannung und Anschwellung der Rachentheile. Diese leichteste Form der Rachenerkrankung sollte nicht gleich Besorgniz hervorrufen, denn ich habe sie in einer grossen Zahl von Scharlachfällen, welche sonst keine erheblichen Abweichungen von dem normalen Verlaufe darbieten, beobachtet. Nach 5–6 Tagen, oft erst viel später (in der zweiten oder dritten Woche) stossen sich die letzten Reste der Plaques, welche bis dahin immer noch ein remittirendes Fieber (S. 296) unterhalten können, los und hinterlassen seichte, leicht blutende Substanzverluste, welche nach kurzer Zeit verharben. Häufig entwickelt sich aber diese Affection zu höheren Graden, und ist dann fast immer mit anderen bedenklichen Anomalien und Complicationen, welche das Leben ernstlich gefährden können, verbunden. Nicht bloss die Mandeln und das Velum, sondern auch die hintere Pharynxwand bedecken sich mit den gefährlichen speckigen Plaques, ein zäher klebriger Schleim liegt auf der ganzen Schleimhaut und zieht sich beim Öffnen des Mundes in dicken Fäden von der Zunge los zum Gaumen hinauf. Starker Foetor dringt aus dem Munde, die submaxillaren Schwellungen sind ausgedehnter und härter als sonst, und fast immer greift der Process auf die Nasenhöhle über und erzeugt jene Koryza, welche schon bei den alten Aerzten einen bösen Ruf hatte, und sich von dem einfachen, auch beim leichten Scharlach bisweilen auftretenden Schnupfen wesentlich unterscheidet. Aus den excorirten Nasenlöchern fliesst continüirlich ein jauchig-seröses, oft blutiges Secret über die auferhobene Oberlippe, und die Nase wie ihre ganze Umgebung bis zu den Augulidern hin schwillt nicht selten oedematös an. Bisweilen nimmt auch die Conjunctiva, wahrscheinlich durch Vermittelung der Thränenwege, Theil, entweder nur in der Form einer katarrhalischen Entzündung mit reichlicher Secretion und Verklebung der Lidränder, oder seltener als eine tief greifende nekrotisirende Verschorfung mit starker Geschwulst der Augenlider. In den schlimmsten, glücklicher Weise sehr seltenen Fällen dieser Art kann es sogar zur Nekrose der Cornea und zur vollständigen Zerstörung des Auges kommen, was ich ein paar Mal erlebt habe. Es gelingt übrigens fast niemals, sich durch die Inspection von dem Bestande der nekrotisirenden Exso-

date in der Nasenhöhle zu überzeugen, weil dieselben meistens ganz oben und hinten sitzen, und die Untersuchung mit dem Spiegel sehr schwer und unzuverlässig ist; wohl aber sah ich in mehreren Fällen tagelang wiederholt mit dem Secret der *Koryza pseudomembranosa* Fetzen aus der Nase sich entleeren, welche keinen Zweifel übrig liessen. Diese Ausstossungen von Fetzen, die besonders beim Ausspritzen der Nase stattfanden, dauerten bei einem mit Nephritis scarlatinosa behafteten 3jährigen Mädchen wochenlang; sie füllten bisweilen den ganzen Boden des Glases und stellten zum Theil förmliche Abgüsse der Chazanen dar, bis sie in der 5. Woche unter Ausspritzungen der Nase mit einer *Solutio Zinci sulphurici* (1:100) verschwanden. Auch kam es bisweilen zu wiederholten, selbst erschöpfenden Blutungen aus den ulcerösen Substanzverlusten, welche sowohl in der Nasenhöhle, wie in den Rachenorganen nach der Abstossung der nekrotischen Schorfe zurückgeblieben waren. Bei sehr tief in das Gewebe der Mandel dringender Infiltration und entsprechender Nekrose wurden auch ganze Stücke der Tonsille brandig abgestossen, welche zunächst noch als schwarzbraune stinkende Klumpen im Rachen flottirten. In mehreren Fällen kam es zu einer doppelseitigen totalen Perforation des Gaumensegels durch unregelmässige Löcher, welche meistens oberhalb der Mandeln ihren Sitz hatten.

Alle diese schlimmen Erscheinungen können, wie wir sehen werden, in derselben Weise auch bei der eigentlichen „Diphtherie“ vorkommen. Es handelt sich hier wie dort um eine fibrinöse Infiltration mit reichlicher Kernwucherung und Zellenproduction in den tieferen Schleimhautschichten, wodurch die Gefässe comprimirt und die Gewebetheile nekrotisch werden, und auch die mikroskopischen Befunde der „Bakterien“ sind in beiden Fällen die gleichen¹⁾. Das alles beweist aber, wie ich schon bemerkte, keineswegs die Identität beider Krankheitsprocesse, gegen welche sich noch die Thatsache geltend machen lässt, dass Paralyse, welche man bei der „diphtheritischen“ an die Seite stellen könnte, auch der scarlatinösen Pharynxnekrose kann vorkommen. Ich selbst habe in keinem Falle Accommodationslähmungen des Auges, ebenso wenig die charakteristischen Lähmungen des Velum, der Nacken- oder Extremitätenmuskels beobachtet; denn wenn auch während des Bestehens der Pharyngitis scarlatinosa die Getränke bisweilen aus der Nase ausgestossen werden, so ist nur die eintöndliche Starre und Unbeweglichkeit des Gaumensegels daran schuld, und mit der als Nachkrankheit der

¹⁾ Da von Reichenow angeführte Differenzen schliesslich nur nicht bedeutend genug, um einen wesentlichen anatomischen Unterschied zu begründen.

eigentlichen Diphtherie auftretenden Gaumenlähmung hat dies Symptom nichts zu schaffen.

Ein anderer wichtiger Unterschied liegt noch darin, dass die scarlatinöse Rachennekrose im Gegensatz zur wirklichen Diphtherie nur eine geringe Tendenz zeigt, vom Pharynx aus sich in die oberen Luftwege zu verbreiten. Während die Ärzte mit Recht in jedem Falle von primärer Rachendiphtherie sofort an die Gefahr des Croup denken, kommt ihnen beim Scharlach dieser Gedanke kaum in den Sinn. Heiserkeit der Stimme, die sich sogar bis zur Aphonie steigern kann, ist freilich nichts seltenes, aber dies verlässliche Symptom verliert sich in den meisten Fällen allmählig und scheint nur von einem bis auf die Stimmbänder sich verbreitenden Katarrh abzuhängen, der sich später als loser Husten kundgibt, zuweilen aber auch weiter abwärts schreitet und mit einer Bronchopneumonie abschliesst. Dennoch sei man nicht allzu sicher. Wenn Brotaudou von der scarlatinösen Pharyngitis sagt: „elle a une tendance à se propager dans les canaux voisins“ so geht er darin entschieden zu weit. In meiner früheren Arbeit *) finden sich 8 Fälle von Scharlach, in welchen diese Verbreitung der Rachenaffectio in den Larynx thatsächlich stattfand, und 1mal auch durch die Section constatirt wurde. Aber in keinem der letzteren überschritt der Croup die Grenze der Stimmbänder, und nur in dem einzigen, welcher nicht zur Section kam, sprach die Entleerung percutanemembranöser Fetzen aus der auch der Tracheotomie eingeführten Canüle für einen Croup der Trachea oder der Bronchien. Dabei hat man aber zu bedenken, dass ein Bronchiacroup unter diesen Umständen lediglich durch Aspiration infectiöser Fetzen vom Rachen her entstehen kann, ohne dass der Process sich continuirlich durch die oberen Luftwege fortgesetzt hat. Dafür spricht wenigstens der Fall eines 8-jährigen Knaben, bei welchem die ulceröse Nekrose des Pharynx über die Ligamenta aryepiglottica sich bis zu den wahren Stimmbändern ausdehnte, hier aber scharf abschnitt und die Trachea ganz freiliess. Erst in den mit schleimig eitrigen Secret gefüllten Bronchien fanden wir wieder blutige Fetzen, und in einigen kleineren sogar lose Cylindren.

In den letzten Jahren kamen mir noch mehrere ähnliche Fälle von Larynxroup bei Scharlach vor, von denen die drei folgenden hier eine Stelle finden mögen:

Emma H., 5jährig, aufgenommen am 26. Februar 1877 mit Eiterallerg. Am 2. März Scarlatina mit hohem Fieber und einfacher Pharyngitis. Disquisitiones

*) Charité-Annales. III. 1876. S. 529.

giert schon am 5. im Gesicht. In den nächsten Tagen bei fortwährendem mäßigem Fieber (38–39°) Heiserkeit, die sich am 8. zur Aphonie steigert und mit einer geringen Inspiration verliert. Mit dem Eintritt von Dyspnoe am 10. steigt die Temp. auf 40,4; Ab. 40,7. Leichter Husten ohne Erfolg. Am 12. wird eine doppel- seitige Bronchopneumonie an der Lungenfläche constatirt, welche unter anhaltend hohem Fieber, schließlich unter Collapserscheinungen am 17. März, also am 15. Tage der ganzen Krankheit, zum Tode führt. Während des ganzen Verlaufs war im Rachen niemals ein Belag, sondern immer nur Rötze, Schwellung und starke Schleim- secretion sichtbar gewesen. Section: Pharyngitis diphtheritica, Laryngitis crepans. Doppel- seitige Bronchopneumonie, Pleuritis sinistra mit serofibrinösem Exsudat. Hyperphorie der Milz und der Mesenterialdrüsen.

Helene Schw., 1¹/₂-jährig, aufgenommen am 12. Februar 1877 mit Euphorie. Ausbruch des Scharlachs am 14. (T. 39,9–40,6) mit Angina und kleinen Eiterpunkten auf dem Rachen. In den nächsten Tagen Bronchialstärke, mäßiges Fieber. Am 24. Heiserkeit, verächrlicher Klang des Hustens, steigendes Fieber. (39,4). Während der folgenden 11 Tage Entwicklung von Dyspnoe, Brand doppel- seitiger Bronchopneumonie, Stimme fast aphonisch, leichtes stenosirtes Geräusch beim Atmen; in den drei letzten Tagen zunehmender Collaps mit Abendtemp. von 40,2. Tod am 7. Die Untersuchung des Pharynx hatte auch hier nie einen Belag constatirt. Section: Diphtheritis des Pharynx und Oesophagus. Creps des Kehlkopfs, doppel- seitige Bronchopneumonie. Wässrige Degeneration der Bronchialdrüsen. Tuberkel in der Milz und Leber.

In beiden Fällen war die nekrotisirende Pharyngitis trotz wieder- holter Untersuchung während des Lebens nicht erkannt worden, ein Umstand, der auch bei der primären Diphtherie nicht selten vorkommt, und theils in dem verborgenen Sitze der Pflanze, theils in der Unmög- lichkeit, die Rachenhöhle solcher Kinder nach allen Richtungen hin genau zu untersuchen, seine Erklärung findet.

Martha B., 7-jährig, aufgenommen am 20. März 1877 mit Scharlach, welches seit 5 Tagen besteht. Senocium benommen, Delirien, beschleunigter Athem, sub- costale Schwellung auf beiden Seiten, Eustachium nur noch partiell sichtbar. Pharynx geröthet, geschwollen, mit dicken graugelben Plaques und nachfoltem Schleim bedeckt. T. 39,5–40,2. P. 144–168. Am 22. geröth sich eine starke Karyza und Fester oris hirta; Uvula und Gaumenbogen zeigen schwarze- braune leuchtende Flecke, hintere Pharynxwand grau belegt, beginnender Collaps. Am 23. Sopor, völlige Aphonie. Tod im Collaps. Section: Pharyngitis et Laryn- gitis diphtheritica atrophica. Diphtheritische Nekrose des Oesophagus und des Para- pylorae des Magens. Multiple Bronchopneumonische Herde. Leichtes Septicämie parenchymatosa.

Auch in diesen drei Fällen überschritt der nekrotisirende Process den Larynx nicht; Trachea und Bronchien waren vollkommen frei von demselben. Wenn es nun auch in der Literatur nicht an Beispielen eines Tracheal- oder Bronchialcreps im Gefolge des Scharlachfiebers fehlt, so muss doch diese Ausdehnung über den Larynx hinaus immer

als eine sehr seltene im Vergleich mit dem bei der primären Diphtherie stattfindenden Verhältnisse erscheinen. Dann kommt, dass nie und da, wie Sie bald sehen werden, die Scarlatina eine Complication mit der eigentlichen Diphtherie eingehen kann, wobei dann das Auftreten eines Tracheal- und Bronchialcroup der letzteren allem, nicht mehr dem Scharlach zur Last fällt.

Zwei von den mitgetheilten Fällen zeigen Ihnen, dass der nekrotisirende Process beim Scharlach auch den Oesophagus und sogar die Magenschleimhaut befallen kann. Letzteres beobachtete ich nur einmal, während fibrinöse hitzige oder eiterartige Einlagerungen, besonders aber längsgestreckte, fast bis an die Kehle reichende Ulcerationen der Oesophagusschleimhaut öfter vorkamen. Aber allen diesen Befunden entspricht kein bestimmtes Symptom während des Lebens, und selbst die Theilnahme des Larynx verräth sich in der Regel nur durch verhältnissmässig milde Symptome, welche die Intensität der eigentlichen Crouperscheinungen bei weitem nicht erreichen, Heiserkeit, Aphonie, geräuschvolles Athmen. Ja in einzelnen Fällen beherrschen die malignen Symptome des Scharlach die ganze Scene derartig, dass wir die laryngealen Zeichen gänzlich übersehen und bei der Section überrascht waren, den Kehlkopf vergrössert zu finden. Nur einmal bei einem 2jährigen Mädchen bestand neben der starken Heiserkeit noch eine bedeutende Empfindlichkeit des Larynx gegen Druck, welche von einer Perichondritis abzufließen schien und sich allmählig verlor.

Die dyspnoeischen Symptome, welche im Verlaufe der nekrotisirenden Pharyngitis scarlatinea auftreten, besitzen, auch wenn sie einen entschieden stenotischen Charakter haben, durchaus nicht immer auf eine Erkrankung des Larynx, sondern können auch durch eine locale Anschwellung der Mandeln und der benachbarten Rachentheile, welche den Luftrraum einschnürt, verursacht werden. Eine gleichzeitig bestehende intensive Coryza kann durch die Verengerung der Nasenhöhle diese Symptome noch erheblich steigern, und diese werden ihren höchsten Grad dann erreichen, wenn eine sero-entzündliche Infiltration der Ligamenta aryepiglottica (Orbina glottalis) sich hinzugesellt. In allen solchen Fällen ist es aber absolut unmöglich sich über den Zustand des Larynx selbst Gewissheit zu verschaffen, da bei der gewöhnlich vorhandenen Immunität des Sensoriums, der Schwierigkeit den Mund zu öffnen, der enormen Anschwellung der Mandeln und den alles verdeckenden Schleim- oder nekrotisirenden Massen von einer erfolgreichen Anwendung des Kehlkopfspiegels nicht die Rede sein kann. In mehreren zur Section genommenen Fällen dieser Art, in welchen die stenotischen Symptome

sehr hochgradig waren, fanden wir neben der nekrotisirenden Pharyngitis und Koryza noch grosse Tonsillarabscesse, ein paar Mal auch mittliche oder mässige Retropharyngealabscesse, während der Larynx, abgesehen von einer mässigen Infiltration der Ligamenta aryepiglottica, ganz frei war. Unstreitig ist hier die Indication zur Tracheotomie gegeben, von welcher ich indess nur einmal, bei einem 8-jährigen Knaben in der Privatpraxis, Erfolg beobachtete. Alle anderen Fälle gingen trotz der Tracheotomie oder auch der wiederholt vorgenommenen Incision der Mandelabscessen in Folge der begleitenden malignen Zustände zu Grunde.

Zu der nekrotisirenden Rachenaffectio'n gesellt sich häufig eine analoge Affectio'n der Mundschleimhaut (*Stomatitis scarlatinea*), bei welcher die Mundwinkel, die Lippen, meistens auch die Zunge, seltener der harte Gaumen mit graugelben oder grauweissen Plaques insel-förmig oder auch in grösseren Strecken infiltrirt erscheinen. Diese Stomatitis kann sich schon am 5. Tage der Krankheit bilden, doch sah ich sie häufiger erst während der 2. Woche, bisweilen auch noch später eintreten. Die Schmerzhaftigkeit ist oft so heftig, dass die Kinder die Zunge nicht herausstrecken, auch nicht essen können, wodurch die schon vorhandene Schwäche noch vermehrt wird. Aus den blutenden Rhagaden der Mundwinkel und Lippen gehen oft graugelbe Plaques hervor, welche sich weiter über die Mund- und Zungenschleimhaut ausbreiten und nach ihrer nekrotischen Abstossung mehr oder minder tief dringende, besonders den Zungenrand einkerbende Substanzverluste hinterlassen. Selbst da, wo diese Geschwüre noch ziemlich oberflächlich waren, sah ich ein paar Mal so bedestende Blutungen eintreten, dass das Leben der Kinder durch Erschöpfung bedroht wurde. Aus der Zunge und den Lippen rieselte das Blut besonders beim Versuch zu essen, oft aber auch spontan, massenhaft hervor, und jeder Versuch, die dicken Blutgerinnsel von den Lippen zu entfernen, erneuerte die Blutung. Nur durch consequente Anwendung von Liqueur ferri sesquichlorati, welcher mittelst Charpie applicirt oder in die Zunge eingepinselt wurde, gelang es uns, die Blutung zum Stillstande zu bringen. In manchen Fällen ist diese Affectio'n indess nur so schwach entwickelt, dass sie das Bild und den Verlauf der gewöhnlichen Stomatitis aphthosa (S. 424) darstellt, während in anderen die dunkelrothe Zungen- und Gaumenschleimhaut mit weissen croupartigen Auflagerungen, die sich ziemlich leicht abstreifen lassen und oberflächliche blutende Erosionen hinterlassen, bedeckt erscheint. Der Gebrauch eines Mundwassers von Chlorkali (3:200), besonders aber täglich ein paar Mal wiederholte Pinselungen mit einer

Zinksolution (Zinc. sulphur. 0,5:30,0), leisteten mir bei dieser Stomatitis oft vortreffliche Dienste.

Auch die grossen Schamlippen und die Schleimhaut der Valva, so wie zufällig bestehende Excoriationen der äusseren Haut, z. B. Ekzeme im Gesicht, hinter den Ohren u. s. w., können sich mit fibrinösen Auf- und Einlagerungen bedecken. Bei einem 3jährigen Kinde sah ich im Laufe der zweiten Woche des Scharlach zehen einer Angina und Koryza necrotica auch die Labien und Nymphen anschwellen, bläulich roth werden und sich mit missfarbigem Exsudat überziehen, bald auch ein hinter beiden Ohren befindliches Ekzem dieselbe Beschaffenheit annehmen. Anhaltende Fomentationen mit einer Mischung von Aq. saturni. und (2%) Carbollösung erzielten binnen 6 Tagen bedeutende Besserung, doch erlag das Kind später einer Nephritis. —

Ich bemerkte oben (S. 606), dass die Pharyngitis in den ersten Tagen des Scharlach eine einfach entzündliche zu sein, und der nekrotisirende Charakter erst am 3. bis 4. Tage hervorzutreten pflegt. Von dieser Regel giebt es infoss Ausnahmen, indem gleich anfangs, ja selbst noch vor der Entwicklung des Exanthems verächtliche Plaques im Rachen auftreten können. Die Krankheit beginnt dann mit einem mässigen, bisweilen auch mit hohem Fieber (39,5 bis 40,0) und „diphtheritischer“ Angina, und erst 2—3 Tage, in einem Fall sogar 5 Tage später erscheint das Scharlachexanthem auf der Haut. Seit meiner früheren Publication¹⁾ hatte ich wiederholt Gelegenheit, diesen ungewöhnlichen Beginn zu beobachten:

Frida Th., 5 Jahre alt, aufgenommen am 25. Dec. 1877. Seit einigen Tagen Klagen über den Hals, seit gestern Fieber. Auf beiden gerötheten und geschwellten Tonsillen ein mässiger grauweisser Belag, submaxilläre Drüsenanschwellung. T. 39,5. In den nächsten beiden Tagen Besserung; der Belag streift sich ganz ab. T. 38,4. Erst am 1. Jan. 1878 beginnt neues heftiges Fieber (40,5) mit starker Rötze des Pharynx, und am 3. zeigt sich die Scharlachrötze auf der Brust. Tod am 6. unter Collapsymptomen.

Friedrich M., 7 Jahre alt, aufgenommen am 28. Dec. 1878 mit einem starken „diphtheritischen“ Belag beider Tonsillen, der Gaumenbögen und Anschwellung unter dem rechten Kieferwinkel. T. 38,3. In den beiden nächsten Tagen völlige Abtönnung der Beläge und Fieberlosigkeit (T. 36,6—37,4). Erst am 31. wieder Steigerung (40,3), Kopfweh, Angina, und am folgenden Tage Ausbruch des Exanthems. Tod am 6. durch Collaps.

In diesen beiden Fällen liegt also ein zweitägiges Intervall zwischen dem Auftreten der diphtheritischen Pharyngitis und dem Erscheinen des scarlatinösen Prodromalfiebers, ein Intervall, während dessen

¹⁾ I. u. S. 525.

die Rachnaffectio und das Fieber auf ein Minimum herabgehen oder ganz verschwinden. Man muss sich daher die Frage vorlegen, ob hier die erste Affectio mit der zweiten wirklich zusammenhing, und nicht vielmehr eine ächte primäre Diphtherie vorlag, auf welche in Folge einer Infection in der Klinik rasch Scharlach folgte, dessen Incubationsperiode, wie wir bald sehen werden, nur eine äusserst kurze zu sein braucht. Für diese Ansicht spricht noch der Umstand, dass in der Familie des ersten Kindes bereits ein Knabe kurz zuvor an primärer Diphtherie gestorben war, dass mir ferner kein einziger Fall dieser Art in der Privatpraxis, wohl aber mehrere in der Klinik vorkamen, wo die Infection mit verschiedenen Contagien kaum zu vermeiden ist. Winterholt sah ich ausserordentlich Kinder, die wegen eines diphtheritischen Croup tracheotomirt werden waren, schon wenige Tage darauf an Scharlach erkrankten. In solchen Fällen sieht man daher wohl auch Nachkrankheiten auftreten, die einerseits auf die Diphtherie, andererseits auf das Scharlachfieber bezogen werden müssen, z. B. submaxillare Abscesse und Gelenkaffectionen, welchen später eine Gummehahnung folgt¹⁾. Schliesst man nun diese, aus der Combination von echter Diphtherie und Scharlach entstandene Mischformen aus, so wird man wohl die Thatsache bestätigt finden, dass die Pharyngitis beim Scharlach in den ersten Tagen fast constant eine einfache, wenn auch meistens recht intensive, den nekrotisirenden Charakter aber erst auf der Höhe der Krankheit annimmt. —

Die Malignität des Scharlach beruht aber nicht bloss in der geschilderten Tendenz zu nekrotisirenden Processen, sondern auch wohl mehr in der specifischen Wirkung des Virus auf das Nervencentrum und von diesem aus auf das Herz. Bevor ich auf diese ansehnliche Eigenthümlichkeit näher eingehe, lenke ich Ihre Aufmerksamkeit auf gewisse Symptome, welche schon in den ersten Tagen der Krankheit lebhaft, aber nicht ganz gerechtfertigte Besorgnisse erregen können. Gleich beim Eintritt der nur in den Morgenstunden etwas remittirenden hohen Continua (40° und mehr), bei dunkelrothem und diffusem Exanthem, verfallen viele Kinder in einen somnolenten Zustand, aus dem sie aber in der Regel leicht zu erwecken sind. Viele deliriren dabei mehr oder minder lebhaft und werfen sich unruhig hin und her; andere sind apathisch, geben auf vorgelegte Fragen keine Antwort und scheinen selbst ihre Umgebung nicht deutlich zu erkennen. Bedenkliche Com-

¹⁾ S. einen von mir beobachteten Fall (dieser Art) der Berl. Klin. Wochenschr. 1892. S. 200.

pilationen irgend einer Art finden dabei nicht statt; der Urin ist frei von Eiweiss oder enthält nur Spuren desselben, wie bei anderen hoch fieberigen Krankheiten, die Angus ist mässig, der Puls nicht allem frequent und von guter Beschaffenheit. Nur die Bewusstseinsheit des Sensoriums flösst also Besorgnisse ein und lässt einen malignen Charakter befürchten. Aber mit dem Sinken der hohen Temperatur am 4. oder 5. Tage schwinden auch die sensoriellen Symptome, die Unruhe macht einem ruhigen Schlaf Platz, das Bewusstsein stellt sich rasch wieder her, und die Krankheit nimmt von ihren gewöhnlichen, freilich immer unheilvollen Verlauf.

Offenbar liegt den scheinbar drohenden Störungen des Sensoriums in diesem Falle nur das continuirliche hohe Fieber zu Grunde, da analoge Symptome auch in den ersten Tagen anderer, mit sehr hoher Continua einhergehender Krankheiten der Kinder, namentlich bei der primären Pneumonie, nicht selten vorkommen. In der That leistete mir unter diesen Verhältnissen die abkühlende Methode entschieden gute Dienste, besonders lauwarme Bäder von 26–25° R., deren Dauer etwa 10 Minuten betragen darf. In manchen Fällen liess ich sogar zweimal täglich baden. Gleichzeitig wusch ich Eisteuchel continuirlich auf den Kopf, und bei heftiger Pharyngitis ein solches auch um den Hals applicirt. Auch grosse Dosen Chinin (0,5 bis 1,0) oder Natrium salicylicum (20) in den Nachmittagsstunden gereicht, setzten sich nur unter wirksam, indem sie auf 6 bis 12 Stunden die Temperatur um 1 bis 2° herabdrückten. Dagegen sah ich alle diese antipyretischen Mittel fehlschlagen, wenn das hohe Fieber, die Delirien und die Somnolenz von vornherein die Verkünder wirklich maligner Krisenstimmungen waren. Die Temperatur blieb dann auf derselben Höhe oder stieg sogar noch mehr, und ich betrachte daher die Unwirksamkeit der Antipyrese geradezu als ein prognostisch ungünstiges Moment, welches uns anzeigt, dass es sich um eine wahre, durch die Virulenz der Infektionskrankheit bedingte Malignität handelt. Von dem Wesen dieser Virulenz wissen wir freilich so gut wie nichts. Deshalb das Scharlachfieber in einer Reihe von Fällen aberaus leicht, in einer anderen Reihe überwiegend bösartig verläuft, ist uns ebenfalls durchaus unbekannt, und die beliebte Beratung auf den „Charakter der Epidemie“ kann daran nichts ändern. Auffallend war mir dabei die gewisse auch von vielen anderen Aerzten gemachte Beobachtung, dass wenn in einer Familie Scharlach ausbricht und eins der Kinder an der malignen Form zu Grunde geht, sehr häufig auch noch ein zweites und drittes Kind unter denselben Erscheinungen hingerafft wird, und auf diese Weise ganze Familien aussterben können.

Schon in vielen einfachen Scharlachfällen bekundet der hüpfende Charakter (Pulsus celer) und die ungewöhnlich hohe Frequenz des Pulses (150 Schläge und mehr) den erwähnten Einfluss des Virus, welchen ich mir als einen das Vaguscentrum lähmenden vorstelle. Wenn auch andere Infektionskrankheiten, z. B. der Typhus und besonders die Diphtherie, in ihren schweren Formen ähnliche Collapsercheinungen aufzuweisen haben, so kommen dieselben doch dem Scharlachfieber bei weitem am häufigsten zu und bilden die Hauptgefahr, welche man während des tödlichen Verlaufs dieser Krankheit stets im Auge zu behalten hat. Die bei der Section häufig gefundenen moleculären Veränderungen des Herzmuskels können wohl aus dem Grunde nicht daran Schuld sein, weil die Erscheinungen der Herzparalyse schon zu einer Zeit auftreten können, in welcher an eine so ausgedehnte moleculäre Degeneration noch nicht zu denken ist. Jedem Arzte kommen dann und wann Fälle vor, in welchen bei voller Gesundheit plötzlich Erbrechen, auch wohl Diarrhoe, enorme Frequenz und Kleinheit des Pulses eintreten und ein so schneller Collaps erfolgt, dass schon nach 8—12 Stunden der Puls schwindet, Gesicht und Extremitäten kühl werden, und unter soporösen Erscheinungen, seltener unter mehr oder minder heftigen Convulsionen der Tod eintritt, ohne dass ein Exanthem zum Vorschein gekommen ist. Die Diagnose bleibt dunkel, bis nach wenigen Tagen eins oder mehrere Geschwister des verstorbenen Kindes am Scharlach erkranken und dadurch der Zweifel gehoben wird. Häufiger kommt es infess noch zum Ausbruch eines heftigen Fiebers und zur Entwicklung des Exanthems, wenn auch nur zu einer partiellen und ungleichmässigen, und der Tod erfolgt erst nach 24—48 Stunden:

Kind von 5 Jahren, am 21. Juni 1879 aufgenommen. Noch am Abend ruher gemüth. In der Nacht zwei Mal Erbrechen. Morgens partielles Scharlachexanthem am Rumpf, Pharyngitis, Sopor, Conjunctivitis. Temp. 40,5; Puls 180, sehr klein. Resp. 72. Nachmittags Collaps, Puls kaum fühlbar. Nachts 11 Uhr Tod. Dauer 24 Stunden.

Ebenso schnell, aber unter terminalen Zuckungen, starb ein 2jähriges Kind, welches anhaltend eine Temp. von 40,2—40,5 darbot, kleine Petechien auf Brust und Armen zeigte, schon nach 18stündiger Dauer der Krankheit collapsirte und 8 Stunden später zu Grunde gieng. Bei einem erst 6 Monate alten Knaben, dessen Temperatur am ersten Tage 39,2, Ab. 40,2, am zweiten Tage 40,8 und 41,4 betrug, erfolgte in tiefem Sopor und Collaps tödtlicher Ausgang am Abend des zweiten Tages, bei einem 2jährigen Kinde mit anhaltenden Temperaturen von 40,0 bis 41,8 und einer Pulsfrequenz von 180 bis 192 am vierten Abend.

Diese lähmende Einwirkung des Virus auf Gehirn und Herz macht sich, so weit meine Beobachtungen reichen, am intensivsten immer schon in den ersten Tagen der Krankheit bemerkbar, am häufigsten bei Kindern

unter 3 Jahren. Hier findet man oft den Puls von vornherein enorm schnell (170 Schl. und mehr), leicht wegdrückbar; Hände, Füße und Nase zeigen bei anhaltend hoher Körpertemperatur (40—41°) eine widersprechende Kühle, und das Exanthem bekommt in Folge der durch die Herzschwäche bedingten venösen Stauung einen cyanotischen, lividen Anstrich; die kleinen Kranken sind in höchsten Grade unzufällig, deliriren, versuchen das Bett zu verlassen, zeigen Zähneknirschen, auch wohl Tremas und rigide Extremitäten, werden rasch soporös und gehen in diesem Zustande mit immer mehr schwindendem und an Frequenz sich zunehmendem Pulse, bisweilen auch nach wiederholten epileptiformen Anfällen zu Grunde. Alle diese „foudroyanten“ Fälle sind absolut letal. Die gepriesensten Reimittel präall an der paralysirenden Wirkung des Herzgiftes machtlos ab.

Etwas günstiger gestaltet sich die Prognose, wenn nicht von vornherein, sondern erst nach der völligen Entwicklung des Exanthems innerhalb der ersten oder gar erst in der zweiten Krankheitswoche die Symptome der Herzschwäche auftreten. Da sie unter diesen Umständen langsamere Fortschritte zu machen pflegen, so werden sie in ihrem Beginn von Ungeübten um so leichter überschauen, als eine andere Reihe von krankhaften Erscheinungen sich in den Vordergrund drängt und die Aufmerksamkeit des Arztes in Anspruch nimmt. Die Kinder liegen mehr oder weniger somnolent da, zeigen vollständige Apathie, werfen sich unruhig hin und her. Die Augen sind halb oder ganz geschlossen, die Conjunctiva meistentheils stark injicirt, das Auge trübscheinig; das Exanthem, in verschiedenen Graden entwickelt, oft als Scarl. variegata (S. 195), oder morbillenähnlich auftretend, oder von einer ins Kupferrothe spielenden Farbe. Das Gesicht ist gelblich, besonders die Umgebung der Nase, deren Theilnahme an der nekrotisirenden Entzündung (S. 607) sich durch die Koryza, durch Schniefeln, Schnarchen oder direct durch Blutung und wiederholte Ausstossung diphtheritischer Fetzen aus der Nasenhöhle kund giebt; Zunge, Lippen und Zahnfleisch erscheinen trocken, mit bräunlichen Becken wie im Typhus bedeckt; die Rachenhöhle, wenn ihre Untersuchung überhaupt gelingt, fast immer „diphtheritisch“ und einen starken Fötor verbreitend. Dabei kann auch noch Otitis und Phlegmone der submaxillären Partien bestehen, der Urin die Spuren frühzeitiger Nephritis zeigen, und auch eine Complication mit Entzündung der Respirationsorgane oder der serösen Membranen, zumal auch eitrige Synovitis beobachtet werden, welche ich Ihnen oben (S. 602) geschildert habe. Dies in seinen wesentlichen Zügen immer ziemlich gleiche und sehr charakteristische Gesamtbild der Malignität kann

8 bis 10 Tage und darüber bestehen, wobei die zuweilen eintretende grössere Freiheit des Sensoriums, das Beantworten vorgelegter Fragen mit zusehender oder fallender Sprache nicht sofort trügerische Hoffnungen erwecken darf. Während dieser ganzen Zeit dauert das Fieber mit Temp. von $38,5$ bis 40° und darüber bis zum Tode fort. Ja in einzelnen Fällen fand ich noch kurz vor dem Tode $40,2$ bis $42,5^{\circ}$, obwohl der Puls kaum noch zu fühlen und die extremen Theile schon kühl wurden, während in anderen scheinbar ganz analogen Fällen die Temperatur vielfach schwankte und am letzten Tage erheblich, selbst bis auf $36,5$ herabsank. Als ein beim einfachen Scharlach ziemlich seltenes, in malignen Fällen aber weit häufigeres Symptom ist noch eine mehr oder minder profuse Diarrhoe zu erwähnen, welche bisweilen von variösern so plötzlich und massenhaft eintritt, dass ein choleraartiger Verfall darauf folgt. So trübe und unheilverkündend aus sich der Gesamteindruck dieser malignen Fälle ist, darf man doch die Hoffnung nicht aufgeben, so lange die Zeichen des fortschreitenden Collapses fehlen. Hier ist wieder einmal ein Fall, in welchem der Puls seine prognostische Bedeutung in hervorragender Weise bekundet. So lange derselbe ein gewisses Maass von Frequenz, also je nach dem Alter 120 bis 180 Schl., nicht überschreitet und dabei seine nahezu normale Spannung und Fülle bewahrt, lässt man den Muth nicht sinken, mögen auch die übrigen Symptome noch so schlimm erscheinen. Wird aber der Puls sehr klein, leicht wegdrückbar, dikrot, unregelmässig und ungleich, besonders aber äusserst frequent (180 oder gar 200 und 240, wie ich es bei einem 4-jährigen Kinde beobachtete), wird die Haut der extremen Theile kühl, das noch bestehende Exanthem cyanotisch und der Sopor immer tiefer, so ist die Prognose eine lethale. Man muss auf den Eintritt dieser Collapserseignisse in allen malignen, selbst in mittelschweren Fällen gefasst sein; nicht selten erfolgt derselbe ganz plötzlich und unerwartet, und straft die noch Tags zuvor gestellte günstige Prognose Lügen.

Die Sectionen, auch der hässlichsten Fälle von Scharlach, ergeben nichts, was man als charakteristisch für diese Krankheit betrachten könnte. Neben den vielfachen Complicationen, welche Sie schon während des Lebens constatiren konnten, und auf welche ich hier nicht noch einmal zurückkomme, finden Sie höchstens jene albuminösen und fettigen Degenerationen der Muskelfasern des Herzens, der Leberzellen und Nierenepithelien, welche allen schweren Infektionskrankheiten gemeinsam sind, demnächst häufig eine mässige Schwellung vieler Lymphdrüsen, der Peyer'schen Plaques, der Solitärfollikel des Darms und der Mesenterial-

drusen, nie Befund, welcher auch da oft vorkommt, wo im Leben keine Diarrhoe bestand. Die Darm Schleimhaut bot in diesen Fällen keine bemerkenswerthen Veränderungen dar¹⁾. In der Mund- und Rachenhöhle, wie im Oesophagus, fanden wir neben den nekrotisirenden Processen häufig auch Soor-Entwicklung. Eine charakteristische Veränderung des Blutes ist nur bei den leider sehr zahlreichen Sectionen, welche ich zu nachher Gelegenheit hatte, niemals aufzufallen, und ein erheblicher Milztumor wurde nur in einer kleinen Anzahl von Fällen constatirt. —

Aus der Schilderung der Krankheit, ihrer zahlreichen Varietäten und Complicationen, werden Sie wohl erkannt haben, dass ich berechtigt war, das Scharlachfieber als ein in ihrem Verlauf und Ausgang ganz unberechenbare Affectum zu bezeichnen, deren Prognose unter allen Umständen auch bei dem anscheinend günstigsten Verlaufe immer nur zweifelhaft gestellt werden darf. Da aber auch dem vollständigen Ablauf des acuten Processes noch verschiedene Nachkrankheiten auftreten können, welche die Gesundheit und das Leben des schon ausser aller Gefahr stehenden Kindes von neuem bedrohen können, so rathe ich Ihnen, den Eltern gleich im Anfange der Krankheit mitzutheilen, dass Sie vor dem Ende der 4. Krankheitswoche keine Garantie für einen glücklichen Ausgang übernehmen können. Unter den Nachkrankheiten steht in erster Reihe die Nephritis, welche ich Ihnen bereits früher (S. 542) ausführlich geschildert habe. Demnach haben Sie die Folgen der Otitis media, ihren Uebergang auf den Knochen, schliesslich selbst die Mitleidenchaft der Sinus und der Meningen, oder Paralyse des N. facialis und bleibende Taubheit zu fürchten. In zwei Fällen beobachtete ich während der Reconvalescenz die Entwicklung einer Pneumonie, einmal am 13. Tage nach der Eruption, nachdem Patient schon 3-Tage lang völlig entseufert war, das andere Mal am 24. Tage nach dem Beginn der Krankheit, und zwar mit tödtlichem Ausgange, während der erste Fall nach 11 Tagen kritisch endete. Wiederholt sah ich auch, wie bereits erwähnt wurde, in Folge directer Infection in den klinischen Sälen die eben vom Scharlach genesenen Kinder an echter Diphtherie erkranken, und durch Oedipus oder Croup zu Grunde gehen. Dagegen kam mir Gangrän der Haut oder der Schleimhäute nur höchst selten vor, ein paar Mal als Decubitus am Kreuzlein oder an anderen dem Druck ausgesetzten Körperstellen, einmal als Nekrose des Nasenkörpers.

¹⁾ Aehnlich gelbe Locherstraphen und dysenterische Veränderungen der Darm-schleimhaut, welche LITTLE (L. v. S. 120 und 128) beobachtete, kamen mir bei Kindern bisher nicht vor, wohl aber Darmcatarrh und Schwellung der solitären und Peyer-schen Falteln.

nimals aber in der Form von Noma des Mundes oder der weiblichen Genitalien, wie es von Anderen beobachtet wurde. In der Literatur fehlt es nicht an Beispielen, in denen schon während der ersten Krankheitswochen die Zangenspitze oder Theile der Alveolarfortsätze durch Brand verloren gingen. Zu den häufigen Nachkrankheiten gehörten auch Abscesse am Halse, auf dem Rücken, den Händen, den Augenlidern und in unmittelbarer Nähe der Gelenke, welche durch ihre continuirliche Neubildung und die copiose Eiterung schliesslich Marasmus herbeiführten, ein paar Mal auch die in ihrer Nähe liegenden Gefässe perforirten. Ekzematöse und pustulöse Eruptionen, besonders im Gesicht und an den Ohren, kamen in den ersten Wochen und Monaten nach überstandener Scharlach nicht selten zum Vorschein, während ich einen Pemphigus acutus nur einmal um diese Zeit auftreten sah, und daher ungewiss bin, ob derselbe nicht als etwas Zufälliges zu betrachten war. In einzelnen Fällen wurde Fluor albus unmittelbar nach dem Scharlach beobachtet, wahrscheinlich als Folge einer Verbreitung der Dermatitis auf die Schleimhaut der Genitalien. Am wenigsten hat man, wenigstens nach meiner Erfahrung, für das Nervensystem zu fürchten. Nur bei zwei Kindern beobachtete ich unmittelbar nach dem Verlassen des Bettes einen vollkommen ataktischen Gang, welcher im ersten Fall ein paar Tage, im zweiten aber einige Wochen bestand. Chorea kam mir nur zweimal während der acuten Periode des Scharlach vor, beide Mal mit Gelenkschmerzen, resp. Synovitis verbunden, nie aber als Nachkrankheit. Bei der sehr grossen Zahl der choreakranken Kinder, welche ich zu sehen Gelegenheit hatte, scheint mir dieser Umstand um so bemerkenswerther, als andere Autoren (Gubler und Bouchat) gerade Chorea nach Scharlach häufig beobachtet haben wollen. Erwähnt sei schliesslich noch die Manifestation einer hämorrhagischen Diathese in Form von Purpura, welche ich wiederholt als Nachkrankheit, und zwar bisher immer mit glücklichem Ausgange beobachtete, während andere Autoren auch schnell tödtliche Fälle dieser Art verzeichnet haben. Mir stehen im Ganzen 5 Fälle von Purpura nach Scharlach zur Verfügung, welche sämmtlich in der 3. oder 4. Woche nach der Eruption sich entwickelten. In keinem dieser Fälle hatte die Scharlatina eine wesentliche Abweichung von ihrem normalen Verlauf dargeboten. Bei drei Kindern wurden nur Blutextravasate in der Haut verschiedener Körpertheile beobachtet, z. B. bei einem 3-jährigen Mädchen eine sehr reichliche confluirende, fast symmetrisch angeordnete Purpura auf beiden Wangen und auf der Streckseite beider Vorderarme. In den beiden anderen Fällen fanden gleichzeitig noch Blutungen aus Schleimhäuten

(Morbus maculosus) statt. Mit Ausnahme eines einzigen wurde bei allen gleichseitig Nephritis beobachtet:

Maria U., 6 Jahre alt, aufgenommen am 25. Novbr. 1874, soll seit 3 Wochen krank sein. Seit 3 Tagen bläset sie fast anhaltend aus der Nase, dem Munde und den maxillaren Gehörgängen, ist fast appetitlos, sehr kermelzgelblich und anstichig. Puls kaum fühlbar, Extremitäten und Gesicht kühl, allgemeines Zittern. Die Haut der Extremitäten spärlich, Bauch und Brust aber mit zahlreichen grossen und kleineren, aus Thrombosen Erythemen bedeckt. Das rechte obere Augenlid durch blassgelbe Schwellung geschwollen, Geögenes Oedem der Beine. Brust- und Bauchorgane normal. Urin enthält eine mässige Menge Albumen, Epithelien und Cylindrer. Stuhlgang schwarz, blutig. T. 38—38.4. Die Anamnese ergab, dass das Kind Scharlach überstanden hatte, was auch durch die festlichen Reste der Abkapsung bewiesen wurde. Therapie: Tamponade der rechten Nasenhöhle behufs der Entleerung. Injection von Ergotin, 0.1. Vom 25. an Ergotin 1.5 : 120 Zufällig 1 Kinderleib! Schon am nächsten Tage Katheterung, besserer Appetit, ein paar Stühle aber nicht blutige Stühle; allmähliches Schwinden des Erythems, keine neuen Blutungen. Nephritis fortwährend bis zum 1. Dec., wo die Urin normal erscheint und auch das Oedem geschwunden ist.

Unter dem Gebrauch des Ergotins heilten auch die anderen Fälle in kurzer Zeit, und die gleichzeitige rasche Rückbildung der Nephritis, welche mir in den beiden ersten von mir beobachteten Fällen dieser Art auffiel, veranlasste mich gerade, mit diesem Mittel bei der Nephritis scarlatinosa überhaupt Versuche anzustellen. Wodurch die hämorrhagische Diathese nach Scharlach zu Stande kommt, wissen wir nicht; vielleicht handelt es sich um molekulare Veränderungen in den Wänden der kleinen Gefässe, wodurch eine grössere Brüchigkeit derselben bedingt wird. Bemerkenswerth ist, dass eine kurz zuvor überstandene Purpura keine besondere Disposition begründet; denn bei einem 10-jährigen Knaben, welcher Anfangs Mai 1875 in meiner Klinik an Purpura rheumatica behandelt und am 16. Mai von Scarlatina befallen wurde, fand nach demselben kein Recidiv der Purpura statt.

Wie beim Typhus abdominalis, kommen auch beim Scharlachfieber, wenn auch viel seltener, Recidive vor. Nachdem der Kranke schon mehrere Tage oder selbst einige Wochen vollständig entfiebert war, und die Desquamation in normaler Weise eingetreten ist, bricht mit plötzlichem auftretendem Fieber das Exanthem entweder am ganzen Körper oder nur partiell von neuem hervor, und die Krankheit macht ihren Verlauf zum zweiten Mal durch, wobei die Symptome sogar bedrohlicher sein können, wie im ersten Anfall. Seit den Arbeiten von Trojanowski, Thomas und Körner¹⁾ hat sich die Aufmerksamkeit der Aerzte mehr

¹⁾ Jahrb. f. Kinderheilk. 1873. S. 417; ibid. 1876.

und mehr diesen Recidiven zugewandt, und ich selbst hatte Gelegenheit, dieselben wiederholt zu beobachten:

Flora M., 19-jährig, vor 12 Tagen an einfachem Scharlach erkrankt, seit 5 Tagen ganz fieberfrei und munter, wurde plötzlich wieder von starkem Fieber mit lebhaften Delirien befallen, wenn sich Husten und rascher Athmungswechsel. Am 27. Dec. 1876 (also 12 Tage nach der ersten Eruption) fand ich 32 Resp., Stenose, hörten beiderseits und links vom raschen Athmen mit zahlreichen feinsten Rasselgeräuschen. Zunge trocken. Auf der Haut des ganzen Körpers starke Desquamation und darüber eine diffuse dunkle Rötze, welche am Tage zuvor noch nicht bemerkt worden war. P. 144. In den nächsten Tagen gewiss sich dann starke Pharyngitis und Coagulation, und am 30., während sich die beschriebenen Symptome allmählig zurückbildeten und das Fieber sich verminderte (38,5) Anschwellung der submaxillären Lymphdrüsen, Prominenz der Zungenspitzen und gelblich weisse Auflagerung auf beiden entzündeten Tonsillen. Ab 29,5. Am 31. erlosch das Kratzen und nur am folgenden Tage ganz verschwinden. Auch die Angina und die Eosinose nahmen ab, und am 6. Jan. war die Kranke fieberfrei. Dagegen war Otitis und Schwerhörigkeit eingetreten, welche sich, ebenso wie die Abschuppung, mehrere Wochen hinzog. Die Therapie bestand aus hydropathischen Einathmungen des Thymol und Turb. roth. (0,12 : 1000), später Inf. rad. ipoc. und Kali chloric. (5 : 100) zum Gurgeln.

Ein 5-jähriger Knabe bekam am 28. Aug. Scharlach. Am 22. Septbr., also 25 Tage später, neues Fieber (38,5), Erbrechen, allgemeine blasser Rötze und Angina. Am 27. Schwanden des Anschlages und des Fiebers. Erneute Desquamation.

Marie S., mit Scharlach erkrankt am 11. Oct. 1878. Normaler Verlauf. Am 13. Tage plötzlich neues Fieber (39,5) und diffuse rothes Erythem auf dem Rumpf und den Oberschenkeln, welches nach 24 Stunden erlosch und dann ganz verschwand. T. 38,7 wegen Otitis und einiger noch bestehender nekrotischer Plaques im Rachen. Völlige Heilung.

Ein 21-jähriger Knabe (April 1880) bekam 4 Wochen nach dem ersten Anfall von Scharlach ein Recidiv, welches eine heftigste parainf. Pleuritis zur Folge hatte. Heilung nach zweimaliger Punktion und Aspiration.

Von einer neuen Infection kann unter diesen Umständen ebenso wenig die Rede sein, wie beim Typhus, und ich kann mir daher nur denken, dass das scharlachöse Virus durch den ersten Anfall nicht vollständig eliminiert worden ist und demnach ein Nachschub folgen muss. Bei geschärfter Aufmerksamkeit dürften die Recidive häufiger beobachtet werden, als bisher; nur erwarte man nicht immer ein so prägnantes Bild, wie in unserem ersten Falle; vielmehr können einzelne Erscheinungen, Fieber oder Exanthem, in so flüchtiger Weise von neuem auftreten, dass sie, namentlich in der Ambulanz, leicht übersehen werden. Andererseits hüte man sich auch vor der Verwechslung einfacher Erytheme oder Urticaria, welche ich öfters nach dem Ablauf des Scharlach auftreten sah, mit einem Recidiv, welchem immer eine erneute

Desquamation folgen muss. Jedenfalls hat man dem Recidiv keine geringere Bedeutung zuschreiben, als dem ersten Anfall; mehrere Fälle, unter anderen auch ein von mir selbst¹⁾ beobachteter lehren, dass es unter malignen Erscheinungen lethai enden kann, während der erste Anfall ganz normal verlief.

Die Desquamation scheint mir nach von besonderer Wichtigkeit für die Beurtheilung der sogenannten *Scarlatina sine exanthemate*, d. h. einer Scharlachkrankung, in welcher der Ausschlag fehlt. Dass solche Fälle, wenn auch nicht gerade häufig, vorkommen, ist unzweifelhaft. Sie charakterisiren sich dadurch, dass in manchen Familien mehrere Mitglieder an vollständigem Scharlach mit normal ausgebildetem Exanthem erkranken, während andere, insbesondere die Eltern und Dienerschaft, zweifeln aber auch Kinder, mögen sie aus das Scharlachfieber schon überstanden haben oder nicht, nur von einer mehr oder minder heftigen Pharyngitis mit Fieber und bedeutender Störung des Allgemeinbefindens befallen werden, ohne ein Exanthem darzubieten. Trousseau will auch unter diesen Umständen einen ungewöhnlich schnellen Puls beobachtet haben. Dies schließt aber auch die nachfolgende Desquamation aus, welche nur da zu erwarten ist, wo ihre anatomische Bedingung, d. h. die Dermatitis, vorausgegangen war. Ein paar Mal, und zwar bei erwachsenen Personen, hatte ich auch Gelegenheit, als Nachkrankheit dieser *Scarlatina sine exanthemate* eine Nephritis zu beobachten, welche jeden Zweifel an der Natur der Krankheit ausschliessen müsste. Dass sogar Gelenkschmerzen diese Form mitunter begleiten, lehrt der folgende Fall.

Im Oktober 1878 kam ich bei zwei Kindern consultiert, von denen das Ältere an einer Stomatitis ylangata mit sehr heftiger Pharyngitis litt. Auf den Armen war das Exanthem noch deutlich sichtbar, im Gesicht stellenweise schon Desquamation vorhanden. Der jüngere Knabe litt ebenfalls stark (A), (Temper. 40,0), hatte eine starke, also vielsache Angina, ohne eine Spur von Exanthem, so genau sich täglich darauf untersucht wurde. Am 8. Tage traten unter anhaltendem Fieber sehr heftige Schmerzen in den Hals-, Knie-, Ellenbogen- und Knöchelgelenken auf, welche jede Bewegung hinderten, aber nicht mit Anschwellung verbunden waren. Wässersekretion. Heilung nach wenigen Tagen. Keine Desquamation. —

Die Empfänglichkeit für das Scharlachfieber ist in allen Stufen des Kindesalters vorhanden, am geringsten bei Kindern unter 2 Jahren. Wenn ich auch in meiner Klinik oft genug Scharlach bei Kindern dieses Alters zu sehen bekam, und gerade diese die stärkste

¹⁾ *Cherub-Annales*. VII. S. 611.

Mortalität zeigten, so wird doch das Alter zwischen 3 und 8 Jahren weitaus am häufigsten befallen. Im Allgemeinen entgehen weit mehr Menschen dem Scharlach, als den Masern, welche oft noch im erwachsenen und selbst im vorgerückten Lebensalter bei Individuen auftreten, die als Kinder von ihnen verschont geblieben waren. Vom Scharlach bleiben indess sehr viele Menschen während des ganzen Lebens frei, und zwar auch solche, die sich vielfach der Ansteckung aussetzen müssen. Ueber die Art der Infection fehlt uns jede sichere Kenntniss. Dass ein längerer Aufenthalt bei Scharlachkranken, also das Einathmen der den Kranken umgebenden Luft am leichtesten die Ansteckung vermittelt, steht fest; wahrscheinlich, wenn auch nicht gewiss, ist auch die Verschleppung des Virus durch Kleidungsstücke und andere Gegenstände, vielleicht auch durch Lebensmittel. In England wird in dieser Beziehung besonders die Milch als Träger der Infection mit Scharlach, wie auch mit Typhus und Diphtherie, beschuldigt. Ist dies richtig, so wird auch die sorgfältigste Ueberwachung nicht im Stande sein, die Ausbreitung dieser Krankheiten zu verhindern, und ich erinnere mich in dieser Beziehung mit besonderem Unbehagen eines Besuchs, welchen ich dem an malignem Scharlach daniederliegenden Kinde eines Bäckers abstattete. Hier lag das Krankenzimmer dicht neben dem Verkaufslocal, mit welchem es durch eine vielfach geöffnete oder ganz offenstehende Thür communicirte, so dass eine Imprägnirung der Backwaare mit der Infectionsluft nothwendig stattfinden musste. Man stelle sich nun die Folgen vor, wenn in der That auf solche Weise eine Ansteckung vermittelt werden kann!

Die Thatsache, dass Individuen mit offenen Wunden eine gesteigerte Empfänglichkeit für das Scharlachcontagium besitzen, wofür auch die bekannte Disposition der Wöchnerinnen zu dieser Krankheit spricht, konnte ich auf meiner Klinik wiederholt bestätigen¹⁾. Kinder mit frischen Operationswunden (Phimose, Tracheotomie, Augenoperationen u. s. w.) wurden oft, und zwar gewöhnlich 5 bis 7 Tage nach der Operation von Scharlach befallen, was mit den Beobachtungen von Hillier²⁾ und Riedinger³⁾ im Allgemeinen übereinstimmt. Daraus liegt zugleich eine Bestätigung der bekannten Thatsache, dass dem Scharlach ein im Verhältniss zu anderen Infectionskrankheiten (Masern, Pocken) äusserst kurzes Incubationsstadium zukommt. Wenn es auch oft sehr

¹⁾ Charité-Annalen. I. S. 399.

²⁾ Diseases of children. London 1868. p. 289.

³⁾ Centralbl. f. Chirurgie. 1880. p. 57. Dagegen spricht die Beobachtung von Traub (ibid. aa. 18) nicht für einen solchen Einfluss der Traumen.

schwer, ja unmöglich ist, den Zeitpunkt der Ansteckung genau zu bestimmen, so ergaben doch wiederholte, sowohl in meiner Privatpraxis, wie in der Klinik gemachte Beobachtungen, dass die Incubationsperiode nicht länger als 4 Tage, mitunter nur 36—48 Stunden dauerte, während Trousseau, Murchison u. A. eine noch kürzere Dauer (24 bis 8 Stunden) beobachtet haben wollen. Der S. 586 mitgetheilte Fall, in welchem Varicellen und Scharlach gleichzeitig bestanden, und ebenso der folgende können als Beispiel dieser raschen Entwicklung dienen:

Knabe von 10 Jahren, am 5. Decbr. 1866 an Scharlach erkrankt, mit welchem er nachweisbar in der Schule durch einen neben ihm sitzenden Mitschüler infectirt worden war. Trotz der sofortigen Absonderung zweier jüngeren Schwestern erkrankte die eine bereits am 8., also schon nach 3—4 Tagen, ebenfalls an Scharlach, und hier lässt sich bestimmt nachweisen, dass die Ansteckung nur durch den Bruder erfolgt sein konnte. —

In welcher Periode seines Verlaufs Scharlach am leichtesten infectirend wirkt, wissen wir nicht. Vorläufig müssen wir daher die ganze Zeit der Erkrankung bis zum Ablauf der Desquamation als infectiösfähig betrachten und die erkrankten Kinder demgemäss isoliren. Die Möglichkeit einer Ansteckung schon im Incubationsstadium bestimmte mich eben zu den (S. 589) empfohlenen strengen Maassregeln in Bezug auf den Schellensack.¹⁾

Ein zweimaliges Auftreten des Scharlachfiebers in einem und demselben Individuum ist jedenfalls sehr selten, wenn man die oben (S. 621) erwähnten Recidive in Abrechnung bringt. Ich selbst habe nur einen sicheren Fall bei dem Kinde eines Collegen beobachtet, welches ein Jahr nach dem ersten unzwifelschaften Ausfall durch die Erkrankung eines Bruders an Scharlach von neuem infectirt wurde und die Krankheit mit prägnanten Symptomen und schliesslich mit starker Desquamation zum zweiten Mal durchmachte. Auch hier hätte man sich übrigens vor Verwechslungen mit febrhaften Erythemen, welche leicht für wiederholte Scharlachreptionen gehalten werden können, —

Ich komme schliesslich zur Behandlung der Krankheit. In allen Fällen mit normalem, von Complicationen freiem Verlauf bedarf es keiner Medicamente. Man isolire die Kinder von ihren Geschwistern, oder bringe die letztern, wo es angeht, lieber ganz aus dem Hause, um die Ansteckung derselben mit dieser in ihrem Verlauf und Ausgang abzu-

¹⁾ Vergl. auch Löffelmann: *Handb. d. privaten und öffentl. Hygiene des Kindes*. Leipzig 1881. S. 385.

rechenbaren Krankheit möglichst zu verhüten. Reine Luft und kühle Temperatur (13—14° R.) des Krankenzimmers sind dringend zu empfehlen; es ist unglaublich, wie tief das Publicum noch immer in dem alten Glauben steckt, dass die Kinder möglichst warm gehalten werden müssen. Man öffne daher wiederholt, wenigstens im Nebenzimmer, die Fenster, oder lasse dieselben, wenigstens bei Tage, lieber ganz offen, decke die Kinder nur leicht zu und verlasse das Zimmer nur in den seltenen Fällen, wo über Lichtisches geklagt wird. Kühles Getränk (Wasser mit Fruchtsäften), Apfelsenscheiben, Milch, schleimige Suppen, etwas Tauben- und Hühnerbrühe lüthen die Diät während der Fiebertage. Bei Stuhlverhaltung gebe man Klystire oder reiche einen am den anderen Tag ein leichtes Purgans, z. B. einen Theelöffel Magnesia usta oder abführendes Brausepulver, ein Weinglas Bitterwasser u. s. w.

Beharrt das Fieber anhaltend auf bedeutender Höhe, und treten in Folge dessen die scheinbar malignen Symptome auf, von welchen oben (S. 615) die Rede war, Somnolenz, Unruhe, Delirien, so bedecke man den Kopf mit einer Eiskappe, gebe eine grössere Dosis Chinin (0,5 bis 1,0) oder Natr. salicyl. (1,0 bis 2,0) zwischen 4 und 6 Uhr Nachts und setze das Kind in ein laues Bad (nicht unter 25° R.). Kühle Bäder widerrathe ich entschieden aus dem Grunde, weil beim Scharlach, welches schon an und für sich zum Collaps durch Herzschwäche neigt, die Kälte mehr als bei irgend einer anderen Krankheit einen unerwartet schnellen Verfall herbeiführen kann. Dagegen sind 3stündliche wiederholte kühle Waschungen des ganzen Körpers mit einem in Wasser und Essig getauchten Schwamm sehr zu empfehlen, und dabei den lebhaft febernden Kindern meistens sehr angenehm. Will man durchaus etwas verschreiben, so eignet sich am besten die Salzsäure (F. 3).

Die antipyretische Behandlung hat aber nur da einen Erfolg aufzuweisen, wo es sich in der That um scheinbar maligne, nur durch das hohe Fieber bedingte Symptome handelt. In allen wirklich hässartigen Fällen bleiben, wie ich schon (S. 615) bemerkte, die Antipyretica ganz ohne Erfolg. Von grossen Dosen des Chinins, innerlich oder subcutan angewendet, sah ich niemals eine Wirkung, und das Natr. salicylicum halte ich in solchen Fällen sogar für ein bedenkliches, den Collaps förderndes Mittel. Ebenso wenig hatten kühle Bäder oder hydropathische Einwickelungen einen wesentlichen Einfluss auf die hohe Temperatur, die dabei entweder ganz unverändert blieb, oder nur unerheblich und auf ganz kurze Zeit herunterging, während der Puls noch kleiner und der allgemeine Verfall noch bedenklicher wurde. In mehreren Fällen sah ich während des Bades einen gefährlichen, einmal sogar einen

lethalen Collaps eintreten. Offenbar wird hier die enorm gesteigerte Temperatur durch einen so hohen Grad von Infection unterhalten, dass kein Antipyreticum dagegen aufkommen kann, und dieser Grad der Infection entscheidet meiner Ansicht nach überhaupt über den Erfolg der ganzen Behandlung. Es verhält sich hier gerade so, wie bei jeder anderen Vergiftung, deren Ausgang zunächst fast immer von der Menge des eingeführten Giftes abhängen wird. In allen schweren Scharlachfällen ist es hauptsächlich die paralyisirende Wirkung des Virus auf das Herznervensystem, deren Bekämpfung dem Arzte obliegt. Gelingt es, durch die consequente Anwendung kräftiger Excitantia die Herzaction so lange über dem Wasser zu erhalten, bis der Organismus die sonstigen schweren Folgen der Infection überwunden hat, so darf man noch auf einen glücklichen Ausgang hoffen, es müssten denn ausserdem noch schwere Complicationen (Pneumonie, Peri- oder Endocarditis, Pleuritis u. s. w.) vorhanden sein. Ist aber der Grad der Infection so hoch, dass das Herz entweder schon in den ersten 12—48 Stunden der Krankheit gelähmt wird (S. 616) oder weiterhin Sopor, Delirien, grosse Frequenz und Kleinheit des Pulses, Kälte der Extremitäten, cyanotische Hautfärbung stetig zunehmen, so ist das Rüstzeug der stimulirenden Methode ohnehin ohnmächtig, wie alle „desinficirenden“ oder „bakterientödtenden“ Mittel, von welchen ich noch nie den geringsten Erfolg gesehen habe. Mit Chinin, Carbol- oder Salicylsäure, Natrium benzoicum und subphosphoratum (10:120), stellte ich in einer grossen Reihe schwerer Fälle Experimente an, welche ganz enttäuschend ausfielen. Das schwefelsaure Natrium rief überdies wiederholt Diarrhoe hervor und musste deshalb abgesetzt werden. Ich habe daher alle diese Mittel vollständig aufgegeben und beschränke mich nunmehr auf die Anwendung der Excitantia, die wenigstens den palliativen Erfolg, die Behebung der sinkenden Herzthätigkeit für sich haben.

Unter diesen Mitteln räume ich dem Alkohol (Wein, Cognac), dem Kaffee in starker Dosis und dem Kampher die ersten Stellen ein. Letzterer verdient meiner Erfahrung nach den Vorzug vor dem unter denselben Umständen vielfach gerühmten Moschus, dessen Gebrauch in grossen Dosen ich inless immer eines Versuches werth halte. Von der beharrlichen Anwendung dieser Mittel sah ich in einer Anzahl schwerer Fälle, in welchen allerdings die Collapserscheinungen noch nicht den äussersten Grad erreicht hätten, einen entschiedenen Erfolg, und ich verweise deshalb auf die früher¹⁾ von mir mitgetheilten Be-

¹⁾ *Charité-Annalen*. Bd. III. S. 361.

achtungen. Seit dieser Zeit hat sich die Zahl der betreffenden Fälle erheblich vermehrt, und es finden sich unter denselben einzelne, in welchen die Heilung trotz einer colossalen Pulsfrequenz von 180 und darüber noch glücklich zu Stande kam.

Wein (Tokayer, Sherry, Champagner) muss stündlich zu 1—2 Kinderlöffeln, starker Kaffee zu einer halben Tasse mehrmals täglich, Kampfer zu 0,06 bis 0,2, Moschus zu 0,05 bis 0,2 je nach dem Alter 2stündlich gegeben werden. Wo das Schlucken durch die bedeutende Anschwellung der Rachenheile verhindert wird, lasse man 2mal täglich ein erweichendes Klystir von Pepton, oder von einer kleinen Tasse Beurren mit einem Eigelb und einem Löffel Wein versetzt appliciren, und mache 3stündlich eine hypodermatische Injection von Aether sulphuricus (eine Pravaz'sche Spritze voll) oder von Kampfer, sei es nun als Oleum camphoratum oder besser als Lösung von Kampfer 0,06 in Spirit. Vini und Aq. dest. zu 3,0. Diese Einspritzungen rufen an der Injectionsstelle mitunter unschöne, gelbliche, rötlichsaunige Infiltrationen hervor, welche später durch Nekrose und Eiterung ausgestossen werden. Dem gerühmten Ammonium carbonicum kann ich ebenso wenig einen Werth beilegen, wie der Valeriana, kalte vielmehr beide Mittel für viel zu schwach, um die bedrohte Herzkraft aufrecht zu erhalten. Besser eignen sich noch laue Bäder (27—25° R.) mit kalten Affusionen über Nacken und Rücken, deren Einwirkung aber deshalb genau zu überwachen ist, weil die letzteren mit bisweilen den Collaps zu befördern schienen und es starker Reizmittel bedurfte, um die gesunkene Temperatur wieder anzufachen.

Verläuft die maligne Form des Scharlach noch ohne bedrohliche Symptome von Herzschränkung, was ja viele Tage lang der Fall sein kann, so empfehle ich Ihnen den beharrlichen Gebrauch eines Decoct. cort. Chinæ (5,0—10,0:120) mit Aq. chlori (15,0), welche man bei sinkendem Pulse mit Tinctur. Valerianæ (2,0—3,0) vertauschen kann. Behufs Desinficirung der Mund-, Rachen- und Nasenhöhle mache man 2—3stündlich Ausspritzungen dieser Theile mit einer (2procentigen) Carbolsäurelösung oder mit Kali hypermanganicum (0,5:100). Auch liess ich mit Erfolg die Nase mit Zinci sulphur. (1,0:100,0) ausspritzen oder mit einer (5procentigen) Lösung von Chlorzink pinseln.

Die verschiedenen Complicationen Seitens der Ohren, der Respirationsorgane und serösen Häute werden ihrer Natur nach behandelt. Bei Synechitis lasse man die schmerzhaften oder geschwollenen Gelenke in Watte einwickeln. Der Versuch, die in der Sinusmaxillargegend sich bildenden Phlegmosen durch Bepinselung mit Jodtinctur zu zertheilen,

schlägt fast immer fehl, weit eher pflegt dies Verfahren durch die Reizung der Haut den Aufbruch zu befördern. Warme Kataplasmen, bei fühlbarer Fluctuation freiste Einschüttele, antiseptischer Verband, und bei tief dringender Eiterung fleissige Ausspülung und Drainage kommen hier vorzugsweise in Betracht.

In der Convalescenz lasse man, sobald die Desquamation beginnt, fleissig lauwarm baden. Die früher gerühmten und noch jetzt von Vielen angewendeten Speckeinreibungen des ganzen Körpers sind für mich ein überwundener Standpunkt, da ich trotz derselben nicht wagen würde, ein Kind vor der vierten oder fünften Woche ins Fesie zu schicken.

II. Die Masern.

Obwohl die Merbillen, wie Sie bald sehen werden, keineswegs immer eine leichte Krankheit darstellen, so stehen sie doch an Ernst und Schwere der Complicationen hinter dem Scharlachfieber erheblich zurück. Es fehlt ihnen vor allen die Unberechenbarkeit des letzteren, die Tücke und Plötzlichkeit, mit welcher bei diesem auch in scheinend günstigen Fällen drohende Symptome hereinbrechen. Der erfahrene Arzt ist daher auf die im Verlaufe der Masern vorkommenden ungünstigen Erscheinungen weit nicht vorbereitet, und kann die Prognose mit grosserer Sicherheit stellen, als beim Scharlach, wo dies, wie Sie sich erinnern werden, vor dem Ablauf der vierten Krankheitswoche nicht statthaft ist.

Aus gewissen Erfahrungen, welche in Localitäten, die eine lange Reihe von Jahren von den Masern unberührt geblieben waren, gemacht wurden, so besonders von Panum auf den Faröerinseln, wissen wir, dass die Incubationsperiode, also die Zeit zwischen der Ansteckung und dem Auftreten der ersten Symptome, etwa 12 bis 13 Tage beträgt, worauf noch ein paar Tage bis zum Erscheinen des Ausschlags zu vergehen pflegen. Diese im Vergleich mit dem Scharlach (S. 625) lange Dauer der Incubation bewirkt, dass in kinderreichen Familien, wo ein Kind das andere infectirt, ein paar Monate verstreichen können, bis Alle die Krankheit durchgemacht haben. Denn infectirt werden sie fast immer sämmtlich, mag man nun die Kinder isoliren oder nicht, was von der grösseren Flüchtigkeit und Diffusion des Contagiums durch alle Wohnräume abzuhängen scheint. Deshalb gelangen auch nur verhältnissmässig wenige Menschen über die Kinderjahre hinaus, ohne die Masern überstanden zu haben, und auch dann werden sie mit wenigen Ausnahmen noch als Erwachsene früher oder später befallen, während das Scharlachfieber eine bei weitem grössere Zahl von Menschen vollständig verschont.

Die Periode der Incubation ist in den meisten Fällen gänzlich frei

von krankhaften Erscheinungen. Nur selten konnte ich die Beobachtungen von Thomas, Rehn u. A. bestätigen, dass schon in dieser Zeit ephemere Fiebersymptome (38,8—39°) auftreten können. Freilich wird in solchen Fällen kaum zu entscheiden sein, ob die vorübergehende Temperatursteigerung wirklich mit den Masern zusammenhängt, oder von einer anderen unbekannten Ursache herrührt:

Kind von 2 Jahren, am 5. März 1873 mit Oreama aufgenommen. Am 12. plötzlich Fieber (38,2), etwas Husten und Diarrhöe, am 14. wieder fieberlos. Am 28. erst beginnt das Prodromalstadium, Eruption der Masern am 1. April.

Kind von 4 Jahren mit Oreama aufgenommen. Am 5. April allgemeines Unwohlsein; 37,9, am nächsten Abend 39,4. Von da an fieberlos und milder bis zum 15. (also 10 Tage), wo das Prodromalstadium beginnt.

Der Eintritt des Prodromalstadiums giebt sich bei den meisten Kindern durch allgemeines Krankheitsgefühl, Verlust der Laune und des Appetits und leichte katarrhalische Symptome kund. Die Augenlider sind schwach geröthet und etwas geschwollen, die Augen trübe und leicht tränenend; häufiges Niesen, auch wohl Nasenbluten, und ein kurzer trockener Husten sind gewöhnliche Begleiter. Einige klagen auch über Schmerz beim Schlucken, und die Untersuchung des Rachens ergiebt dann eine leichte Angina tonsillaris. Diese katarrhalischen Symptome, die während einer Masernepidemie hinreichend sind, um den bevorstehenden Ausbruch der Krankheit zu verkünden, können freilich auch so unbedeutend sein, dass das Wohlbefinden der Kinder kaum gestört erscheint, und nur das Thermometer den drohenden Feind verräth. Dasselbe ergiebt nämlich fast durchweg eine mehr oder minder erhebliche Temperatursteigerung, die meistens nur Abends 37,8 bis 38°, in anderen Fällen schon Morgens, besonders am ersten Tage 38 bis 39° beträgt, stets aber Schwankungen zeigt, so dass z. B. am zweiten Tage die Temperatur wieder ganz oder nahezu normal sein kann, und erst am dritten Tage wieder zu die Höhe geht. Unter diesen Umständen versäumen Sie nie, auch wenn die Kinder nicht über Schmerz beim Schlucken klagen, die Rachenhöhle zu untersuchen. Vom Ende des zweiten Tages an bemerken Sie in den meisten Fällen, besonders bei kräftigen blutreichen Kindern, am harten und weichen Gaumen eine diffuse, hier und da dunkeler gefleckte Röthe, seltener auf der sonst noch Massen Schleimhaut mehr oder weniger zahlreiche punkt- und sternförmige rötliche Flecken; erstere pflegt der Eruption der Mochillen fast immer vorauszu gehen. Die Dauer des Prodromalstadiums beträgt im Durchschnitt 3., weit seltener 4 bis 6 Tage, ohne dass man immer im Stande ist, den Grund dieser Anomalien anzugeben. Man vergleiche z. B. die folgenden Curven:

Kind von 1½ Jahren.			Kind von 3 Jahren.		
M.	A.		M.	A.	
2. Dec.	—	39,6 Congestion.	28. März	—	39,3
3.	38,1	39,4 Husten.	29.	37,6	38,4 Katarrh.
4.	39,4	39,5.	30.	38,7	39,2 Congestionitis.
5.	38,5	39,8 Eruption.	31.	38,6	39,8.
			1. April	39,8	39,8.
			2.	39,1	40,0 Eruption.
Kind von 4 Jahren.			Kind von 3½ Jahren.		
M.	A.		M.	A.	
10. Aug.	—	39,3 Angina.	15. Nov.	37,6	38,1 Katarrh.
17.	38,5	38,2.	16.	—	39,3 39,6 Zunahme.
18.	37,7	38,3 Eruption.	17.	—	38,8 40,4.
19.	38,1	39,4 Husten.	18.	38,5	39,6.
20.	—	38,4 39,6 Eruption.	19.	—	40,3 40,2 Pneumonie.
			20.	—	39,5 40,2 Eruption.

Von diesen 4 Fällen ist nur der letzte, in welchem der verzögerte Ausbruch der Masern mit einer schon während des Prodromalstadiums entwickelten Pneumonie zusammenfällt. Solche Fälle kommen indess öfters vor, und man muss annehmen, dass eine so frühzeitig auftretende ernste Complication den Ausbruch des Exanthems zurückhält, während die Laien hier von einem „Zurückbleiben“ oder „nach Innen-schlagen“ desselben zu sprechen pflegen. Auch bei schwächlichen oder sonst kranken Kindern zieht sich das Vorläuferstadium gern etwas länger hinaus. Die äussere Haut bietet während desselben in der Regel keine krankhaften Erscheinungen dar; nur selten bemerkt man schon jetzt im Gesicht sehr kleine blasse-rote Papeln, ausnahmsweise auch ein flüchtiges Erythem (Rash der Engländer):

Bei einem 2jährigen Kinde entstand am 1. März 1877 plötzlich Fieber und Husten. T. 38,4; A. 40,0. Auf Gesicht und Brust eine lebhafte diffuse Röthe. Am 2. ist dieselbe verschwunden. Bronchopneumonie, bes. im linken Unterlappen, und starke Diarrhoe. In der Nacht vom 3. zum 4. Ausbruch des Masernexanthems.

Der Beginn der Eruption wird stets, ausser bei sehr elenden, an chronischen Krankheiten leidenden Kindern, durch bedeutende Zunahme des Fiebers bezeichnet. Die Temperatur steigt rasch auf 39,5 bis 40,5, und unter lebhafter Ursache und kurzem, oft fast anhaltendem Husten brecht das Exanthem zuerst im Gesicht, und zwar meistens an den Schläfen, in der Gegend vor dem Ohr und am Kinn in Gestalt stecknadelkopf- bis linsengrosser, hellrother, sehr barter Stippchen (Papeln) hervor. Die Ausbreitung derselben über das ganze Gesicht, den Hals, die Brust und weiter abwärts geschieht sehr rasch, so dass meistens schon nach Ablauf von 24 Stunden der ganze Körper bis zu den Füssen

herab vom Ausschlag bedeckt erscheint, wobei dann die oberen Körpertheile weit dichter befallen erscheinen, als die unteren Extremitäten, an welchen nur erst discrete Stippchen bemerkbar sind. Erst am folgenden Tage pflegt das Exanthem völlig entwickelt zu sein. Die anfangs nur kleinen, deutlich um die Haarwurzeln aufsprüßenden Papeln nehmen während dieser Zeit durch einen hyperämischen Hof (Rosola) an Umfang und Röthe zu, und bilden nach vollendeter Eruption erbsen- bis höhnengroße, unregelmässig geränderte, rundliche oder mehr halbmondförmige Flecken, welche beim Druck momentan verschwinden, und deren papulöser Ursprung sich mehr durch das Gefühl, als durch das Auge wahrnehmen lässt. Nur selten bemerkt man in der Mitte einzelner oder selbst vieler Stippchen eine miliäre Venikel mit trübem Inhalt, eine Erscheinung, die ich keineswegs an reichliche Schweisse gebunden fand. Die In- und Extensität, so wie die Färbung des Ausschlags bieten uns sehr erhebliche Verschiedenheiten dar. Bald stehen die Flecken am ganzen Körper discret, überall durch normal gefärbte Hautstellen von einander getrennt, bald fließen sie an einzelnen Theilen, namentlich auf den Wangen, dem Kinn, dem Rücken und an den Nates zu diffusen rothen oder bläulichrothen Flatschen zusammen, wobei besonders das Gesicht durch seine Turgescenz und durch die geschwellenen, der Lichtscheu wegen meistens geschlossenen Augenlider einen ganz veränderten Ausdruck darbietet; mitunter ist der Ausschlag am ganzen Körper nur sehr sparsam entwickelt, die einzelnen Stippchen sind klein und blassroth und fehlen an manchen Körpertheilen gänzlich. Diese schwach entwickelten, so zu sagen rudimentären Formen scheinen vorzugsweise bei heruntergekommenen, durch chronische Krankheiten erschöpften Kindern, die vollständig entwickelten und zum Theil confluirenden Eruptionen aber mehr bei kräftigen, gesunden Kindern vorzukommen, was indess keineswegs constant ist. Ebenso wenig ist das Hinzutreten einer ersten Complication immer eines hemmenden Einfluss auf die Erscheinung des Exanthems. Vielmehr sah ich gerade in mehreren Fällen, welche mit bedeutender Bronchitis und Bronchopneumonie complicirt waren, den Ausschlag sehr ausgebreitet, theilweise confluirend und von blühend rother Farbe. Wichtiger erschien mir immer der Entwicklungsgang des Ausschlags. Wo statt der regelmässigen Ausbreitung vom Gesicht abwärts nach den Füssen, das Exanthem zuerst auf der Brust oder auf dem Rücken hervorbricht und von hier unregelmässig ausstrahlt, wird sehr häufig der Verlauf der Krankheit durch Complicationen oder durch eine bereits vorhandene Körperschwäche ungünstig beeinflusst. Dass aber auch diese Thatsache nicht durchweg gültig ist,

vielmehr die Eruption, wie beim Scharlach, auch in günstigen Fällen von Masern nur äusserst unbedeutend sein kann, beweist unter andern der folgende Fall:

Clara M., 2jährig, aufgenommen am 5. März 1873 mit Masern. Am 28. Beginn des Prodromalfiebers und Katarth; am 1. April viel Husten, Conjunctivitis, einige Massenflecken auf Brust und Bauch, am 2. Eruption im Gesicht und an andern Körpertheilen, T 38,1, P. 112, Am 3 bereits entleert. Am 4. Exanthem überall abgeblasst, nur noch im Gesicht deutlicher sichtbar. Normaler Verlauf.

Bis zur vollendeten Eruption und gewöhnlich noch etwas länger, also etwa 36 bis 40 Stunden, dauert das Fieber in ungebrochener Heftigkeit fort, so dass die Temperatur Morgens 38,5 bis 39,6 (mitunter sogar 40,3), Abends 38,8 bis 40,5 (zuweilen auch 41°) erreichte. Nur ausnahmsweise beobachtete ich einen Typus inversus (Morgens 39,5; Abends 38,5). Grosse Unruhe, Durst, heftiger Hustenreiz sind stete Begleiter. Aber schon am 2. Tage nach dem Beginn der Eruption macht sich, obwohl der Ausschlag noch in Blüthe steht, ein bedeutender Temperaturabfall bemerkbar, im Gegensatz zum Scharlach, bei welchem, wie Sie sich erinnern werden, das Fieber in der Regel mindestens so lange dauert, als das Exanthem auf der Haut sichtbar ist. Oft sah ich schon am 2. Tage nach der Maserneruption kritischen Abfall auf 37,2 und 37,6, Abends höchstens 37,9, während in anderen uncomplicirten Fällen Abends noch 38,8 oder selbst 39,4 erreicht wurde. Mit dem Ablauf des 2. Tages aber sind die meisten einfachen Fälle absolut fieberfrei, zeigen sogar Morgens nicht selten subnormale (36 bis 37°) Temperatur; eine kleinere Zahl bietet bei normaler Morgentemperatur noch abendliche Erhebungen bis 38,0 und 38,5, bisweilen sogar noch bis zum 4. Tage dar, so dass der Abfall nicht kritisch, sondern in der Form der Lysis erfolgt¹⁾. Gewöhnlich treten um diese Zeit starke nächtliche Schweisse mit lebhaftem Jucken auf, und die Haut zeigt oft zahlreiche Sudamina. Wo aber über den vierten Tag hinaus noch Fiebertemperaturen sei es Morgens oder Abends beobachtet werden, da seien Sie immer auf der Hut. Es handelt sich dann stets um eine Complication, am häufigsten um einen diffusen Bronchialkatarth oder um eine Pneumonie, und eine genaue Untersuchung der Athmungsorgane ist dann dringend geboten. Sie sehen also, wie wichtig in diesem Falle die Anwendung des Thermometers werden kann.

¹⁾ Nach den Untersuchungen von Däniker (Jahresbericht pro 1881, S. 67) nimmt während der Fieberperiode die Zahl der rothen Blutkörperchen bis unter die Hälfte der Norm ab (steigt erst wieder am Anfang der zweiten Woche), während Mikrocysten, ihre Kerne und Nucleusfragmente reichlicher auftreten.

Während des dritten und vierten Tages erblässt das Exanthem gewöhnlich sehr schnell. Man kann annehmen, dass dasselbe nach seiner vollen Entwicklung höchstens einen Tag auf der Akme verharret; selten zeigte das Blüthestadium des Ausschlags eine ungewöhnliche Länge, so dass derselbe z. B. in den beiden ersten Tagen nur spärlich und blass erschien, und erst am dritten Tage ganz erwarteter eine lebhafte Röthe und Entwicklung darbot. Meistens zeigt das Gesicht schon am zweiten Tage nur noch Masse Flecken, während dieselben am Rumpf und den Extremitäten noch roth erscheinen. Mehrere Tage nach dem Erblässen bleiben gelbliche oder gelblich graue Flecken, welche der Haut ein marmorirtes Ansehen geben, sichtbar und verschwinden dann spurlos, um einer leichten kleienförmigen Abschilferung Platz zu machen, deren Grad sich nach der Intensität des Exanthems richtet. War dasselbe spärlich und blass, so ist auch die Desquamation am wenigsten gering und kann sogar fast ganz fehlen, während nach einem sehr entwickelten und theilweise confluirenden Ausschlag an den vorzugsweise betroffenen Hautstellen nicht bloss ein feiner mehrlartiger Staub, sondern auch wohl eine kleintetige Ablösung der Epidermis zu bemerken ist.

Die Erscheinungen, welche ausser dem Fieber die Eruption und das kurze, etwa 24stündige Blüthestadium begleiten, weichen von denjenigen des Profrimalstadiums nicht wesentlich ab. Fälle von absoluter Encephalitis, wobei die stark (bis 40,0) fiebernden Kinder sogar noch zum Spielen und Essen aufgelegt sind, kommen zwar bisweilen vor; in der Regel aber findet man Conjunctivitis und Blepharitis, mehr oder minder starke Lichtscheu, die ich nur selten ganz fehlen sah, Schnupfen, Nasenbluten, häufigen kurzen, etwas rauhen Husten, Anorexie, grauweissen Belag der Zunge, deren Papillen an der Spitze bisweilen geröthet und etwas prominirend erscheinen, auch wohl anginöse Beschwerden, Schmerz beim Schlucken, Röthung und Schwellung der Rachenböhle, besonders der Tonsillen. Oefters ist auch das Zahnfleisch und die gesammte Mundschleimhaut stark geröthet, empfindlich, und hier und da mit dornartigen Fetzen von abgestossenem Epithelium bedeckt. Manche Kinder leiden auch am ersten Tage der Eruption wiederholt an Uebelkeit und Erbrechen, mehr noch an Diarrhoe, welche sogar recht profus sein und geringe blutige Beimischungen zeigen kann. Bei sehr intensivem Fieber liegen die kleinen Patienten oft in anhaltendem Halbschlummer, phantastiren zeitweise, besonders in der Nacht, und bekommen leicht trockene, mit dünnen bräunlichen Borken bedeckte rissige Lippen. Ueber Hautjucken wird nicht selten geklagt. Ein 3jähriges Mädchen zeigte starkes Drängen zum Urinlassen und eine sehr sparsame und schmerzhafte Ham-

entzündung, welche von einem Katarrh der äusseren Genitalschleimhaut abzuhängen scheint. Bei der Untersuchung der Brustorgane, welche man namentlich bei verstärkten und beschleunigten Athembewegungen nie vernachlässigen sollte, hört man gewöhnlich nur ein raubes Athemsgeräusch und Schnurren, später meistens Rasseln an der Rückenseite, in manchen Fällen aber gar nichts abnormes. Nur der durch einen Fingerdruck auf die Trachea hervorgerufene schmerzhafteste Hustenreiz verkündet uns den Katarrh der Luftröhre und der grossen Bronchien. Die Frequenz der Respiration (30 bis 40) entspricht der hohen Temperatur und dem Pulse, welcher meistens auf 132—144 in der Minute steigt, darf also, wenn nicht etwa Dyspnoe vorhanden ist und die Untersuchung etwas Bedenkliches ergibt, nicht leuzruhigen. Denn sowohl dies, wie alle anderen erwähnten Symptome gehen mit dem Abfall des Fiebers schnell zurück, und schon am 4. oder 5. Tage (vom Beginn der Eruption an gerechnet) können die meisten Kinder als Reconvalescenten betrachtet werden, wobei nur noch ein geringer katarrhalischer Husten und die nicht immer leicht nachzuweisende Abschuppung an die überstandene Krankheit erinnern. In durchaus nicht selteneren Fällen sehen Sie aber die Spuren des Exanthems in Form bläulichrother, dem Fingerdrucke nicht weichender, discreter oder selbst confluirender Flecken am ganzen Körper oder nur an einzelnen Theilen, z. B. am Bauche, weit über die gewöhnliche Zeit hinaus, selbst noch 2—3 Wochen lang fortbestehen. Es handelt sich dabei um kleine, durch die Intensität der Hyperämie bedingte Hautblutungen, vielleicht nur am einen Durchtritt von Blutkörperchen durch die Wände der überfüllten kleinen Gefässe (die sogenannten hämorrhagischen Masern), welche den milden Verlauf der Krankheit in keiner Weise beeinträchtigen und prognostisch ebenso wenig Bedeutung haben, wie die aus gleicher Ursache bisweilen zu beobachtenden kleinen Blutflecken am Gaumen und Pharynx. Mit einer eigentlichen „hämorrhagischen“ Diathese hat diese Form der Masern durchaus nichts zu schaffen, und der folgende Fall lehrt, dass gerade eine solche Diathese bestehen kann, ohne dass der Masernausschlag einen hämorrhagischen Charakter annehmen braucht:

Martha Sch., 3 Jahre alt, aufgenommen am 15. April 1873 mit Morbilli maculosi. Am 15. Mai Beginn der Prodrome, am 18. Eruption. Von 20, an Abklingung und Entfieberung. Am 22. Ausschlag *aparis* verschwunden. Während des ganzen Verlaufes hatte sich nirgends eine Eklhymose gebildet.

Dieser einfache, normale Verlauf der Morbillen kann durch die Steigerung gewisser begleitender Symptome oder durch neu hinzutretende Complicationen, etwelche Modificationen erliden. In erster Reihe stehen

hier die eitrigen Affectionen der Respirationsorgane, welche bei den Masern etwa dieselbe Rolle spielen, wie die verschiedenen Formen der Pharyngitis beim Scharlach. Zunächst kann von der Schleimhaut des Larynx und der Trachea aus dem Kinde Gefahr drohen. Schon bei sonst normalem Verlauf zeigt der Husten im Prodromal- und Eruptionstadium nicht selten einen rauhen oder bellenden Klang, die Epiglottis und Stimmbänder sind geröthet und geschwollen, und bei Kindern, welche eine Tendenz zum Pseudocroup haben, pflegen die Masern mit einem solchen Anfall zu beginnen, auf welchen ich hier nicht zurückzukommen brauche (S. 304). In anderen Fällen nimmt aber die Stimme und der Husten schon in den ersten Tagen der Krankheit einen heiseren Klang an, und die Kinder klagen auch wohl über Schmerz im Halse, welcher beim Schlucken und beim Druck auf den Kehlkopf oder die Luftröhre zunimmt. Ich rathe Ihnen, diese Symptome immer recht ernst zu nehmen, bei kräftigen Kindern ohne Aufschub ein paar Blatzegelein auf das Manubrium sterni zu appliciren und andere antiplagagistische Mittel (S. 314) zu verordnen, weil sonst aus dem Larynxkatarrh leicht eine heftigere Entzündung mit fibrinösem Exsudat, mit einem Worte Croup sich bilden kann. Dass man diese Steigerung trotz aller Vorsicht nicht immer verhüten kann, ist sicher und wird durch einen bereits früher (S. 317) mitgetheilten Fall veranschaulicht. Die Complication mit Croup kommt bei den Masern überhaupt nicht selten vor, und zwar ohne jede diphtheritische Rachenaffectio:

Paul K., 6jährig, aufgenommen am 22. März 1887 mit Masern und Katarrh. Am 24. entleert. In der Nacht zum 26. Heiserkeit, Morgens Croup, Tracheotomie. Entleerung mehrerer Fetzen. Schneller Erfolg. Am folgenden Tage rascher Athem, Dyspnoe, Tod am 28. Section: Laryngo-tracheitis fibrinosa, Pharynx frei. Bronchitis parvula in beiden Lungen.

Gustav K., 5jährig, aufgenommen am 11. Juni 1877 mit Masern. Am 17. Heiserkeit, croupöser Husten und Athem, kein Belag im Pharynx. Fieber (39,6 Ab. 40,4). Am folgenden Tage Tracheotomie mit Entleerung kleiner fleckiger Fetzen. Fortdauer der Dyspnoe und des Fiebers (41,0). Tod am 19. Section: Laryngo-tracheitis fibrinosa; Bronchopneumonia duplex, Pleuritis destra. Pharynx intact.

Carl R., 4jährig, aufgenommen am 8. December 1876 mit Masern, die vor 2 Tagen ausgebrochen sind. Seit heute Anfalle von Athemnoth. Die Untersuchung ergibt alle Symptome des Croup, im Rachen keine Spur von Belag, nur mässige Röthung. Tracheotomie und nach derselben Inhalationen von gestülptem Kalkwasser durch die Cavität. In den nächsten Tagen Erysipelas faciei, welches von der Wunde ausgehend fast bis zur rechten Maxilla sich ausdehnt, bei mässigen Fieber und Verschwinden aller laryngealen Symptome. Vom 15. an Rückbildung des Erysipelas und des Fiebers. Vollständige Heilung.

Noch viel häufiger als der Larynx und die Trachea werden die Bronchien und das Lungengewebe der Ausgangspunkt der bedrohlichsten Complicationen. Die Bronchitis und besonders die Bronchopneumonie, welche im Gefolge der Morbillen auftreten, weichen in ihren klinischen und anatomischen Erscheinungen von den früher geschilderten (S. 375) in keiner Weise ab. Wie die aus einem gewöhnlichen Katarrh sich herausbildende, befallt auch die morbillöse Bronchopneumonie mit Vorliebe die beiden Unterlappen, doch habe ich auch Fälle von grösserer Ausbreitung, bei welchen gleichzeitig der mittlere Lappen der rechten Lunge oder ein Oberlappen mehr oder weniger mit ergriffen war, nicht selten beobachtet. Seltener kommt hier die „fibrinöse“ Pneumonie vor, welche mit der confinementellen Form der Bronchopneumonie physikalisch leicht verwechselt wird. Fibrinöse Pleuritis zeigt sich über den entzündeten Lungenlappen häufig, während flüssige Exsudate zu den Seltenheiten, und besonders grössere purulente Anhäufungen in der Pleura zu den Ausnahmen gehören (S. 371). — Auf die Bronchopneumonie haben Sie während des ganzen Verlaufs der Masern Ihre Aufmerksamkeit zu richten. Wenn sie auch, wie ich bereits erwähnte, schon im Prodromal- und Eruptionsstadium der Krankheit auftreten und bei grosser Extensität dann eine cyanotische Verfärbung des Exanthems bedingen kann, so wird sie doch entschieden am häufigsten in der Zeit der Erlassung oder erst nach dem völligen Verschwinden des Exanthems beobachtet, und auch hier liefert Ihnen das Thermometer das beste diagnostische Kriterium. Das Wiederaufflammen des Fiebers, nachdem bereits ein paar Tage eine normale Temperatur sich erhalten hatte, oder die Fortdauer des Fiebers nach der vollendeten Eruption oder gar Erlassung des Exanthems müssen Sie veranlassen, den Thorax sofort gründlich zu untersuchen, auch wenn der Athem oder Husten noch keinen bedrohlichen Charakter zeigen. Finden Sie auch nur die trockenen oder feuchten Rhonchi eines Bronchialkatarrhs, so genügen diese doch schon, Sie in der Prognose vorsichtig zu machen, weil bereits nach 24 bis 36 Stunden Dyspnoe, stöhnende Expiration, Stertor und die anderen subjectiven und objectiven Symptome der Bronchopneumonie vollständig entwickelt sein können. Gerade die im Abnahmestadium der Masern auftretende Lungentzündung ist erfahrungsgemäss die gefährlichste und entschieden die häufigste Ursache aller in Folge dieser Infektionskrankheit stattfindenden Todesfälle. Je jünger die Kinder, um so bedenklicher pflegt der Verlauf der Bronchopneumonie zu sein, besonders im Säuglingsalter, wo ich ein paar Mal heftige, selbst 24 Stunden lang sich wiederholende epileptiforme Convulsionen als Einleitung

derselben beobachtete. Aber auch bei älteren Kindern, namentlich bei solchen, die schon vorher an chronischem Bronchialkatarrh oder gar an Lungentuberkulose litten, darf die Prognose nur mit grosser Reserve gestellt werden.

Auch durch Complicationen von Seiten der Verdauungsschleimhaut kann das Fieber über die normale Zeit hinaus unterhalten werden. Bisweilen sah ich eine Angina tonsillaris noch in der zweiten Woche der Masern fortbestehen oder erst jetzt sich entwickeln, welche durch die, wenn auch nur ephemere, hohe Temperatur (bis zu 40,0), wie durch die graugelben Eiterpunkte auf den Mandeln die Befürchtung einer Diphtherie erregte. Auf der Zunge, mitunter auch auf anderen Theilen der Mundschleimhaut, bildet sich bisweilen, in einzelnen Epidemien häufiger als in anderen, eine der beim Scharlach (S. 612) beschriebenen ganz ähnliche Form von Stomatitis, welche durch Schmerzen und Verhinderung des Essens sehr störend werden kann.

Maria St., 1 $\frac{1}{2}$ Jahre alt, aufgenommen am 7. Mai 1876 im Abnahmestadium der Masern, welche auch als gelblich graue Pignmentflecken sichtbar sind. Leichtes Bronchialkatarrh. T. 39,5. P. 100. R. 40. Schleimhaut der Lippen, Wangen und Zunge stark gewulstet, rath, bei Berührung leicht blühend, und streckenweise mit gelblich grauen Plaques bedeckt; starker Speichelfluss. In den folgenden Tagen Fortdauer dieser Symptome mit hohem Fieber (bis 40,2), grosser Unruhe, Schlaflosigkeit, Durchfall. Vom 10. an Besserung. Fieber remittirend, Mundschleimhaut unter dem Gebrauche einer Pflasterung mit Zinc. sulphur (S. 613) allmählig zur Norm zurückkehrend. Am 25. Fieberfrei. Durchfall durch Bismuth. nur 0,2 Tisulfolien beseitigt. Heilung.

Eine weit häufigere Complication bildet die Diarrhoe, welche schon in den ersten Tagen der Masern auftreten kann, in manchen Epidemien fast zu den constanten Symptomen gehört, und sich oft mit heftigen Bronchialkatarrhen oder mit Bronchopneumonie im Abnahmestadium combinirt. Diese Diarrhoe ist wegen ihrer nicht seltenen Intensität keineswegs unbedenklich. Die Ausleerungen werden leicht profus, erfolgen 12—20 mal täglich, oft begleitet von heftigen Koliken, und nehmen durch Tenesmus und blutige Beimischungen leicht einen dysenterischen Charakter an, welcher tödtlichen Collaps herbeiführen kann. In der That ergaben die Sectionen in solchen Fällen einen mehr oder weniger intensiven acuten Katarrh des Colon mit Schwellung oder selbst Ulceration der Follikel, wie ich es früher (S. 474) geschildert habe. Obwohl nun viele Fälle bei mässiger Diarrhoe durchaus günstig verlaufen, ist doch diese Tendenz der Masern zu Darmerkrankungen immer zu berücksichtigen, und erfordert besonders Vorsicht bei der Anweisung von Abführmitteln. Um eine vorhandene Obstructio alvi zu

bestätigen, werden daher nur Klystire oder milde Mittel (Pulv. liqur. comp., Ol. ricini in kleinen Dosen) zu verordnen sein.

Wie beim Scharlach kann auch im Gefolge der Masern eine *Otitis media* mit Durchbruch des Trommelfells und fortwährender Otorrhoe sich entwickeln, welche das Fieber längere Zeit unterhält und auch nach dem Ablauf aller anderen Symptome Monate und Jahre lang zurückbleiben kann. Schwere Leiden des Gehörorgans, Taubheit, Caries des Felsenbeins lassen sich nicht selten auf eine früher überstandene und vernachlässigte *Otitis media* zurückführen, welche fast durchweg mit der scarlatinösen (S. 538) übereinstimmt. Die Frequenz der letzteren ist indess bei weitem grösser, weil ihre eigentliche Ursache, die Pharyngitis, eben beim Scharlach eine constante ist, bei den Morbillen aber seltener vorkommt, und daraus erklärt es sich auch, dass die besonders in der zweiten Woche der Morbillen auftretenden submaxillären Drüsenanschwellungen und Abscesse an Häufigkeit hinter den scarlatinösen weit zurückstehen.

Unter den Infektionskrankheiten ist es vorzugsweise der Keuchhusten, welcher sich häufig sowohl in ganzen Epidemien, wie im einzelnen Individuum mit den Masern verbindet (S. 402). Gewöhnlich besteht dasselbe schon Wochen lang, und der Hinzutritt der Morbillen ist dann immer ein schlimmes Ereigniss, weil die beiden Krankheiten gemeinsame Tendenz zur Bronchopneumonie durch diese Combination wesentlich gesteigert wird. Wenn auch viele Fälle dieser Art günstig, d. h. ohne erste Lungenaffectio verlaufen, so ist doch die Prognose immer zweifelhaft, besonders aber dann, wenn bereits eine Bronchopneumonie in Folge der Pertussis sich ausgebildet hatte und nun noch die Masern hinzutreten. Unter diesen Umständen sah ich mehrere Mal das Exanthem entweder nur spärlich zum Vorschein kommen, einen Theil der Körperoberfläche ganz verschonen, oder sofort eine cyanotische Färbung annehmen, während die schon vorhandene Dyspnoe sich enorm steigerte, die pneumonischen Geräusche sich über die ganze hintere und selbst über die vordere Fläche des Thorax ausbreiteten und der Puls immer kleiner und schwächer wurde. Fast immer erfolgte schon nach 36—40 Stunden unter intensiver Cyanose der Tod durch Collaps. Dieser schnell tödtliche Verlauf durch ausgedehnte Bronchopneumonie und Herzparalyse ist überhaupt bei allen Kindern zu fürchten, welche schon längere Zeit an erschöpften Krankheiten, chronischer Pneumonie, Diarrhöen, Tuberkulose u. s. w. leiden und dazu noch die Masern bekommen. Diese werden dann eine im wahren Sinne terminale Krankheit, deren Fiebertverhältnisse von den normalen meistens wesentlich

abweichen. In vielen Fällen dieser Art, welche ich in der Klinik beobachtete, kam es nämlich gar nicht mehr zu dem token Eruptionsfieber, vielmehr brachen die spärlichen Stippchen hervor, ohne dass die schon früher bestehende mässig erhöhte Temperatur (38—39°) eine Steigerung erfuhr, und selbst da, wo die primäre Krankheit, z. B. ein chronischer akuter Darmkatarrh, gänzlich hebellos verlief, war der Ausbruch dieser terminalen Masern bei sehr heruntergekommenen Kindern nur von einer geringen Steigerung der Temperatur begleitet, die in den Morgenstunden sogar nahezu normal blieb:

Kind von 9 Monaten, durch chronische Dysenterie sehr elend und erschöpft:

	M.	A.
17. Dez.	37,4.	38,4. Katarrh.
18.	37,5.	36,6. R. 60
19.	35,7.	39,7. Eruption der Masern
20.	37,9.	39,9.
21.	36,9.	39,2. Collaps und Pneumonie.
22.	38,3.	34,8. Tod.

Auch die Diphtherie kann als eine unter gewissen Umständen nicht seltene Complication der Masern bezeichnet werden, und zwar meine ich hier die echte Diphtherie, nicht jene nekrotische Entzündung der Rachenzorgane, welche wir beim Scharlach als eine gewöhnliche Erscheinung kennen lernten. Dafür spricht schon die Tatsache, dass diese Complication, wenigstens nach meinen Erfahrungen, bei Masernkranken in der Privatpraxis nur ausnahmsweise vorkommt, was wohl nicht der Fall wäre, wenn es sich hier, wie beim Scharlach, um eine der Krankheit innewohnende Tendenz zu nekrotisirenden Processen handelte. Die ziemlich zahlreichen Fälle jener Complication, welche ich in meiner Klinik zu beobachten Gelegenheit hatte, kann ich mir nur aus der Infection der masernkranken Kinder mit Diphtherie in den für die Infektionskrankheiten bestimmten Räumen erklären. Mitunter kam es auch vor, dass Kinder, welche mit einer Rachendiphtherie aufgenommen waren, in der Klinik von den Masern befallen wurden, weit häufiger aber war das Umgekehrte der Fall. Gewöhnlich entwickelte sich die Diphtherie im Verlauf der zweiten Krankheitswoche und blieb nur selten, und dann mit günstigem Ausgange, auf den Pharynx beschränkt. Die meisten Fälle wurden durch Hinabsteigen der Diphtherie in den Kehlkopf und in die Bronchien tödtlich, so dass auch die Tracheotomie fast immer erfolglos blieb. In einzelnen Fällen trat die Diphtherie und der daraus resultirende Croup allerdings schon in einer früheren Periode, z. B. am 4. Tage, einmal sogar mit dem Masernausschlage gleichzeitig auf, so dass schon am Tage der Eruption die

Tracheotomie ausgeführt werden musste, und die Sectionen ergaben, dass es sich hier in der That um einen ächten diphtheritischen, nicht bloss um einen rein entzündlichen Croup handelte. Da aber diese Kinder wegen anderer Krankheiten (Rachitis, Caries u. s. w.) sich bereits Wochen lang in der Klinik befinden, so ist wohl anzunehmen, dass die diphtheritische Infection hier gleichzeitig oder bald nach der morbillösen erfolgt war, und dadurch ein fast simultanes Auftreten beider Krankheiten bedingt wurde.

Von mehreren Autoren (Klüpfel¹⁾, Steiner²⁾, Löschner³⁾) werden Fälle mitgetheilt, in welchen eine Complication der Masern mit acutem Pemphigus stattfand. Einen solchen Fall hatte ich selbst zu beobachten Gelegenheit⁴⁾:

Mädchen von 4 Jahren. Die 1881 Masern mit normalem Verlauf während der beiden ersten Tage, aber Fortbestand des Fiebers. Am 3. Tage Eruption von Blasen am ganzen Körper, von Halsansatz bis Thalsegense. Am 4. Tage beide Wangen von je einer einzelnen Blase eingenommen, ebenso beide Handrücken, Inhalt der Blasen gelbliches Serum. Zwischen den Blasen, die vielfach dicht gedrängt standen, dunkles hämorrhagisches Maternenvatieren, zum Theil raufzirend. Die Blasen erhoben Oedeme auf dünnen Eruptionswällen, aber auch an massenhaften Herdpartien auf. Angesichts stark geschwollen, ebenso Lippen und Wangen, so dass der Mund nicht zu öffnen und zu ernähren war. T. M. 37,5; Ab. 36,5. P. klein, beschleunigt, Collaps, wie nach ausgebreiteter Verbrennung, wucht das Krankheitsbild überhaupt Achterförmig heran. Zwischen dem 6. und 7. Tage eingetretenes Fieber (40,5), Entzündung einer Fremdeile des rechten Unterlappens. Tod am 8. Tage. Section nicht gestattet.

Ich habe an der bezeichneten Stelle die Gründe angegeben, welche mich zur Annahme einer Complication mit Pemphigus acutus in diesem und den ähnlichen Fällen der angeführten Autoren bestimmte. In einzelnen derselben traten die Blasen zum Vorschein schon vor der Eruption der Masern auf, und bildeten auch nach dem Erlöschen desselben noch Nachschübe, einmal bis zum 15. Tage. Bemerkenswerth ist noch, dass diese Complication ein paar Mal bei Geschwistern beobachtet wurde. Drei Fälle endeten durch Pneumonie tödtlich. In der That sind hier alle Gefahren vorhanden, denen ein mit ausgebreiteter Verbrennung behaftetes Kind ausgesetzt ist, und zwar um so mehr, als die Masern an und für sich schon zu Lungen- und Darmerkrankungen disponiren.

Am seltensten wurden Complicationen der Masern mit Affectionen des Nervensystems beobachtet. Bei kleinen Kindern in den ersten

¹⁾ Hirsch-Virchow, Jahresbericht 1875, II. 317.

²⁾ Jahrb. f. Kinderheilk. VII. 1874. S. 330.

³⁾ Ibid. VII. S. 42.

⁴⁾ Berl. klin. Wochenschr. 1882, No. 15.

beiden Lebensjahren traten bisweilen eklamptische Anfälle als Einleitung des Eruptionsfiebers auf. Ältere Kinder klagen häufig über Kopfschmerzen, besonders in der Stirn, welche theils vom Fieber, theils von dem fast immer vorhandenen Schnupfen abhängen. Die während der Eruption und Blüthe des Exanthems nicht seltene Somnolenz mit geschlossenen Augen darf nicht beunruhigen, da sie mit der Abnahme des Fiebers rasch verschwindet. Ernstere nervöse Erreigungen kommen, was auch Billiet und Barthex hervorheben, nur selten vor, und der folgende Fall ist der einzige dieser Art, über welchen ich selbst zu verfügen habe:

Carl J., 3jährig, bekam Anfangs November 1876 die Masern, welche zunächst normal verliefen. In der Mitte der zweiten Woche nach der Eruption plötzlich Somnolenz, aus welcher das Kind nur schwer zu erwecken ist, starrs Contractum der Nackenmuskeln (*Bismus capitis*), mässiges Fieber, unregelmässiger Puls. Behandlung mit Blutegeln am Kopf, Eisclaus, Calomel und starken Mercuro-einreibungen in Nacken. Schnelle Besserung. Der Kopf wird gerade gehalten, Status normal, Puls regelmässig, aber noch Unmögliches zu gehen. Ohne erkennbare Ursache nach einigen Tagen Recidiv. Am 1. December wieder starrs Neckcontractum, linksseitiger Strabismus internus, bei Fieberlosigkeit und hohem Serum. Jekali (2 + 120). Am 7. Kopf bei beweglich, Schielen geringer, Epistaxis. Nach weiteren 8 Tagen völlige und dauernde Heilung.

Meine Befürchtung, dass es sich hier um eine im Gefolge der Masern sich entwickelnde Meningealtuberkulose handeln könnte, bestätigte sich glücklicherweise nicht, und man kann daher nur einen einfachen meningitischen Process von mässiger Intensität (S. 290) annehmen, wie er auch von anderen Autoren bisweilen im Gefolge der Masern beobachtet wurde¹⁾. Dass auch bei den Masern, wie beim Scharlach, schwere cerebrale Zufälle, tiefer Sopor, Delirien, Zittern, durch einen malignen Charakter der Krankheit, d. h. durch den deletären Einfluss des Virus auf das Gehirn hervorgerufen werden können, ist sicher; aber diese Malignität wird doch bei den Masern nur selten beobachtet. Mir selbst sind bisher nur vereinzelte Fälle dieser „typhösen“ oder „dynamischen“ Morbullen vorgekommen, welche ähnlich der *Scarlatina maligna*, bisweilen begleitet von starken Hämorrhagien in der äusseren Haut, sowie aus verschiedenen anderen Theilen (Mund, Nase, Darmkanal, Nieren) verlaufen und stets einen lethalen Ausgang nehmen. Das Krankheitsbild war in zwei Fällen dieser Art so beschaffen, dass man

¹⁾ Man vergesse aber nicht, dass auch ein zufälliges Zusammenstossen stattfinden kann, wenn die Masern selbst nicht schuld sind. Gewiss gehört ein Theil der von Thomas (Ziemssen's Handb. d. spec. Path. u. Ther. II. S. 93) zusammengestellten Fälle in diese Kategorie.

in Veranlassung kommen konnte, eine Complication der Masern mit Abdominaltyphus anzunehmen, und die Verweigerung der Section löst diese Zweifel aufgelöst.

Recidive in der Weise, wie ich sie beim Scharlach beschrieb, kommen auch bei den Masern vor, doch hatte ich selbst nur selten Gelegenheit, ein solches zu beobachten:

Kind von 2 Jahren, aufgenommen mit Kochlyonen am 24. Mai 1880. Heilung durch 12 Einschnitten von Ung. zinc. (1.0). Am 19. Juni Ausbruch von Masern, normaler Verlauf mit mäßigem Catarrh und Durchfall. Am 11. Juli von neuem Fieber (39.6), welches am 12. erlosch, am Abend des 13. auf 40.0 steigt und in eine zweite Eruption von Masern übergeht, welche namentlich mit einer ziemlich intensiven Bronchopneumonie, besonders im rechten Unterlappen, verläuft. Am 20. Entlassung.

Die Nachkrankheiten der Masern sind fast alle nichts weiter, als die einen chronischen Verlauf nehmenden Complicationen. So sehen wir häufig eine Blepharitis, Blepharitis der Conjunctiva, Keratitis, Otitis viele Wochen und Monate lang sich hinziehen, während in anderen Fällen ulceröse Prozesse der Larynxschleimhaut, welche sogar zu Perforationen der Knorpel und Abscessen an der Vorderfläche des Halses führen können, ferner chronische Bronchopneumonien und Darmthien als Nachkrankheiten zurückbleiben. Im letzteren Falle kann es schließlich zu Darmgeschwüren kommen, welche bei günstigen Sitze im Rectum durch locale Mittel geheilt werden können. Die häufigste Nachkrankheit ist entschieden die chronische Bronchopneumonie, deren bedenkliche Symptome und Aehnlichkeit mit der Lungophthise ich Ihnen früher (S. 336) geschildert habe. In der That sehen wir in einer Reihe von Fällen diese Nachkrankheit unter zunehmender Abmagerung und Hektik nach monatelangen Verlauf tödtlich enden, und finden dann bei der Section entweder nur eine chronische Bronchopneumonie mit Dilatation der Bronchien und kleinen Lungenabscessen, welche durch die Zerstörung der Alveolenwände und Coefferenz der eitergefüllten Lungenblaschen entstanden sind, oder häufiger käsige Degenerationen der Lunge und der Bronchiadrüsen. Die Ansicht, dass gerade die Masern eine besondere Tendenz haben, Tuberkulose zu erzeugen, beruht, wie ich glaube, nur auf der That-
sache, dass diese Krankheit, ähnlich dem Keuchstossen, durch ihre häufige Complication mit Bronchopneumonie, zumal bei prädisponirten Individuen, käsige Prozesse in den Lungen und in deren Folge Milariertuberkulose hervorzurufen vermag. Auch die Verkäsungen der Tracheal- und Bronchiadrüsen, welche als Folge der Masernpneumonien häufig zurückbleiben, mögen hier als Infectionsherde für die allgemeine Tuberkulose in Betracht kommen.

Zu den Nachkrankheiten der Masern gehören auch Krankheiten der äusseren Haut, Abscesse, Ekzeme, Impetigo, Ekthyma, besonders aber gangränöse Affectionen, die hier sogar häufiger vorkommen, als nach dem Scharlachfieber. Fälle von Noma, Gangrän des Pharynx und der Lunge werden bei diesen Kindern in schlechten Lebensverhältnissen einige Wochen nach der Eruption nicht selten beobachtet. Mir selbst kam nur ein einziger Fall von Noma in Folge der Masern vor, häufiger beobachtete ich Gangrän der Haut, des subcutanen Bindegewebes, des Ohr- und Nasenkorpels, worauf im Heilungsfalle kleine Defecte dieser Theile zurückblieben:

Bei einem 5jährigen Mädchen, welches auch an einer Adenitis und Phlegmone submaxillaris in Folge einer eben überstandenen Diphtherie litt, brachen am 14. Febr. 1876 die Masern hervor, und unter ihrem Einfluss wurde die bereits in Eiterung übergegangene und gekästete Phlegmone nach 10 Tagen brandig. T. immer 40.0 bis 40.6. Gesicht stark oedematös, Zimmer durch gangränösen Geruch verpestet. Tod durch Collaps und doppelseitige Bronchopneumonie.

Bei drei andern Kindern bildeten sich in der dritten Woche der Masern umschriebene Nekrosen der Haut, welche aus Blasenbildung (Rupia oder Ekthyma) hervorgingen, und runde, scharf umskizzierte, wie mit einem Lockseile durchgeschnittene, mit schwärzlichem Detritus bedeckte Defecte von Groschen- bis Markstückgrösse am Hinterhaupte, in der Region der Schlüsselbeine, in der Hüfte und an anderen Hautstellen zur Folge hatten. In zwei Fällen erfolgte der Tod durch Collaps und Bronchopneumonie, nur in einem Heilung.

Kind von 2 Jahren, aufgenommen am 1. März 1877. Am 3. Eruption der Masern. Am 9. ist der linke Arm peil geschwollen, am Ockeranoc eine Blase mit blutig weissen Inhalt vorhanden. In den nächsten Tagen Fortschreiten der Infiltration bis zum Schlüsselbein, Schulterblatt und Brustwarze. Eine am 11. gemachte Incision entleerte nur Blut und etwas gelbliches Serum. Am 12. neue Eruption von Blasen mit blutigem Inhalt auf dem Rumpf und linken Arm, welche platzen und speckig aussehende Ulcerationen hinterlassen. Am 19. ist die ganze Haut vom Ellenbogen bis zur Schulter angeteilt. Gegenöffnung am Rücken. Ausfluss von Eiter aus derselben. Bindegewebe in ganzer Ausdehnung nekrotisch; in abgestorbenen Fetzen hervorstechend. Anhaltendes Fieber und Collaps. Tod am 24. Section: Doppelseitige Bronchopneumonie, Nephritis parenchymatosa. Hepatitis alipura.

Dieser Sectionsbefund (trübe Schwellung der Nierenrinde und mässige Fettleber) ist überhaupt bei den Masern, wie bei den anderen Infectiouskrankheiten kein seltener, ohne nothwendig klinische Erscheinungen hervorzurufen. Nur in verhältnissmässig seltenen Fällen kommt es auch hier, wie bereits (S. 564) erwähnt wurde, zu einer der scarlatinösen analogen Nephritis. Die Erfahrung lehrte mich aber, dass manche als merkwürdig betrachtete Nephritis nichts weiter war, als eine verkannte scarlatinöse, mochten nun die Angehörigen oder die Aerzte die falsche Diagnose ge-

stellt haben. Mir selbst kamen bisher nur vereinzelte Fälle von Masernephritis vor, z. B. der Folgende, welchen ich von Anfang an zu beobachteten Gelegenheit hatte und dessen Richtigkeit ich daher verbürgen kann:

Carl B., 7 Jahre alt, Ende Juni 1873 Masern mit ganz normalem Verlauf. Drei Wochen nach der Eruption Oedem des Gesichts, der Füße und des Scrotum. Urin albuminös, sparsam, Epithelien und Cylinder enthaltend, nach einigen Tagen hämorrhagisch. Behandlung mit warmen Bädern, Saliern, Wässiger Wiener. Am 25. Juli Oedem teilsweise geschwunden. Urin immer noch bluthaltig. Erzeugt 1.5 : 120. Vollständige Heilung nach 10 Tagen. Einen gegen die zurückgebliebenen Anämie.

In einem analogen Fall, welcher bei einem 3-jährigen Kinde ebenfalls 3 Wochen nach der Masernruption vorkam, aber durch Oedem pulmonum tödlich wurde, ergab die am 24. December 1874 in der Charité ausgeführte Section neben Lungenoedem und multipler Bronchopneumonie eine charakteristische Nephritis parenchymatosa in beiden Nieren; bei einem andern Kinde wurde eine entzündete Nephritis hämorrhagica mit Vergrößerung beider Nieren, zahlreichen punktförmigen Blutungen in der sehr breiten graugelben Corticalis und fettiger Epithelentartung constatirt.

Purpura als Nachkrankheit der Masern (S. 620) konnte ich nur einmal bei einem 8-jährigen Mädchen beobachten, welches mir am 9. November 1851 zugeführt wurde. Hier waren drei Wochen nach der Eruption, welche mit einer blätigen Diarrhoe verlaufen war, plötzlich Blutungen aus Mund, Nase, Ohren und Darm eingetreten, zahlreiche Pöstechen auf der Haut erschienen und die linke Conjunctiva palpele, blutig unterlaufen. Dabei bestand völlige Euphorie. Ueber den weiteren Verlauf ist mir leider nichts bekannt geworden.

Während das Scharlachfieber in grossen volkreichen Städten nie erlischt, vielmehr während des ganzen Jahres sporadisch auftritt, und nur zeitweise, besonders in den Herbst- und ersten Wintermonaten eine epidemische Verbreitung erlangt, sehen wir die Masern hie und da fast ganz von der Scene verschwinden, und dann plötzlich wieder als Epidemie auftauchen, welche, von einzelnen Stadtbezirken ausgehend, allmählig nach die benachbarten überzieht und mehrere Monate zu dauern pflegt. Dass ein Individuum, so gut wie von Scharlach, auch von den Masern zweimal befallen werden kann, steht fest; doch glaube ich, dass die Zahl dieser Fälle, besonders von den Laien, stark überschätzt wird. So skeptisch ich nun in dieser Beziehung bin, muss ich doch

einzelne Fälle, welche ich selbst erlichte, z. B. den folgenden gelien lassen:

KNABE von 13 Jahren, überstand im Jahre 1872 mit seinen 4 Geschwistern zusammen die Masern (unter meiner Behandlung). Im November 1876 zweite Morbilli-erkrankung mit den charakteristischen Prodromen, dem heftigen am 3. Tage kintirenden Fieber, Katarrh, Photophobie u. s. w. Exanthem im Gesicht und am Rumpf stark entwickelt, gering an den Extremitäten. Ansteckung in der Schule während einer Masernepidemie war nachweisbar.

Solche Fälle gehören aber unbedingt zu den Ausnahmen. Die meisten, von denen man im Publicum sprechen hört, beruhen auf einer Verwechslung mit anderen stulichen Exanthemen, welche man deshalb unter dem Namen „falsche Masern“ (*Morbilli spurii*) beschreibt. Dabei muss man aber festhalten, dass dieser Name keineswegs einen bestimmten Krankheitsprocess bedeutet, dass vielmehr verschiedene Affectionen, welchen ein masernähnliches, kleinfleckiges, leicht papulöses Exanthem gemeinsam ist, in demselben zusammengefasst sind. Ich erinnere Sie nur an die besonders im Frühjahr häufigen Erytheme, welche als *Roseola vernalis*, *autumnalis*, *aestivalis*, *infantilis* beschrieben werden, Exantheme, welche nicht immer rein maculös, sondern auch mit flachen centralen Erhebungen auftreten können und oft genug für Masern gehalten werden. Das diagnostische Kriterium der letzteren liegt, wenn ich von den abnorm verlaufenden kuckektischen und terminalen Formen absehe, hauptsächlich in der charakteristischen Fiebercurve und dem Katarrh der respiratorischen und Rachenschleimhaut, zwei Momente, welche jenen Erythemen und Roseolen durchaus fehlen.

Hier scheint mir auch der passendste Ort zu sein, um auf die unter dem Namen Röttheln (*Rubeola*) seit langer Zeit beschriebene Affection, über deren Existenz noch immer lebhaftes Controversen geführt werden, mit einigen Worten einzugehen. Während ein Theil der Aerzte die Röttheln als eine selbstständige epi- oder häufiger endemisch auftretende Infektionskrankheit betrachtet, welche mit einem kaum bemerkbaren, in der Regel nur einleitenden Fieber, bisweilen auch mit leichten katarthischen Erscheinungen, vorzugsweise aber mit einem aus kleinen rothen Stippchen bestehenden Ausschlage einhergeht, behaupten die Gegner, dass alle solche Fälle nichts weiter seien, als sehr leichte, fast asyrische Formen von Masern oder selbst von Scharlack. Meine eigene Erfahrung berechtigt mich nicht, in dieser Frage ein entscheidendes Urtheil abzugeben; wenn ich auch nie und da in einer Familie ein paar Kinder an einer den „Röttheln“ der Autoren entsprechenden Affection erkranken sah

und nicht selten Fälle beobachtet, welche mich in der Diagnose schwanken liessen, so war es mir doch bisher nicht vergönnt, eine grössere Epi- oder Endemie dieser Art zu beobachten, wie sie von Anderen, Steiner, Thomas, Nymann, Roth beschrieben werden. So lange dies nicht geschehen ist, bin ich ausser Stande, mein Urtheil zu Gunsten der Selbstständigkeit der Röheln abzugeben. —

Die Empfänglichkeit für das Maserncontagium²⁾ ist in allen Lebensaltern vorhanden, am stärksten zwischen dem 2. und 6. Jahr, am geringsten bei Neugeborenen und Säuglingen, welche dann aber am meisten durch respiratorische Complicationen gefährdet sind. Andere bestehende Krankheiten, seien es nun acute oder chronische, verleihen keinen Schutz vor der Infection mit Masern; einzelne, wie die Variellen und der Keuchhusten, scheinen sogar eine besondere Disposition zur Aufnahme des Maserncontagiums zu begründen. In welcher Periode die Krankheit am leichtesten ansteckt, lässt sich hier ebenso wenig bestimmen, wie beim Scharlachfieber; doch ist es unzweifelhaft, dass schon das Stadium prodromicum und eruptivum zu infectiren vermag. Während die meisten Kinder schon beim ersten oder zweiten Contact mit einem masernkranken Individuum angesteckt werden, sehen wir einzelne Kinder einen drei- bis vierwöchentlichen Verkehr mit den an Masern erkrankten Geschwistern tragen, bevor sie der Infection unterlagen. Eine absolute Immunität gegen die Ansteckung, wie ich so mehrfach bei Scharlach gesehen, ist mir jedoch bei den Masern noch niemals vorgekommen. Ebenso wenig konnte ich selbst jemals einen sicheren Fall von Marbilli sine exanthemate beobachten, will aber, gestützt auf die analogen Fälle von Scharlach (S. 623), die Möglichkeit des Vorkommens nicht in Abrede stellen.

Ueber die Behandlung habe ich Ihnen nur wenig zu sagen, da der Krankheitsprocess als solcher nichts weiter erfordert, als Aufenthalt im Bette, eine Zimmerwärme von 15—16° (wärmer als beim Scharlach) bei leichter Bedeckung, und so lange das hohe Fieber dauert, eine aus Milch, Wassersuppen und kühlem Getränk bestehende Nahrung. Eine Ver dunkelung des Zimmers sollte man nur in dem Maasse vornehmen, wie es den Kindern ansehnlich ist, nie vollständig, wie es leider noch vielfach Sitte oder vielmehr Unsitte ist. Eine Trennung der erkrankten Kinder von ihren Geschwistern halte ich nicht für durchaus nothwendig.

²⁾ Die Natur dieses Contagiums kennen wir ebenso wenig, wie diejenige des variatorischen Infectiousstoffes. Da von Babesin (Archiv f. Kinderheilk. III. 5. 143) beschriebenen Bakterien jedenfalls weiterer Bestätigung von sich vererbender Seite.

so sehr ich auch beim Scharlach für dieselbe eintrat. Die weit geringere Gefahr der Masern und die Gewissheit, dass die Kinder denselben auf die Dauer doch nicht entgehen werden, spricht meiner Ansicht nach gegen die Isolirung. Nur ganz kleine oder kranke Kinder, besonders tuberkulöse, würde ich durch gänzliche Absperrung vor der Infection zu schützen suchen. In einfachen Fällen bedarf man keiner Medicamente. Nur bei heftigem Hustenreiz kann man ein Infus. rad. specae. mit Aq. laurocerasi (F. 16) verordnen, allenfalls auch ein Blasenpflaster von der Länge eines Fingergliedes auf die Kehlgube appliciren. Mässige Diarrhoe, die während der ersten Woche nicht selten ist, kann unberücksichtigt bleiben; nur wenn die Ausleerungen reichlicher werden, etwa 4—6mal oder noch häufiger täglich erfolgen, versuche man dieselbe durch ein Infus. rad. specae. mit Opium (F. 29) oder durch Magister. Bismuthi (F. 30) zu beschränken. Aber auch bei ganz normalem Verlauf rathe ich Ihnen, die Kinder eine volle Woche im Bette zu halten, und im Sommer drei, im Winter vier Wochen lang das Zimmer kühlen zu lassen.

Was die Behandlung der Complicationen betrifft, so kann ich Sie auf die früheren Mittheilungen über Croup, Bronchopneumonie und Diarrhoe verweisen. Der folgende Fall zeigt Ihnen den raschen Erfolg der localen Behandlung bei einem ulcerösen Prozesse des Mastdarms, welcher nach den Masern zurückgeblieben war.

Marie S., 1½ Jahre alt, kam am 20. Januar 1877 in meine Poliklinik. Früher gesund. Zu Weihnachten Masern mit einer drei Wochen dauernden blutigen Diarrhoe. Seitdem 1—2mal täglich ziemlich normaler breiiger Stuhlgang. Dazwischen aber mehrmals Tenesmus, Prolapsus ani und Entleerung von 1—1½ Theelöffeln blutvermischten Eiters, mitunter auch von reinem Blut oder eitrigen Schleim. Mässige Abmagerung, Blässe, sonst Euphorie. Untersuchung des Rectum ohne Resultat. Diagnose: Geschwürbildung im oberen Theile des Mastdarms. Ther. System von Argeol. nitr. 0.1 auf 60.0. Nach 5 Klystiren Heilung, welche durch weitere Einspritzungen von Alaus (1 Theel. auf 1 Taubenpfl Wasser) befestigt wurde.

Bei Gangrän der Haut bedeckten wir die leidenden Partien mit Charpie, welche mit Vinum camphor., mit einer 2%, Carbod- oder mit Chlorzinklösung getränkt war, und gaben innerlich reichlich Wein und ein Decoct. cinch. Chinac (F. 23).

Die hier und da geltend gemachte Ansicht, dass die Masern selbst einen heilenden Einfluss auf gewisse chronische Krankheiten, zumal der Haut, ausüben könnten, vermag ich nach meinen Erfahrungen nicht zu theilen. Chronische Ekzeme und Prurigo sah ich wenigstens auch nach Ablauf der Morbilen unverändert fortbestehen.

Die Versuche, durch Einimpfung von Blut, Thränen, Nasenschleim Masernkranker die Krankheit auf andere zu übertragen (Home, Katona, Mayr), um nach Art der Vaccine dadurch einen milderen Verlauf zu erzielen, sind unzufriedenend ausgefallen.

III. Die Windpocken.

Die Varicellen gehören zu den wenigen Krankheiten, welche dem Kindesalter fast ausschliesslich eigen sind. Mir wenigstens ist bisher noch kein einziger sicherer Fall bei einem Erwachsenen vorgekommen.

Ueber die Ansteckungsfähigkeit der Windpocken kann kein Zweifel bestehen. Wenn auch die Inoculationsversuche mit dem Inhalt der Bläschen nur in einem kleinen Theil der Fälle (Steiner¹⁾ Erfolg hatten (mir selbst ist die Inoculation ebenso wenig gelungen, wie Thomas, Hippinus²⁾ u. A.), so regelt doch die tägliche Praxis, das successive Befallenwerden aller Kinder einer Familie, und die endemische Verbreitung der Krankheit in Anstalten, welche ich selbst in meiner Klinik wiederholt beobachtet habe, den untrüglichen Beweis. Ähnlich wie bei den Masern beträgt das Incubationsstadium auch hier 12–14 Tage, worauf das Exanthem, in der Regel ohne prodromale Erscheinungen, zum Vorschein kommt. Ueber Kopfschmerz, Erbrechen und Hitze wurde nur ein paarmal vor dem Ausbruch geklagt, hier und da auch eine Conjunctivitis oder eine Angina beobachtet, welche ich indess mehr für zufällige, als mit der Varicelle in Causa stehende Affectionen betrachtete. Nur einmal, bei einem 5-jährigen Knaben, sah ich ein diffuses Erythem (Rash) dem Ausbruch der Varicellen mehrere Stunden vorausgehen und noch am ersten Tage derselben fortbestehen.

Die Eruption erfolgt ohne bestimmte Reihenfolge an verschiedenen Körpertheilen gleichzeitig in der Form von etwa linsengrossen, runden, rothen Flecken, in deren Centrum sich sofort ein stecknadelkopfgrosses Bläschen bildet. Diese erste Periode konnte ich indess nur ausnahmsweise beobachten, denn die Vergrösserung des Bläschens geschieht so rasch, dass man schon nach einer Stunde überall linsen- bis erbsengross, zuweilen auch grössere, mit ganz durchsichtigem Serum gefüllte Bläschen antrifft, welche von einem schmalen roten Rande umsaumt sind. Nur ein paar Mal bestand das Exanthem, was auch Thomas beobachtete, aus rothen runden Flecken, die fast alle in ihrer Mitte ein miliäres Bläschen zeigten. Die Zahl der Bläschen, welche sich rasch

¹⁾ Wiener med. Wochenschr. 16. 1825.

²⁾ Centralbl. f. Kinderkrankh. II. 1879. S. 222.

hintereinander entwickeln, ist sehr verschieden; bald stehen sie vereinzelt, bald dicht aneinander gedrängt, besonders an Theilen, welche einer Reizung durch Druck oder Spannung der Haut ausgesetzt sind, z. B. auf dem Rücken. Daher war auch bei einem Kinde, welches stets auf der linken Seite lag, diese bei weitem stärker als die rechte befallen, und bei einem Knaben, welcher einen kindskopfgrössen Oongostionalsacculus in der linken Schenkelbeuge hatte, war gerade die enorm gespannte Haut des Abscesses der Sitz einer dichten Varicelleneruption, welche am übrigen Körper nur spärlich auftrat. Sehr häufig bilden sich auch auf der Mundschleimhaut, am harten Gaumen, auf der Innenseite der Lippen, auf der Zunge sparsame Varicellenehläschen, die aber wegen der raschen Epithelabstossung sofort als weissliche oder graugelbliche runde Erosionen erscheinen. Selbst auf der Conjunctiva bulbi und der Genitalschleimhaut kleiner Mädchen kamen mir hin und wieder vereinzelt trübe Vesikeln mit umgebender Injection der Gefässe vor.

Die noch immer von Vielen getheilte Ansicht, dass die Varicellen eine fieberlose Krankheit seien, fand ich nicht bestätigt; dieselbe rührt aus der Privatpraxis her, wo das Thermometer bei einer so unbedeutenden Affection gar nicht in Anwendung kommt. Wo dies aber geschieht, wird man fast immer während der Eruption, also am ersten Tage, bisweilen auch noch am zweiten, einen febrilen Zustand constatiren, welcher freilich in den meisten Fällen einen sehr mässigen Grad nicht überschreitet. In der Regel fand ich am ersten Tage 38,3 bis 38,8 (Abends), während schon der zweite Tag häufig fieberlos verlief oder nur Abends höhere Temperatur (38,5 oder noch mehr) zeigte. Nur selten zeigt das Fieber höhere Grade und längere Dauer:

Kind von 2 $\frac{1}{2}$ Jahren, Varicellenausschlag am 11. Mai 1875 mit hoher Temperatur (40,1; 168 P.), Rücken mit diffusen Erythem überzogen. Sehr reichliche Bläscheneruption, besonders auf Brust und Oberschenkeln. Den 12. Erythem noch sichtbar, T. 37,8; Abds. 39,4. P. 144. Den 13. Blässe verschwunden. T. normal. Beginnende Eintrocknung der Varicellen.

Bei einem anderen Kinde zeigte das Thermometer schon am Abend vor der Eruption 38,6, am Abend des zweiten Tages 39,0 und noch am dritten Tage 38,9. In einem dritten Fall, der wie der erste von Erythem begleitet war, betrug die Initialtemperatur 40,5, am zweiten Abend noch 38,3. Nur einmal sah ich bei einem Knaben, welcher wegen eines Masternecrops glücklich tracheotomirt war, die während der Reconvalescenz auftretenden Varicellen nach einer profunden Eileitung von 38,6 (Abend vor der Eruption) mit einem febrilen Zustande, welcher volle 4 Tage dauerte, verliefen, und zwar in einer Höhe, welche am Abend des zweiten und dritten Tages bis auf 40,2, 40,5, ja am vierten Abend bis auf 41,0 sich erhob. Dieser Knabe war aber überhaupt zu hohem Fieber dreartig disponirt, dass er während

einer unbedeutenden Gaitzess den Tage lang eine Abendtemperatur bis zu 40.0 und darüber darbiet.

Die ungewöhnlich hohe Fiebertemperatur bei den Varicellen hängt, wie ich öfters beobachtete, meistens mit einer weit verbreiteten und dicht aussehenden Eruption zusammen, deren einzelne Efflorescenzen dann nicht selten durch eine erythematöse Rötze miteinander verbunden sind, und vom zweiten oder dritten Tage an zum Theil eine purulente Umwandlung erleiden. Häufiger bleibt die Form der durchsichtigen Bläschen erhalten, deren Eruption mit dem zweiten Tage beendet zu sein pflegt. Vom dritten Tage an beginnt die Eintrocknung derselben durch Verdunstung ihres Inhaltes, die Bläschen sinken zusammen und verwandeln sich in entsprechend grosse, braune oder schwärzliche dünne Krusten, deren rother Saum rasch schwindet, und die nach 8–14 Tagen abfallen und rothe Fleckchen, aber keine Narben hinterlassen. Letzteres geschieht nur dann, wenn die Kinder durch das heftige Jucken während der Eintrocknung zum Abkratzen der Efflorescenzen und Schorfe veranlasst werden, wobei dann einzelne leicht in oberflächliche kleine Ulcerationen mit nachfolgender Narbenbildung übergehen können, mitunter auch ekthymatöse Pusteln und Erytheme im Umkreise hervorgerufen werden. Die Eruption ist indess nicht immer mit dem zweiten Tage vollendet, vielmehr kam es nicht selten noch zu Nachschüben derselben mit ganz unregelmässiger Succession, so dass z. B. zuerst der Rücken und die unteren Körpertheile, und erst am dritten Tage das Gesicht befallen wurde, oder zwischen den schon eintrocknenden schossen noch frische wasserhelle Bläschen auf, und man konnte dann an einem und demselben Körpertheil die verschiedenen Stadien des Exanthems gleichzeitig beobachten. Ich habe dies so häufig gesehen, dass ich die Behauptung von Thomas²⁾, welcher sich gegen das Vorkommen solcher Nachschübe ausspricht, nicht theilen kann. Bei einem 13 Monate alten Kinde sah ich sogar diese neuen Eruptionen am Abend des 3. Tages von einer erheblichen Fiebersteigerung (39.3) begleitet.

Ich muss hier noch einmal auf die oben erwähnte purulente Füllung einzelner oder vieler Bläschen, welche man in einer Reihe von Fällen beobachtet, zurückkommen. Gerade diese Fälle sind es, welche den auch immer nicht zur Ruhe kommenden Streit über das Verhältniss der Windpocken zur Varicellagruppe unterhalten. Meiner Meinung nach muss sich jeder unbefangene Beobachter entschieden auf die Seite der Dualisten, d. h. Derjenigen stellen, welche von einem solchen Verhältnisse

²⁾ Archiv f. Derm. 1869. Heft 4.

überhaupt nichts wissen wollen, vielmehr die Variellen als eine ganz selbstständige Infectiönskrankheit, die mit der Variola durchaus nichts zu schaffen hat, betrachten, und in diesem Sinne habe ich mich bereits (früher¹⁾) unter Anführung bestimmter Gründe ausgesprochen. Zunächst berufe ich mich auf die anatomische Verschiedenheit der Efflorescenzen, welche bei der Variella von Anfang an vesiculös erscheinen, während die Variola mit rothen Papeln beginnt, auf deren Spitze später das Bläschen sich entwickelt; ferner auf die einhöckerige Beschaffenheit der Variellenbläschen, welche beim Einstich ihren Inhalt mit einem Mal entleeren und sofort collabiren, während die Variolabläschen multiloculär erscheinen, so dass beim Einstich immer nur der Inhalt des getroffenen Faches entleert wird. Dies alles ist aber nicht entscheidend, denn zwischen den normalen Variellenbläschen findet sich häufig eine kleine oder grössere Zahl solcher, welche mehrfächerig sind, eine centrale Delle zeigen und schliesslich eiterig trübe werden, sich also ganz wie die Variola oder Variolös verhalten. Auch kommen nicht ganz selten Fälle vor, in denen die Variellen abortiv d. h. wenigstens theilweise als kleine rothe Papeln erscheinen, auf deren Spitze hier und da eine minimale Vesikel sich bildet. Die Hauptsache bleibt immer, dass die Windpocken absolut keinen Schutz vor der Variola gewähren, dass diese vielmehr schon wenige Wochen nach dem Ablauf der Variellen auftreten kann und umgekehrt; dass ferner die Variella unmittelbar nach der gelungenen Vaccination ausbrechen, und die letztere wiederum kurz nach dem Ablauf der Windpocken mit Erfolg vorgenommen werden kann; dass bei kleinen Endemien der Variella, wie ich sie wiederholt in der Klinik gesehen habe, auch nicht ein einziger Fall die Charaktere der Variola oder Variolös darbietet; dass endlich auch die äusserlich den Variolösen ähnlichen Fälle von Windpocken bei anderen Individuen doch immer nur Variellen erzeugen. Von zwei gut vaccinirten Geschwistern, die gleichzeitig an Variellen litten, bot die ältere eine sehr intensive, zum Theil gedellte und purulente, und von starkem Fieber begleitete Eruption dar, während der jüngere Bruder bei voller Euphorie nur sparsame wasserhelle Variellenbläschen zeigte. In einer anderen Familie erkrankte ein 3-jähriges mit Erfolg vaccinirtes Kind in heftigster Weise an Variellen, welche so reichlich hervorgetrieben und zum Theil so deutliche Dellen und eiterigen Inhalt darboten, dass ich irrefühlet werden wäre, wenn ich nicht den ersten Ausbruch der durchsichtigen Vesikeln selbst beobachtet hätte. Nach 14 Tagen wurde der ältere Bruder von ganz leichten

¹⁾ Beil. Hn. Wochenschr. 1874. No. 18.

und unzuverlässigen Varicellen befallen. Eine Verbreitung der Krankheit auf die erwachsenen Mitglieder der Familie, die bei den Pocken gewiss einmal eingetreten sein würde, habe ich nie gesehen, und ebenso wenig wurde bei den in der Klinik beobachteten kleinen Endemien jemals eine Wärterin von Varicella oder Variolois befallen. Gegen diese Thatsachen, welche sich täglich wiederholen, hilft alle Sophistik, mit welcher die Anhänger der Unität ihre Ansicht zu verfechten suchen¹⁾, nichts und bald werden auch die letzten Zweifler einsehen, dass sie es hier mit zwei grundverschiedenen Krankheiten zu thun haben.

Die Varicellen können schon ganz junge Kinder in den ersten Monaten befallen, werden aber hier nicht gefährlicher als später. Niemals beobachtete ich eine erhebliche Complication oder gar einen Todesfall in Folge dieser Krankheit. Nur bei ihrer Combination mit anderen Infectiouskrankheiten (Scharlach, Masern, Diphtherie), welche auch mir bisweilen vorkam, können durch die letzteren bedenkliche Folgen entstehen. Gerade die Varicellen eignen sich, wie ich glaube, am besten, das gleichzeitige Vorkommen zweier anderer Exantheme zu beweisen, weil ihre charakteristische Bläschenform sich von den diffusen oder papulöserförmigen Ausschlägen des Scharlach und der Masern am prägnantesten abhebt. Dies erinnert mich noch an den Fall eines in der Klinik behandelten Mohrenkindes, dessen schwarzbraune Haut nach dem Ausbruch der Varicellen wie mit durchsichtigen Perlen bestreut erschien. Zweimal beobachtete ich Varicellen bei Kindern, die mit Ichthyosis congenita behaftet waren, einmal bei ausgebreiteter Psoriasis, und einmal complicirt mit Intermittens tertiana.

Von einer Behandlung ist hier kaum die Rede, doch lasse ich die Kinder auch in den leichtesten Fällen einige Tage das Bett und eine Woche lang das Zimmer hüten.

IV. Die Diphtherie.

Die epochemachende Arbeit von Bretonneau²⁾ (Hospitälarzt in Tours), welche im Jahre 1826 erschien, enthielt keineswegs eine neue Entdeckung. Unter dem Namen „Diphthérie“ brachte er den Ärzten nur eine schon von den Alten, besonders den Arabern, genau beschriebene, aber halb vergessene Krankheit wieder in Erinnerung, welche nie aufgehört hatte zu existiren, vielmehr wiederholt in grossen epidemischen

¹⁾ Karsowitz, Jahrb. f. Kinderheilk. 1877, Bb. 2. — (Ibid. Bb. 4. S. 420.

²⁾ Des maladies spéciales de l'homme adulte, et en particulier de la diphthérie etc. Paris 1826.

Zügen durch Europa bedeutende Verbreitungen angerichtet hatte. Bretonneau's Verdienst ist aber nicht nur die genaue anatomische und klinische Schilderung dieser furchtbaren Krankheit, sondern auch das Hervorheben ihrer spezifischen Natur, während seine Vorgänger, zumal die Engländer, die Anschauung durch Zusammenwerfen mit böartigen Formen des Scharlach verwirrt hatten. Unsere Aufgabe ist es, wie ich schon früher bemerkte, die spezifische Natur der Diphtherie, d. h. ihre Bedeutung als selbstständige Infectiouskrankheit, festzuhalten, und uns von diesem klinischen Standpunkte nicht durch anatomische Rücksichten abdrängen zu lassen.

Hätte Virchow vorausgesehen, dass durch die scharfe Trennung des „croupösen“ vom „diphtheritischen“ Exsudat, von denen das erste der Schleimhaut nur aufgelagert, das letztere aber in die Gewebe infiltrirt sein sollte, die ärztlichen Anschauungen von neuem ins Schwanken kommen würden, so würde er vielleicht den Ausdruck „diphtheritisch“ vermieden haben. Jetzt aber, wo die von Virchow eingeführten Bezeichnungen der beiden Exsudate einmal eingeklungert sind, würde es in der That am besten sein, für unsere Krankheit einen ganz andern Namen, z. B. den von Senator vorgeschlagenen „Synanche contagiosa“ einzuführen, weil auf diese Weise die klinische Selbstständigkeit der Affection klar hingestellt würde. Denn wir werden bald sehen, dass gerade hier die rein anatomische Scheidung der beiden Exsudatformen oft ihre Bedeutung verliert, dass vielmehr beide Formen mit einander combinirt auftreten können. Da inless der Vorschlag Senator's bis jetzt keinen Anklang gefunden hat, so wollen wir vorläufig bei der Bezeichnung „Diphtherie“ bleiben, und das Wort „diphtheritisch“ für das infiltrirte Exsudat reserviren.

Ich lege der folgenden Schilderung vorzugsweise 258 in meiner Klinik genau beobachtete und journalisirte Fälle von Diphtherie zu Grunde, benutze aber ausserdem noch viele andere aus meiner Privatpraxis herrührende, über welche ich nur kurze Notizen besitze. Unter jenen 258 Kindern befinden sich fast eben so viele Mädchen wie Knaben. Vertreten sind alle Altersstufen, wie die folgende Aufstellung zeigt:

Alter. Zahl der Fälle.

3 Monat	5
8 -	8
9	3
1 Jahr	21
2	48
3	34

Alter.	Zahl der Fälle.
4 Jahr	35
5 -	28
6 -	18
7 -	9
8 -	16
9 -	8
10 -	3
11 -	2
12 -	4
14 -	1
nicht bekannt	15
	<hr/> 258

Die grösste Frequenz fällt demnach in das Alter zwischen 2—8 Jahren, was mit allen anderen Erfahrungen übereinstimmt. Die 37 Fälle, welche schon während des ersten Lebensjahres vorkamen, erklären sich vorzugsweise aus der in der Kinderalterthum fast unvermeidlichen Infection.

Ueber den Einfluss der Jahreszeiten konnte ich zu keinem sicheren Schluss kommen. Meine Fälle vertheilen sich fast gleichmässig über alle Monate. Wie das Scharlachfieber verschwindet auch die Diphtherie in Berlin niemals vollständig; vielmehr kommen zu allen Zeiten sporadische Fälle vor, deren Zahl sich in unbestimmten Perioden mehr oder weniger steigert und bisweilen eine mehr epidemische Ausbreitung erreicht. Besonders häufig aber finden wir Epidemien in einzelnen oder mehreren Häusern, welche entweder auf eine gegenseitige Infection oder auf eine gemeinsame Ursache zurückzuführen sind. Eben dahin gehören auch die nicht selten vorkommenden verstreuten Ru- und Epidemien in einzelnen benachbarten Dörfern. Ueber das Wesen des aufsteigenden Stoffes, welcher ohne Zweifel von einem Individuum auf das andere übertragbar ist und die eigentliche Ursache der Krankheit bildet, fehlt uns jede sichere Kenntniss. Dass es sich auch hier um ein Contagium pflanzlicher Art, ein Bakterien handelt, ist sehr wahrscheinlich. Die bisherigen genauen Untersuchungen haben indess noch kein unzweifelhaftes Ergebniss geliefert, und was man bis jetzt als „Diphtheriepilz“ beschrieb, dürfte wohl nur in die Klasse der Fäulnisbakterien gehören. Auch mit der Aufzählung anderer nur dürftig begründeter Ursachen, welche überall geltend gemacht werden, wo es sich um Infectiouskrankheiten handelt, z. B. der Kloakenluft, des verdorbenen Wassers oder einer infectirten Milch, möchte ich Sie nicht behehlen. Ganz unsicher sind auch unsere Kenntnisse von der Dauer der Incubationsperiode. Aus einzelnen in

meiner Klinik gemachten Beobachtungen möchte ich zwar schliessen, dass dieselbe im Durchschnitt 7 Tage dauert, doch war ich nie ganz sicher, ob nicht die Infection schon vor der Aufnahme stattgefunden hatte. So ziehe ich es denn vor, mit dem Bekenntnisse unserer vollständigen Unbekanntschaft mit allen diesen Verhältnissen sofort zu den klinischen Erscheinungen unserer Krankheit überzugehen.

In einer grossen Reihe von Fällen ist die Diagnose von vorn herein leicht, weil die Symptome sofort auf ein Leiden der Rachenorgane hindeuten. Ältere Kinder klagen dann entschieden über den Hals, über Schmerzen beim Schlucken, welche die Aufmerksamkeit der Eltern erregen. Der kinsagenruffende Arzt findet die gesammte Rachenschleimhaut in verschiedenen Graden geröthet, die Mandeln angeschwollen und, zumal an ihren inneren, einander zugewandten Flächen, mit weissen oder grauweissen Flecken überzogen, welche fest anhaften und nur schwer oder gar nicht mit einem Pinsel oder Spatel entfernt werden können, wobei gewöhnlich eine kleine Blutung aus der blossgelegten Schleimhaut erfolgt. Nur ausnahmsweise fand ich die Mandeln frei von Auflagerung, und dafür von vorn herein das Velum, oder gar die hintere Pharynxwand, am seltensten die Schleimhaut des harten Gaumens mehr oder weniger mit Belägen besetzt. Man hüte sich dabei, etwa aus der Nase über die hintere Pharynxwand herabfließendes Secret für einen wirklichen Belag derselben zu halten; ersteres lässt sich immer leicht abstreifen oder bei älteren Kindern durch Gurgeln entfernen. In der Regel fiebern die Kinder dabei, doch erreicht die Temperatur im Durchschnitt kaum die hohen Grade, wie bei dem Initialfieber, welches die gewöhnliche Angina „follicularis“ einleitet (S. 436), schwankt vielmehr meistens zwischen 38 und 39°, mit abendlichen Steigerungen. Auch fehlt es nicht an Fällen, die wenigstens im Anfange ganz fieberlos verlaufen. Fast immer aber fühlen sich die Kinder ungewöhnlich matt und verstimmt, verlieren den Appetit, haben eine grau belegte Zunge, und klagen über Kopfschmerz. Meistens fühlt man schon in den ersten Tagen eine Anschwellung einer oder zweier unter dem Kieferwinkel gelegener Lymphdrüsen, welche indess ebensogut bei der einfachen katarrhalischen Angina vorhanden sein, wie bei der Diphtherie fehlen kann. Letzteres ist allerdings selten, kam mir aber bei zwei Geschwistern vor, von welchen eins an Croup, das andere an Collaps zu Grunde ging.

Die Unterscheidung der beginnenden Diphtherie von der katarrhalischen Angina ist, wie ich bereits früher (S. 436) bemerkte, durchaus nicht leicht, besweilen sogar in den ersten 24 bis 48 Stunden geradezu unmöglich, so dass man gut that, mit dem entscheidenden Urtheil

etwas zurückhalten, jedenfalls aber das verdächtige Kind von seinen Geschwistern zu isoliren. Die grau gelbliche Farbe und die rundliche Form der kleinen, isolirten, über die rothe geschwollene Mandel zerstreuten Eiterpföpfchen ist zwar für die betreffende Form der kатарhalischen Angina ziemlich charakteristisch, und auch der Beginn derselben auf einer Seite, das successive Befallenwerden der anderen, spricht für dieselbe; dennoch können öfters Fälle vor, in welchen auch die Diphtherie in ganz ähnlicher Weise einseitig und mit sehr kleinen Plaques beginnt, und sich erst am nächsten Tage auf die andere Mandel ausdehnt. Die Unterscheidung wird noch schwerer, wenn bei der kатарhalischen Angina statt der erwähnten Eiterpföpfchen grauweiße, meist länglich gestreckte Fetzen auf den Mandeln sich bilden, welche den diphtheritischen in der That täuschend ähnlich sind, sich aber von denselben dadurch unterscheiden, dass sie der Schleimhaut, wie ein mucöses Exsudat, nur locker aufliegen, und hauptsächlich aus reichlich abgelösstem, durch eine amorphe (fibrinöse) Masse verkrüppelten Epithelium bestehen. Die Ansicht, welche dieser Art von Auflagerungen immer einen specifisch diphtheritischen Charakter zuerkönt, kann ich nicht theilen, glaube vielmehr, wie ich schon S. 487 bemerkte, dass sie nur das Product einer fibrinösen Entzündung der Schleimhaut sind, weil ich sie nicht selten gleichzeitig oder abwechselnd mit den gewöhnlichen goldlichen Pföpfchen bei Kindern und Erwachsenen beobachtete, welche an kатарhalischen Angina besonders disponirt waren, nicht selten auch mit Abscessbildung in der Mandel einhergehen sah. Niemals aber sahen in diesen Fällen die Inmischungswunde, auch wenn sie mitten durch das mucöse Exsudat hindurchging, einen diphtheritischen Charakter an. Jedenfalls vermehren alle diese Dinge die Schwierigkeiten der Lage, und man wird sich in solchen Fällen ebenso sehr vor einer übereilten Diagnose der Diphtherie, wie vor einem absolut beruhigenden Urtheil zu hüten haben. Die mikroskopische Untersuchung der erwähnten abgelösten Fetzen ergiebt meiner Ansicht nach durchaus kein sicheres Kriterium, weil Epithelien, amorphe Massen und Micrococci sich in beiden Fällen finden.

Bedenklicher gestaltet sich aber die Sache, wenn nicht bloss die Mandeln, sondern auch der Rand des Gaumensegels, die Uvula, die Winkel zwischen dieser und dem Velum, und die absteigenden Gaumenmandeln sich stellenweise mit den gefurchten weißen Plaques bedecken. Selbst unter diesen Umständen können die Schlingenschmerzen fehlen oder nur sehr unbedeutend, das Fieber mäßig, die allgemeine Euphorie nur wenig gestört sein. Oft genug sah ich Kinder mit recht ausgedehnten

Belägen der Rachentheile zu Fuss in die Poliklinik kommen, welche entweder über gar nichts oder nur über „den Leib“ klagten, keine Lust zum Spielen hatten und nur deshalb der Klinik zugeführt wurden, weil die Eltern, durch die gleiche Erkrankung oder den Tod eines anderen Kindes beunruhigt, den Hals untersucht und dabei die Krankheit entdeckt hatten. Ich kann diese Toleranz vieler Kinder für die beginnende Diphtherie nicht genug betonen, weil sie häufig die Ursache ist, dass die Krankheit vollständig übersehen wird, und ich lege es Ihnen dringend ans Herz, bei jedem Kinde, welches fiebert oder sich nur in seinem Wesen verändert zeigt, auch wenn gar keine localen Zeichen vorhanden sind, den Rachen sorgfältig zu untersuchen. Meine Zuhörer waren häufig genug Zeugen davon, dass diese Untersuchung eine schon stark entwickelte Diphtherie ergab, von welcher weder die Eltern noch der behandelnde Arzt eine Ahnung gehabt hatten. Die Krankheit bleibt dann latent, bis entweder der plötzliche Eintritt drohender Erscheinungen oder gewisse Nachkrankheiten, besonders Lähmungen, zeigen, dass man sich eine Vernachlässigung zu Schulden kommen lässt. Während also selbst bei ausgebreiteter Rachen-diphtherie sowohl die localen wie die allgemeinen Erscheinungen, wenigstens in den ersten Tagen, geringfügig sein können, bietet die in vielen Fällen bemerkbare Theilnahme der Nasenschleimhaut ein wichtiges Symptom, den diphtheritischen Schnupfen, welcher jeden erfahrenen Arzt sofort beunruhigt, und welchen ich bisher bei der nicht specifischen croupösen Angina noch nicht beobachtet habe. Die Kinder schnarchen ungewöhnlich während des Schlafes oder athmen auch im wachen Zustande hörbar durch die Nase, aus welcher ein dünnes eiteriges Secret hervorquillt oder leicht ausgepresst werden kann. Beim Schreien und andern expiratorischen Acten kommt dieser Ausfluss besonders zum Vorschein, welcher allmählig die Naseneingänge und die Oberlippe röthet und erodirt. Die Diphtherie der Nasenhöhle hat hier nach meiner Erfahrung dieselbe ungünstige Bedeutung, wie der ähnliche (eitrige) Process beim Scharlachfieber (S. 607). Ich will zwar keineswegs behaupten, dass die *Koryza diphtherica* immer einen schlechten Ausgang der Krankheit verkündet, da ich nicht ganz selten auch leichtere Fälle mit einem nässigen Schnupfen verlaufen sah; im Allgemeinen aber halte ich die Theilnahme der Nasenschleimhaut, besonders wenn dieselbe einen höheren Grad erreicht, für ein schlechtes Omen. Häufig ist der sechs-eiterige Ausfluss aus der Nase mit Blut vermisch, und in Folge der Ablösung diphtheritischer Schorfe, welche besonders beim Ausspritzen der Nase in grösserer oder geringerer Menge entleert werden.

kommt es auch wohl zu starken Blutungen aus der Nase, welche die schon vorhandene Schwäche noch steigern und deshalb immer besorgniserregend sind. Besonders bei kleinen Kindern, welche noch nicht sprechen können, halte ich diese Koryza für ein ausserst wichtiges Symptom, weil es öfters zuerst den Verdacht einer Diphtherie erregte und mich zur Untersuchung des Pharynx veranlasste, und sogar bei einem 6jährigen Mädchen bestimmten mich zur wiederholten Nasenblutungen und Anschwellung der Nase mit Ausschluss aller anderen Symptome dazu, den Hals zu besichtigen und dadurch die Diphtherie zu entdecken. Das durch die Anschwellung der Nasenschleimhaut bedingte Schnarchen kann besonders während des Schlafes so laut werden, dass es mit dem stentischen Geräusch des Croup Aehnlichkeit hat; man braucht aber dem Kinde nur den Mund zu öffnen, um dasselbe zu vermindern und dadurch der Verwechslung zu entgegen.

Die diphtherische Koryza entwickelt sich nicht immer vom Rachen her; sie kann vielmehr auch die Scene eröffnen auf die Einleitung des ganzen Leidens bilden. Nur selten bleibt dann die Diphtherie auf die zuerst befallene Nasenschleimhaut beschränkt, dehnt sich vielmehr meistens durch die Choanen über den Rachen und selbst über den Kehlkopf aus. Man erfährt dabei oft, dass die Kinder schon 8–10 Tage an einem starken Schnupfen gelitten haben, welcher jedoch kaum beachtet wurde, bis die weitere Ausbreitung oder gar schon urcaspale Symptome Besorgniss erregten. Leider lässt sich diese Form der diphtherischen Koryza im Beginn von einem gewöhnlichen starken Schnupfen nicht sehr unterscheiden, denn nur selten ist es möglich, wesentlich bis gegen die Nasenlöcher herabreichende Exsudate deutlich zu sehen, während die rhinoskopische Untersuchung jebeinal bei kleineren Kindern fast unüberwindliche Schwierigkeiten darbietet. Man achte daher besonders auf etwa vorhandenes Fieber (ich sah eine solche Koryza mit 40,0° beginnen), Oedem der äusseren Nase, ungewöhnliches Schnarchen, serös-blutigen Ausfluss aus der Nase, allgemeine Apathie und blasses, häufiges Aussehen — ein Complex von Erscheinungen, welcher entschieden für die diphtherische Natur des Schnupfens spricht. Gewissheit giebt allerdings immer erst das Herabsteigen der Krankheit in den Rachen, oder die Ausstossung membranöser Fetzen aus der Nase, welche ich wiederholt hier, wie beim Scharlach beobachtet habe. Ein Beispiel dieser Art Oedem ich schon oben (S. 608) mit, und dasselbe beobachtete ich bei einem 3jährigen Kinde, welches gleichzeitig an Conjunctivitis und Otis diphtherica litt, und bei welchem auch einige furunculöse Abscesse am Hals und auf der Brust sich mit diphtherischen

Belägen überzogen; ferner bei einem 13jährigen Mädchen mit mässiger Rachen- und Nasendiphtherie, aus dessen Nase am 14. Tage der Krankheit ein ansehnlicher Membranfetzen herausgezogen wurde. Viel seltener als in der Nase beginnt die Diphtherie auf der Lippenschleimhaut in Gestalt grauweisser, den confluirenden Plaques der Stomatitis aphthosa (S. 424) ähnlicher Einlagerungen, welchen ich erst 36 bis 48 Stunden später die Rachenliphtherie folgen sah. In einem Falle dieser Art ging die Diphtherie von den Lippen auf den Zungengrund über und wurde schon am folgenden Tage unter eitrigen Symptomen lethäl. Da ich diese Art der Entwicklung bisher nur in der Klinik beobachtet habe, so möchte ich eine hier erfolgte diphtherische Infection bereits vorhandener Erosionen oder Rhagaden der Lippen annehmen. In mehreren Fällen, die vor der Augenabheilung auf meine Station verlegt wurden, hatte eine Conjunctivitis diphtherica, in noch anderen ein diphtheritischer Belag bereits länger bestehender Ekzeme des Gesichts oder des Ohrs den Anfang gemacht, und wir sahen nun die weitere Entwicklung auf der Lippen- und Rachenschleimhaut unter unseren Augen vor sich gehen. Am seltensten begann die Affection an den Genitalien kleiner Mädchen und schien von hier aus den ganzen Organismus zu inficiren:

Clara B., 8¹/₂jährig, aufgenommen am 29. Juli 1878, gut genährt, strophilös, mit doppelseitiger Conjunctivitis palpearum, sehr blasse. Seit einigen Tagen beide grosse Schamlippen stark geschwollen und geröthet; ihre innere Fläche erodirt und blutend, ebenso der Mons Veneris und die innere Fläche der Oberschenkel. Leistendrüsen geschwollen. Seits Fieber. Vom 3. August an Fieber, Ab. 39,5. Auf den Schamlippen bilden sich zahlreiche, scharf umschriebene, tief dringende Geschwüre von Linsen- bis Bohnengrösse, die zum Theil confluiren und sich mit grauweissen adhärennten Massen bedecken. Vom 7. an Diphtherie der Lippen mit Belag, den 30. auch der Mundwinkel, der Kinnfalte und der rechten Conjunctiva. Submaxilläre Drüsenanschwellung. Steigende Temperatur; Ab. 40,4. Am 16. auch Diphtherie der Tonsillen, der Uvula und der linken Conjunctiva. Zerstörung beider Hornhäute mit Perforation. Den 19. Tod im Collaps. Section fehlt.

Die Diphtherie der Genitalien kann aber auf diese Theile allein beschränkt bleiben und entweder einen günstigen Verlauf nehmen, oder auch lethäl enden, gerade so, wie wir es bei der Pharynxdiphtherie finden werden:

Anna M., 1jährig, aufgenommen am 20. Juli 1878. Seit einer Woche Diphtherie der Genitalien, welche auf die Infection einer vorhandenen Intertrigo durch zwei an Rachenliphtherie erkrankte Geschwister zurückzuführen war. Gut genährtes Kind, sonst vollkommen gesund. Grosse Schamlippen stark geschwollen und geröthet, mit schmutzig grauem membranösem Belag, welcher sich bis zum Anus aus-

Abend, Bülbe bis über den Mund Vomer und die Regio hypoglossum verstreut. T. 37.5—38.0. Diarrhoe. Tod des 22. an plötzlichem Collapse. Bei der Section über normal, bis auf die Genitalien.

Marie O., 4jährig, aufgen. am 1. October 1877. Beide Labien stark geschwellen, rot, mit grauweißen Belag, sehr unglücklich. Sonst gesund, leidet Pilsen. Penetration von *Ap. plumb.* 500.0 mit *Am. carbol.* 5.0. Am folgenden Tage Belagzug der Diphtherie auf die Inguinalgegend mit ausgebreiteten roten Hefe. Vom 4. an Beizung der labiellen Theile, Abkantung der Scheite; am 12. völlige Heilung unter dem Gebrauch einer Salbe von Argent. nitr. 0.2. Balsam. persic. gtt. xi. Ungt. simpl. 20.0.

Mädchen von 1½ Jahren. Diphtherie vulvae, Tod nach 4 Tagen unter Collapse. Section. Die ganze Vulva bildet eine riesige, glatte Geschwulst. Labien bis zum Mund Vomer mit blutigen Pseudomembranen bedeckt; rings herum diffuse Eryth.

Die angeführten Beispiele zeigen also, dass der diphtheritische Infektionsstoff an verschiedenen Stellen (Nase, Lippen, Conjunctiva, Genitalia, äussere Haut) in den Organismus eindringen kann. Am häufigsten aber geschieht dies ohne Zweifel durch den Pharynx, wo der Infektionsstoff in den Falten und Krypten der Tonsillenschleimhaut sich einzunistet und von hier aus tiefer einzudringen scheint. Dass derselbe den Rachen ohne Effect zu passieren und erst im Larynx seine Wirkungen zu entfalten vermag, wie die Gegen des rein wundärztlichen Camp (S. 319) annahm, glaube ich nicht.

So viel von den verschiedenen Arten der Entwicklung unserer Krankheit. Ich kehre nunmehr zur Schilderung ihrer typischen Form, der Nasen- und Rachendiphtherie zurück. Den Schmecken, welchen diese Diagnose in der Familie verbreitet, werden Sie zur allzu häufig kennen lernen. Wie beim Scharlach wenn Sie aber auch hier sehr vorsichtig in der Prognose. Eine Beruhigung der Eltern à tout prix halte ich nicht für rathlich. Denken Sie immer daran, dass auch bei den anscheinend leichtesten Graden der Krankheit ganz unerwartet äusserst bedenkliche Erscheinungen eintreten können, auf deren Möglichkeit die Umgebung meiner Ansicht auch immer vorerzählt sein sollte. Ueber den Verlauf der Krankheit lässt sich von vorn herein gar kein Urtheil geben; er ist unberechenbar, und wenn ich der besseren Schilderung wegen eine leichte, eine mittelschwere und eine schwere Form unterscheiden, so bin ich doch selbst der erste, der das Unzulängende dieser Eintheilung anzieht, weil die erste Form jeden Augenblick in die zweite und dritte übergehen kann.

I. Die leichte Form. Die Beläge beschränken sich hier auf die Mandeln; die Nasenschleimhaut ist frei oder nur von einer sehr leichten Koryza befallen, die submaxillären Lymphdrüsen sind mässig geschwellen,

kann empfindlich. Fieber kann vollständig fehlen, und wo es vorhanden ist, hebt sich die Temperatur nur selten über 38,5 oder 39° und remittirt stark in den Morgenstunden. Die Pulsfrequenz schwankt je nach dem Alter zwischen 120 und 144, und die Qualität des Pulses bleibt eine gute, d. h. die einzelnen Schläge sind deutlich getrennt von einander und die Spannung der Arterienwand ist nicht vermindert. Das Allgemeinbefinden braucht wenig oder gar nicht gestört zu sein. Viele Kinder verlieren kaum den Appetit, zeigen nur einen mässigen grauen Belag der Zunge und sitzen spielend im Bette. Nach einer durchschnittlichen Dauer von 8 bis 12 Tagen, nachdem sich die Beläge allmählig von der Schleimhaut der Mandeln gelöst und stückweise abgestossen haben, pflegen auch die zurückgebliebenen oberflächlichen Substanzverluste, welche bei Berührungen leicht bluten, sich zu überhäuten, und bald findet man als einzigen Rest nur noch einen dunkelrothen Fleck an der erkrankten Stelle. Sie müssen indess immer darauf vorbereitet sein, nach der Abstossung des Belags entweder an derselben Stelle oder dicht daneben wieder neue Beläge auftreten zu sehen, wobei auch das schon geschwandene Fieber wiederkehren, und der ganze Process auf 2—3 Wochen verlängert werden kann. Nachschübe dieser Art nach Pausen von 2—3 Tagen sind mir keineswegs selten vorgekommen. Auch in dieser leichten Form kann der in seinem Aussehen normale, höchstens etwas spärlichere Umriss weiss enthalten, ohne dass dadurch die Prognose wesentlich getrübt wird.

2. Die mittelschwere Form. Ausser den Mandeln finden Sie hier das Velum, die Uvula, auch wohl die hintere Pharynxwand mit grauweissen Plaques bedeckt. Nicht selten wird, wie ich schon bemerkte, das aus den Choren über die hintere Rachenwand flüssende schleimig-eitrige Secret für einen diphtheritischen Belag derselben gehalten, kann aber durch Gurgeln oder Hinüberstreichen mit dem Pinsel leicht entfernt werden, während der eigentliche Belag gerade hier sehr fest zu haften pflegt. Die Nasenhöhle ist stärker ergriffen, der Ausfluss reichlicher, graugelblich, blutig, oft foetid, wie auch der Geruch aus dem Munde. Die Schwellung der Rachentheile und der Nasenschleimhaut ist bedeutend, das Schnarchen lauter, der Isthmus faucium mehr verengt, wobei die Schlingbeschwerden sehr heftig, aber auch sehr gering sein, ja sogar ganz fehlen können. In einzelnen Fällen sah ich die Uvula bis zur Dicke eines Fingers angeschwollen und vollständig von einem weissgrauen Exsudate wie mit einem Handschuhfinger überzogen. Wenn auch das Fieber auch hier noch mässig bleiben kann (38—39,5), so ist doch

das Allgemeinbefinden weit mehr getrübt, die Lust zum Spielen verlohren, die Apertlie grösser, oft auch eine mässige Schwellung bemerkbar, sobald die Kinder sich selbst überlassen werden. Der Appetit fehlt gänzlich, die Zunge ist meistens dick grau-gelb belegt, nur selten hochroth, mit vortretenden Papillen an der Spitze. Erbrechen findet häufig in den ersten Tagen der Krankheit statt. Der Urin ist sparsam und enthält häufig, keineswegs aber constant Eiweiss, Epithelien und blaue Cylinder. Auch hier aber ist dies Symptom, wenigstens meiner Erfahrung nach, für die Prognose fast ohne Bedeutung, da ich sehr oft Kinder mit reichlicher Albuminurie gesund werden, und viele andere, deren Urin durchweg frei von Eiweiss blieb, zu Grunde gehen sah. Nicht selten kommt es auch zu einer besorgniserregenden Veränderung der Stimme; die Kinder werden nicht oder weniger heiser, selbst bis zur Aphonie, und bekommen auch wohl einen raschen heiseren Husten, welcher lebhaft an den Croupstos erinnert. Die Befürchtung, dass dies Symptom das Herabsteigen des diphtheritischen Processes in den Larynx verkündet, ist unter diesen Umständen sehr natürlich. Man muss dann immer auf den Eintritt heftiger croupöser Erscheinungen und auf die Nothwendigkeit der Tracheotomie vorbereitet sein. Trotzdem sah ich in einer ziemlich grossen Zahl von Fällen diese anscheinend bedenklichen Symptome, nachdem sie viele Tage, einmal sogar 1½ Wochen lang heftige Besorgnisse erregt hatten, sich allmählig wieder zurückbilden und verschwinden, und es liegt daher nahe, es solchen Fällen nur einen Katarrh der Schleimhaut anzunehmen, welcher vom Pharynx aus sich bis über die Stimmländer ausbreitete. Eine am 16. Juli 1878 gemachte Section lehrte mich aber, dass auch ernstere Veränderungen im Larynx unter diesen Umständen nicht auszuschliessen sind. Bei einem Kinde, welches im Gefolge der Rachendiphtherie die oben erwähnten laryngealen Erscheinungen 4—5 Tage lang, jedoch ohne Athemnoth, dargeboten, dann aber seine normale Stimme wieder bekommen hatte und kaum noch hustete, fand sich nach dem an Collapse plötzlich erfolgten Tode die Schleimhaut des Larynx und der Trachea bis und da mit einer dünnen croupösen Auflagerung besetzt, woraus sich ergibt, dass man nicht berechtigt ist, in allen Fällen, in welchen eine Rückbildung der Heiserkeit und des croupösen Hustenklanges erfolgt, immer nur an einen einfachen Katarrh zu denken. Leider ist die laryngoskopische Untersuchung, welche hier am besten Anschluss geben würde, nur bei den wenigsten Kindern mit sicherem Erfolg auszuführen, und man wird daher meistens in Zweifel darüber bleiben, ob man es nur mit einem Katarrh

oder mit einem eitrigen Process zu thun hätte. Man vergleiche z. B. folgende Fälle:

Anna L., 3jährig, aufgenommen am 30. October 1878 mit Diphtherie des Pharynx, welche seit 5 Tagen bestand. Am 15. Rachenröhre wieder fast normal, nur die Tonsillen noch roth und geschwollen. Kein Fieber. Am 18. plötzliche Heiserkeit, Athmen etwas erschwert, Inspiration stridulös, milder Husten, T. Abends 38,9; P. 168. Während der nächsten Tage (vom 19.—23.) starkes Fieber mit Abendtemperatur von 40,2—41,1; P. 144—160. Larynxsymptome fortwährend, in der Nacht vom 22. zum 23. sogar Anfälle von Dyspnoe, welche schon an die Tracheitis denken liessen. Daraus Abnahme aller Symptome unter dem Gebrauch von Tartar. stibiat. Vom 24. an Schwanden des Fiebers, am 29. Stimme klarer, normaler Athem. Entlassung am 2. November.

Anna Th., 5jährig, aufgenommen am 10. März 1879 mit Rachenliphtherie, welche auf der linken Tonsille einen tiefen ulcerösen Sequesterrest hinterlassen hatte. Dabei seit einigen Tagen Heiserkeit, stridulöse Inspiration, ohne Dyspnoe. Am nächsten Tage totale Aphonie. Die Anfälle einer gleichzeitig bestehenden Taxis cerebriosa zeichnen sich dadurch aus, dass die gemessenen Inspirationen, welche die Hustenstöße begleiten, einen rauhen croupähnlichen Charakter haben, so dass man schon daraus auf eine Theilnahme der Glottis schliessen konnte. Albuminurie in mässigen Graden, Fieber gering (37,8—38,6). Behandlung mit Inhalationen von Kalkwasserspray, innerlich Eisen. Am Abend des 13. Athem ruhig, ohne Nebengeräusch, am 14. Stimme beim Lauten Intenres klingender. Von nun an allmähige Besserung.

Maria B., 3½ Jahr alt, Reconvalescentin von Brechrupeptoneie. Am 1. Febr. 1881 leichte Angina ohne Fieber. D. 5. Beläge auf beiden Tonsillen, Ab. T. 38,6. In den nächsten Tagen abendliches Fieber bis 40,1; starke granigelle Beläge, die sich am 9. abkloppen mit abnehmendem Fieber. Dagegen macht sich nun Heiserkeit, und am 10. croupöser Husten bemerkbar. B. 40, stridulös, mit mässiger Einziehung des Epigastriums. Am 11. Erweichung stärker, Anfälle von Dyspnoe. Wechselnder Zustand bis zum 2. April, an welchem Tage alle respiratorischen Symptome verschwinden und die Gefahr beseitigt erscheint. Behandlung bestand in Inhalationen von Kalkwasserspray und kleinen Dosen von Tartar. stibiat.

In diesen Fällen konnte kein klares laryngoskopisches Bild wegen der Widersetzlichkeit der Kinder gewonnen werden. Da ich aber bei einem älteren Knaben, welcher den Mund sehr weit öffnen konnte, ohne Kehlkopfspiegel deutlich beobachtete, wie der freie Rand der Epiglottis sich allmähig mit einem weissen diphtheritischen Belag überzog, und auch hier nach der Abstossung dessen vollständige Heilung eintrat, so glaube ich mit Rücksicht auf den oben (S. 663) mitgetheilten Sectionsbefund annehmen zu dürfen, dass auch der diphtheritische Process im Larynx, wenn er nur in gewissen Grenzen bleibt, sich häufiger zurückbildet, als man im Allgemeinen glaubt.

Die Dauer der mittelschweren Diphtherie beläuft sich im Durchschnitt auf 14 Tage, doch zieht sie sich nicht selten in Folge wieder-

holter Nachschüle und schwer heilender Ulcerationen auf 3–4 Wochen hinaus. Da nämlich das Exsudat hier tiefer in das Gewebe der Rachenschleimhaut infiltrirt zu sein pflegt, so geschieht auch die Lösung und die nekrotische Abstossung desselben langsamer, und es bleiben tiefere Ulcerationen der Mandeln und des Gaumensegels, zumal der Uvula, zurück, deren Vernarbung längere Zeit in Anspruch nimmt. Dieser Heilungsprocess kann zwar ganz ohne Fieber verlaufen, nicht selten aber dauert ein remittirendes Fieber Wochenlang fort und bedingt zunehmende Schwäche und Abmagerung. Die submaxillären Drüsenanschwellungen läßt sich in der Regel mit der Heilung der Ulcerationen wieder zurück; viel seltener als beim Scharlach kam es hier zu einer Plaque und Abscessbildung, welche Larynxen tödtig machte. Verwundete Eiterenkungen aber, die beim Scharlach nicht zu den Seltenheiten gehören, oder ausgebreitete, harte, zur Gangrän neigende Infiltrationen (Angina Ludmigi) beobachtete ich hier nur in vereinzelten Fällen.

Während der Heilungsperiode sieht man bisweilen nekrotische Fetzen, welche noch theilweise an der Schleimhaut haften, bei jeder In- und Expiration im Rachen flottiren, oder die Kinder expectoriren grössere abgestossene Stücke, welche in einem Fall einem vollständigen Abguss der Uvula darstellten. Selbst ganze Stücke der infiltrirten und nekrotisirten Mandel können auf diese Weise abgestossen werden, und es kommt dann bisweilen zu mehr oder weniger reichlichen Blutungen aus der Rachen- und Nasenhöhle, welche den schon vorhandenen Schwächezustand bedeutlich steigern können. In einzelnen Fällen sah ich auch die ganze Uvula oder wenigstens einen Theil derselben durch Ulceration verlieren gehen und tiefe narbige Einkerbungen des freien Velumrandes zurückbleiben, bei drei Kindern aber vollständige erbsen- bis bohnen-grosse Perforationen des Velum (2mal einseitig, 1mal doppelseitig) zu Stande kommen.

3) Die schwere Form. Die Gefahr der Diphtherie wird vorzugsweise durch zwei Umstände bedingt, einmal durch ihre mit der Scarlatina übereinstimmende lähmende Wirkung auf das Nervensystem, zweitens durch ihre Neigung, sich vom Rachen aus in die Luftwege fortzusetzen, wobei der Tod unter suffocatorischen Erscheinungen eintreten kann. Mit diesen beiden Gefahren haben sie in jedem Fall von Diphtherie zu rechnen, mag nun die Krankheit in ihrer mildesten Form oder in der mittelschweren auftreten. Es ist durchaus nichts seltenes, dass schon nach einigen Tagen oder erst im weiteren Verlauf der Krankheit, die bis dahin anscheinend gar keine Bedenken hatte, der Puls plötzlich sehr frequent und klein, seltener langsam und

unregelmässig wird, und ein schnell tödtlicher Collapse eintritt, oder dass zu einer Zeit, in welcher die Rachenaffectio schon in der Rückbildung war und alles eine baldige Heilung versprach, mit einem Mal croupöse Symptome sich geltend machen.

Selbener tritt die Diphtherie von vorn herein in ihrer schwersten Form auf und bekundet dies gewöhnlich durch ein mit grosser Intensität einsetzendes Initialfieber (40°) und eine ungewöhnliche Pulsfrequenz von 140—160 Schlägen. Grosse Apathie, Somnolenz und vollständige Anorexie gehen damit Hand in Hand. Mit der Rachenaffectio, welche nicht immer die höchsten Grade darbietet, braucht, hier und da sogar überraschend geringfügig erscheint, verbindet sich hier immer eine intensive Koryza mit reichlichem fötalem Secret, mit oedematöser Schwellung der äusseren Nase, oft auch der Augenlider, und starkem Schnarchen, wobei die Kinder mit offenem Munde athmen. Die Stimme ist näseltend, oft schwer verständlich; viele sind überhaupt gar nicht zum Sprechen zu bewegen und verfallen, kaum erweckt, wieder in Gleichgültigkeit und Somnolenz. Aus dem Munde dringt meistens ein äusserst fötider Geruch, und die hier und da vorhandene Salivation erschien mir immer als ein besonders ungünstiges Zeichen; die submaxillären Lymphdrüsen sind stark geschwollen, aber nur zwei Mal beobachtete ich eine ausgedehnte an die Ludwig'sche Angina erinnernde Infiltration des ganzen submaxillären Bindegewebes, in einem Fall auch eine diffuse eigige Anschwellung der linken Parotidengegend, während rechtsseits eine submaxilläre Adenitis bestand. Die schon früher erwähnten Blutungen aus der Nase und aus den geschwägten Nasenthellen pflegen in der schweren Form besonders heftig aufzutreten und durch ansehnliche Erschöpfung den tödtlichen Ausgang zu beschleunigen. Wiederholt mussten wir wegen dieser Blutungen aus der Nase die Höhle der letzteren tamponiren oder Injectionen von Liquor ferri sesquichlor. in diese und die Rachenhöhle machen, um den drohenden Collapse verhüten zu können. Auch Petechien und grössere Purpuraeflecken kommen nicht selten auf verschiedenen Theilen, selbst auf der Conjunctiva bulbi zum Vorschein, und nur selten ist der sparsame Urin frei von Eiwass und nephritischen Elementen.

In allen Schilderungen der Diphtherie ist viel von Exanthemen die Rede, welche im Verlauf der Krankheit, zumal in den schweren Fällen auftreten sollen und entweder als diffuse Erytheme oder als mehr oder weniger reichliche Roseolen beschrieben werden. Obwohl ich auf diese Ausschläge immer sorgfältig achtete, gelang es mir doch nur in einer verhältnissmässig kleinen Reihe von Fällen, dieselben mit Sicher-

heit zu constatiren, und zwar nicht bloss in der schweren, sondern auch in der mittelschweren Form mit günstigem Ausgange. Bei einem 2jährigen Kinde, welches an Collaps zu Grunde ging, zeigte sich erst am Todestage auf dem Gesicht und den Nates eine omfattende Röthe, während auf Bauch und Rücken stecknadelkopfgrosse Papeln aufschossen. Sonst zeigten sich immer nur Roseolen oder Erytheme, welche ein paar Tage bestanden, also dass dabei eine Steigerung des Fiebers stattfand. Gerade darauf aber lege ich einen besondern Werth, weil ich davon überzeugt bin, dass die grössere Zahl der Exantheme, welche man als diphtherische beschrieben hat, nichts weiter sind als Scharlach, dessen Eintritt dann immer mit einer charakteristischen Steigerung der Temperatur verbunden ist. Bei drei Kindern sah ich während des Verlaufs der Diphtherie unter rascher Fiebersteigerung (bis 40,0) die Variocellen ausbrechen, ein neues Beispiel für das gleichzeitige Bestehen zweier acuter Infektionskrankheiten (S. 586). Alle drei Fälle endeten glücklich.

Unter allen Symptomen der schweren Form ist aber keins so zu fürchten, wie die schon erwähnte Tendenz zur Herabföhrung, welche sich durch einen allen Mitteln widerstehenden Collaps ankündigt. Der Puls wird immer schneller (160 und mehr) und schwächer, oft auch unregelmässig und ungleich; die Hände, Füsse und Wangen kühl, die Haut und die sichtbaren Schleimhäute etwas cyanotisch, wobei aber das Fieber nicht immer sinkt, vielmehr, wie ich wiederholt beobachtete, bis zuletzt sehr hoch (40,8) bleiben oder erst am Todestage die höchste Temperatur erreichen kann. Doch fehlt es auch keineswegs an Fällen dieser Art, welche ohne jede Temperatursteigerung bis zum Ende verlaufen, sobald zur Larynx und Lungen frei blühen. Einige Kinder bekommen in diesem Zustande noch starkes Erbrechen, andere deliriren, die meisten aber liegen ganz schlaff in einem soporösen Zustande mit fahlgelbem Antlitz, starren oder halbgeöffneten Augen, und sind nur schwer oder gar nicht mehr zu erwecken. Während der Puls gänzlich unter dem Finger schwindet, wird auch der Herzstoss immer schwächer, nicht selten unregelmässig, der zweite Herzton immer undeutlicher. Die Zahl der Respirationen sinkt bisweilen auf 20 in der Minute, es müsste denn durch eine Complication mit Bronchopneumonie die normale Zahl mehr oder weniger überschritten werden. In diesem Zustande ist es kaum mehr möglich, sich einen ausreichenden Einblick in die Rachenhöhle zu verschaffen, doch verkündet bisweilen ein ungewöhnlich fetter, selbst gangränöser Geruch aus dem Munde, dass es sich um eine das gewöhnliche Maass überschreitende Nekrosirung, um eine wirkliche Gangrän des Pharynx handelt. Gelingt unter diesen Umständen

nach die Untersuchung, so sieht man eine oder beide Tonsillen, einen Theil des Velum, selbst die hintere Pharynxwand in eine schwärzliche, blutende, zottige Masse zerfallen, welche einen eomaisähnlichen Gestank verbreitet. Häufig entwickelte sich als Schluss des Dramas noch eine in der Regel doppelseitige Bronchopneumonie, welche indess während des Lebens kaum zu erkennen ist. Der Husten kann nämlich vollständig fehlen oder wird überschen, und nur die frequente oberflächliche Respiration deutet auf ein Leiden der Respirationsorgane, deren genaue physikalische Untersuchung aber bei dem elenden Allgemeinzustande der Patienten kaum mehr auszuführen, überdies auch für die Praxis ganz bedeutungslos ist.

Diese Art von schwerer Diphtherie, welche man als „septische“ bezeichnen kann, endet, so weit meine Erfahrung reicht, fast durchweg (ethal, oft schon stürmisch nach wenigen Tagen, höchstens nach einer Woche) nur da, wo diese Form sich aus der zweiten (mittelschweren) entwickelt, können zwei bis drei Wochen vergehen, ehe der Tod eintritt. Ich rechne indess nur diejenigen Fälle hierher, in welchen der tödtliche Collapse noch auf der Höhe der Krankheit eintritt, nicht jene später zu beschreibende, die erst nach vollendeter Heilung der Localaffection ganz unerwartet durch Herzlähmung tödten. Ein günstiger Ausgang dieser schweren Form ist mir wenigstens nur zweimal vorgekommen, einmal bei einem Kinde, welches bei einer Temperatur von 40,0, einem elenden kleinen Pulse von 144, lebhaften Delirien, Kräfteverfall, doch nur eine geringe Localaffection des Rachens darbot, das andere Mal bei einem Mädchen, welches bei sehr intensiver Rachendiphtherie grosse Apathie, völlige Anorexie, vielfache Petechien, Aphonie, Croupäusten und einen äusserst kleinen, sehr frequenten Puls zeigte. In beiden Fällen erfolgte zu meiner grossen Ueberraschung allmähliche Genesung unter einer kräftigen excitirenden Therapie. —

Nicht minder schlimm, wie die septische Form, ist die Ausbreitung der Diphtherie vom Rachen aus über die Epiglottis, den Larynx und die Trachea in der Form des Croup. Selbst bei unzweifelhafter Verbreitung bis in die mittleren Bronchien habe ich aber ausnahmsweise noch Heilung beobachtet. Auch in den leichtesten Fällen der Krankheit sind Sie vor diesem Uebergange niemals ganz sicher; die Erfahrung lehrt sogar, dass die leichte und mittelschwere Form weit mehr zum Croup disponirt, als die eben beschriebene septische, in welcher die allgemeinen infectiösen Symptome prävaliren. Trotzdem sind mir Fälle von höchstgradiger septischer Diphtherie, welche mit Croup endeten, wiederholt vorgekommen. Der Zeitpunkt, in welchem der Uebergang der Diphthe-

rie auf den Kehlkopf und die Luftröhre erfolgt, lässt sich nicht genau bestimmen; im Durchschnitt pflügen 4 bis 6 Tage, oft aber nach einer und selbst 1 1/2 Woche zu vergehen, ehe die Larynxsymptome bemerkbar werden. Bisweilen ist die Localaffection im Rachen schon gänzlich geheilt, so dass man jede Gefahr vorüber wähnte und die plötzlich eintretenden Crouperscheinungen nun eine um so schmerzlichere Enttäuschung bereiten. Bei einem 6jährigen Knaben sah ich sogar erst 14 Tage nach dem Beginn der Diphtherie, von welcher nur ein paar leichte Ulcera zurückgeblieben waren, Croup eintreten, welches durch die Tracheotomie glücklich geheilt wurde. Andererseits fehlt es auch nicht an Fällen, wo der Croup schon am zweiten Tage der Krankheit, oder gar noch früher als erstes Symptom der Diphtherie sich entwickelt haben soll, doch glaube ich, dass dann wohl immer die diphtheritische Affection der Rachenhöhle überschauen worden ist. Mir kamen oft Fälle von ausgesprochenem Croup bei Kindern vor, welche nach Aussage der Angehörigen noch vor 24 oder 36 Stunden vollkommen gesund gewesen sein sollten, und dennoch ergab die Untersuchung eine schon weit vorgeschrittene diphtherische Erkrankung der Nase und des Pharynx. Aber selbst dann, wenn man den letzteren anscheinend normal findet, ist dies noch kein Beweis für seine Integrität, welche nur durch die Section festgestellt werden kann. Sehr oft wird nämlich der Arzt durch den versteckten Sitz der Diphtherie irre geführt; bei der oft sehr schwierigen Untersuchung des Pharynx findet er höchstens eine Röthung und Anschwellung der Rachenhöhle mit starker Schleimsecretion, und glaubt nun sicher, wenn eine Stenose des Larynx vorliegt, es mit einem primären entzündlichen Croup zu thun zu haben. Dennoch ergibt die Section einen diphtherischen Process, der indess auf solche Theile beschränkt ist, welche der Inspection während des Lebens bei den meisten Kindern unzugänglich sind, insbesondere die Fossa pyramidalis an beiden Seiten des Zungengrundes und der Epiglottis, oder gar die hintere Fläche des Velum, während die vordere intact ist.

Am häufigsten wird die dem Croup vorausgehende Rachendiphtherie in denjenigen Fällen überschauen, wo letztere sich terminal im Gefolge schwerer Krankheiten entwickelt, besonders bei Kindern mit vorgeschrittener Tuberkulose, chronischer Pneumonie, schwerem Typhus, Meningitis tuberculosa, Enterophthisis u. s. w. Ich selbst verhehle nicht, unter diesen Umständen wiederholt von dem plötzlichen Auftreten eines Croup überrascht worden zu sein, welcher erst den Anlass gab, die Rachenhöhle genau zu untersuchen. Ebenso ergaben die Sectionen bei solchen Kindern nicht selten eine Diphtherie des Pharynx, welche sich

während des Lebens durch gar keine Symptome, oder höchstens durch einen *Foetor oris* oder eine *Koryza* verräthlich gemacht hätte. Um diesen Überraschungen zu entgehen, bliebe nur übrig, sämmtliche in der Klinik befindliche Kinder mindestens einmal täglich einer Racheninspektion zu unterwerfen, was indess leichter anzuordnen, als auszuführen ist. Glücklicher Weise hat das Uebersehen dieser terminalen Diphtherie bei dem ohnehin hoffungslosen Zustande der Patienten keine vitale Bedeutung.

Am seltensten kam es mir vor, dass die Diphtherie des Pharynx erst nach dem Auftreten des Croup sichtbar wurde, und ich möchte auch dann viel eher annehmen, dass sie schon längere Zeit an verborgenen Stellen bestanden und erst später sich auf andere dem Blicke zugängliche Partien vertheilt hat, als dass es sich um eine Diphtheria adscendens im wahren Sinne des Wortes gehandelt habe. Dahin gehört z. B. der folgende Fall:

Carl O., 4jährig, aufgenommen in die Klinik mit hochgradigem Croup am 26. Januar 1878. Pharynx geröthet, viel Schleim in demselben, aber keine Beläge sichtbar. Tracheotomie mit gutem Erfolg. Vom 31. an Fieber mit stürzlichen Exacerbationen von 39,5—40,5. Pharyngitis zunimmt, aber erst am 4. Februar grauer Belag beider Mandeln. Von nun an Sinken des Fiebers und allmähige Besserung.

Ueber die Erscheinungen des diphtheritischen Croup habe ich schon wenig zu sagen, da sie mit denen der primären Laryngitis pseudomembranosa fast durchweg übereinstimmen. Heiserkeit und rauher, von sägertiger Inspiration unterbrochener Husten machen auch hier den Anfang; nur sehr selten fand ich die Stimme noch klar, während schon croupöses Einathmen vorhanden war. Sehr verschieden gestalten sich die Verhältnisse des Fiebers. Häufig steigt die Temperatur mit dem Eintritt des Croup, während sie in anderen Fällen auch bei voller Entwicklung desselben nahezu normal bleibt (37,9 bis 38,2). Ja in einzelnen Fällen constatirte ich noch kurz vor der Tracheotomie 36,2 bis 37,4, ohne dass die begleitenden Erscheinungen die Annahme eines Collapses rechtfertigten. Sehr vernebelt, zwischen 140 und 180 schwankend, ist immer die Frequenz des Pulses, während seine Fülle und Spannung rasch abnimmt und der Rhythmus nicht selten unregelmässig wird. Bei einem 7jährigen Knaben wurde der zuvor schon unregelmässige Puls bald nach der Tracheotomie aussetzend, und nahm einige Tage später bei sinkender Frequenz (56—80) die Charaktere des von Traube beschriebenen Pulsus alternans (*higeninus*) an. Nach zwei ziemlich rasch auf einander folgenden Schlägen trat immer eine Pause ein, auf welche

wieder zwei Schläge, dann eine Pause u. s. w. folgten, wobei aber der zweite Pulschlag constant niedriger und schwächer als der erste erschien. Die Respiration hatte keinen Einfluss auf diese Erscheinung, welche nur drei Tage dauerte, dann unter allmählichem Schwinden des zweiten Schlages sich verlor und in einen lethalen Collaps überging. Die bei der Section gefundene ausgedehnte Fortentartung der Herzmusculatur kann nicht als Ursache jenes Phänomens betrachtet werden, da sie bei Diphtherie mit oder ohne Croup keineswegs selten ist, ohne dass während des Lebens ein Pulsus bigeminus beobachtet wurde. Ich selbst sah z. B. bei einem 10jährigen Knaben, welcher im diphtherischen Collaps zu Grunde ging, und dessen Section eine sehr unbedeutende fettige Degeneration des Herzens ergab, den Puls schliesslich sehr unregelmässig werden und dabei von 132 auf 72 herabgehen, aber von einem Pulsus bigeminus oder alternans im Sinne Traube's war dabei nicht die Rede.

Die Expectoration grösserer Membranfetzen oder röhriger Gebilde durch Husten und Würgen ist beim diphtherischen Croup in prognostischer Hinsicht nicht besser zu beurtheilen, als beim primären (S. 321). Ich sah ein Kind schon am dritten Tage einen vollständigen Abguss der Trachea, einen 12jährigen Knaben eine kleine Schale voll Cylinder expectorata, welche in ihrem Lumen der Luftröhre und den Hauptbronchien entsprechen, in anderen Fällen Secrete, aus den kleinen Bronchien stammende röhrige Gerünselfragmente ausgeworfen werden — fast alle diese Fälle endeten tödtlich, wenn auch hin und da eine kurze Erleichterung Hoffnungen erweckt hatte. Man darf daher auf diese Expectoration keinen Werth legen, wenn auch hin und wieder Fälle vorkommen, in welchen dieselben mit einem günstigen Ausgange zusammenfielen.

Fast noch häufiger als beim primären tritt sie beim diphtherischen Croup Bronchitis und Bronchopneumonie, welche sich, wie schon (S. 320) bemerkt wurde, vorzugsweise durch die bedeutende Steigerung der Respirationsfrequenz und des Fiebers kund geben, während die physikalischen Symptome, abgesehen von einer nicht immer zu constatirenden Dämpfung des Percussionsschalles, in der Regel durch die lauten laryngealen Geräusche ganz verdeckt oder wenigstens sehr undeutlich gemacht werden. Der Auswurf feiner oder gar dendritisch verzweigter Gerünselfragmente deutet mit Sicherheit auf das Vorhandensein einer bis in die unteren Lufttröhrenäste hinabgestiegenen Bronchitis cruposa¹⁾. Sowohl diese, wie

¹⁾ Die von einigen Autoren (Öttenberg, Riegel) für die Diagnose der crupösen Bronchitis geltend gemachte eigenthümliche Dyspnoe (Fehlen der inspiratorischen Einströmung und der Athmungserschließung des Larynx, schwaches Athmen

besonders die in einzelnen Fällen von mir beobachtete putride Bronchitis und circumscripte, in kleinen Herden auftretende Gangrän der Lunge glaube ich von der Aspiration diphteritischer oder gangränöser Gewebereste vom Rachen her ableiten zu müssen, welche nicht nur entzündungserregend, sondern auch direct infectirend auf die kleinen Bronchien und das umgehende Parenchym einwirken können. Eine Diagnose dieser putriden Bronchitis oder gar des circumscripten Lungenbrandes konnte aber, wenigstens in den mir vorgekommenen Fällen, nicht gestellt werden, weil überhaupt gar kein Auswurf vorhanden war, und der föetide Geruch des Athems sich schon durch die Rachendiphterie allein erklären liess.

Die Verbreitung der Diphterie in die Luftwege verschlechtert die Prognose in allen, auch sonst leichteren Fällen bedeutend. Während von 124 Fällen von Rachendiphterie 62 geheilt wurden und 62 an Collaps oder an Bronchopneumonie und anderen Complicationen zu Grunde gingen, verlor ich von 127 Fällen, welche in Croup übergingen 107. Nur 20 wurden geheilt, und zwar mit Ausnahme von zweien sämmtlich durch die Tracheotomie. Der Uebergang in Croup fügt ja noch eine neue Gefahr zu der bereits bestehenden hinzu, denn die Tendenz zum lethalen Collaps dauert auch nach der Verbreitung der Krankheit in die Luftwege fort, und so mancher Fall, dessen Erstickungsgefahr auf operativem Wege beseitigt war, und in welchem die Athmung schon längere Zeit ohne Canüle gut von Statten ging — endet trotzdem ganz unerwartet durch Collaps tödtlich. —

Die Sectionen der im Acutestadium der Krankheit Gestorbenen ergaben häufig viel ausgebreitetere und tiefer dringende Veränderungen, als die ungenügende und mühsame Inspection während des Lebens erwarten liess. Schmutzig-graue, in's Braune oder Grünliche spielende fettige Beläge überziehen in verschiedener Ausdehnung die hintere Rachenhaut, den weichen, seltener auch den harten Gaumen, die Tonsillen, den hinteren Theil des Zungenrückens und der Nasenschleimhaut, lassen sich auch bei sorgfältiger Präparation mitunter bis in die Thymuswege und die Tuba Eustachii verfolgen. Meistens ist das Exsudat in die oberflächlichste Schicht der Schleimhaut dergestalt infiltrirt, dass es nicht hautartig abgezogen, sondern nur durch Abkratzen mit dem Scalpell entfernt werden kann, wobei dann ebenso, wie nach der spontanen Abstossung, Substanzverluste zurückbleiben. Diese Infiltration zeigt sich auch häufig in der Schleimhaut der Epiglottis und, wenn es zum Croup

in den oberen Lungenzweigen) kann mir nicht häufig genug vor, um ein solches Urtheil zu gestatten.

gekommen war, noch in der oberen Larynhälfte bis zu den Stimmländern herab, während weiter abwärts sowohl im Kehlkopf, wie in der Luftröhre und den Bronchien das Exsudat der Schleimhaut nur locker aufgelagert ist, so dass man dasselbe mit einer Pincette abheben oder mit einem Wasserstrahl leicht abspülen kann, worauf die lössgelegte Schleimhaut mehr oder weniger geröthet, aber sonst intact erscheint. Das vielleicht von den Verschiedenheiten des Epithels (Pflaster- oder Cylinderepithel) abhängende Verhalten des Exsudats ist indess nicht ganz constant; vielmehr konnten wir wiederholt die Beläge des Pharynx und der Mandeln als eine mehr oder weniger dicke Membran ziemlich leicht abziehen, und nur an den geschwellenen Follikeln zeigte sich eine etwas stärkere Adhärenz (Croup des Pharynx). Andererseits beobachtete ich in mehreren Fällen eine im anatomischen Sinne diphtherische, d. h. infiltrirte gelbliche Exsudation auf der Schleimhaut der Trachea und selbst der Bronchien, welche sich nur durch Abkratzen mit dem Messer unter Zurücklassung von Substanzverlusten entfernen liess. Sie ergeben aus dieser Thatsache, dass bei der Diphtherie beide Exsudatformen, die infiltrirte und die auf die freie Schleimhautfläche abgelagerte, nicht nur nebeneinander auftreten können, sondern dass auch die Art des Epithels für die Form des Exsudats keineswegs immer ausschlaggebend ist.

Die Schleimhaut des Pharynx und der oberen Luftwege erscheint nach Entfernung des Belags fast immer in verschiedenen Graden geröthet, cyanotisch, oedematos; die Tonsillen sind oft durch Infiltration mit Exsudat stark geschwellen, hier und da auch von kleinen, frischen oder käsigem Eiterherden durchsetzt. Nur selten beobachtete ich Abscesse im retropharyngealen Bindegewebe. Wirklicher Brand der Rachentheile mit missfarbigem, grünlich braunem Zerfall und gangränösem Foetor kam ebenfalls nur selten vor, viel häufiger mehr oder minder ausgebreitete, besonders die Mandeln betreffende, oberflächliche oder tief dringende, mit einem missfarbigen Detritus bedeckte Ulcerationen, welche aus der Abstossung der infiltrirten und nekrotisirten Schleimhautpartien entstanden, beträchtliche Verwüstungen der Mandeln, des Velum, der Uvula und, wie ich schon (S. 663) erwähnte, auch Perforationen des Velum auf einer oder auf beiden Seiten zur Folge haben können. In vielen Fällen erstreckte sich der diphtherische Process auch auf den Anfangstheil des Oesophagus, dessen Schleimhaut infiltrirt, hämorrhagisch, oder mit seichten, vielfach gerundeten Ulcerationen bedeckt erschien. Nur selten aber zeigten sich ähnliche Veränderungen auch auf der Schleimhaut des Magens, besonders in der Regio pylorica, und zwar in

Gestalt einer blättrigen Infiltration und eines darüberliegenden röthfarbigen Belags. Eine Hyperplasie der submaxillaren Lymphdrüsen ist fast constant, seltener eine blättrig seröse Infiltration oder gar eine Phlegmone des umgebenden Bindegewebes, am seltensten eine brandige Zerstörung desselben. Nur in einem Fall fanden wir eine wirkliche Parotitis purulenta mit Vereiterung des umgebenden Bindegewebes. — In den Fällen, wo der Process sich in die Luftwege verbreitet hatte, zeigen sich die schon beim Croup beschriebenen Veränderungen, Infiltration und Ulceration der Epiglottis und der Ligam. aryepiglottica, Oedem derselben, Degeneration der Larynxmuskeln, selten Nekrose der Knorpel, Belag und oberflächliche Verschwärung der Stimmbänder, membranöse, fettige und röthige Exsudate im Larynx, in der Trachea und den Bronchien, deren Schleimhaut verschiedenartig geröthet, geschwollen, auch hämorrhagisch gefleckt erscheint, während das Lumen von eiterigem Schleim erfüllt ist. Sowohl die Ausbreitung der Exsudate wie ihre Dicke ist sehr verschieden. Während sie in vielen Fällen nur fettzigartig als dünne Beläge der Trachea aufliegen, bilden sie in anderen dicke grauweisse Cylinder, welche die Luftröhre auskleiden, bis tief in die Bronchialäste hinabreichen und einen vollständigen Abguss derselben darstellen, oft aber auch nur hier und da in den Bronchien auftreten und dann durch freie, mit Schleim gefüllte Zwischenräume von einander getrennt sind. In mehreren Fällen fanden wir nur die eine Lunge von dieser Bronchitis crouposa befallen, während die andere einfach katarthalische Prozesse darbot. Dass auch eine wirklich diphtherische Infiltration der Tracheal- und Bronchialschleimhaut vorkommen kann, wurde bereits erwähnt. Bronchopneumonie in verschiedener Ausdehnung ist fast constant, oft begleitet von vielfachen Atelektasen des Lungenparenchyms, sowie von adhäsiver Pleuritis, von Oedema pulmonum und Emphysem der Ränder und Oberlappen. Bronchitis putrida und kleine gangränöse Herde im Parenchym fand ich nur in vereinzelten Fällen. Tracheal- und Bronchialdrüsen sind fast immer geschwollen, auch wohl hämorrhagisch infiltrirt. Das Herzfleisch erscheint sehr häufig schlaff, röthlich-grau und unter dem Mikroskop fettig degenerirt, besonders der linke Ventrikel und seine Papillarmuskeln, während das Endocardium, abgesehen von kleinen Ekchymosen, niemals erhebliche Veränderungen zeigte. Insbesondere fehlte die von Bouchut und Labadie-Lagrave als fast constant angegebene Endocarditis in unseren Fällen durchweg. Kleine Ekchymosen fanden sich fast immer in den verschiedensten Theilen, im Peri- und Endocardium, in der Pleura, dem Omentum, Mesenterium, Mediastinum und in der Haut. Die Leber war

gewöhnlich schlaß, rüthlich-gelb, festig entartet, die Nieren fast immer im Zustande der parenchymatösen Nephritis, die Mesenterialdrüsen und die Peyer'schen Plaques mässig angeschwollen. In mehreren Fällen fanden wir neben der Diphtherie noch einen starken Soorbelag im Rachen und Oesophagus, einmal auch Soor auf der Magenschleimhaut.

Die dankenswerthen Bestrebungen, diese größeren Befunde durch das Mikroskop zu ergänzen und auf diesem Wege einen Einblick in das Wesen der Krankheit zu gewinnen, haben bis jetzt leider zu keinem sicheren Resultate geführt. Nicht einmal über die Entwicklung und die Bestandtheile der diphtheritischen Beläge und Infiltrationen herrscht Einstimmigkeit. Der gewöhnlichen Auffassung derselben als einer fibrinösen Exkulation mit profuser Kernwucherung in den oberflächlichen Schleimhautschichten steht eine andere gegenüber, welche eine eigenenthümliche Degeneration der Epithelien als die Hauptursache betrachtet. Dazu kommt nun noch die parasitäre Theorie, welche ihre Bakterienhaufen nicht nur im Pharynx findet, sondern weit über diesen hinaus bis in die Nierenkanälchen und in viele andere Körpertheile verfolgt, ohne entscheidende Beweise dafür zu liefern, dass diese „Bakterien“ nun auch wirklich die specifischen Infektionselemente, und nicht vielmehr die Träger eines allgemeinen septischen Processes sind. Ja selbst die Frage, ob alle diese Körnchen und Haufen in der That etwas Besonderes, nicht etwa zur Zerfallsperiode sind, scheint mir noch keineswegs entschieden zu sein. —

Als Nachkrankheiten der Diphtherie beobachtete ich in einigen Fällen Otorrhoe und Schwerhörigkeit in Folge der Ausdehnung der Krankheit auf das Mittelohr, und einmal Chorea. In Folge der grossen Schwäche und der verminderten Herzenergie kann es auch zur Thrombose grösserer Venen kommen:

Alice M., 11jährig. Von 3 Wochen Diphtherie, nach welcher einem Schwäche mit kaum fühlbarem Pulse zurückblieb. Anfangs Februar 1861 Quinseibildung, Gefühlskram des Herzens, Urin zeigt Spuren von Eiweis. F. 100, nimmt ihm. Von 7. Pfe. in Oedem der ganzen Rücken untern Extremität bis zur Inguinalgegend heuaf, mit grosser Empfindlichkeit gegen Berührung und Bewegung. Verschwinden aller krankenhaften Erscheinungen nach 10 Tagen unter einer kräftigen Behandlung.

Vor Allen verdient die Nephritis¹⁾ und die Lähmung unsere Aufmerksamkeit. Die erstere manifestirt sich sehr oft schon im Blüthenstadium der Krankheit durch Albuminurie und nephritische Elemente

¹⁾ Ueber die anatomischen Verhältnisse derselben vergl. Brault, Journal de l'Anat. et de la physiol. 6. 1868.

im sparsamen Urin, kann aber auch nach der Heilung der Diphtherie fortbestehen. Am seltensten tritt sie, wie beim Scharlach, erst während der Convalescenz auf:

Marie St., 4 jährig, an *Cottus* leidend, wurde am 14. Januar 1874 von einer leichten, mit geringem Fieber (38,4 Abends) zusammengehörender Diphtherie befallen. Bis zum 22. war dasselbe abgelaufen, an der rechten Seite des weichen Gaumens noch ein tiefer Defect sichtbar, das Allgemeinbefinden vollkommen gut. Die Excretion war wie bisher und der mehrmals untersuchte Urin stets frei von Eiweis befunden worden. Am 31., also 17 Tage nach dem Eintritt der Krankheit, wurde das Kind mitleidung. Heftig, klagte über tags-Schmerzen und erbrach sich wiederholt. T. Ab. 38,7. Am folgenden Tage Oedema faciei, Urin spärlicher, stark albuminös. Diese Erscheinungen bestanden unter mäßigem Fieber (T. M. normal, Ab. 38—39) über eine Woche, gleichzeitig mit einem Katarrh in beiden Unterlappen. Der Urin enthielt während dieser Zeit immer viel Urace und verschiedene Mengen von Eiweis, an einzelnen Tagen aber keine Spur davon. Cylinder konnten nur selten aufgefunden werden, wohl aber 60 Epithelien. Vom 11. Februar an Schwinden des Oedems und der Albuminurie. Therapie: Kali acetatum.

Im Ganzen sind solche Fälle selten, besonders im Vergleich mit der Scharlachnephritis. Nur einmal sah ich diese diphtherische Nierenaffectio unter noch zunehmenden Collapserscheinungen tödtlich enden, glaube aber in diesem Fall nicht die Nephritis, sondern den von ihr gänzlich unabhängigen Collaps als Todesursache bezeichnen zu müssen. Leider gehört nämlich dieser unglückliche Ausgang, welcher noch 2 bis 3 Wochen nach der Heilung der Diphtherie eintreten kann und dann die schon in Sicherheit gewiegten Eltern um so schmerzlicher trifft, durchaus nicht zu den Seltenheiten:

Clara R., 9jährig, im November 1873 an einer mäßig schweren Diphtherie des Pharynx leidend, wurde nach etwa 10 Tagen vollständig wieder hergestellt. Das Kind hatte wieder guten Appetit, sah blühend aus, sass spielend im Bett und jede Gefahr schien vorbei. Am 12. Tage nach der vollkommenen Abkennung der nekrotischen Theile fand ich das Kind bei einem zufälligen Besuch im Bette sitzend und spielend, von gutem Aussehen, aber zu meiner Ueberraschung mit einem Pulse von 144 Schlägen, welcher auffallend klein war. Neben dem Eltern ungetheilten Desideratium waren wir zu sehr gerechtfertigt: denn trotz aller angewandten Analeptica nahm die Pulsfrequenz abnehmend zu, die Kräfte sanken schnell, die Extremitäten wurden kühl, der Puls unzufüllbar, die Respiration aussetzend, und schon am folgenden Tage erfolgte der Tod.

Ähnliche Fälle habe ich leider öfters beobachtet, und ich halte es daher für die Pflicht des Arztes, auch in den scheinbar getarteten Fällen von Diphtherie die Prognose nicht absolut günstig zu stellen, ehe nicht zwei bis drei Wochen nach der Heilung verfloßen sind. Dasselbe gilt auch von den Fällen, in welchen die Tracheotomie gemacht werden mußte. Auch hier kann eine Zeit lang Alles nach Wunsch

gehen, und erst, wenn die Heilung der Trachealwunde bereits im Gange ist, erfolgt mit einem Mal ein tödtlicher Collaps, dessen Erscheinungen nicht immer die gleichen sind. Bisweilen eröffnete ein wiederholtes Erbrechen die Scene und der Puls wurde langsam, schwach und unregelmässig, häufiger aber, wie in dem oben erwähnten Falle, immer frequenter und kleiner, während die extremen Körpertheile erkalten, die Haut etwas cyanotisch und die Herzthöne, besonders der zweite, immer schwächer werden und öfters den „galopirenden“ Rhythmus zeigen. Die Respiration ist dabei nicht immer dyspnoeisch, erreicht aber eine hohe Frequenz (60–70), und die Kinder verfallen unter Stöhnen und Wimmern in einen gänzlich apathischen, schliesslich soporösen Zustand, dessen Dauer ich zwischen einigen Stunden bis zu drei Tagen schwanken sah. Der Ausgang war fast in allen meinen Fällen ein tödtlicher, wenn es auch bisweilen gelang, durch starke Analeptica die Herzkraft ein paar Tage über dem Wasser zu erhalten:

0416 T., 6jährig, aufgenommen mit Diphtherie am 15. September 1877. Lungentrichter Verfall. Erst am 8. October ist der Pharynx frei und das Fieber verschwunden. Geringe Albuminurie, die von 18. an nur noch temporär auftritt. Allgemeine Euphorie. Am 19., also mindestens 4–5 Wochen nach dem Eintritte der Diphtherie, plötzlich Collaps Symptome: P. 152, sehr klein, kühle Extremitäten, grosse Apathie und Schwäche. Von nun an wird stündlich ein grosser Esslöffel Sherry oder Tokayer Wein gegeben, und das Verfahren drei Tage lang bis zu einem Zustande höchster Trunkenheit (Röthe der Wangen, massiges Delirium, fortwährendes Schreien) fortgesetzt, wobei der Puls sich wieder hob und die Hände warm wurden. Demnach gewann der Collaps schliesslich die Oberhand, und unter den früheren Erscheinungen, zu denen sich am Schluss noch das Chéné-Stokes'sche Phänomen gesellte, erfolgte der Tod.

Dass es sich in diesen Fällen wesentlich um eine Herzlähmung handelte, unterliegt keinem Zweifel. Wenn mir auch ein paar Sectionen, die ich zu machen Gelegenheit hatte, die von Mosler gefundene diffuse fettige Degeneration des Herzmuskels bestätigen, und zu letzter Zeit auch myokardiotische Veränderungen (Leyden) gefunden wurden, so ist es doch die Frage, ob man diese in Folge der Infektionskrankheit eintretenden Degenerationen auch stets als die Ursache des tödtlichen Collapses betrachten soll, ob nicht vielmehr eine vom Nervensystem (Vagus?) direct abhängende Paralyse des Herzens bei nahezu normaler Structur des Organs diesen Ausgang ebenso gut herbeiführen kann. So viel steht fest, dass wir in mehreren Fällen dieser Art den bei weitem grössten Theil der Herzmusculatur völlig intact mit normaler Querstreifung gefunden haben. Ebenso fehlten die von mancher Seite als Ursache bezeichneten grossen Blutgerinnungen in den Herzhöhlen

oder im Stamm der Lungenarterie. Dass hier das Nervensystem eine wichtige Rolle spielt, scheint mir auch daraus hervorzugehen, dass bisweilen im Verlauf diphtheritischer Lähmungen ganz ähnliche Erscheinungen von Seiten des Herzens auftreten, welche den Tod fast plötzlich durch Synkope herbeiführen können. So sah ich im April 1879 einen 8jährigen Knaben etwa 14 Tage nach überstandener Diphtherie vollständig ataktisch werden und dann plötzlich unter starker Dyspnoe, Störor, Erhlassung und Schwinden des Pulses nach wenigen Stunden zu Grunde gehen. Seltener erfolgt dieser Ausgang erst nach tagelanger Dauer der drohenden Symptome!

Otto M., 9jährig, am 3. October 1876 von mir zuerst untersucht. Vor fünf Wochen hatte er eine mäßig schwere Diphtherie überstanden, auf welche eine Gaumenlähmung folgte. Diese war schon beinahe geheilt, und der Knabe seit einer Woche wieder ausgegangen, als vor einigen Tagen plötzlich Ataxie und Paralyse beider unteren Extremitäten eintrat. Stehen und Gehen alsdort unmöglich, während im Sitzen und Liegen die Beine hülflos, aber ungeschickt bewegt werden. Auch die Kraft der Arme ist schwächer, als im Normalzustande. Gleichzeitig enorme Frequenz (120 und mehr) und grosse Unregelmässigkeit des Pulses, welche mich schon eine drohende Vaguslähmung befürchten liess. Untersuchung des Herzens sonst normal. Auch der linke N. abducens paretisch, so dass das Auge nicht nach aussen bewegt werden konnte. Unter dem Gebrauch eines Chinadecocti und täglicher Strychninjectionen (0,002) besserte sich die Motilität langsam, während der Puls unverändert blieb, die Unregelmässigkeiten und Ungleichheit der einzelnen Schläge vielmehr noch zunahm. Gleichzeitig wurde derselbe immer kleiner und schneller, und unter wiederholtem Vorstoss trat am 7. Tage nach dem ersten Auftreten der drohenden Erscheinungen ein Collaps ein, welchem der Knabe bei vollem Bewusstsein rasch erlag. Section nicht gestattet. —

Ein von Dubrisay¹⁾ mitgetheilter Fall dieser Art beweist, dass unter diesen Umständen nach viel längerer Dauer der bedrohlichen Symptome noch Heilung eintreten kann.

Die Ansichten über das Wesen der diphtheritischen Lähmung, die sich lange in unklaren Hypothesen ergingen, fangen erst jetzt an, eine festere Gestalt zu gewinnen. Dass eine bloss Muskelaffectio, sei es nun eine Entartung der Primitivbündel, oder eine Einwanderung von Bakterien in dieselben, der Lähmung zu Grunde liegen soll, ist nicht erwiesen; vielmehr scheint es sich hier um eine Beeinträchtigung des Nervensystems durch den diphtheritischen Infektionsstoff zu handeln, welche sich merkwürdiger Weise erst zu einer Zeit geltend macht, in welcher die Kranken die Infection selbst längst überwunden zu haben scheinen. Déjérine²⁾

¹⁾ Centralzeit. f. Kinderheilk. I. S. 72.

²⁾ Jahrb. f. K. 1878. XIII. S. 132.

wird in den vorderen Wurzeln der Spinalnerven, wie auch in vielen peripherischen Nerven Fettkörnchenbildung und Schwinden der Achsen-cylinder, ausserdem aber Atrophie der Ganglienzellen in den Vorderhörnern und Verwachsung des interstitiellen Bindegewebes, also eine „parenchymatöse Neuritis und Myelitis“ beobachtet haben, und P. Meyer¹⁾ fand in einem Falle von sehr verbreiteter diphtherischer Lähmung fast in allen peripherischen Nerven deutliche Zeichen einer parenchymatösen Neuritis (Zerklüftung des Markes, Kernwucherung in der Schwann'schen Scheide, Umwandlung in Körnchenzellen, Knötchenbildung durch Oedem und Schwellung des Bindegewebes). Dieselben Veränderungen fanden sich in den Wurzeln der Spinalnerven und in vielen Spinalganglien, während im Rückenmark selbst nur viele Ganglienzellen ihre Fortsätze ganz oder zum Theil eingebüsst hatten. Diese Befunde bestätigen die schon 1867 von Buhl gemachten Beobachtungen und fordern zu fortgesetzter Untersuchung des peripherischen Nervensystems bei der diphtherischen Lähmung auf. Die zum Theil negativen Resultate Gaucher's²⁾ lassen sich nicht dagegen geltend machen.

Die diphtherische Lähmung, welche gerade nach den leichteren Fällen der Krankheit am häufigsten aufzutreten pflegt, kündigt sich in der Regel 2—3 Wochen nach Ablauf der Krankheit durch eine Paralyse des Gaumens an, welche häufig auch das einzige Lähmungssymptom bleibt. Die Kinder bekommen eine nasale, mehr oder weniger unverständliche Sprache, und ein Theil des Getränks, welches sie geniessen, wird sofort aus der Nase wieder ausgestossen. Bei der Untersuchung des Pharynx bemerkt man, dass das Gaumensegel sowohl beim Inspiriren, wie beim Phoniren brennend oder gänzlich unbeweglich ist und schlaff herabhängt, so dass es nicht im Stande ist, beim Trinken die Rachen- von der Nasenhöhle abzuschiessen, und das Getränk daher durch die Choanen in die Nase gelangt. In manchen Fällen ist das Velum nur halbseitig gelähmt, so dass es beim Phoniren schief verzogen wird. Zumeilen fand ich dasselbe auch unempfindlich gegen Berührungen, z. B. mit einem Pinsel, die weder gefühlt wurden, noch eine Reflexbewegung hervorriefen. Diese Gaumenlähmung kann, wie ich wiederholt beobachtete, besonders in den niederen Ständen, das erste Zeichen sein, welches eine vorausgegangene, aber von den Eltern ganz übersehene und spontane geheilte Rachendiphtherie verräth. Sehr häufig quellen sich aber noch Störungen des Selbstvermögens, besonders eine

¹⁾ Virchow's Archiv Bd. 85. Heft 2.

²⁾ Journal de l'unt. et de la physiol. I. 1881.

Unfähigkeit, deutlich zu lesen oder die Gegenstände in gewisser Entfernung scharf zu erkennen, Flimmern vor den Augen, Diplopie, hinc, Erscheinungen, welche durch Accommodationsstörung in Folge einer Paralyse des Musc. tensor chorioideae herbeigeführt werden. Die Bewegungen der Pupille sind dabei meistens schwerfällig oder ganz aufgehoben. Besonders pflegt das Sehen in der Nähe gestört zu sein, so dass z. B. einer meiner kleinen Patienten beim Schreiben nicht mehr wusste, ob er noch immer auf derselben Zeile schriebe. Längeres Lesen und besonders das Lesen feiner Schrift wird häufig unmöglich. Die meisten dieser Kinder sind in Folge der überstandenen Krankheit etwas anämisch, zeigen auch wohl noch Spuren von Eiweiss im Urin. Da hier ohne Zutun der Kunst sehr oft im Verlauf weniger Wochen allmähliche Heilung eintritt, so darf man den Werth der empfohlenen therapeutischen Methoden nicht überschätzen.

In einer anderen Reihe von Fällen gewinnt die Paralyse eine bei weitem grössere Ausdehnung, wobei aber die Gaumen- und die Accommodationslähmungen doch fast immer den Anfang bilden, viel seltener entweder ganz fehlen oder bereits geheilt sind, wenn andere Körpertheile von der Lähmung befallen werden. Eine Parese der Nackenmuskeln, wodurch der Kopf vornüber sank und nur mühsam ohne Nachhülfe aufgerichtet werden konnte, kam mir ziemlich oft vor, selbst in Fällen, wo nasser der Gaumen- und Augenmuskellähmung keine andere paralytische Erscheinung bestand. Zunächst macht sich dann Ataxie und Kraftlosigkeit der unteren Extremitäten bemerkbar, welche das Stehen und Gehen mehr oder weniger erschwert, so dass die Kranken ihre Beine nach Art der Tabetischen „schleudern“ und besonders beim Umdrehen leicht hinfallen. Nur selten steigert sich diese Parese und Ataxie zu einer vollständigen Lähmung, an welcher auch die oberen Extremitäten Theil nehmen können. Ich selbst habe diese completen und ausgedehnten Paralyseu ebenso wenig beobachtet, wie die hemiplectischen und gekreuzten Formen, oder die Paralyseu vieler cerebraler Nerven, von denen hier und da die Rede ist. Wohl aber sah ich bei einem Knaben eine Aphonia paralytica, welche durch den faradischen Strom geheilt wurde, und mehrere Mal Lähmungszustände der respiratorischen Muskeln, wobei die Athmung sehr oberflächlich, dyspnoeisch und frequent war, ein bestehender Husten gänzlich kraftlos und unfähig wurde, die angesammelten Schleimmassen aus den Bronchien zu entleeren. Da jeder stärkere Bronchialkatarrh unter diesen Umständen durch Suffocatio lethalis werden kann, so ist die Paralyse der Athmuskeln als die bedenklichste Form der diplo-

therischen Lähmung überhaupt zu betrachten. Denn die durch Gaumenlähmung bedingte Dysphagie wird nur selten so hochgradig, um das Leben ernstlich zu gefährden, vielmehr werden feste Speisen meistens noch gut geschluckt, und auch die oben (S. 677) erwähnte Herzlähmung ist im Allgemeinen seltener die Ursache des Todes bei diphtherischer Paralyse, als diejenige der Athemmuskeln. Lähmungen der Sphinkteren habe ich nur im letzten Stadium dieser Krankheit, erhebliche Störungen der Sensibilität aber, sei es nun Anästhesie, Analgesie, Kältegefühl oder gar Hyperästhesie niemals beobachtet. Da aber gerade die Beurtheilung dieser Zustände im kindlichen Alter besonderen Schwierigkeiten unterliegt und bei kleinen Kindern sogar meistens ganz unmöglich ist, so will ich damit nicht in Abrede stellen, dass die zu Erwachsenen gemachten Beobachtungen dieser Art ihre Richtigkeit haben. Hervorzuheben ist noch, dass die elektrische Erregbarkeit und die Ernährung der gelähmten Muskeln in meinen Fällen selbst bei längerem Bestehen der Paralyse ungestört blieben. Dass die letztere auch nach einer Diphtherie der äusseren Haut auftreten kann, ist durch einzelne Fälle bewiesen, in welchen Personen nach einer durch Infection entstandenen Diphtherie des Fingers Lähmungserscheinungen, und sogar recht ausgedehnte, zeigten. Mir selbst ist ein solcher Fall bis jetzt nicht vorgekommen.

Dieser ausführlichen Schilderung der Diphtherie entspricht leider nicht das, was ich Ihnen über die Behandlung mitzutheilen habe. Noch heut muss ich wiederholen, was ich schon 1874¹⁾ aussprach: „Nach meinen Erfahrungen leisten alle bisher empfohlenen Mittel (und ausser den Schwefelpräparaten glaube ich sie fast alle versucht zu haben) absolut nichts in den schweren Fällen der Krankheit, und darauf kommt es doch allein an, da die leichteren auch ohne Zuthun der Kunst heilen.“ Ich glaube, das alle erfahrenen Aerzte darin mit mir übereinstimmen. Die enorme Zahl der Mittel, von denen theilweise wahre Wunderdinge berichtet werden, das Ausproben von Methoden, bei deren Anwendung fast kein Kraaker mehr gestorben sein soll, erklärt sich eben daraus, dass diese gerühmten Dinge sich in leichten, allenfalls auch mittelschweren Fällen, oder gar bei den so häufig mit Diphtherie verwechselten katarrhalischen und croupösen (S. 437) Anginen bewährten. An den wirklich schweren Fällen prallen sie erfolglos ab. Sie werden mir daher erlassen. Die vielen in der Literatur aufgeführten Mittel, von denen ich nie einen Erfolg gesehen habe, hier zu wiederholen. Obwohl

¹⁾ Charité-Annalen. Bd. I. S. 588.

meine Pflicht als Vorstand einer pädiatrischen Klinik mich nöthigt, mit den neu empfohlenen Mitteln Versuche anzustellen, gestehe ich doch offen, dass ich auch unzähligen Misserfolgen anfangs dieser Pflicht nur zögernd und mit grossen Misstrauen nachzukommen. Alte halbvergessene Methoden werden von jüngeren Aerzten immer wieder laut angepriesen, und besonders das Bestreben, die präsumierten Bakterien zu vernichten, fördert immer neue „antiseptische“ Mittel zu Tage, welche bei näherer Prüfung doch höchstens einen günstigen localen Einfluss, oft aber auch nicht einmal diesen, auszuüben im Stande sind. Und wie könnte es auch anders sein in einer Krankheit, bei welcher die Infection des ganzen Organismus die Hauptrolle spielt, und die locale Rachenaffection, wenigstens zu der Zeit, wo wir sie in der Regel zur Behandlung bekommen, schon nebensächlich geworden ist. Daher kommt es, dass von allen diesen Wundermitteln nach wenigen Monaten kaum mehr die Rede ist. Ich verdanke es gewiss keinem Arzte, wenn er den Muth nicht verliert, nach einem Specificum gegen eine so furchtbare Krankheit zu suchen; nur ist zu verlangen, dass die Empfehlung eines solchen mit sorgfältigster Kritik der Beobachtung und erst nach vielfacher Prüfung des Effects geschieht, noch mehr aber, dass das empfohlene Mittel nicht schädliche Nebenwirkungen entfaltet. Die neueste Zeit bot uns ein solches Beispiel in dem mit unverantwortlichem Leichtsinne angepriesenen Pilocarpin, von dessen bedenklicher Wirkung in dieser an und für sich schon zum Collaps tendirenden Krankheit ich mich wiederholt überzeugen konnte.

Von allen infectiösen Krankheiten ist es bis jetzt nur das Malariafieber, gegen welches wir ein Specificum kennen. Bei Scharlach, Masern, Pocken, Typhus, Cholera, Pest u. s. w. hat man sich längst resignirt, ein solches zu finden, und die Hoffnung, gerade in Bezug auf die Diphtherie glücklicher zu sein, muss deshalb wohl erheblich herabgestimmt werden. Bis jetzt hat sich noch jede Hoffnung als eine trügerische erwiesen. Vor allem wollen wir uns nicht selbst betrügen. Wenn ich Ihnen also dasjenige Verfahren empfehle, welches ich nach vielfachen Versuchen beibehalten habe, so geschieht dies nur aus dem Grunde, weil ich es wenigstens für rationell halte und die Hälfte aller Fälle, und zum Theil recht ernste, dabei genesen sah. Oertlich wende ich zur Gurgelungen oder bei kleineren Kindern flüssige Ausspritzungen der Rachen- und Nasenhöhle mit einer Lösung von Kali chloricum (10 : 500), Alumen aceticum (25 : 500), Carbonsäure (1 bis 2 pCt.) oder mit Aq. calcis und Aq. destill. na an. Am bequemsten ist hier die Anwendung dieser Mittel in zerstäubter Form, weil man die dünne Spitze des Spray-Apparats auch bei widerspenstigen

Kindern leicht durch die Zähne zwangen und dann alle Theile der Rachenhöhle gleichmässig bespülen kann. Je häufiger dies Verfahren in Anwendung kommt, um so besser; im Allgemeinen sind ein- bis zweistündige Intervalle zu empfehlen. Von einer specifischen, die präswirten „Krankheitserreger“ vernichtenden Wirkung dieser Ausspülungen ist dabei gewiss keine Rede; der Zweck des Verfahrens ist eben nur die möglichst vollständige Ausspülung der ersetzten Stoffe, die Beseitigung des Pseudoes und die allmähliche Lockerung und Lösung festhaftender Exsudate. Aus diesem Grunde ist auch das von Rigauer¹⁾ empfohlene Verfahren, den Kindern mehrere Mal täglich 4 bis 5 Theelöffel kühles Wasser in die Nase zu gossen, gewiss nicht zu verwerfen; nur darf man sich nicht die Wundenlinge davon versprechen, welche der genannte Autor durchblicken lässt. Bepinselungen der kranken Theile, mit wolkiger Flüssigkeit es auch sei, halte ich für nicht zweckmässig, weil sie die Kinder fast immer stark weizen und bei Widerständigkeit nur mit Gewalt durchzuführen sind, wobei die Schleimhaut leicht verletzt werden kann. Diese Verletzungen sollten wegen der fast un vermeidlichen diphtherischen Infection aller Läsionen der Schleimhaut um jeden Preis vermieden werden, und ich begreife daher am wenigsten den Rath Letze-rieh's, eines der eifrigsten Anhänger der Bakterien-theorie, die Beläge mit den Fingernägeln abzukratzen, denn gerade dies Verfahren müsste doch den „Bakterien“ erst recht die Thore des Organismus öffnen. Aus demselben Grunde halte ich auch, wie die meisten Aerzte, alle Anzeigen des Pharynx, ohne welche man früher nicht auszukommen glaubte, längst aufgegeben und wandle mich nur, dass immer wieder neue Empfehlungen dieser verurtheilten Methode auftauchen. Selbst der begeisterte Verfechter der Bakterieninfection wird zugeben, dass die locale Zerstörung derselben, wenn überhaupt möglich, doch nur im Augenblicke der Infection nutzen kann, nicht aber zu einer Zeit, wo bereits die Beläge entwickelt sind und die Bakterien schon längst in die Lymph- und Blutbahnen eingedrungen sein können. — Bei lebhafter entzündlicher Röthe und Schwellung der Rachenröhre lasse ich einen Eisbeutel um den Hals appliciren und häufig kleine Eisstückchen schlucken, um die Entzündung zu mässigen. Zum inneren Gebrauch empfehle ich ihnen von Anfang an ein Decoct. Chinæ (5 bis 10:120) mit Aq. chlori (10,0 bis 15,0), daneben eine nahrhafte Diät (Milk, Fleischbrühe und Weiss), welche freilich durch die vollständige Anorexie vieler Kinder

¹⁾ Die Diphtherie und ihre Behandlung durch das kalte Nasenbad. Leipzig 1890.

oft geradezu unmöglich wird. Bei unbesiegbarem Wadervillen muss man zu ernährenden Klystiren (Fleischsolation, Pepton, Bouillon mit Ei und Wein) seine Zuflucht nehmen.

Diese einfache Therapie, welche die Indication der Reizlichkeit, der Atrophie und der Tonisirung gleichmässig zu erfüllen sucht, hat wenigstens die Gefährlosigkeit für sich. Entschieden widerrathen muss ich Ihnen alle Methoden, welche die schon vorhandene Tendenz zum Collaps noch steigern, besonders die grossen Dosen des Kali chloricum (kleine Dosen sind zwar unschädlich, aber ganz nutzlos), welche ausserdem noch gefährliche Intoxicationen mit Hämoglobinurie zur Folge haben können, ebenso die grossen Dosen des Chinins und salicylsäuren Natrons. Gänzlich erfolglos blieb in meinen Händen auch das Natrium subphosphoricum, das vielgerühmte „bakterienmordende“ Natrium benzoicum, welches wir sowohl innerlich, wie als Stropspulver, in mindestens 25 schweren Fällen versuchten, und das Brom, dessen Inhalation das Weiterkriechen des Processes auf den Larynx nicht verhinderte. Auch die Carbonsäure habe ich sowohl innerlich, wie als subcutane Injection neben dem Zungenbein (0.03 bis 0.05 gr. dos.) wiederholt ohne jeden Erfolg versucht und führe Ihnen zum Beweise ihrer Unwirksamkeit noch den Fall eines 9-jährigen Knaben mit Fractur des Oberarms an, welchem nach der Resection des Humerus am 19. Juli 1873 ein Carbolverband angelegt wurde. Der Urin wurde schwärzlich, aber trotz dieses deutlichen Zeichens der Resorption bekam der Knabe am 18. August Diphtherie mit consecutiver Gaumenlähmung. Ebenso erfolglos zeigte sich mir der Gebrauch des Arseniks und der subcutanen Injectionen von Sublimat, welche ich, gestützt auf die Koch'sche Empfehlung, in einigen schweren Fällen versuchte, und ich kann daher die von Kaulich¹⁾ auf dies Mittel gesetzten Hoffnungen nicht theilen. Ueber die ätliche Anwendung des Jodoforms²⁾ fehlt mir zwar noch eigene Erfahrung, doch verspreche ich mir von demselben ebenso wenig, wie von allen anderen Localmitteln.

Ganz waffenlos stehen wir dem diphtherischen Collaps gegenüber, mag er nun von vorn herein in der schweren Form oder als unerwartete Nachkrankheit sich geltend machen. Unsere bewährtesten Excitantia, Kampher, Moschus, grosse Dosen von Wein, selbst bis zur Trunkenheit gegeben (S. 677), endlich die von mir versuchte Application des elektrischen Stroms auf den Vagus — alles prallte an dem übermächtigen Gegner ab. Zu der Zeit, als ich noch gewohnt war, das Eisen, zumal

¹⁾ *Pragte med. Wochenschr.* 1882. Nr. 18, 20.

²⁾ *Kerack, Deutsche med. Wochenschr.* 1882. Nr. 26.

den Liqueur ferri sesquichlorati, in allen Fällen von Diphtherie von Anfang an zu geben, war dieser traurige Ausgang nicht seltener, als jetzt, wo ich von diesem fruchtlosen Mittel längst zurückgekommen bin. Nur in einzelnen Fällen sah ich zu meiner eigenen Ueberraschung einen glücklichen Ausgang, weiss aber nicht, ob ich denselben der Naturheilkraft oder den angewendeten Excitantien zuschreiben soll.

Ebenso wenig giebt es ein Mittel, um der Ausbreitung der Diphtherie in die Respirationswege Schranken zu setzen. Wir sind leider auf das Abwarten angewiesen, und kommen erst mit dem Eintritt der croupösen Symptome in die Lage, an eine Aenderung der bisher befolgten Therapie zu denken. Von der Anwendung antiplöagistischer Mittel, welche beim primären Croup (S. 323) in Betracht kommen, haben wir hier gänzlich abzusehen; sie sind nicht nur nutzlos, sondern können auch durch ihre schwächende Wirkung gefährlich werden, und dasselbe gilt von den Brechmitteln in voller Dosis, von denen ich wenigstens nie einen dauernden Erfolg, wohl aber oft genug eine heftigere collabirende Wirkung beobachtet habe. Ein paar Mal glückte ich zwar durch energische Mercurialeinreibungen (1,0 Ung. einer 2stündlich) eine Heilung erzielt zu haben, und fand mich dadurch bewogen, die Schmiercur in einer grösseren Zahl von Fällen zu versuchen. Diese Versuche fielen aber so unglücklich aus, dass ich jene vereinzelter Erfolge nur als glückliche Zufälle betrachten konnte und die Mercurialcuren vollständig aufgab. Ich kann mich dabei auf den Fall eines 1 $\frac{1}{2}$ -jährigen Knaben berufen, welcher in der Klinik wegen Syphilis mit einer Schmiercur behandelt wurde und sogar einen leichten Pyralismus bekam, trotzdem aber am Schlusse dieser Cur von Rachendiphtherie befallen wurde. Dass auch der diphtheritische Croup hier und da spontan, also auch bei der Anwendung sehr verschiedener Mittel heilen kann, bestrite ich keineswegs, und habe schon oben (S. 663) einen anatomischen Beweis dafür beigebracht. Jedenfalls aber sind diese Heilungen, zumal wenn die croupösen Erscheinungen einen hohen Grad erreicht hatten, nur Ausnahmen. Unter 127 Croupfällen sah ich nur zwei auf diese Weise günstig enden, während 37, welche sich grösstentheils nicht mehr zur Tracheotomie eigneten, ohne Operation zu Grunde gingen, und 88 tracheotomirt werden mussten. Diese Operation (wir machten fast durchweg die Tracheostomia superior) ist nach meiner Ueberzeugung das einzige Mittel, von welchem man sich noch Hilfe versprechen darf, und ich rathe Ihnen daher, dieselbe in allen Fällen vorzunehmen, welche sich nicht bereits in Agone befinden oder sehr schwere Infectionssymptome darbieten. Das zarte Alter der Kinder darf nicht abschrecken. Sind auch die

Aussichten für die Tracheotomie nach dem vollendeten dritten Jahre weit günstiger als zuvor, so fehlt es doch nicht an Beispielen des Gelingens bei Kindern im zweiten, ja selbst im ersten Lebensjahre. Von grosser Wichtigkeit ist es, die Operation nicht zu spät auszuführen, wenn bereits Cyanose, Kühle der Extremitäten, äusserste Orthopnoe vorhanden sind. Obwohl man auch unter diesen Umständen nicht von der Operation absehen soll, ist es doch immer geräthlich, sofort zu operiren, wenn die localen Zeichen der Larynxstenose (anhaltender Stridor beim Athmen, croupöser Husten, Einsenkung des Jugulum und der unteren Rippen) eingetreten sind. Man hat dabei nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen. Selbst eine nachweisbare Pneumonie geht meiner Ansicht nach keine Contraindication, da trotz derselben die Operation wiederholt erfolgreich war. Freilich darf man dabei nie vergessen, dass die Tracheotomie nur die Larynxstenose compensirt und die Respiration wieder möglich macht, auf die Diphtherie selbst aber durchaus keinen Einfluss ausübt. Diese kann zwar auch der Operation stillstehen und heilen, ebenso gut aber bis in die Bronchien hinabkriechen, Bronchopneumonie hervorrufen oder durch Collaps tödten, und daraus erklärt sich denn auch die grosse Mortalität der operirten Fälle. Meine eigenen Beobachtungen stimmen mit denen vieler Hospitalärzte ziemlich überein, da wir unter 88 Operirten 29 (nicht ganz den 4. Theil) durchbrachten, und dies Verhältniss auch während der letzten Jahre sich nicht wesentlich änderte. Günstiger gestaltete sich dasselbe in der Privatpraxis. Bedenkt man, dass wir Kinder jedes Alters und in jedem Stadium der Krankheit operirten, dass ein grosser Theil derselben den ärmsten Volksklassen angehörte, viele auch tuberkulös waren, so kann unsere Statistik immerhin als eine nicht zu ungünstige betrachtet werden. Ich wiederhole hier, dass diese Statistik sich nur auf den diphtherischen Croup bezieht, und dass die Tracheotomien, welche bei Kindern mit einfachem eitründlichem Croup unternommen wurden, ein bei weitem günstigeres Resultat lieferten. Die Thatsache, dass zu manchen Zeiten die Operation auffallend gute Erfolge hatte, während zu anderen Zeiten fast alle operirten Kinder starben, wurde auch von uns wiederholt beobachtet.

Die Hauptursache der Mortalität nach der Tracheotomie ist, wie unsere Sectionen ergaben, die zum Theil croupöse Bronchitis und die Bronchopneumonie, welche nicht etwa als Folge der Operation betrachtet werden darf, vielmehr auch in den nicht croupösen Fällen von Diphtherie oft genug vorkommt. Grosse Frequenz und Oberflächlichkeit der Athemzüge ist daher schon vor der Operation immer ein

bloes Zeichen, weil sie uns die Theilnahme der Bronchien und Lungen verkündet, und aus demselben Grunde ist der Auswurf röhriger oder gar verzweigter Membranen durch die Canüle nach der Tracheotomie ein schlechtes Symptom. Die Fälle, in welchen auch nach dem Auswurf oder der Extraction zusammenhängender, dichotomisch verzweigter, selbst einen verästelten Baum darstellender Pseudomembranen dennoch Heilung erfolgte, was ich selbst zu beobachteten Gelegenheit hatte, gehörten zu den Ausnahmen. Die bronchitischen und pneumonischen Complicationen lassen nach der Operation kaum eine Milderung des Zustandes aufkommen; wenn auch die Symptome der Laryngstenose schwinden, so nimmt doch die Respiration an Frequenz noch zu (60—70 in der Minute), die Temperatur verharrt auf 39 bis 40° und darüber, und der Tod pflegt schon nach 24—48 Stunden eintreten.

Wo aber diese Complicationen fehlen, da bringt die Operation eine so auffallend günstige Veränderung hervor, dass Ueberlebende, zumal Laien, sich den besten Hoffnungen hingeben. Leider werden dieselben sehr häufig nach wenigen Tagen herb enttäuscht. Der bisher ruhige Athem wird frequent und dyspnoeisch, das Fieber steigt von Neuem und die Untersuchung ergibt, dass die gefürchtete Complication von Seiten der Bronchien und Lungen dennoch eingetreten ist. Diese Gefahr ist durch kein Mittel mit Sicherheit zu verhüten. Wie allgemein nützlich, bedecken auch wir die Oefnung der Canüle mit einem feuchtwarmen Schwamm und füllten ausserdem in vielen Fällen das Zimmer mit einem durch Dampfpray erzeugten Nebel von Wasserdampf¹⁾, oder liessen heissig Inhalationen von zerstäubter Kochsalzlösung oder Aq. calis durch die Canüle machen, und dennoch verloren wir eine grosse Zahl dieser Kinder durch croupöse Bronchitis und Pneumonie. Aber noch andere Gefahren können nach der Operation das Leben bedrohen, zunächst die diphtherische Infiltration der Incisionswunde, welche mitunter ausgedehnte nekrotisirende Zerstörungen der vorderen Halspartie herbeiführt, ferner ein Erysipelas serpens, welches wir ein paar Mal mit starker Blasenbildung bis zum Kinn und Epigastrium sich ausbreiten, und unter heftigem Fieber und Collaps tödtlich enden sahen. Auch Blutungen aus der diphtherisch gewordenen Wunde, der durchschnittenen Schilddrüse, der durch die Canüle ulcerirten Trachea, selbst aus der nurirten Arteria aortica können gefährlich und lethal werden²⁾. Zu den sehr störenden, aber nicht seltenen Ereignissen gehört auch das Ausfliessen

¹⁾ Jämbasch, Berl. klin. Wochenschr. 1882, Nr. 22.

²⁾ Zimmerlin, Jahrb. f. Kinderheilk. 32X. 1882, S. 39.

der Getränke aus der Canüle, oder wenn diese schon herausgenommen ist, aus der Trachealwunde, während feste Nahrungsmittel besser geschluckt werden, aber doch leicht in die Athemswege gerathen und heftigen Husten erregen. Die Ursache dieses Symptoms, welches die Ernährung des Operirten wesentlich erschwert, kennen wir nicht sicher. Um eine Unfähigkeit der Epiglottis, den Larynx während der Deglutition zu schliessen, kann es sich kaum handeln, da Menschen mit ansehnlichen Defecten des Kehlkopfs diesen Uebelstand nicht darzuleiden brauchen. Eher scheint ein Offenstehen der Glottis in Folge von Lähmung die Ursache desselben zu sein. Durch die Einführung der Trendelenburg'schen Obliterationscanüle kann man hier günstig einwirken, aber auch durch ausschliesslich feste Nahrung (Bier, geschabtes Fleisch) und durch Anwenbung ernährender Klystire gelang es uns, ein paar Mal die Kinder zu erhalten, da diese Störung der Deglutition nur einige Tage, höchstens eine Woche anzuhalten pflegt. Dass die Gefahr einer Schluckpneumonie in diesen Fällen nahe liegt, ist begreiflich, doch lehrt der folgende Fall, dass selbst bei einer Combination so erschwerender Umstände der Ausgang noch ein günstiger sein kann:

Anna K., 6jährig, am 28. Januar 1874 mit diphtheritischem Crup aufgen. Tracheotomie am 29. mit Entleerung mehrerer pseudomembranöser Fetzen. Während der folgenden Woche (bis zum 7. Tage) Ausflüssen aller Getränke aus der Trachealwunde mit zunehmendem Kräfteverfall (Klystire von Milch, Kigelb und Bouillon, später Leube'sche Fleischklystire). Am 7. Februar schluckte sie zuerst ein weich gekochtes Ei, vom 18. an wieder alle Flüssigkeiten. (Seit einer Woche täglich 2mal 2 Tropfen Liq. fern ausgehlet. in einem Theelöffel fein geschabten Rindfleisch). Von Anfang an bestand Albuminurie mit Cylindern im Harn, welche 3 Wochen lang bis zum 19. Februar dauerte. Die Trachealwunde wurde diphtherisch, und ein schon bestehender Bronchialkatarrh complicirte sich am 16. Tage nach der Operation mit einer Bronchopneumonie im linken Oberlappen (Temp. bis 38,8). Vom 18. Febr. an Schwinden des Fiebers, am 2. März klangvolle Stimme. Geheilt entlassen.

In zwei Fällen traten am zweiten und dritten Tage nach der Tracheotomie epileptiforme Convulsionen ein, welche tödtlich endeten. Ob dieselben als Initialsymptom einer Pneumonie, oder als Erscheinungen der Irritation aufzufassen waren, will ich nicht entscheiden; jedenfalls fand sich in der Schädelhöhle kein erklärender Befund.

Bei günstigem Verlauf konnte die Canüle in der Regel schon am 5. Tage nach der Operation entfernt werden, was natürlich immer erst probeweise unter ärztlicher Beobachtung geschah. Durch bedeutende Wulstung der Schleimhaut, zumal über den Aryknorpeln, welche das Lumen des Kehlkopfes beeinträchtigt, kann indess die Herausnahme der Canüle verzögert werden. So konnten wir z. B. bei einem Kraben,

welcher am 7. Januar 1877 operirt war, erst am 31. die Röhre entfernen, weil bis dahin jeder Versuch dazu sofort Orthopnoe erzeugte, und die Untersuchung mit dem Spiegel immer noch bedeutende Schwellungen der Mucosa ergab. Unter diesen Umständen hat man immer zu bedenken, dass eine ungewöhnlich lange Zeit in der Trachea liegende Canäle, mag es auch noch so gut gearbeitet sein, durch ihren Druck die Schleimhaut reizen, sogar ein Decubitalgeschwür derselben, welches in der Regel etwa 2—2½ Ctm. unterhalb der Wunde sich befindet, erhebliche Ulcerationen und schliesslich polypöse Wucherungen zur Folge haben kann. Ist es aber erst zu diesem gekommen, so kann von einem Herausnehmen der Canäle nicht mehr die Rede sein, und die Kinder laufen Tage und Tag mit derselben herum, bis es gelingt, die Wucherungen der Schleimhaut und damit die Gefahr der Stenose zu beseitigen. Zu dicke und besonders sehr scharfrandige Canäle sind natürlich am schädlichsten, besonders wenn dieselben nicht regelmäßig herausgenommen und gereinigt werden.

Ich werde mich immer eines 4jährigen Knaben erinnern, welcher bereits vor 4 Wochen in der Stadt operirt worden war, und dessen Canäle nach Aussage des Vaters seitdem ununterbrochen in der Wunde gelegen hatte. Als nun am 6. März 1878 die Canäle, welche viel zu dick für den vorliegenden Fall ersahen, in der Klinik mit vieler Mühe herausgenommen wurde, entleerte sich eine Menge von bläulichem Eiter aus der Wunde und dem umgebenden Bindegewebe. Nach zwei Stunden machte der Eintritt von Orthopnoe das Einlegen einer neuen dünnen Canäle nothwendig, welche aber am folgenden Tage für immer entfernt werden konnte.

Schliesslich möchte ich noch erwähnen, dass wir alle Verwundeten (S. 624), so auch die tracheotomirten Kinder, welche sich in meiner Klinik befanden, eine besondere Tendenz zur Infection mit Scharlach zeigten, welches öfters schon 24 Stunden oder ein paar Tage nach der Operation ausbrach und vollkommen günstig verlaufen konnte. Eins dieser Kinder, ein 6jähriger Knabe, welcher am 10. März 1877 tracheotomirt worden und dabei viele membranöse Fetzen entleert hatte, machte innerhalb der nächsten Woche ausser dem Scharlach noch eine Bronchopneumonie und Nephritis durch, entleerte aber während dieser ganzen Zeit, mitunter täglich, immer noch Fetzen von Pseudomembranen aus der Wunde. Fälle dieser Art, in welchen der eitrige Process in der Trachea und den grossen Bronchien nach Wucherungslang nach der Operation fortbesteht, sind im Ganzen selten, können aber erfahrungsgemäss einen guten Ausgang nehmen. Unter das endliche Schicksal meines kleinen Patienten blieb ich zwar im Ungewissen, weil derselbe am 27. von seinen Eltern der Klinik entzogen wurde, aber in der Literatur existiren Beispiele, in welchen die Ausstossungen croupöser

Petosa und Röhren aus den Bronchien nach 31. ja 61 Tage nach der Operation fortgesetzt und dennoch Heilung erfolgte¹⁾.

Was endlich die Behandlung der diphtherischen Paralyseu betrifft, so stimmen alle erfahrenen Aerzte in der Empfehlung eines tonisirenden Verfahrens, (gute Nahr., Eisenpräparate, frische Luft) überein, und viele Fälle werden in der That auf diese Weise binnen kurzer Zeit geheilt. Da indess nicht mit Sicherheit darauf zu rechnen ist, so versuchte ich seit 1874 in vielen Fällen subcutane Injectionen von Strychnin, welche fast zu derselben Zeit von Acker²⁾ bei Erwachsenen mit Erfolg angewendet wurden. Obwohl schon früher (z. B. von Troussseau als Strychninsyrup) empfohlen, erweckt dies Mittel doch gerade in der Kinderpraxis Bedenken erregt zu haben. Die zahlreichen von mir mit dieser Methode behandelten Fälle aber, sowie die Erfahrungen von Demme, welcher gegen die spinale Kinderlähmung Strychninjectionen in Gebrauch zog, beweisen, dass bei angemessener Dosierung und Vorsicht auch bei Kindern nichts zu fürchten ist.

Zwei bereits früher von mir mitgetheilte Fälle³⁾, von denen der eine im Ganzen 0.012, der andere 0.02 Strychnino sulphurici bis zur Heilung verbrauchte, gaben durch die Schnelligkeit des Erfolgs, welcher schon nach den ersten Injectionen bemerkbar war, den Beweis, dass in der That das Strychnin die Heilung bewirkte oder wenigstens bedeutend förderte, und meine seitdem gemachten Erfahrungen bestätigen dies günstige Urtheil:

Otto H., 7 Jahre alt, am 21. Juni 1875 in der Poliklinik vorgestellt. Vor drei Wochen Diphtherie. Seit 8 Tagen mangelnde Sprache, Dysphagie, Ausstoßen der Nahrung, besonders der Getränke, aus Nase und Mund. Gaumensegel unbeweglich, aber ersichtl. Schon in der Nähe gestört, Flimmern vor den Augen, Kopf vornüber gebeugt, mit Mühe aufrichten. Gang wackelig, nichts Ermüden, Schwanken beim Aufsteigklappen. Senst gesund. Injection von Strychnin. sulphur. 0.009, später 0.002 täglich am 6ten andern Tag in die Nackengegend. Besserung schon am 28. deutlich bemerkbar. Am 14. Juli nach 15 Einspritzungen alles normal.

Ida W., 8jährig, am 16. Aug. 1875 vorgestellt. Am 3. Juli an Diphtherie erkrankt, schon nach einer Woche geheilt. Seit mindestens 14 Tagen mangelnde Sprache, Ausstoßen der Getränke durch die Nase, Accommodationsstörungen, Parese der unteren Extremitäten, Innerlich Eies. Dabei Injectionen von Strychnin 0.002 täglich. Am 31. nach 11 Einspritzungen fast völlige Heilung.

Clara Z., 4jährig, am 16. Juni 1875 vorgestellt. Vor 4 Wochen Diphtherie. Seit etwa 10 Tagen Sprache mangelnd, Flüssigkeiten aus der Nase wieder ausgespien.

¹⁾ Gazette de Gascogne, Gaz. hebdom. 1876. No. 29. — Sarrus, Traité de la diphthérie, p. 55.

²⁾ Deutsches Arch. f. Clin. Med. Bd. XIII. Heft 4 u. 5.

³⁾ Berl. Min. Wochenschr. 1875. No. 17.

Gaumenorgel unbeweglich und anästhetisch. Uvula sehr schlaff. Paross der Beine. Strychnin 0,001 täglich im Nacken injicirt. Schon am 22. nach 4 Injectionen Trinken beßter. Puls auf 0,002 gesteigert. Am 20. nach 10 Injectionen Heilung.

Anna W., 7jährig, am 3. April 1876 vorgestellt. Vor 3 Wochen Diphtherie. Seit 3 Wochen Gaumenlähmung und Schwäche. Eiserne und Strychnineinspritzungen. Schon am 5. Sprache etwas besser; am 7. kleine Bewegungen des Gaumensegels; am 10. Sprache und Trinken besser. Am 22. alles normal. Eben als Nachkur.

Kind W., 3½ Jahre alt, im Oct. 1876 untersucht. Vor 4 Wochen Diphtherie; in Folge davon Gaumenlähmung, grosse Schwäche und Blässe. Seit 3 Tagen plötzlich Paross der Beine, so dass das Kind nur schwer mit Unterstützung gehen konnte, Leichte Albuminurie. Eiserne und Strychninjectionen (0,001) täglich. Nach 14 Einspritzungen völlige Heilung.

Adolf D., 4jährig, am 5. October 1877 in der Poliklinik vorgestellt. Vor 3 Wochen Diphtherie, seit 14 Tagen sehr erhebliche Gaumenlähmung (Speichel kann vollständig) und Paross der unteren Extremitäten mit statischem Schwanken. Sonst gesund. Nach 5 Strychninjectionen (0,002) Sprache schon viel deutlicher, Trinken fast normal, Vohm etwas bewegter, Gang besser, nur noch grosse Unsicherheit beim Umdrehen. Am 20. fast alle Erscheinungen verschwunden. Aus der Cur befreit.

Elise S., 4jährig, am 17. December 1877 in die Klinik aufgenommen. Vor 6 Wochen Diphtherie und Comp. Mit Erfolg tracheotomirt. Seit 3 Wochen Gaumen- und jetzt auch Lähmung der unteren Extremitäten. Eiserne schon beinahe geheilt. Beine ganz schlaff, absolut unbeweglich, auch die Arme schwach, so dass jeder Lagerwechsel nur mit fremder Hilfe möglich ist. Sensibilität normal. Strychnin 0,002 täglich injicirt. Vom 21. an, also schon nach 5 Tagen, Flinieren im Kniegelenk möglich; am 23. konnte das Kind mit Unterstützung etwas gehen. Nach weiteren 14 Tagen völlige Heilung.

Dass man in sehr schweren Fällen von Paralyse mehr Geduld haben muss, bestreite ich nicht. Die Einspritzungen werden dann länger fortgesetzt und deshalb auch sorgfältiger überwacht werden müssen. Unter diesen Umständen rathe ich Ihnen zur gleichzeitigen Anwendung der Elektricität, deren verdienter Ruf durch die Empfehlung der Strychnineinspritzungen in keiner Weise geschmälert werden soll.

V. Der Typhus abdominalis.

Der folgenden Schilderung, welche nur meine persönlichen Erfahrungen über die Eigenthümlichkeiten des Dystyphus im Kindesalter enthält, lege ich ein Material von 192 Fällen, von denen 152 auf meiner klinischen Abtheilung und 40 in der Privatpraxis beobachtet wurden, zu Grunde. Dazu kommt noch eine Reihe anderer Fälle, von denen ich nur Notizen, aber keine vollständigen Krankenjournalen besitze.

Schon aus diesen Zahlen ersieht Sie, dass die frühere Ansicht von der Seltenheit des Dystyphus bei Kindern auf einem Irrthum beruht.

Rilliet¹⁾ und Taupin²⁾ haben das Verdienst, durch ihre Arbeiten diesen Irrthum zu streifen zu haben. Der grösste Theil der Fälle, welche die älteren Autoren unter dem Namen „Febris mesenterica“ oder „Febris remittens infantilis“ beschrieben, gehört der leichten, dem Kindesalter vorzugsweise eigenen Form des Ileotypus an. Die exactere anatomische Untersuchung und besonders die Anwendung des Thermometers haben darüber keinen Zweifel gelassen.

Allerdings bietet die pathologische Anatomie des Abdominaltypus bei Kindern im Grossen und Ganzen nicht die prägnanten Erscheinungen dar, wie bei Erwachsenen. Schon Rilliet machte auf die mildere Form derselben, insbesondere auf die Seltenheit und Kleinheit der Darmgeschwüre aufmerksam, die er von dem Vorwiegen der sogenannten „Plaques molles“, d. h. durch Wucherung lymphatischer Zellen in den Follikeln bedingten Anschwellungen der Peyer'schen Drüsenhaufen ableitete, während die harten Plaques, bei welchen die markige Infiltration nicht bloss das ganze Drüsengewebe, sondern auch die unterliegende Schleimhaut durchsetzt, nur selten vorkommen sollten. Gerade die letzteren aber gehen in Folge einer tief greifenden Gewebsnekrose gern in umfangreiche Ulcerationen über, während die ersteren durch Verfettung der neugebildeten Zellen schliesslich zur Resorption gelangen. Ueber diese Ansicht, welche auch von anderen französischen Autoren (Barciet, Bouchet) getheilt wird, kann der Einzelne sich nur schwer ein bestimmtes Urtheil bilden, weil bei der im Allgemeinen gütartigen Natur des Kindertypus die Gelegenheit zu Sectionen sich verhältnissmässig selten darbietet, die Zusammenstellung fremder Beobachtungen aber keine zuverlässigen Resultate giebt. Wenn z. B. Gerhardt unter 43 zusammengestellten Sectionen 29 Fälle von Geschwüren findet, so fehlt doch gerade die wichtige Angabe über die Art und Ausdehnung derselben. Von meinen 192 Fällen kamen nur die 13 folgenden zur Section:

1) 4-jähriges Mädchen. Dauer der Krankheit 11 Tage. Section: Die Peyer'schen Plaques gehen weit hinauf in den oberen Theil des Ileum, allerdings in sehr geringer Grösse. Die im unteren Theil befindlichen sind fast stark geschwollen, wenig blutreich, aber ausgesprochen markig. Minder geschwollen sind die Solmsköpfer'schen Mesenterialdrüsen besonders im Mesenterialstränge sehr gross, einzeln wie Haselnüsse und darüber, stark geröthet, markig.

2) 2-jähriges Mädchen. Dauer etwa 3 Wochen. Section: Zahlreiche Typhusgeschwüre im Ileum, die darmschwellende Schleimhaut in einem der Dysenterie ähnlichen Zustande. Mesenterialdrüsen stark markig imbecill.

¹⁾ De la fièvre typhoïde chez les enfants. Thèse. 1840.

²⁾ Journal des sciences méd. (lit. Nat., Dec. 1839; Jan. 1840).

7) 7jähriger Knabe. Dauer unbekannt, aber kurz. Section: Massenhafte Entwicklung der Peyerschen Plaques und aller Solitärfollikel, welche stark prominiert die Darmmucosa bedeckten. Keine Ulcera. Mesenterialdrüsen bedeutend geschwollen.

8) 3jähriger Knabe. Heilung nach 8—10tägiger Dauer. 3 Wochen später Tod an septikämischen Crisp. Section: Peyersche Plaques und Mesenterialdrüsen, besonders im Ileocaecabereich, geschwollen; keine Geschwürnarben.

9) 10jähriges Mädchen. Dauer 4 Wochen. Recidiv. Section: Spärlicher Ulcera bei in anastomosen. Solitärfollikel und Mesenterialdrüsen schwarz pigmentirt.

10) 10jähriger Knabe. Dauer 13 Tage. Section: Peyersche und Solitärfollikel sehr stark hyperplastisch, letztere auch im Colon. Ebenso die Mesenterialdrüsen. Keine Geschwüre.

11) 4jähriges Mädchen. Dauer 4 Wochen. Section: Peyersche Plaques und Solitärfollikel im Ileum stark geschwollen. Unmittelbar vor der Klappe blutkongressives Malignanz und gelbliche mortificirte Follikel. Mesenterialdrüsen markig mit eingestreuten weissgelblichen nekrotischen Herden. Keine Geschwüre.

12) 13jähriges Mädchen. Dauer 16 Tage. Section: 10 Ctm. oberhalb der Klappe 2 markige Peyersche Plaques mit centrahlem Ulcus und fast anhaltendem gelbem Scharf. Darin wieder dicht vor der Klappe eine Reihe confluirender diffus markige Schwellungen mit Ulcerationen und Schorfbildung. Ein einzelnes fast reines Ulcus im Anfang des Colon. Mesenterialdrüsen markig geschwollen.

Fall 9 und 10 betreffen Kinder, welche an einem schweren Typhus in der 3. und 4. Woche zu Grunde gegangen waren. In beiden Fällen zeigten sich nur mässige Schwellungen und theilweise netzförmige Beschaffenheit der Peyerschen Drüsen, aber keine Ulcerationen.

13) 9jähriger Knabe. Dauer etwa 26 Tage. Section: Peyersche und Solitärfollikel noch mässig geschwollen; keine Geschwüre.

14) 4jähriges Mädchen. Tod im Recidiv. Dauer der Krankheit etwa 22 Tage. Section: Netzförmige Beschaffenheit vieler Plaques; keine Geschwüre.

15) 8jähriger Knabe. Tod im Beginn der 3. Woche. Section: Kleine oberflächliche Ulcerationen auf vordem Plaque.

Unter diesen 15 Fällen finden wir also nur 4 mit Geschwürsbildung im Darm (Fall 2, 5, 8 und 13), und zwar nach einer Krankheitsdauer, welche zwischen 16 Tagen und 4 Wochen schwankte. Nur in Fall 2 waren die Ulcerationen auf die dazwischen liegende Schleimhaut so beschaffen, dass man, wäre das klinische Bild des Typhus nicht über jedem Zweifel erhaben gewesen, an eine Dysenterie denken konnte. Alle anderen Fälle zeigten nur markige Schwellungen oder netzförmige Beschaffenheit der Drüsen ohne Geschwürsbildung, und zwar nicht allein diejenigen, welche erst kürzere Zeit (bis zu 13 Tagen) gedauert hatten, sondern auch mehrere (Fall 7, 9, 10, 11 und 12), bei denen der Typhus sich 3 bis 4 Wochen langgezogen hatte. Die Seltenheit der Geschwüre beim Kindertyphus wird also auch durch meine Beobachtungen bestätigt. Selbst da, wo Geschwüre vorhanden waren, erschienen sie weniger zahl-

reich, dabei flacher und kleiner (z. B. nur im Centrum der Plaque entwickelt), als es gewöhnlich bei Erwachsenen der Fall ist. Mit dieser Thatsache hängt auch die Seltenheit von Darmsperforationen und profusen Darmblutungen beim Kindertypus zusammen.

Die markigen Schwellungen der Darmdrüsen finden sich zwar schon beim Infantypus kleiner Kinder in den beiden ersten Lebensjahren, verlieren aber hier einen grossen Theil ihrer Bedeutung, weil die Peyerschen Plaques und die Solitärfollikel in diesem Alter bei Darmkatarrhen und bei verschiedenen Infectiouskrankheiten in ähnlicher Weise anschwellen können, mitunter auch die Merkmale von Entzündung und sogar Ulcerationen darbieten, ohne dass im Leben typhöse Symptome beobachtet wurden. Andererseits können diese Symptome in charakteristischer Weise vorhanden gewesen sein, und doch lässt die Section die erwarteten Anschwellungen der Darmdrüsen vermissen, ergiebt vielmehr entweder gar keine nennenswerthen Veränderungen, oder nur entzündliche Erscheinungen in der Schleimhaut des Dün- oder Dickdarms (Rilliet und Barthéz's Enterite typhoïde). In meiner Arbeit über den Kindertypus¹⁾ theilte ich ein paar solcher Fälle mit, welche fast gleichzeitig in der Klinik bei Kindern von 6—7 Monaten vorkamen. Hier waren Diarrhoe, Milztumor, Bronchialkatarrh, Otitis, Somnolenz und vor Allem die charakteristische Fiebercurve vorhanden, und dennoch zeigte der eine zur Section gekommene Fall nur eine Peyersche Plaque von annähernd normaler Beschaffenheit, eine unbedeutende Schwellung einzelner Mesenterialdrüsen, eine durchweg gesunde Schleimhaut und eine normale Milz, dabei Pneumonie des linken Unterlappens und serösen Erguss zwischen Dura und Pia mater. Wie sollen wir nun diese Fälle, welche auch von anderen Autoren (Barriér, Bouchut) und sogar bei Erwachsenen²⁾ beobachtet wurden, erklären? Die klinischen Symptome des Typhus sind so ausgeprägt, dass der Mangel der gewöhnlichen anatomischen Erscheinungen dagegen zurücktreten muss. Man darf daher annehmen, dass die letzteren entweder nur sehr schwach entwickelt zu sein brauchen oder auch wohl ganz fehlen können, ohne dass man berechtigt ist, der Krankheit ihren typhösen Charakter abzusprechen.

Uebrigens werden Kinder im ersten und zweiten Lebensjahre vom Infantypus weit seltener befallen, als Ältere. Von meinen 152 klinischen Fällen kamen nur 5 auf dies Alter, während die grösste Frequenz (71) zwischen dem vollendeten 5. und 9. Jahre lag, 33 das Alter zwischen

¹⁾ Charité-Analen, II. 1876. S. 542.

²⁾ Grissinger, Infectiouskrankh. S. 188.

dem 3. und 5. Jahre, und 43 das 10. bis 14. Lebensjahr betrafen. Das Verhältniss der Geschlechter war nahezu gleich (81 Knaben und 71 Mädchen). Unter den Jahreszeiten schien mir besonders der Herbst und Spätherbst eine Prädisposition zu begründen. Von 120 Fällen fielen auf die Monate October und November 51, demnächst 13 auf den December und 9 auf den März und April, während in den Sommermonaten nur vereinzelte Fälle vorkamen, und auch die übrigen Monate spärlich befaßt waren.

Die Contagiosität der Krankheit kam, wenn sie überhaupt anzunehmen ist, nur eine sehr geringe sein: Ich lasse die typhuskranken Kinder nie isoliren, sondern von jeder inmitten der anderen kleinen Patienten liegen, und doch kam eine analoge Erkrankung der in den benachbarten Betten liegenden Kinder nur ein paar Mal vor, und zwar fast ausschliesslich in der Umgebung sehr kleiner Typhuskranker, welche ihre Faeces constant ins Bett entleerten. Vielleicht wirkte hier die Verdunstung der flüssigen Faecalmassen infectirend. Die sowohl in der Privatpraxis wie in der Klinik wiederholt gemachte Erfahrung, dass in einer Familie zwei oder mehrere Kinder, und auch die Eltern gleichzeitig oder successiv am Typhus erkranken, erklärt sich eher aus der schädlichen Einwirkung der gleichen Ursache, als aus gegenseitiger Ansteckung. Dieser Ursache, d. h. der Natur des Infectiousstoffes, sind wir erst in neuester Zeit durch die Befunde der „Typhusocillen“ etwas näher getreten¹⁾. Demnach fehlt der sichere Nachweis, dass diese Organismen hier als die eigentlichen Krankheitserreger zu betrachten sind, und auch über die Art und Weise, wie das specifische Krankheitsgift in den Organismus gelangt, wissen wir nichts Gewisses. Die auf der Kinderklinik beobachteten Typhen kamen fast sämmtlich von aussen herein; nur ausnahmsweise entstand die Krankheit bei einem Recidivale oder bei einem Kinde, welches an einer anderen Krankheit behandelt wurde, und zwar öfters, nachdem seit langer Zeit kein Typhus auf der Abtheilung vorgekommen war. Das Trinkwasser konnte hier keine Rolle spielen, weil sonst weit mehr Kinder hätten erkranken müssen. Das Virus musste also von aussen (zu dem Besatzstagen) auf irgend einem Wege eingeschleppt werden sein. Ob die Incubationsperiode, wie man meistens annimmt, 3–4 Wochen dauert, wage ich nach meinen Beobachtungen nicht zu entscheiden. Ist einmal die Infection erfolgt, so kann der Ausbruch der Krankheit durch gewisse Einflüsse gefördert

¹⁾ W. Meyer, Untersuchungen über den Bacillus des Abdominaltyphus. (Zang, diss. Berlin 1892).

wurden, unter deren Gemüthsaffecte und starke Erkältungen hervorzuheben sind:

Ein 12jähriger gesunder Knabe wurde im Juni 1875 auf dem Wege zur Schule von einem Gewitterregen überrascht, der ihn bis auf die Haut durchkälte, und rasch in diesem Zustande 4 Stunden lang in der Schule sitzen. Schon am nächsten Tage klagte er über Kopfschmerz, und man entwickelte sich ein Typhus, welcher den Knaben 5 Wochen lang als Bess. heilte. — Bei einem 11jährigen Waisenknecht, welcher seiner Aussage nach völlig gesund in der Kirche, während er stehend mit dem Lesen des Gesangbuchs beschäftigt war, durch den Klang der Orgel plötzlich gemaltren erschüttert wurde, stellte sich sofort Schwindel und Erbrechen, und schon an demselben Abend Fieber ein, welches sich zum Typhus entwickelte. Gewiss wäre dieser in beiden Fällen auch ohne die angegebenen occasionellen Momente, wenn auch vielleicht etwas später, zum Ausbruch gekommen.

Die Gutartigkeit des Kindertyphus wird von allen Autoren hervorgehoben, und zwar schon zu einer Zeit, in welcher die jetzt übliche antipyretische Behandlung noch nicht in Gebrauch war. Ich zähle unter 152 klinischen Fällen, welche zum Theil recht schwere waren, 21 Todesfälle, von denen eigentlich nur 14 auf den Typhus selbst zu beziehen waren. Der Tod erfolgte 9mal in tiefem Sopor und Collaps, 1mal durch Perforation eines Darmgeschwürs, 2mal durch Pneumonie, 1mal durch Gangrän pulmonum und 1mal durch Darmblutung. Die anderen Kinder erlitten anderweitigen neu hinzutretenden oder schon bestehenden Krankheiten. In der Privatpraxis stellte sich das Mortalitätsverhältniss bei weitem günstiger heraus. Die oben erwähnten anatomischen Verhältnisse, die grosse Seltenheit von Darmperforationen und copiosen Blutungen sind wohl als die Hauptursachen dieses milden Verlaufs zu betrachten. Selbst eine lange Fieber continua mit sehr hohen Temperaturen, reichliche Diarrhoe, complicirte Lungenaffectationen, Sorenbildung im Munde und Rachen — dies alles konnte mein Vertrauen auf einen guten Ausgang nicht erschüttern, und nur selten sah ich mich in denselben gettascht. —

Gehen wir nun zu den klinischen Erscheinungen der Krankheit über, so muss zunächst hervorgehoben werden, dass der Arzt in leichten Fällen bei Kindern noch mehr, als bei Erwachsenen, darüber in Zweifel sein kann, ob er es mit einem wirklichen Heutypus oder nur mit einem „gastrischen Fieber“ zu thun hat, dessen Existenz und Entwicklung aus einem von einer typhösen Infection ganz unabhängigen Gastrointestinalkatarrh gewiss nicht zu leugnen ist. Es wird immer Fälle geben, in welchen die Ansicht der Ärzte in dieser Beziehung eine getheilte ist, weil nicht alle wesentlichen Züge des Typhus, Fieber, Milztumor, Roseola, Diarrhoe, immer vorhanden zu sein brauchen, vielmehr theil-

weise fehlen können. Selbst das massgebendste Moment, die charakteristische Fiebercurve, welche hier dieselbe ist, wie im späteren Lebensalter, zeigt hier und da verwirrende Abweichungen. Ein solcher Fall betraf z. B. ein 4jähriges Mädchen¹⁾, welches mit einem alten Herzfehler, pleuritischen Exsudat und Catarrh des Dickdarms in der Klinik lag, und erst 11 Tage vor ihrem Tode zu fiebern anfang, aber so regellos, dass schon im ersten Stadium die Morgenstunden absolut fieberfrei waren. Das Auftreten des Fiebers in einem bereits sehr geschwächten Kinde mag den abnormen Fieberverlauf bedingt haben; immerhin aber ersieht Sie daraus, dass der Dostyphus ausnahmsweise auch ohne seine charakteristische Fiebercurve verlaufen kann²⁾.

Das Fieber begann nur selten plötzlich mit einem Schüttelfrost, auf welchen Hitze, einmal auch reichlicher Schweiß folgte, und auch dann blieb es immer zweifelhaft, ob nicht zuvor schon übersohene Fieberbewegungen stattgefunden hatten, welche nun plötzlich unter Frostschauern eine rasche Steigerung erfuhren. Bei einem 11jährigen Knaben z. B., welcher sich bereits im Abnahmestadium mit normaler Morgentemperatur befand, sah ich das Recidiv plötzlich mit einem heftigen Schüttelfrost einsetzen. Fast immer trat in diesen Fällen unmittelbar nach dem Frost eine rapide Temperatursteigerung ein, so dass schon in den ersten Abenden 40.0 bis 41.0 erreicht wurde. Mitunter wurde aber nach dem plötzlichen steilen Ansteigen des ersten Tages am zweiten ein Absinken der Temperatur beobachtet, welche dann erst am dritten Tage die frühere Höhe wieder erreichte oder noch überschritt. Man darf aus diesem jähen Ansteigen der Temperatur gleich im Beginn nicht etwa ungünstige prognostische Schlüsse ziehen; denn nur einer dieser Fälle verlief ziemlich schwer mit einem 29 Tage dauernden Fieber, während 9 andere einen sehr günstigen und auffallend kurzen Verlauf von 8 bis höchstens 14 Tagen nahmen³⁾.

Viel häufiger als der plötzliche Beginn war das allmähliche Steigen der Curve in der sogenannten Tropfenform, wobei die Temperatur oft erst in der zweiten Hälfte der ersten Woche 40.0 erreichte. Hier fehlt der initiale Schüttelfrost, und es kommt höchstens zu leichten Schauern,

¹⁾ 1. 6. S. 360.

²⁾ Vergl. Fränzel (Zeitschr. f. Klin. Med. Bd. II. Heft 2), welcher Dostyphus mit sehr niedrigen Temperaturen oder auch ganz afebril, aber mit schweren Cerebralsymptomen, häufig lethal verlaufen sah, besonders bei Patienten, welche durch Strupagen und mangelhafte Ernährung erschöpft waren.

³⁾ Aetiologische Untersuchungen machten Liebermanster und Jürgensen an Erwachsenen.

welche sich zur Zeit der Exacerbation, Mittags oder Abends, einstellen. Das Fieber verläuft nun, ebenso wie bei Erwachsenen, als eine Continua remittens, mit hohen Abend- und etwa 1° niedrigeren Morgentemperaturen, verharrt einige Zeit auf ziemlich gleicher Höhe (Akme) und geht dann allmählig sinkend in ein intermittirendes Stadium mit normaler Morgen-, aber noch febriler Abendtemperatur über. Mit dem Sinken der letzteren auf die Norm erreicht das Fieber sein Ende. Um die Dauer desselben im Ganzen bestimmen zu können, muss man den Beginn der Krankheit wenigstens mit annähernder Sicherheit feststellen können, was mir nur in 86 Fällen möglich war. Die Gesamtdauer des Fiebers betrug danach in

8 Fällen	7—9 Tage.
5	10
8	11
2	12
17	13—15
5	16—17
12	18—19
16	20—23
7	28—30
1	35
1	42
4	48—49
86	

Die völlige Entfieberung trat also in der grössten Zahl der Fälle (40) mit dem Ablauf der 2., demnächst mit dem Ablauf der 3. Woche ein. Ueber diesen Termin hinaus zogen sich 13 Fälle, davon 4 bis zum Ende der 7. Woche. Im Laufe der 3. Woche erlitten 17, zwischen dem 7. und 12. Tage 23 Fälle. Gerade die letzteren (sogenannte „Abortivtyphen“) hätten wegen der kurzen Fiebertdauer Zweifel darüber gestattet, ob man sie als Typhus, oder nur als „Febris gastrica“ gelten lassen sollte, wenn nicht der palpable Milztumor, die Roseola und die Diarrhöe meistens die Diagnose sicher gestellt hätten. Während der Dauer der Continua zeigt die Höhe des Fiebers in den verschiedenen Fällen grosse Differenzen. Während die Maximal-Temperatur in vielen nie über 39,3—39,8 hinausging, in Ausnahmefällen Morgens selbst 38,2 nicht überschritt, schwankte sie Abends bei der Mehrzahl zwischen 40,0 und 40,6, und erreichte zuweilen 41 bis 41,3. Mehr als drei Messungen täglich vorzunehmen halte ich nicht für ratsam, weil die dabei hervortretenden Schwankungen eher verwirren, als nützen.

Als Gesamtergebnis ergibt sich, dass fast immer die Morgentemperatur um $\frac{1}{2}^{\circ}$ bis 1° niedriger ist, als die abendliche. Stärkere Differenzen sind (ohne Anwendung antipyretischer Mittel!) selten und meistens nur auf einzelne Tage beschränkt. So zeigte z. B. ein 8-jähriger Knabe an zwei Tagen Morgens 38,2 und 38,4; Abends 40,3 und 40,2. Um die Mittagstunde beginnt in der Regel eine Steigung, welche zwischen 2 und 3 Uhr ihre Höhe zu erreichen pflegt, dann abfällt und etwa um 5 Uhr von neuem beginnt, so dass in den meisten Fällen eine Mittags- und eine Abendexacerbation vorhanden ist, von denen die erste bisweilen um $\frac{1}{2}$ — 1° höhere Temperaturen zeigt, als die zweite. Fälle, in welchen die Abend- und Morgentemperatur fast gleich hoch sind, kommen seltener vor, sind aber immer äusserst hartnäckig. Ich beobachtete wiederholt Kinder, welche mindestens eine Woche lang Morgens nie unter 40,1 oder 40,5, Abends immer 40,2 bis 41 $^{\circ}$ zeigten, und gerade diese widerstanden allen antipyretischen Mitteln am hartnäckigsten. Nur einmal beobachtete ich einen Typus inversus des Fiebers, d. h. das Ueberwiegen der Morgen- über die Abendtemperatur. Bei 3 Kindern bestand dieser Typus nur ein paar Tage, bei 2 anderen 7, resp. 13 und 18 Tage, stets aber im Beginn oder noch häufiger im Abnahmestadium, niemals während der Akme der Krankheit.

Die Dauer der Akme schwankte in der Regel (50mal unter 62 Fällen) zwischen 8 und 20 Tagen; am häufigsten bildete der 10., 13. und 18. Tag ihr Ende. Weit seltener zeigte sie eine kürzere (5 oder 7 Tage) oder gar eine bedeutend längere Dauer (35—44 Tage). Mit dem Aufhören der Akme nimmt die Temperatur allmählig ab, fällt in den Morgenstunden auf 38,8 und darunter, und pflegt auch Abends nur noch 39,5 zu erreichen. Die Dauer dieser Periode der Continua (Stad. decrementi), welche ich in 60 Fällen genau feststellen konnte, betrug bei mehr als der Hälfte 2—4 Tage, in 7 Fällen sogar nur 1 Tag, während sie in 15 Fällen sich 5—9 Tage lang hinzog. Sie müssen aber immer darauf gefasst sein, noch in dieser Periode unerklärliche plötzliche Abendsteigerungen bis auf 40 $^{\circ}$ und selbst darüber zu bekommen, welche freilich nur ephemere sind und den Verlauf der Krankheit nicht weiter beeinflussen. In einzelnen Fällen beobachtete ich eine solche Steigerung auf 40,0 sogar noch am letzten Abend dieser Periode, und schon am nächsten Morgen zeigte das Thermometer mit 37,3 den Beginn des intermittirenden Stadiums an, welches dann seinen regelmässigen Gang nahm.

Während dieses letzten Stadiums ist die Morgentemperatur normal oder selbst subnormal, während Nachmittags und Abends noch Fieber

stattefindet. Die Dauer dieser Periode schwankte unter 63 Fällen 38mal zwischen 2 und 5 Tagen, während sie 11mal nur einen Tag, 6mal eine ganze Woche, 2mal 9 Tage, 4mal 10 Tage und 2mal sogar 19 Tage betrug. In diesen selten vorkommenden, sich ungewöhnlich in die Länge ziehenden Fällen wird leicht der Verdacht einer Miliartuberculose regt, welcher sich schliesslich als unbegründet erweist. Die abendliche Steigerung erhob sich im Allgemeinen nur bis 39,5, sehr selten und nur vorübergehend bis 40,0, eine Erscheinung, die mir in mehreren Fällen mit einer Stuhlverhaltung zusammenzuhängen schien:

Bei einem 9jährigen Mädchen, welches nach dem Ablauf eines 14tägigen Recidivs in das intermittierende Stadium getreten war, betrug die Abendtemperatur noch etwa 38,5. Am 7. und 9. Septbr. stieg dieselbe plötzlich wieder auf 40,0 und sank nach der Entleerung enormer knolliger Faecalmassen durch ein Klystir jedesmal sofort wieder auf 38,4.

Auch Ueberladung des Magens, übereiltes und anhaltendes Aufrecht-sitzen im Bett und Gemüthsaffection können dieselbe Wirkung haben, und daraus erklärt es sich, dass selbst in den febricitanten Morgenstunden dieses Stadiums, ja sogar während der ganz apyretischen Reconvalescenzperiode hin und wieder flüchtige Erhebungen der Temperatur vorkommen können, welche nicht gleich Beruhigung erregen dürfen. In Folge der Besuchstage, an welchen den Reconvalescenten von ihren Angehörigen Kuchen u. s. w. zugestreckt werden, gehört diese Erscheinung in unserer Klinik nicht zu den Seltenheiten. Ausnahmeweise (unter 137 Fällen 9mal) fehlte das intermittierende Stadium oder sogar das Stadium decrementi gänzlich, oder war nur so schwach angedeutet, dass die Continua unvermittelt nach Art einer Krise in den fieberlosen Zustand überging. Mehrere Curven dieses kritischen Abfalls habe ich in meiner Arbeit¹⁾ bereits mitgetheilt, und füge denselben noch die folgende hinzu, welche, wie fast alle anderen, einen Fall mit sehr raschem Verlauf und hoher Temperatur betraf:

Knabe von 3 Jahren. Dauer der Akme 7 Tage; Temp. Mg. 39,9—40; Ab. 40—41,2. Diarrhoe, Somnolenz, Erbrechen u. s. w. Am 7. Tage Temp. 39,6; Ab. 40,7; Puls 100. Am folgenden Tage Temp. Mg. 36,7; Ab. 37,5; Puls 88. Von da ab fieberlos. —

Mit dem vollständigen Erlöschen des Fiebers beginnt die Reconvalescenz, welche, wie bei anderen hochfebrilen Krankheiten, häufig mit subnormaler Morgens (36—35,5) oder selbst Abendtemperatur verläuft, bis allmählig in Folge gesteigerter Nahrungsaufnahme und regel-

¹⁾ Charité-Analen. II. 8. 501.

nässiger Verlaufs die normale Temperatur sich dauernd wiederherstellt. Epidemische Steigungen, wie ich sie oben erwähnte, selbst Frostfälle kamen auch in dieser Periode dann und wann noch vor, ohne indess üble Folgen zu haben.

Die Pulsfrequenz der typhösen Kinder entsprach zwar im Allgemeinen der Höhe der Temperatur, doch wurden auch, wie bei Erwachsenen, Ausnahmen von dieser Regel, z. B. 96, 108, 120 P. bei 40,2 und 41,2° beobachtet. Uebrigens schwankte die Pulszahl beträufend und erreichte selbst in glücklich verlaufenden Fällen seltener eine Höhe (152 bis 180 Schl.), welche bei älteren Individuen ein unfehlbares Kriterium des letalen Ausgangs sein würde. Selbst in der Recuperationszeit bestand eine hohe Pulsfrequenz in Folge der durch das Fieber bedingten Herzschwäche nicht selten noch Tage lang fort; weit seltener eine abnorm niedrige Zahl, z. B. 60, oder Ungelmässigkeit des Pulses, wie sie auch noch anderen schweren Krankheiten, z. B. nach Pneumonie, beobachtet wird. Die bei Erwachsenen ziemlich häufige Dikrotie des Pulses kam mir auch bei Kindern, aber doch nur in einer kleineren Reihe von Fällen vor. Wegen der Lage der Arterie ist die Qualität des Pulses natürlich weit schwerer zu beurtheilen, als im späteren Alter, und besonders bei Kindern unter 5 Jahren erscheint der Puls immer klein und leicht zu comprimiren. Nur dann, wenn die sehr frequenten Pulschläge auch bei leiser Palpation schwer fühlbar sind, ineinander fließen, und die extremen Theile kühl und cyanotisch werden, ist Collaps durch Herzschwäche zu fürchten.

Ich komme nun zu den nervösen Erscheinungen, welche in früheren Zeiten das Hauptinteresse beim Typhus in Anspruch zu nehmen pflegten. Dass diese Symptome bei Kindern, selbst auch bei solchen von 11 und 12 Jahren, an Intensität und Frequenz hinter denen der Erwachsenen im Allgemeinen erheblich zurückbleiben, ist eine Thatsache. In einer nicht geringen Zahl von Fällen werden entweder gar keine oder nur ganz unbedeutende nervöse Symptome beobachtet. Manche Kinder sitzen zum Theil aufrecht im Bette, lächeln und zeigen sogar localen Appetit, während die Fiebercurve und der palpable Milztumor an einem Typhus nicht zweifeln lassen. Ja ich sah Fälle, in welchen von allen Symptomen des Typhus nur die charakteristische Fiebercurve vorhanden, alles Andere aber (Diarrhoe, Milztumor und Roseola) absolut fehlte, so dass man 3 oder selbst 4 Wochen lang immer wieder durch den Gedanken beunruhigt wurde, es könne sich um etwas Anderes, um eine Milartuberkulose oder um eine schleichende

Endocarditis handeln. Häufiger sind allerdings gewisse nervöse Symptome vorhanden, aber doch nur in beschränktem Maasse und keineswegs der hohen und anhaltenden Temperatur entsprechend. Kopfschmerz und Apathie bei freiem Sensorium, leichte Somnolenz, Unruhe, mässige Delirien, besonders Abends und in der Nacht, Schwerhörigkeit, Hyperaesthesie der Haut, besonders am Bauche, Schlaflosigkeit, Träume und Schwindel kommen am häufigsten vor. Schwere Nervenerscheinungen gehören immer zu den Seltenheiten. Bei kleinen Kindern tritt an die Stelle der Delirien oft ein ungestirrtes, sehr heftiges Geschrei, welches besonders in der Nacht die Ruhe der Familie in hohem Grade stört. Die Ansicht Liebermeister's, nach welcher die nervösen Symptome nur durch den Einfluss der hohen Temperatur bedingt werden sollen, ist meiner Ueberzeugung nach nicht haltbar, weil, wie ich früher¹⁾ zeigte, die Intensität dieser Symptome keineswegs der Fieberhöhe zu entsprechen braucht. Es müssen daher ausser der Temperatur noch andere Ursachen, unter denen wohl die Einwirkung des typhösen Giftes auf das Gehirn in erster Reihe steht, hier in Rechnung gebracht werden. Je älter die erkrankten Kinder sind, um so mehr zeigen sie auch zu schweren nervösen Symptomen; vom 10. Jahre an habe ich lebhaftes Delirien, tiefe Benommenheit des Sensoriums, Sopor, Tremor der Hände und Zunge, Versuche, aus dem Bett zu springen, oft genug beobachtet. Bei tödtlichem Ausgange in tiefem Sopor sah ich ein paar Mal, ähnlich wie bei der Meningitis tuberculosa und bei der Cholera, die Conjunctiva bulbi sich röthen und die Cornea sich mit Schleimfetzen bedecken, schliesslich ganz trocken und trübe, bei einem 3jährigen Mädchen sogar perforirt werden. Hier traten am letzten Tage des Lebens noch leichte Zuckungen der Extremitäten auf, welche ich sonst nicht zu beobachten Gelegenheit hatte, und die durch keine Abnormität des Gehirns bei der Section erklärt wurden. Bei einem 10jährigen Mädchen, welches in der 5. Krankheitswoche einem Recidiv erlag, trat zuletzt eine Contractur beider Beine und des rechten Arms, wiederholt auch Zahnknirschen auf, ohne dass die Section mehr ergab, als eine mässige Menge von Serum in den Ventrikeln und ein Oedem der Pia, die man auch in Fällen von Typhus ohne die erwähnten spastischen Symptome findet. Denselben Befund bot ein 4jähriges Mädchen dar, welches in den letzten Tagen eine deutliche Nackenstarre, zumal beim Aufrichten des Körpers, gezeigt hatte. Bei einem 9jährigen Knaben endlich, wel-

¹⁾ *l. c.* S. 367.

cher in der letzten Woche des Typhus anhaltend an Trismus gelitten hatte, wurde die Schädelhöhle zu untersuchen verabsäumt.)

Unter den psychischen Störungen ist die Apathie die häufigste und oft mit leichten Delirien, besonders während der Nacht, verbunden. Nur sehr selten beobachtete ich ernstere Symptome:

Bei einem 3jährigen Knaben bemerktgekommenen und blühenden Mädchen ausstellend nach der Defervens wirkliche Anfälle von Tetanisch (währendes Gekrei, Umschlaglagen, aus dem Bette Springen), während das Kind in den Intervallen mit starrten Blick rothwarmer apathisch dalag und nur dann und wenn vollen Bewusstsein zeigte, obwohl der Gesamteindruck hier für die Annahme einer Inanitionpsychose sprach, konnte doch eine kräftige Diät und der reichliche Gebrauch von Wein den tödtlichen Collaps nicht verhindern. Eine andere Art von psychischer Alienation machte sich bei einem 12jährigen Knaben im Stadium decemendi (Ende der 2. Woche) geltend. Eine launige, fast unverständliche Sprache, kindlicher Eigensinn, unwillkürliches Schreien und Toben vertrieb tagelang die Eltern in Schrecken, und als in der 5. Woche ein Recidiv des Typhus eintrat, beherrschte auch einige Tage darauf derselbe psychische Zustand, und zwar diesmal mit deutlichen Symptomen von Grössenwahn wieder. Patient behandelte seine Eltern und Geschwister mit Verachtung, schreute unablässig unverständliches Zeug, tadelte, war absolut schlaflos und trank fast alles Hiesiges wieder aus. Puls sehr frequent und klein, Athem rasch, Extremitäten und Säugspitze kühl und cyanotisch. Unter diesen Umständen versuchte ich das Chloralhydrat (2,25 im Klystir), und schon nach 15 Minuten wurden die Hände und Füße warm, die Cyanose schwand, Puls und Athem waren langsamer, die ersten kräftiger geworden. Das drei Abende hintereinander wiederholtes Chloralkystrat hatten auch ein Schwanden des tetanischen Symptomcomplexes zur Folge, während Morphinum und zwei Bäder ergebnislos geblieben waren.

Ich will dabei nicht unerwähnt lassen, dass dieser Knabe von jeher äusserst verlegen und reichbar war, und dass mir überhaupt der durch Anlage und Erziehung bedingte Charakter der Kinder auch auf ihr psychisches Verhalten im Typhus Einfluss auszuüben schien.

Wirkliche Lähmungen in Folge des Heotypus beobachtete ich nur selten. Bei einem 9jährigen Knaben hatte sich auch denselben eine Parese und Ataxie beider unteren Extremitäten ausgebildet, welche bereits 2 Jahre bestand und deren weiterer Verlauf mir unbekannt blieb. Bei einem anderen Kinde, welches sich noch jetzt in Behandlung befindet, entstand nach dem Recidiv des Typhus eine Hemiplegia dextra mit Theilnahme des Facialis und Abducens, und ein 11jähriges Mädchen warnte im Stadium decemendi von einer doppelseitigen Paresis, einer Paralyse

*) Vergl. Förster (Jahrb. f. Kinderchik. 1863. VI. 8. 114), dessen mit Trismus und Opisthotonus complicirter Fall gleichfalls exakte. Auch Böth (Archiv f. Kinderchik. II. 315) theilt einige Fälle von apathischen Contracturen im Verlauf des Kindertypus mit.

des rechten N. abducens und einer 7 Tage dauernden Aphasie befallen, nach deren Verschwinden ein kindischer weinerlicher Gemüthszustand wochenlang zurückblieb. Vollständige Aphasie kam mir überhaupt in 6 Fällen vor, während in einigen anderen nur ein bestimmtes Wort, z. B. „ja“, sonst aber gar nichts gesprochen werden konnte. Auch die Aphasie trat immer erst im intermittirenden Stadium oder im Beginn der Reconvalescenz auf, niemals auf der Höhe des Fiebers, und pflanzte 8–14 Tage lang zu dauern. Anfälle von Epilepsie oder ephemere hoher Temperatursteigerung, wie sie als Einleitungen dieser Aphasie hier und da beschrieben werden¹⁾ habe ich nie beobachtet, ebenso wenig Lähmung der Kehlkopfmuskeln (Glottisverenger), welche in einem von Kohn²⁾ beschriebenen Falle die Tracheotomie erforderte.

In allen Fällen, welche Aphasie zur Folge hatten, war der Verlauf des Typhus ein länger und schwerer gewesen; doch genesen die Kinder sämtlich mit Ausnahme eines 6-jährigen Knaben, welcher in einem Recidiv zu Grunde ging. Zweimal, bei einem 9-jährigen Knaben und einem 14-jährigen Mädchen, beobachtete ich während der Defervescenz eine mehrere Tage bestehende Amblyopie, welche sich im zweiten Falle als eine Lähmung der Accommodation herausstellte, bei beiden Kindern aber vollständig verschwand. Ob allen diesen nervösen Symptomen bestimmte Veränderungen im Gehirn zu Grunde liegen, ist durchaus unbekannt; doch könnte man daran denken, dass unter dem Einflusse der Krankheit in den Gewebselementen des Gehirns ähnliche degenerative Veränderungen Platz greifen, wie sie in den Muskelfasern, besonders des Herzens, in den Zellen der Leber und der Nieren nachgewiesen sind, und nach deren Ausgleichung während der Reconvalescenz auch die von ihnen abhängigen Symptome wieder schwinden. —

Zu den wichtigsten Zeichen des Typhus gehören bei Kindern wie bei Erwachsenen der Milztumor und die Roseola. Was zunächst die Milz betrifft, so kann ich die Schwierigkeiten, welche sich der Erkenntnis ihrer Anschwellung entgegenstellen können, nicht genug betonen. Namentlich kann die Percussion der Milz durch Gasauftreibung des Colon, durch krankhafte Zustände der linken Lunge und Pleura, und durch die Unruhe vieler Kinder während der Untersuchung ganz illusorisch gemacht werden. Nur in 80 Fällen war ich im Stande, die Exploration der Milz mit der notwendigen Genauigkeit und Beharrlichkeit vorzunehmen, und unter diesen fand ich die Milz 33mal palpabel, ent-

¹⁾ Symtschenko, *Jauch. i. Kindstvenk.* XVIII, S. 206.

²⁾ *Deutsches Archiv f. Med. Med.* XVIII, Heft 1.

weder des Rippenraums anhaltend um 2–3 Ctm. überragend, oder nur während tiefer Inspiration deutlich fühlbar, mitunter auch entschieden schmerzhaft beim Druck. Die Schwere des Falles hatte auf die Grösse des Tumors im Allgemeinen keinen Einfluss. In allen anderen Fällen konnte man die Anschwellung der Milz nur durch die Percussion, und zwar meistens bis zum unteren Rande der 7. Rippe, selten bis zur 6. Rippe hinauf nachweisen, wobei die Percussion oder der Druck unter dem Rippenrande bisweilen ebenfalls empfindlich war. In vielen anderen Fällen aber konnte weder durch die Palpation, noch durch die vorurtheilsfrei ausgeführte Percussion ein Milztumor constatirt werden. Für die Beurtheilung der zeitlichen Verhältnisse des letzteren will ich nur diejenigen 35 Fälle benutzen, in welchen ich die Milz deutlich palpiren konnte, weil nur diese meiner Ansicht nach über jedem Zweifel erhaben sind. Dabei ergab sich nun, dass, je stürmischer und rapider die Temperaturcurve ansteigt, um so früher auch der Milztumor erscheint, mitunter schon am 3. oder 4. Tage, während es in der Mehrzahl der Fälle erst am 6. oder 8. Tage, oder noch später fühlbar wurde, nachdem die Vergrösserung der Milz nach oben und vorn schon durch die Percussion nachgewiesen werden war. Der Tumor konnte dann meistens bis in das intermittirende Stadium hinar, bei einem 11-jährigen Mädchen sogar noch eine ganze Woche nach der vollständigen Defervescenz gefühlt werden. Ein paar Mal konnte ich denselben erst während eines Recidives deutlich fühlen, nachdem im ersten Anfall der Krankheit nur die Percussion eine Vergrösserung der Milz nach oben ergeben hatte.

Auch die Beurtheilung der Roseola erfordert, zumal in Fällen, welche man nicht wenigstens vom Ende der ersten Woche an beobachtet hat, grosse Vorsicht, denn oft wird die Roseola gänzlich übersehen oder ist schon erblüht, wenn man das Kind in Behandlung bekommt. Ich kann jedoch mit vollster Bestimmtheit versichern, dass in 11 Fällen, welche von Anfang bis zu Ende in der Klinik genau beobachtet wurden, die Roseola durchweg vermisst wurde. In allen anderen aber erschien sie in derselben Weise wie bei Erwachsenen, d. h. in Form sehr spärlicher blassrother, meistens schwach prominirender Stippchen von Stecknadelkopf- bis höchstens Linsengrösse, besonders am Bauch und am unteren Theil des Thorax, seltener auch auf dem Rücken und der inneren Fläche der Oberschenkel. Die Zahl der Roseolen war meistens eine sehr beschränkte, 5 bis 10 im Ganzen, oft auch weniger, so dass man zweifelhaft sein kann, ob es sich wirklich um Roseolen oder um andere zufällige Erythrasmen handelt. Nur in 7 Fällen zeigte sich eine

ungewöhnlich copiose, ein paar Mal fast über den ganzen Körper verbreitete Eruption, die mit derjenigen des Typhus exanthematicus die grösste Aehnlichkeit hatte. Die zeitlichen Verhältnisse der Roseola stimmen mit denen des Milztyphus im Allgemeinen überein. In denjenigen Fällen, welche sich durch ein rapides und hohes Ansteigen der Temperatur auszeichneten, erschien auch die Roseola oft schon am 3. bis 5. Tage nach dem Beginn des Fiebers, einmal sogar fast über den ganzen Körper verbreitet, während sie in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle erst am 7. bis 10. Tage, sehr selten am Ende der zweiten Woche während des Stadium decrementi zum Vorschein kam. In der Regel kamen auch einzelne Nachschübe im Laufe der nächsten Tage, selten später vor, nachdem die ersten Rosaeolen schon völlig verschwunden waren, so z. B. erst am 12. bis 18. Tage des Typhus, wobei auch die bereits gesunkene Temperatur wieder auf 40° und darüber stieg. Wenn auch die einzelnen Rosaeolen meistens nur 2 bis 3 Tage bestanden, so blieb doch in Folge der Nachschübe die Eruption im Ganzen oft bis in das Ende der 2. Woche, selbst noch etwas länger sichtbar, worauf in der Regel eine schwache gelbliche Pigmentirung noch einige Tage lang an der Stelle der Rosaeolen zurückblieb. Kam es später zu einem Recidiv, so erfolgte während desselben in der Regel, keineswegs aber constant, auch ein neuer Rosaeolenausbruch.

Abgesehen von dieser Eruption treten bei Kindern, so gut wie bei Erwachsenen, häufig die bekannten Sudaminabläschen mit nachfolgender kleinförmiger Abschuppung auf, sobald mit dem Sinken der Temperatur reichliche Schweisse sich einstellen. Wirkliche Petechien zeigten sich sehr selten, während falsche, durch Flechtläche bedingte, in den klinischen Fällen häufig vorkamen und bei richtiger Betrachtung leicht für wahre gehalten werden konnten. Uebrigens begründet auch die Eruption wirklicher Petechien nicht gleich eine schlechte Prognose, selbst wenn zahlreiche Nachschübe derselben stattfinden sollten:

Martha W., 14jährig, aufgenommen am 19. Septbr. 1874 in der 2. Woche des Mtyphus. Über den ganzen Körper verbreitet eine grosse Zahl stecknadelkopfg- bis linsengrosser bläulichlicher Petechien, hier und da auch grössere Echyemenen, die gröbste unter dem linken Trochanter, in deren Mitte man ein grossengrosses festes Katarramat fühlte. Am 21. neue thalergrasse Echyemenen auf dem Kreuzbein, am 26. auch am rechten Oberschenkel mit centraler Härte, während schon das Stadium decrementi des Fiebers begonnen hatte. Alle diese Erythrasmate wurden binnen 10 Tagen vollständig resorbt. Der Verlauf der Krankheit war im Ganzen ein schwerer: hohes Fieber (bis 40.4°), äusserst kleiner Puls, kühle Extremitäten, sehr schwache Herzöne, grosse Unruhe mit Delirien, diffuser Katarrh und Bronchopneumonie, endlich ein nach 11tägigem Fieberfreien Intervall

eintretenden Recidiv, welches 12 Tage dauerte, Dennoch erfolgte schliesslich ein günstiger Ausgang. Die Ursache der hämorrhagischen Diathese blieb unbekannt. Bemerkenswerth war ihr Erscheinen mit dem Schwinden des ersten Fieberstadiums, da während des Recidivs keine neuen Extravasate zum Vorschein kamen.

Sehr selten im Vergleich mit den Erwachsenen zeigte sich bei unseren Kindern Decubitus. Im Ganzen kamen mir höchstens 8 solcher Fälle vor, welche fast nie einen sehr hohen Grad erreichten. Bei der Martha W. heilte ein ziemlich tief dringender Decubitus auf dem Kreuzbein sogar noch während des Recidivs bei anhaltend hoher Temperatur (Abends bis 40.8). Bei einem anderen Kinde wurde ein gerade auf dem grossen Trochanter befindlicher Naevus der Sitz des Decubitus. Nur in zwei Fällen dieser Art erfolgte der tödtliche Ausgang. Auch kleine Abscesse und Furunkel kamen wiederholt, besonders in der Sacralgegend, an der Spina ossis bei und auf der Bauchwand vor, einmal mit einer so tiefen Nekrose des unterliegenden Bindegewebes, dass die Bauchmuskeln blossgelegt wurden. —

Die von Seiten der Digestionsorgane auftretenden Symptome stimmen mit denen des späteren Lebensalters überein. Appetitlosigkeit bis ins intermittirende Stadium hinein fehlt fast nie und bedingt bei eigensinnigen und vorerhöhten Kindern bisweilen Ausbrüche von wilder Heftigkeit, sobald man ihnen die nöthwendige Nahrung aufzwingen will. Nur selten, in ganz leichten Fällen, asserten die Kinder selbst das Bedürfniss nach Nahrung. Mit dem Eintritt der Reconvalescenz tritt aber fast immer ein abnorm gesteigerter Hunger ein, welcher in einem Fall, wenn er nicht sofort befriedigt wurde, wahre Wuthanfälle mit Geschrei zur Folge hatte.

Sehr verschieden war die Beschaffenheit der Zunge, welche nur ausnahmsweise durchweg rein und feucht, aber auch selten so trocken, rissig und mit schwarzbraunen Beelen bedeckt erschien, wie wir sie häufig bei Erwachsenen antreffen. In der Regel wurde in der ersten Zeit der Krankheit ein dicker weisslicher oder graugelber Belag mit starker Rötze der Ränder und der Spitze, oder eine rothe glatte Beschaffenheit der vorderen Hälfte, während die hintere stark belegt war, beobachtet. Auf der Akme des Fiebers stiess sich der Belag oft gänzlich oder theilweise ab, und die Oberfläche der Zunge wurde dann glänzend roth, wie lackirt, etwas trocken und in der Mitte bräunlich, wobei die Papillen nicht selten stärker hervortraten. Ueberhaupt aber war das Aussehen der Zunge oft von Tag zu Tag wechselnd. Im Allgemeinen erschien mir die Tendenz derselben zum Trockenwerden, welche mit der Schwere der acuten Erscheinungen, besonders mit der Somnolenz gleichen

Schritt zu halten pflegt, weniger ausgeprägt, als bei Erwachsenen, und dasselbe gilt auch von der Trockenheit und dem fuliginösen Belag der Lippen und des Zahnfleisches, der oft ganz fehlt und nur selten den bei Erwachsenen so häufigen hohen Grad erreicht. Dagegen zeigen die Lippen fast immer Fetzen von Epidermis, welche die Kinder bei dem fast constant beobachteten Zupfen an den Lippen allmählig abreißen. Diese Erscheinung, welche in eine Kategorie mit dem ebenso häufig vorkommenden Bohren in der Nase und dem Reiben der Augenlider gehört, macht sich schon in den ersten Tagen des Heftyphus bemerkbar, kann sich aber auch bis in die späteren Stadien hineinziehen. Eine charakteristische Bedeutung kommt ihr indess nicht zu, weil sie auch im ersten Stadium der Meningitis tuberculosa (S. 274) sehr häufig beobachtet wird. Bei einem 5-jährigen Mädchen bildete sich einige Tage vor dem Tode, anscheinend von einer Rhagade der Unterlippe aus, eine bis zum Rande des Unterkiefers sich erstreckende harte Infiltration und gleichzeitig eine breitharte Anschwellung der linken Parotis.

Kleine aphthöse Plaques und oberflächliche Geschwüre an den Zungenrändern und Mundwinkeln veranlassen bisweilen die Kinder, ihre Finger fortwährend in den Mund zu führen. Bisweilen begleitet auch eine Angina tonsillaris den Typhus; ja bei einem 10-jährigen Mädchen wurde sowohl der erste Anfall desselben, wie auch das später folgende Recidiv durch eine solche Angina eingeleitet, während die Schleimhaut des Mundes völlig intact war. Soorbildung (S. 82) beobachtete ich in 19 Fällen, immer nur bei hochgradiger allgemeiner Schwäche, entweder auf der Höhe der Krankheit, oder bei schon sinkender Temperatur; meistens war nur das Gaumengewölbe der Sitz des Soors, bisweilen aber auch die ganze Mund- und Rachenhöhle befallen, und gerade der Saum des Pharynx kann zu Verwachsungen mit einer terminalen Diphtherie Anlass geben, welche nur durch den mikroskopischen Befund der Oidium-Gelen zu vermeiden sind.

Erbrechen fand in 20 Fällen statt, meistens nur im Beginn und in der ersten Krankheitswoche, seltener auch noch im späteren Verlauf, ja bis ans Ende der Krankheit sich von Zeit zu Zeit wiederholend. In der Regel erfolgt es nach dem Genuß von Nahrungsmitteln oder Getränken, seltener spontan, setzt einige Tage ganz aus und wiederholt sich dann ohne deutliche Ursache. Jedenfalls kommt das Erbrechen bei Kindern häufiger vor, als bei Erwachsenen, womit auch die Beobachtungen Aander (Taupin, Barrier, Billiet und Barthoz) übereinstimmen. Eine besonders schlimme Vorbedeutung, welche z. B. Löschner dem wiederholten Erbrechen zuschreibt, möchte ich nicht an-

erkennen, wenn ich auch zugebe, dass es vorzugsweise in schweren Fällen vorkommt. Dass ein im Beginn der Erkrankung eintretendes Erbrechen auch den Verdacht einer Meningitis tuberculosa erregen muss, ist selbstverständlich, und man wird deshalb um so sorgfältiger die begleitenden Symptome, zumal die Pulsbeschaffenheit und die Fiebercurve zu prüfen haben.

Der Stuhlgang war unter 124 Fällen 20mal vollkommen normal, höchstens etwas breiiger als sonst, und fehlte auch wohl an einzelnen Tagen gänzlich; ja in 18 Fällen beobachtete ich während der ganzen Krankheit Obstruction alvi, welche die wiederholte Anwendung von Klystiren oder Ol. Ricini notwendig machte. Bei einem dieser Kinder war die Verstopfung so hartnäckig, dass 0.4 Calomel (in 2 Dosen) und 2 ansehnliche Klystire gegeben werden mussten, um Stuhlgang zu bewirken. Auf die Schwere des Falls kam es dabei nicht an, denn wir hatten mehrere Typhen mit sehr langgezogenem Verlauf, anhaltend hohen Temperaturen und verhältnissmässig stark entwickelten nervösen Symptomen, welche von Anfang bis zu Ende mit Stuhlverstopfung verliefen. Oft wurde eine anfangs vorhandene Obstruction später durch Diarrhoe ersetzt. Diese bestand unter 124 Fällen 86mal, entweder von vorn herein, oder häufiger erst von der Mitte der ersten Woche oder von der zweiten Woche an. Die Ausserungen, deren Zahl sehr verschieden war (meistens nur 1–5 Stühle täglich, selten 10–20), zeigten in der Regel die bekannte schleimkrüthartige Beschaffenheit, sahen aber auch öfters grünlich oder wie Milchkaffee aus, dauerten meistens bis zu das intermittirende Stadium hinein und wurden erst mit der völligen Entfieberung normal. Nur selten trat die Diarrhoe während der Convalescenz ohne erkennbare Ursache von neuem auf, bei einem Knaben sogar mit solcher Heftigkeit, dass Collapse drohte. Häufiger besteht während dieser Periode eine Neigung zur Obstruction, auf welche man um so mehr zu achten hat, als dadurch ephemerer Fieberanfälle bedingt werden können, die sofort nach der Entleerung harter Stühle durch Ol. Ricini oder durch reichliche Wasseringussungen in den Dickdarm ihr Ende erreichen (S. 700).

Nur sehr selten im Vergleich mit den Erwachsenen, kommen Darmblutungen im Typhus der Kinder vor. Alle Autoren sind darin einig und bringen diese Thatsache mit der Seltenheit ausgebreiteter Darmschwüre in diesem Alter in Zusammenhang (S. 696). Ich selbst beobachtete Darmblutungen nur 3mal, und zwar in 3 Fällen ganz unbedeutend und rasch vorübergehend, während bei einem 12jährigen Knaben die Heftigkeit der Blutung, welche sich im Rectum wiederholte,

einen besorgnispieldenden Schwäcchegrad herbeiführte. Im 5. Fall, welcher ein 10-jähriges Mädchen betraf, erfolgte während eines in der dritten Woche eintretenden Recidivs eine unbedeutende Blutung, worauf in den nächsten Tagen zwei sehr copiose Hämorrhagien mit lokalem Collaps folgten. In diesem Fall war schon der häufige Abgang äusserst faulig riechender Flatus aufgefalle, die beim Lüften der Bettdecke die ganze Umgebung verpesteten und offenbar von der Zersetzung der im Darmkanal stagnirenden Blutmassen herbeigeführt waren.

Auffallend war nur die äusserst geringe Zahl von Fällen, in denen Stühle und Urin unwillkürlich ins Bett entleert wurden. Fast alle Kinder, welche über die ersten Lebensjahre hinaus waren, gaben ihre Bedürfnisse zuvor der Wärterin kund, selbst wenn die Apathie und Somnolenz nicht unbedeutend waren. Dasselbe Erfahren machten Billiet und Barthéz. Nur in sehr schweren mit tiefem Sopor einhergehenden Fällen erfolgten unwillkürliche Ausleerungen. Um so bemerkenswerther erschien es mir, dass einige Kinder erst im Stadium intermittens oder in der Reconvalescenz bei ganz freiem Sensorium anfangen, den Stuhlgang oder den Urin ins Bett zu entleeren, was ich mir nur aus Schwäche und einer damit verbundenen Scheu vor jeder Bewegung erklären konnte. Auch Retention des Urins kam nur äusserst selten vor, z. B. bei einem 4-jährigen, sensoriell völlig benommenen Knaben, welchem wiederholt der Katheter eingeführt werden musste. Auch dieser Fall nahm übrigens einen glücklichen Ausgang.

Schwerer als bei Erwachsenen lässt sich natürlich bei Kindern die Empfindlichkeit der Coecalgegend beurtheilen, und ich kann desshalb diesem Symptom hier ebenso wenig Werth beilegen, als dem sogenannten „Gargouillement“, welches auch bei Kindern, die an gewöhnlicher Darrhée leiden, durchaus nichts seltenes ist. Die Form des Unterleibs war meistens normal oder nur mässig aufgetrieben. Höhere Grade von Meteorismus kamen nur selten vor, und fast niemals wurde dadurch eine Beeinträchtigung des Diaphragma und der Athmung herbeigeführt, ein Umstand, welcher zu der günstigeren Prognose des Kindertypus das Seinige beiträgt. Kolikschmerzen, besonders vor den Ausleerungen, konnte ich mit Sicherheit nur in 14 Fällen constatiren. Um so auffallender war es, dass bei 3 Kindern diese Schmerzen erst in der Reconvalescenz, und zwar bei zweien mit solcher Heftigkeit auftraten, dass man an die Entwicklung einer perforativen Peritonitis denken konnte:

Otto M., 11 Jahre alt, Reconvalescent von Typhus seit dem 19. Octbr. 1874; am 3. Novbr. Nachmittags plötzlich sehr intensive, sich immer steigende Leib-

schmerzen, die von der Regio ilaca dextra ausstrahlend, sich auf das Hypogastrium und die Nabelgegend verbreiteten und mit windenartigem Erbrechen verbunden. Unterleib gespannt und empfindlich, aber nicht aufgetrieben. Der laut klingende Patient war kolerisch (37,6). Stuhlgang normal erfolgt. Durch 8 Tropfen Tinct. opii und eine Eistasse Besserung; während der Nacht viel Ectus, am nächsten Tage Uebelkeit und ein paar Mal Erbrechen, welches sich auch am 11. und 12. (ohne irgend einen Dünnefall) wiederholte. Am 14. ein neuer heftiger Schmerzfall mit Erbrechen, der wiederum von der Coecalgegend ausging. Von nun an ungestörte Convalescenz.

Max B., 7jährig, nach einem schweren Typhus seit 2 Tagen entleert. Am 28. Decbr. 1875 Morgens plötzlich äusserst heftige Schmerzen in der rechten Seite des Leibes, anhaltendes Geschrei, Schweißausbruch im Gesicht. Injection von Morphium (0,006) bewirkte sofort Nachlass und ruhigen Schlaf. Untersuchung des Unterleibes ohne Resultat. Da bereits 4 Tage lang Stuhventpfang bestand, wurden nach und nach 4 Esslöffel Ol. ricini gegeben, welche indes keine genügende Öffnung bewirkten. Erst nach einigen Klysmen am 30. erfolgte reichlicher Stuhlgang. Während dieser Zeit war noch am 29. ein kurzer Schmerzfall in der rechten Bauchseite erfolgt, der indes spontan vorüberging und nur eine grosse Empfindlichkeit dieser Gegend hinterliess. Dasselbe verschwand nach anhaltender Application eines Eukuts bis zum 31.

Von einer Peritonitis konnte in diesen Fällen wohl keine Rede sein, vielmehr handelte es sich offenbar um Kolikschmerzen, die von dem Reize angeschwulster Darmcontenta abhängen mochten. Ausser dem zweiten Fall spricht für diese Ansicht noch der dritte, in welchem während der Convalescenz durch Verstopfung heftige Schmerzen im Laufe des Colons transiensum erregt wurden. Auch Rilliet und Barthès sprechen von diesen Schmerzen und führen dabei den Fall eines 11jährigen Knaben an, welcher schon während des Typhus von den intensivsten, 36 Stunden mit Unterbrechungen andauernden Schmerzen im Leibe befallen wurde.

Die Perforation eines Darmschwürs habe ich unter allen meinen Fällen nur einmal bei einem 11jährigen Knaben, und zwar in der fünften Woche, nachdem schon die Convalescenz begonnen hatte, beobachtet. Diese Seltenheit der Perforationen wird von allen Autoren bestätigt, und Barrier's Angaben (2 Perforationen unter 24 Fällen) sind eben nur als Spiel des Zufalls zu betrachten. Dasselbe gilt von der Parotidenbildung, welche ich nur 4mal, bei zwei Mädchen, einem 4jährigen und einem 7jährigen Knaben, zu sehen bekam. Bei dem letzteren entwickelte sich eine linksseitige Parotide nach einem äusserst schweren Typhus in der dritten Woche: hier musste, nachdem sich der Eiter spontan in den äusseren Gehörgang entleert hatte, eine Gegenöffnung unterhalb des Ohrs gemacht werden, welche nach einigen Wochen Heilung herbeiführte. In zwei Fällen bildete sich die Parotide einige Tage vor dem Tode, das eine Mal unter steigendem Fieber, bei dem zweiten

Kind in Collapse (Temp. 37,8), ohne dass es zur Eiterung kam, während im vierten Falle Durchbruch in den äußeren Gehörgang und Paralyse des Pes anserinus erfolgte. —

Ich komme nun zu den von den respiratorischen Organen ausgehenden Krankheitserscheinungen, unter denen, wie bei Erwachsenen, der Bronchialkatarrh die constanteste ist. Ich mache Sie aber darauf aufmerksam, dass gerade bei diesem typhösen Katarrh wegen der gesunkenen Muskelkräfte tiefere Inspirationen nothig sind, um die Blenchi hervorzurufen, während oberflächliche Athembögen, wie sie gerade diesen Kindern eigen sind, keine abnormen Geräusche, sondern oft nur ein schwaches Vesiculärathmen zu Gehör bringen. Daher kommt es, dass man in einer Reihe von Fällen trotz des vorhandenen Hustens keine katarrhalischen Geräusche wahrnimmt, bis das Kind zufällig einmal während des Auscultirens recht tief inspirirt. Verhältnissmässig selten (14mal) steigerte sich der Katarrh zu einer durch die physikalische Untersuchung deutlich nachweisbaren bronchopneumonischen Verdichtung. Dass noch in vielen anderen Fällen lobuläre, physikalisch nicht nachweisbare, bronchopneumonische Herde bestanden haben mögen, kann ich dabei nicht in Abrede stellen.

Die Bronchopneumonie trat fast immer doppelseitig in den hinteren unteren Lungenpartien, und zwar während der Akme der Krankheit auf, seltener erst mit dem Sinken der Temperatur oder gar im intermittirenden Stadium, wobei die Annahme einer Steigerung der Verdichtungssymptome durch hypostatische Prozesse nahe lag. Durch Nachschübe der Bronchopneumonie kann der Verlauf sehr in die Länge gezogen und der Kräftezustand der Kinder in beunruhigender Weise herabgesetzt werden. Die enorme Abmagerung, das blasso Colicrit, die Anorexie und das remittirende Fieber, welche in diesen Fällen Wochenlang zu dauern pflegen, sind wohl geeignet, die Befürchtung eines käsigten Zerfalls der Infiltration oder einer hinzutretenden acuten Tuberculose zu erregen. Glücklicherweise aber ist diese Befürchtung nicht immer gerechtfertigt, und es erfolgt vollständige Heilung (S. 336).

Bei weitem seltener als die Bronchopneumonie entwickelt sich die fibrinöse Form im Verlauf des Ileotyphus, wofür der folgende Fall ein Beispiel darbietet:

Hedwig H., 15 Jahre alt, aufgenommen am 11. Novbr. 1878 wegen Epilepsie, die etwa alle 3 Wochen, besonders in der Nacht, starke wiederholte Anfälle machte. Am 4. Februar 1879 wurde sie vom Fieber (40,9) befallen, und es entwickelte sich nun stürmisch ein Ileotyphus mit einer schon am 3. Tage hervortretenden und reichlich fast über den ganzen Körper sich verbreitenden Roseola, Delirium, Sopor,

stärker Diarrhoe u. s. w. Während der 16tägigen Dauer der Krankheit betrug die Temperatur nach in den Morgenstunden fast nie unter 40,0, Abends 40,5 bis 41,7. Von Seiten der Respirationsorgane wurde zuerst ein diffuser Katarrh, später auch eine ausgebreitete Eümpfung der rechten Rückenfliche und Bronchialkatarrh constatirt. Die Schwere des Falls, der tiefe Sog, der mehr und mehr sich geltend machende Collaps verhinderten indess ein genaues Verfolgen der pneumonischen Vorgänge in den letzten Tagen. Tod am 20. im Collaps.

Section: Gehirn normal. Epicardium und Pleura mit kleinen Echyminen durchsetzt. Linke Lunge normal. Von der rechten Lunge ist nur die Spitze noch luftkaltig. Sonst ist der Oberlappen derb grauroth hepatisirt mit eingestreuten hämorrhagischen Partien. An der unteren Grenze befinden sich zwei etwa wülfelförmige 2 Cm. grosse, kirschröthe, von einer scharfen graugelben Demarcationslinie umgebene Herde. Auch der Unterlappen dunkelrothbraunroth, durchweg derb hepatisirt. Nur am untersten Theil des Mittellobens war noch eine luftkaltige Partie bemerkbar. Milz normal, pericardymathes Neptem. (In Betreff der Darmveränderungen vergl. S. 695, Fall 8). An der Basis des Aryknorpels ein bis ins Perichondrium reichendes Ulcus, Epiglottis am Rande oberflächlich ulcerirt. Soor im Pharynx und Oesophagus. Fast alle Lymphknoten mäßig geschwollen.

Wir fanden hier also eine fast totale Hepatisation der rechten Lunge, und an der Grenze des Oberlobens saamen der Verdickung zwei „coquestrirte“ Herde, welche bei längerer Dauer des Lebens entweder in völlige Nekrose, d. h. in circumscribten Lungenbrand, oder in Lungenabscess übergegangen sein würden. Die Demarcationslinie, welche sie umgab, bewies, dass die Abtrennung derselben von dem hepatisirten Parenchym schon begonnen hatte. Zu den seltsamen Befunden beim Typhus der Kinder gehört auch der ulceröse Process an den Stimmbändern und der Epiglottis, welchen ich im Ganzen nur dreimal zu beobachten Gelegenheit hatte. In einem vierten Falle fanden wir keine Ulceration, sondern nur eine bedeutende Schwellung der Kehlkopf Schleimhaut mit entzündlicher Verdickung des Perichondrium. Alle diese Kinder hatten bis zum Tode an starker Heiserkeit und heissem Husten gelitten. Heiserkeit oder selbst Aphonie kam zwar auf der Höhe der Krankheit öfters vor, wurde indess durch stärkere Anstrengung des Stimmorgans überwunden und konnte deshalb auf eine Atone der Stimmuskeln oder auf einen Schleimbeflag der Stimmbänder bezogen werden.

Wirklicher Lungenbrand wurde 3mal beobachtet.

Franziska Sch., 4jährig, aufgenommen am 7. Juli 1877 mit Dyspnoe, Anfangs liess sich nur ein diffuser Bronchialkatarrh constatiren. Erst am 15. expectorirte Patientin beim Husten ein schwammiges blutig tingirtes Sputum, welches größtentheils verschluckt wurde. Die Frequenz der Respiration war dabei nicht erheblich vermehrt (etwa 30 in der Minute), dieselbe auch nicht gerade dyspnoisch. Am 17. Hess sich auf der rechten Rückenfliche von oben bis unten, besonders aber von der Spina scapulae abwärts, eine Eümpfung, beschleunigtes Athmen und mittel-

häufiges klingendes Rauseln nachweisen; die Athmung wurde sichtlich, die Expectation abnehmend, der Husten quälender; Sputa konnten auch jetzt nicht aufgefangen werden. Neben diesem respiratorischen Symptomen verliefen die eigentlichen typhösen Symptome in bekannter Weise, aber in schwerer Form. Tod am 2. August im Collaps.

Section: In der rechten Pleurahöhle reichlicher eitriger, trüblich grauer Etwas. Beide Pleurahäute fibrinös belegt. Der Oberlappen der rechten Lunge größtentheils lederartig fest, die Pleura desselben an einer kirschnussgrossen Stelle missfarbig, darunter fluctuiren fühlbar. Beim Einscheiden dieser Stelle kommt man in eine mit flüssigem jauchigem Inhalt und zerfallendem Lungengewebe angefüllte Höhle, deren ganze Umgebung ringum hepatisirt ist, nach dem Herde zu aber weicher und mischfarbig wird. Die innere der Höhle anliegenden Pleurahäute ist ebenfalls in entzündeten gangränösen zerfallen, stinkend. Unter- und Mittelappen der rechten Lunge frisch roth hepatisirt. Die Veränderungen im Darmkanal siehe S. 693, Fall 7. Milz etwas vergrößert. Septicämie paracachymatosa.

Auch dieser Fall bietet uns eine totale Hepatisation der rechten Lunge, welche aber im rechten Oberlappen brandig zerfällt und eine gangränöse Caverna bildet. Ob die im pathologischen Institut ausgesprochene Ansicht, dass es sich hier um eine sogenannte „Schluckpneumonie“ gehandelt habe, die richtige war, lasse ich dahingestellt, hebe aber in klinischer Beziehung den Mangel des gangränösen Athemgeruchs hervor, der bei der Unmöglichkeit, die Sputa zu gewinnen, uns ausser Stand setzte, die Diagnose des Lungenbrandes zu stellen. Die beiden anderen Fälle von Lungenbrand betrafen einen 9jährigen Knaben und ein 4jähriges Mädchen. Bei dem ersteren schien eine Gangrän des Penis, welche sich im Laufe der 4. Krankheitswoche entwickelt hatte, auf embolischen Wege den gleichen Process in der Lunge herbeigeführt zu haben.

Ueber Abnormalitäten des Urins, insbesondere Albuminurie, finde ich in meinen Fällen keine Notizen, gebe aber zu, dass die Untersuchung dieses Secrets, welches bei den Kindern nur schwer oder gar nicht aufzufangen war, nicht mit der erforderlichen Genauigkeit und Consequenz durchgeführt werden konnte. Bei einem 7jährigen Mädchen (Privatpraxis) fiel mir die enorme Menge und blasser Farbe des Urins im Akutestadium des Typhus auf; da derselbe indess weder Zucker, noch sonst abnorme Bestandtheile enthielt, so musste wohl der enorm vermehrte Durst, welcher dem verhältnissmässig nicht hohen Fieber keineswegs entsprach, als Ursache dieser Polyurie betrachtet werden. —

Von anderen Complicationen und Nachkrankheiten beobachtete ich wiederholt subcutane Abscesse, einmal bei einem 8jährigen Knaben ein mit Bläschenbildung einhergehendes Erysipelas faciei, welches sich unter starker Fiebersteigerung auf die behaarte Kopfhaut verbreitete

und nach 5 Tagen kritisch endete. Otorrhoe, meistens einseitig, kam 12mal vor, dauerte mit oder ohne Schwerhörigkeit 12–20 Tage und verschwand dann allmählig, ohne üble Folgen zu hinterlassen. Ein Hämatom des rechten Musc. rectus abdominis entwickelte sich in der 8. Woche eines schweren Typhus bei einem 7jährigen Knaben unter heftigsten spontanen, aber auch durch Druck und Bewegung hervorgerufenen Schmerzen, und bildete eine harte, scharf umrandete, dicht unterhalb des Nabels endende Geschwulst, welche nach einigen Wochen durch Resorption verschwand. Sehr selten kommen Entzündungen der Gelenke nach dem Heptyphus vor, und deshalb erscheint mir der Fall eines 11jährigen Knaben bemerkenswerth, welcher 3 Wochen nach der Entfieberung eine Synovitis des linken Handgelenks bekam. Dasselbe war stark geschwellen und bei jeder Bewegung äusserst schmerzhaft. Ein mässiges Fieber (38,2) schwand nach zwei Tagen, und unter dem Gebrauch eines Schienenverbandes und eines Eobestels ging auch die Anschwellung rasch zurück, erschien aber schon nach wenigen Tagen ohne Fieber von neuem und wurde nun durch Jodtinctur und einen Gypverband beseitigt. Immerhin hat man zu bedenken, ob diese 3 Wochen nach Ablauf des Heptyphus eintretende Synovitis in der That als eine Nachkrankheit oder als eine zufällige Affectio zu betrachten ist. Ein analoger Fall, welcher das rechte Kniegelenk betraf, nahm unter derselben Behandlung einen glücklichen Ausgang.

Unter den Nachkrankheiten des Typhus wird auch von verschiedenen Autoren (z. B. Griesinger) die Wassersucht, und zwar ohne Abnormitäten des Urins, erwähnt. Bei Kindern wurde dieselbe wiederholt von Stosser und von Rilliet und Barthez beobachtet, deren Fälle stets einen günstigen Ausgang nahmen. Mir selbst kamen hydropische Erscheinungen in Folge des Typhus, abgesehen von einigen Fällen, in welchen die Augenlider nach der Entfieberung gedunsen erschienen, nur einmal bei einem 9jährigen sehr marastischen Knaben vor, welcher in der 5. Woche der Krankheit bei fortwährender abendlicher Temperaturerhöhung (38,4–38,8), Oedem der Hände und Füsse und mässigen Ascites bekam, ohne dass der Urin eine Spur von Albumen zeigte. Das Fieber hörte sofort nach der Incision dreier grosser Abscesse unter der Kopfhaut auf, und unter dem Gebrauch eines Chinadecocts mit Wein und kräftiger Diät verschwanden auch mit der Besserung des Allgemeinbefindens allmählig die hydropischen Symptome, so dass nach Monatsfrist vollständige Heilung erzielt wurde. Ob man den Hydrops in solchen Fällen, wie ich glaube, als einen atonischen, d. h. durch Herzschwäche und venöse Stauung, oder als einen durch parenchymatöse

Veränderungen der Nieren bedingten aufzufassen hat, steht dahin. Der Mangel der Albuminurie lässt sich nicht gegen die letzteren geltend machen, da, wie Sie sich erinnern werden (S. 555) diese auch ohne Albuminurie bestehen können. Ich bemerke ausdrücklich, dass dieser Patient niemals Natrium salicylicum bekommen hatte, weil man hier und da geneigt scheint, diesem Mittel die Entstehung von Oedemen und Transsudaten zuzuschreiben. —

Charakteristisch für die Kinder erschien mir fast immer die im Vergleich mit erwachsenen Patienten überraschend schnelle Wiederherstellung der Kräfte. Wenn auch hin und wieder Fälle vorkommen, in welchen die *reconvalescentes* Kinder enorm abgemagert sind und kaum aufrecht sitzen können, so erstaunte wir doch weit häufiger darüber, Kinder, welche Wochenlang apathisch oder somnolent dagelegen hatten, sofort nach dem Eintritt der Defervescenz, ja selbst schon im Stadium intermittens im Bette sitzend und spielend zu finden, eine Thatsache, welche schon von Billiet und Barthet gewürdigt worden ist. Dagegen fand, wie bei der Mehrzahl der febrilen Krankheiten, immer eine bedeutende *Macies* und Abnahme des Körpergewichts statt, und es dauerte viele Wochen, bis der Fettsatz und das Hautcolorit den Normalzustand wieder erreichten. Der durch das hohe und lange Fieber bedingte Zerfall der Eiweisskörper und der Mangel an Nahrung erklären diese die Angehörigen lebhaft beunruhigende Thatsache. In scheinbarem Widerspruch mit derselben steht das während der Krankheit und der *Reconvalescenz* ungewöhnlich starke Längenwachsthum, besonders der Röhrenknochen der unteren Extremitäten, welches auch im Gefolge anderer Infektionskrankheiten, aber nie in dem Grade beobachtet wird, wie beim Typhus. Im Zusammenhang damit steht eine Erscheinung, auf welche schon vor einigen Jahren Professor Köhler mich gesprächsweise aufmerksam machte, nämlich die Bildung von Querrissen der Haut an der Streckseite der unteren Extremitäten, zumal oberhalb der Kniekehle. Diese Spaltungen, die anfangs roth erscheinen, sich allmählig entfärben und schliesslich den auf der Bauchhaut der Schwangeren wahrnehmbaren narbigen Lücken gleichen, sind eben die Folgen einer besonders bei fleetirten Kniegelenken zu starken Spannung der Haut, welche für die schnell wachsenden Knochen zu eng geworden ist. Die Erscheinung muss aber immerhin nur selten sein; obwohl ich in den letzten Jahren nie verfehlt habe, daraufhin zu untersuchen, ist sie mir bis jetzt auch nicht vorgekommen, während Auboyer¹⁾ mehrere Fälle dieser Art nach schweren Typhen beschrieben hat. —

¹⁾ De la naissance et des rapports avec les maladies aiguës fébriles. Paris 1881.

Schließlich noch einige Worte über die Recidive des Dostyphus. Während Billiot und Barthoz unter 111 Fällen nur 3 Recidive beobachteten, bot sich nur diese Erscheinung unter 152 Fällen 22mal dar, und zwar befanden sich darunter 6 Fälle, in welchen weder kühle Bäder, noch andere kalte Applicationen in Anwendung gekommen waren. Ein Diätfehler liess sich nur einmal bei einem 5jährigen Knaben nachweisen, welcher nach dem reichlichen Genuß von Rosinenkuchen im intermittirenden Stadium sofort wieder stärker zu fiebern begann und im Recidiv zu Grunde gieng. Ob insofern der Diätfehler in der That die Ursache des Recidivs war, wage ich nicht zu behaupten, weil in den übrigen 21 Fällen ein solcher Excess mit Sicherheit ausgeschlossen werden konnte.

Die Schwere des ersten Anfalls giebt keine Garantie gegen den Eintritt eines Recidivs. Wenn auch die meisten Fälle nur die milde Form der Krankheit dargeboten hatten, kamen doch Recidive auch nach schweren Typhen öfters vor. In der Regel erfolgt das Recidiv erst während der Convalescenz, etwa in der 3. bis 5. Krankheitswoche, nach einem vollkommen fieberfreien Intervall, dessen Dauer im Durchschnitt 3 bis 10 Tage, in einem Falle sogar 18 Tage betrug. In einer kleineren Reihe von Fällen aber war überhaupt von einer vollständigen Apyrexie noch keine Rede gewesen, vielmehr gieng das Recidiv in der Form einer allmählig oder auch plötzlich sich geltend machenden Exacerbation aus dem Stadium intermittens des Typhus hervor. Nachdem bereits längere Zeit die Temperatur Morgens normal oder subnormal gewesen und nur Abends noch 38,5 bis 39° erreicht hatte, erfolgte plötzlich wieder eine rasch zunehmende Steigerung, welche bisweilen durch einen Schüttelfrost eingeleitet wurde:

Otto M., 11 Jahre alt, aufgenommen am 15. Mai 1878 im Abdominalstadium des Typhus. Vom 18. bis zum 25. Stadium intermittens. Temp. Mg. 36,5—37,3; Ab. 38,5. Am 25. plötzlich Schüttelfrost, und von nun an wieder Steigerung: Mg. 38,8; Ab. 40,0. Erst am 7. Juni wieder völlige Defervescenz.

Carl Sch., 12 Jahre alt, aufgenommen am 8. Nov. 1878 im Stadium intermittens eines schweren, bereits über 3 Wochen dauernden Typhus. Grösser Abmagerung und Exsiccation. Am 9. und 11. Novbr. zwischen 2—3 Uhr Nachmittags Prostrationsfall; Temp. Ab. 40,3 und 39,5. Während der beiden folgenden Tage völlige Defervescenz. Am 14., 15. und 16. aber zeigt sich wieder erhöhte Abendtemperatur, während die Morgen Temperatur normal ist. Am 17. steigt auch diese von neuem, die Milz wird palpabel und schmerzhaft, und so beginnt nun ein Recidiv, welches nach 9 Tagen glücklich endet.

Hier war der Beginn des Recidivs ein ganz ungewöhnlicher. An zwei aufeinander folgenden Tagen setzen wir Anfälle nach Art einer

Intermittens eintreten, worauf zwei völlig fieberfreie Tage folgen. Die nächsten 3 Tage zeigen nur erhöhte Abendtemperatur, und erst dann nimmt das Recidiv seinen gewöhnlichen Verlauf. — Die Erscheinungen desselben stimmten mit denjenigen des ersten Anfalls durchaus überein; auch die Roseola und der meistens schon zurückgebildete Milzumor pflanzten sich von neuem einzustellen, und in einzelnen Fällen nahm die Krankheit sogar einen bedenklicheren Charakter an als zuvor, so dass von 22 Fällen 2 mit dem Tode endeten. Die Dauer des Recidivs betrug:

2mal	4	Tage
11 „	6—9	„
7 „	11—14	„
2 „	16—17	„
<hr/>		
22		

Ich füge schliesslich hinzu, dass ich chronische Exantheme (Ekzem und Prurigo) ein paar Mal während des Typhus verschwinden, bald nach der Heilung aber wieder zum Vorschein kommen sah. In einem Fall trat unmittelbar nach der Entfieberung Varicella, in einigen anderen während der *Reconvalescenz* Scarlatina auf. —

Es bleibt mir nun noch übrig, Ihnen meine Erfahrungen über die Therapie des Kindertyphus mitzutheilen. Da man vorläufig nicht im Stande ist, das unbekannte Krankheitsgift mit Radicalmitteln zu bekämpfen, so legt man mit Recht das Hauptgewicht auf die Behandlung des Fiebers. Man sollte aber bei dieser „Antipyrese“ nie vergessen, dass wir nicht die Krankheit an und für sich, sondern das kranke Individuum zu behandeln haben, und dass das erbarmungslose Festhalten an einer bestimmten Methode zur Schablonenhaftigkeit und gewiss nicht immer zum Heil des Kranken führt. Dies gilt zum besonders von der beliebten Kaltwasserbehandlung, welche nach meiner Erfahrung von Kindern im Allgemeinen lange nicht so gut vertragen wird, als von den kräftiger organisirten Erwachsenen. Zunächst besitzen wir kein Mittel, welches uns die Toleranz des betreffenden Kindes in Bezug auf diese Behandlung vor dem Beginn derselben nachweisen könnte, und am wenigsten sollte man sich hier auf das Aussehen des Kindes verlassen, welches zu ganz falschen Schlüssen verleiten kann. Anscheinend schwächliche, zarte Kinder sah ich die wiederholte Anwendung kühler Bäder sehr gut vertragen, während ein 12jähriger Knabe von überaus kräftigem Körperbau und bisher intakter Gesundheit schon nach dem zweiten Bade

von 20° R. dergestalt collabirte, dass es einer ganzen Flasche Tokayerweins bedurfte, um die kühlen Hände und Füsse wieder zu erwärmen und dem kleinen Pulse seine normale Beschaffenheit wiederzugeben. In anderen Fällen erfolgte dieser Collaps schon nach dem ersten Bade, oder selbst nachdem das Kind ein paar Stunden auf einer Wassermatratze gelegen hatte. Will man also den Eintritt dieser Collapssymptome, welche im Typhus gewiss zu fürchten sind, vermeiden, so hat man das erste Bad immer nur als ein Experiment anzusehen, von dessen Ausfall die weitere Behandlung abhängen wird. Die übliche Methode, vor und nach dem Bade ein paar Löffel Wein zu geben, ist keineswegs ausreichend, um in ungeeigneten Fällen eine schlechte Wirkung zu verhüten. Dazu kommt nun noch die sich immer von neuem auflehnende Erfahrung, dass die kühlen Bäder während der Akme des Fiebers, d. h. so lange nur sehr geringe Morgenremissionen stattfinden, einen nur unbedeutenden, höchstens auf einige Stunden beschränkten Temperaturabfall erzielen. Dann aber von neuem und bei jeder Steigerung über 39,5 immer wieder zu baden, wie es die Fanatiker der Kaltwasserbehandlung vorschreiben, dazu kann ich mich der eben mitgetheilten Bedenken wegen nicht mehr entschliessen, und so bin ich denn nach und nach dahin gekommen, die Anwendung der Bäder beim Kindertyphus weit mehr einzuschränken, als ich es früher gewohnt war. Nur bei hoher, in den Abendstunden 40,0 und darüber erreichender Temperatur lasse ich überhaupt baden, und beschränke mich auf höchstens 2 Bäder in 24 Stunden, deren Temperatur im Durchschnitt 25° R. beträgt und nie unter 22° sinken darf. Diese Bäder wirken bei vielen Kindern schon dadurch entschieden günstig, dass sie ein unter diesen Umständen durch kein anderes Mittel zu erzielendes Wohlbehagen bewirken und etwa vorhandene schwere Nervensymptome temporär mildern. Die Dauer des einzelnen Bades darf 5 bis 8 Minuten nicht überschreiten. Treten Symptome von Collaps nach dem Bade ein, welche im Bette nicht bald der Euphorie Platz machen (Zittern, Kälte der Hände und Füsse, kleiner Puls, verfallenes Aussehen), so sehe ich darin eine entschiedene Contraindication gegen die weitere Fortsetzung der Bäder. In beschränkteren Fällen mit milder hoher Temperatur und grösseren Morgenremissionen lasse ich überhaupt gar nicht mehr baden, sondern nur Einbestel auf den Kopf und auf den Unterleib appliciren, welche in der Regel gut vertragen, aber sofort entfernt werden, wenn die Kinder anfangen, sich über Kälte zu beklagen. Bei grosser Ursache kann man hier auch lauwarme Bäder von 26—27° R. versuchen, von denen ich nicht selten einen calmirenden Erfolg sah. In den leichteren Fällen bedarf es auch durchaus keiner

stärkeren Antipyrese durch Arzneimitteln. Eine milde flüssige Diät (Milch, Fleischbrühe) und je nach dem Alter 4–5 Theel- oder Kinderlöffel guten Weiss reichen vollkommen aus, und nur wo ein Recept durchaus verschrieben werden muss, also in der Privatpraxis, möge man die Salzsäure (1:120) zweistündlich nehmen lassen.

In erusteren, hochfieberhaften Fällen versuchte ich sehr häufig die kühlen Bäder durch das Chinin in grossen Dosen (0,5 bis 1,0), ein paar Stunden vor der Abendocacervation gegeben, zu ersetzen, und wendete dies Mittel auch in Verbindung mit den Bädern nicht selten an. Je nach der antipyretischen Wirkung wurde die Chinindosis täglich oder einen Tag um den anderen wiederholt. Weder das Ausbrechen des Chinins, was selbst dann vorkam, wenn es in einem halben Weinglase Limonade gereicht wurde, noch das häufig danach eintretende Obreukingen hielt uns von dem weiteren Gebrauch des Mittels ab. Leider aber gilt vom Chinin fast dasselbe wie von den kühlen Bädern. Während der Akme, zumal schwerer Fälle, ist die antipyretische Wirkung dieses Mittels eine geringe oder wenigstens sehr schnell vorübergehende. Erst wenn die Morgentemperatur anfängt, etwas zu sinken, tritt diese Wirkung entschieden hervor, und es gelingt dann in der That oft, durch eine starke Dosis Chinin die nächste Morgentemperatur auf den normalen oder selbst subnormalen Grad zurückzuführen, ja sogar auf 24–36 Stunden einen erheblichen Temperaturabfall zu bewirken. Dagegen konnte ich von der früher viel gerühmten Anwendung des Chinins in kleinen Dosen (0,5:120,0) niemals eine antipyretische Wirkung beobachten.

Dem vielfach z. B. von Stoffen, sehr gerühmten Natrium salicylicum kann ich im Kindertypus nicht das Wort reden. Obwohl ich seine dem Chinin gleichwerthige antipyretische Wirkung nach eigenen Erfahrungen anerkenne, bin ich doch durch das nach grösseren Dosen wiederholt eintretende Erbrechen, besonders aber durch einen bedrohlichen Collaps, welchen ich ein paar Mal beobachtete, von dem Gebrauch desselben mehr und mehr zurückgekommen. Bald nach dem Einnehmen von 1,0–2,0 dieses Mittels sank hier die Temperatur um 2–3°C., und unter copiosen Schweissaustrich erfolgte ein so beruhigendes Sinken des Pulses, Kühlwerden der Extremitäten und Verfall der Gesichtsfarbe, dass wir zur Anwendung starker Reizmittel (Wein, Moschus) genöthigt wurden, was bei der Anwendung der grossen Chinindosen niemals vorgekommen ist.

Wo die Diarrhoe so copios war, um ein besonderes Eingreifen zu erfordern, da zeigte sich das Magister. Bismuthi (0,1 bis 0,3 2stündl.) (E. 60) oder auch das Acid. tannicum (1,0 bis 1,5:120,0 mit Extract.

mar. vomit. 0,1 oder Tinct. nar. vomit. 1,0) (F. 33) in der Regel erfolgreich. Stuhlverstopfung wurde durch Ricinöl (Kinderlöffelweise) oder durch eine Wasserinjection in den Darm bekämpft. Den Bronchialkatarrh konnten wir meistens unberücksichtigt lassen. Nur wo er sehr diffus auftrat oder in Bronchopneumonie ansatzte, wurde ein Decoct. Scrogae mit Liq. ammon. aëre. (F. 20) oder Aëol. benzoe. mit kleinen Dosen Kampher (F. 24) als stimulierendes Expectans gegeben. Zur Anwendung von trockenen Schropfköpfen oder fliegenden Vesicantien kam es nur in einzelnen Fällen von ausgeprägter pneumonischer Verdichtung.

Sobald Collaps Symptome sich bemerkbar machen, sollte man durch grosse Gaben von Tokayer oder Portwein (2stündlich einen Kinderlöffel voll), durch Moschus, Kampfer (F. 14), subcutane Injection von Aether sulphuricus, denselben entgegenzuwirken. Bei grosser Unruhe und Schlaflosigkeit wurde wiederholt Chinahydrat (1,0 bis 2,0 innerlich oder in Klystirform) mit Vortheil in Gebrauch gezogen, während Morphinum, innerlich oder subcutan applicirt (0,005 bis 0,01) milder sicher zu wirken schien. In allen Fällen, wo sich das Fieber bis in die zweite Woche hineinzog, gaben wir consequent ein Decoct. cort. Chinæ (F. 23) bis zur Berovalenscenz. Vor allem aber sorgen Sie dafür, dass die flüssige Diät noch eine volle Woche nach der gänzlichen Entfieberung beibehalten wird. Milch, Breie und Weiz müssen während dieser Zeit als Nahrung ausreichen.

Weder der Typhus exanthematicus, noch die Febris recurrens bieten im Kindesalter Eigenheiten dar, welche eine besondere Schilderung rechtfertigen dürften. Die früher in meiner Klinik vorgekommenen Fälle von Recurrens, 19 an der Zahl (seit dem Jahre 1873 sind nur vereinzelte Fälle hinzugekommen), wurden von Dr. Weissenberg im Jahrbuch f. Kinderheilk. N. F. Bd. VII. 1874 S. 1 zusammengestellt, und den sich speciell dafür interessirenden Leser darf ich auf diese sorgfältig angeführte Arbeit verweisen.

Auch das Wuchseffieber weicht bei Kindern, welche das zweite oder dritte Jahr überschritten haben, in keiner Weise von demjenigen der Erwachsenen ab. Nur in den beiden ersten Lebensjahren zeigt sich die Eigenheit, dass das Froststadium entweder durch einen convulsischen Anfall ersetzt wird, weit häufiger aber gänzlich fehlt, oder nur durch eine Kühle der Hände und Füsse und eine leichte

Cyatose angedeutet ist. Auch der Schweiß fehlt sehr häufig. Da von der Typus hier meistens eine Quotidiana ist, so kann das Fehlen des Froststadiums, der unvermittelte Eintritt der Hitze und das Ausbleiben des Schweißes leicht zur falschen Annahme eines remittirenden Fiebers verleiten, und erst die Anwendung des Chinins verräth dann die wahre Natur der Krankheit. Seit mehr als 20 Jahren hat übrigens die Zahl der intermittirenden Fälle sowohl bei Erwachsenen, wie bei Kindern, in Berlin in dem Grade abgenommen, dass ich das Ungenügende meines Beobachtungsmaterials ausdrücklich betonen muss. Einige Fälle von typischen Neurosen (Eklampsie, Torticollis) habe ich bereits früher mitgetheilt. Ich bemerke nur noch, dass ich das Chinin (muriaticum oder sulphuricum) auch Kindern zunächst immer in grossen Dosen (0,3 bis 0,5 am besten in einem halben Weinglase stark versüßter Citronenlimonade) ein paar Stunden vor dem zu erwartenden Anfall gebe, und nach dem Wegbleiben desselben das Mittel in kleineren Gaben (0,03 bis 0,06 2-mal täglich, mit Zucker oder Chocolate 1,0 versetzt) noch wenigstens 5 bis 6 Tage fortbrauchen lasse. Aber selbst dann wird man es häufig mit Recidiven zu thun bekommen, welche sich nicht immer durch erneute Einwirkung der Malaria erklären lassen. Die hypodermatische Anwendung des Chinins hat zwar den Vortheil, dass man mit einer geringeren Dosis auskommt, und die Kinder sich nicht gegen das Einnehmen des sehr bitteren Mittels sträuben, aber mit wenigen Ausnahmen waren die von mir versuchten Injectionen so schmerzhaft und reizend, dass ich zu denselben nur im Nothfall, wenn der innere Gebrauch durchaus nicht statthaft ist, zurückkehren würde.

Ich will bei dieser Gelegenheit einige Fälle gedenken, die mir hier in Berlin, und zwar in ganz verschiedenen Stadttheilen vorkamen, kaum anders als durch eine Malaria entstanden aufgefasst werden konnten, aber dem Chinin den hartnäckigsten Widerstand leisteten. Es handelte sich um zwei Kinder von 5 bis 8 Jahren, nur eins hatte das zweite Jahr noch nicht überschritten. Bei allen fanden tägliche Fieberanfälle von stundenlanger Dauer, gewöhnlich Nachmittags oder gegen Abend, statt, welche entweder sofort mit Hitze einsetzen oder nur durch eine schwach angekündete, sehr kurze Kälte eingeleitet wurden. Die Temperatur stieg in diesen Anfällen bis 39,5 und darüber, und war auch in der „fieberfreien“ Zeit nicht immer absolut normal. Abgesehen von diesen Anfällen befanden sich die Kinder wohl, wurden aber nach wochenlanger Dauer der Krankheit welk, blass und schwach. Trotz der genauesten und wiederholten Untersuchung aller Organe liess sich nicht der geringste Grund für das Fieber, nicht einmal eine Anschwellung der

Milz nachweisen, und der Verdacht einer schleichenden Endocarditis oder einer sich entwickelnden Miliartuberkulose machte sich um so stärker geltend, als die unehaltende Anwendung des Chinins in grossen und kleinen Dosen absolut erfolglos blieb. In einem dieser Fälle wurde auch die Untersuchung des Blutes vorgenommen, welche jedoch keine Abweichung von Normalzustand, insbesondere keine Leukämie oder Melaninurie ergab. Da nun die Affection sich viele Wochen ganz in derselben Weise hinstieg, am Herzen nichts Alarmer constatirt werden konnte, und auch die Idee einer Miliartuberkulose aufgegeben werden musste, so entfernte ich, die Annahme einer dauernden Malariawirkung festhaltend, diese Kinder aus Berlin und sah auch diesem Wohnungsverwechsel schnelle Heilung erfolgen. Um eine „Intermittensmalaria“ kann es sich bei diesen Kindern kaum gehandelt haben, weil diese dem Chinin wohl nicht in solcher Weise Trotz geboten hätte. Die Quelle der Malaria aber, welche vielleicht in der Wohnung lag, lässt sich um so weniger bestimmen, als kein anderes Familienmitglied ähnliche Erscheinungen darbot oder zu irgend einer Zeit an denselben gelitten hatte. Dennoch warne ich vor übereilter Annahme einer „Malariainfektion“ in ähnlichen Fällen, da ich nach sehr langer und von absolut freien Intervallen unterbrochener Dauer solcher Fieberanfälle die Kinder schliesslich doch an Tuberkulose im Grunde gehen sah.

Neunter Abschnitt.

Constitutionelle Krankheiten.

I. Der Rheumatismus.

Der acute Gelenkrheumatismus (Polyarthritidis acuta rheumatica), welcher jetzt vielfach der Gruppe der Infectiionskrankheiten zugezählt wird, kommt im Kindesalter keineswegs selten vor, unterscheidet sich aber von demjenigen der Erwachsenen eigentlich nur durch eine im Allgemeinen mildere Erscheinungsform. Sowohl die Localaffection, wie das begleitende Fieber, pflegen eine geringere Intensität darzustellen. Mit seltenen Ausnahmen ist die Zahl der ergriffenen Gelenke eine kleinere, die Anschwellung und Schmerzhaftigkeit geringer, und die Temperatur übersteigt an Durehschnitt nicht 39 bis 39,5. Auch die copiosen

Schweise und die Eruptionen der *Sudamina*, welche bei Erwachsenen fast nie fehlen, sah ich bei Kindern nur selten spontan, sondern gewöhnlich erst nach der Anwesenheit der Salicylsäure eintreten. Am häufigsten wurden die Fuss- und Kniegelenke, demnächst die Gelenke der oberen Extremitäten, auch diejenigen der Fingerphalangen und der Metacarpalknochen befallen, wobei die Finger und der Handrücken bisweilen eine leichte oedematöse Anschwellung zeigten. Nur in einem Falle sah ich beide Hüftgelenke schmerzhaft und fast unbeweglich werden. Bei einem 5-jährigen Mädchen schwellen fast gleichzeitig beide Fuss- und Handgelenke und das rechte Kniegelenk an, und die bedeckende Haut zeigt eine Röthe, welche sonst immer fehlte, und nur über den geschwellenen Fingergelenken bisweilen beobachtet wurde. Das Ueberspringen der Affection von einem Gelenk auf das andere, sowie das Zurückspringen auf ein bereits frei gewordenes Gelenk kam wiederholt vor, wodurch der Verlauf der Krankheit, welcher gewöhnlich 8 bis 10 Tage betrug, wie bei Erwachsenen auf 2 bis 4 Wochen ausgedehnt wurde. Dabei wurden aber die späteren Nachschübe der Gelenkaffection immer schwächer und kürzer, ebenso das begleitende Fieber, welches im weiteren Verlaufe nur mässige Temperatursteigerungen (38,2) und dazwischen wohl vollständige Intermissionen in den Morgenstunden zeigte. Einzelne Kinder klagten auch über Schmerzen im Nacken bei den Bewegungen des Kopfes oder über Schmerzen im Leibe mit Druckempfindlichkeit des Abdomens; bei anderen fand gleichzeitig eine *Aegina tonsillaris* mit mässigen Schlingbeschwerden statt.

Die meisten Fälle von acuten Rheumatismen, welche nur bei Kindern vorkamen, betrafen das Alter zwischen 9 und 15 Jahren. Weit seltener sah ich jüngere Kinder von 5—8 Jahren, oder gar noch kleinere befallen werden, wovon ich bereits früher¹⁾ ein paar Fälle mittheilte. Der eine betraf ein erst 10 Monate altes Kind, bei welchem die Erscheinungen der acuten rheumatischen Polyarthrits (Fieber, schmerzhafte Anschwellung und Unbeweglichkeit des rechten Hand- und Ellenbogens, sowie des linken Fuss- und Kniegelenkes) mit einer Bronchopneumonie und wahrscheinlich auch mit linksseitiger Pleunitis complurirt waren. Nach einer Dauer von 4—5 Wochen konnte bei passiver Bewegung des rechten Ellenbogengelenkes noch längere Zeit eine Art von Crepitation (Rauigkeit der Gelenkflächen) wahrgenommen werden, und noch während der Abnahme der Gelenkaffection bildete sich eine Härte und Contractur der Adductoren des Oberschenkels aus, welche erst nach drei

¹⁾ Beiträge zur Kinderheilk. N. F. S. 241.

Wochen langsam verschwand und wahrscheinlich als die Folge einer *Myositis rheumatica* zu betrachten war¹⁾.

Die hier beobachtete Complication mit Pneumonie und Pleuritis, welche bereits in einem früher (S. 416) mitgetheilten Falle beobachtet wurde, steht jedoch an Frequenz weit hinter der Endocarditis zurück, mag diese nun für sich allein oder mit Pericarditis verbunden auftreten. Ja nach dem, was ich selbst gesehen, möchte ich fast annehmen, dass diese Complication bei Kindern noch viel häufiger vorkommt, als bei Erwachsenen. Selbst in Fällen, wo nur ein Gelenk, z. B. das Knie, ergriffen war, wurde Endocarditis beobachtet. Indem ich Sie auf meine früheren Mittheilungen über diese Complicationen (S. 411) verweise, will ich hier nur darauf zurückkommen, dass alle localen Symptome, namentlich stechende Schmerzen in der Herzgegend, welche beim Druck und Percussion zunehmen und sogar schlafraubend werden können, ferner Dyspnoe, Unregelmässigkeit des Pulses und gesteigertes Fieber nur in dem kleinsten Theil der Fälle vorhanden sind. Häufiger verläuft die Endocarditis, ja selbst eine leichte Pericarditis, latent, und nur die locale Untersuchung lässt sie erkennen. Wiederholt hatte ich auch Gelegenheit, bei Kindern mit alten Klappenfehlern unter dem Einfluss eines neuen Gelenkrheumatismus eine frische Entzündung an der erkrankten Klappe (Endocarditis recurrens) zu beobachten, wofür ausser den früher (S. 413) mitgetheilten noch der folgende Fall als Beispiel anzuführen ist:

Kartha Sch., 11 Jahre alt. Vor einem Jahre acuter Gelenkrheumatismus, nach dessen Ablauf in der Poliklinik eine Infection der Mitralklappe constatirt wurde. Am 4. Juni 1877 von neuem mit rheumatischer Schwellung beider Kniegelenke aufgenommen. T. 38,6; P. 140, Mein. Dyspnoe, R. 40. Nite schläft 2/3, hohes Fortdauern des Fiebers (38,2 bis 39,4) innerhalb in den nächsten Tagen heftige Schmerzen in der Herzgegend, während die Gelenksentzündung der Knie sich zurückbildete und auf kein anderes Gelenk überging. Die Beklemmung wurde schlafraubend, Druck und Percussion der Herzgegend sehr empfindlich, R. 52—65, P. 144. Das systolische Geräusch an der Spitze bedeutend stärker, am 8. nach dralligem pericardialis hritus, welches beiden Tönen nachschlug, nach noch längerer Expector. am 12. noch hörbar war und erst am 23. verschwand. In Folge einer orthopedischen Behandlung (6 heftige Schlägköpfe, Knebel, Calmar (0,00), graue Salbe, Volvular) Heilung der frischen Peri-Endocarditis. Nachschütt der Schmerzen zwischen dem 24. und 29. erlebten wiederum die Application von Eisbädern. Am 14. Juli mit dem alten Herdellen erkranken. Dämpfung des rechten Sternumrand um 1 Ctm. überschritten.

¹⁾ Verschiedene in der Literatur mitgetheilte Fälle von zweiten Übermalungen bei Kindern in den ersten Wochen und Monaten des Lebens scheinen mir die einer strengen Kritik nicht Stand zu halten, vielmehr auf eine Verwechslung mit Syphilis der Epiphyen, mit multipler Peritonitis des Gelenkboden zu beruhen.

Auf die Beziehungen des acuten Rheumatismus zur Chorea, von denen (S. 184) bereits die Rede war, brauche ich hier nicht zurückzukommen. Ich füge nur hinzu, dass der sogenannte Rheumatismus cerebialis, wie er bisweilen bei Erwachsenen und auch von einigen Autoren (Picot, Rager) bei Kindern beobachtet wurde, mir bis jetzt nur in einem Falle vorgekommen ist, in welchem gleichzeitig Chorea auftrat und der Tod an Pericarditis erfolgte. Ob aber, wie Rager annimmt, alle Fälle von Rheumatismus cerebialis bei Kindern mit Chorea verbunden sind, wage ich nicht zu beurtheilen.

Unter den Muskeln, welche bei Kindern vom Rheumatismus befallen werden, stehen die Hals- und Nackenmuskeln obenan. Zwar dürfen Sie nicht jede Nackensteifigkeit oder jedes Caput obstipum eines Kindes sofort als eine rheumatische Affection betrachten, müssen vielmehr immer daran denken, dass auch ernstere Leiden, besonders Spondylitis der Cervicalwirbel oder selbst meningitische Zustände dies Symptomen erzeugen können¹⁾. Immerhin aber kommen nicht selten Fälle von Caput obstipum bei Kindern vor, in welchen eine anhaltende Contractur der seitlichen Halsmuskeln mit Bestimmtheit auf eine Erkältung zurückzuführen oder wenigstens keine andere Ursache aufzufinden ist, und der Gebrauch des Jodkali, warmer Kataplasmen und Frictionen, oder der elektrische Strom bald Heilung bewirkt. Bei zwei Kindern im Alter von 12 und 15 Monaten complicirte sich diese rheumatische Contractur der Hals- und Nackenmuskeln mit Bronchopneumonie, und es fehlt in der Literatur (Picot) auch nicht an Beispielen, in welchen ein solches Caput obstipum, ebenso wie der acute Gelenkrheumatismus, Chorea zur Folge hatte. Seltener werden andere Muskelgruppen von schmerzhaften rheumatischen Contracturen befallen, z. B. die Abductoren des Oberschenkels, wie in dem S. 414 und 524 mitgetheilten Fällen. Selbst bei kleinen Kindern, welche noch nicht sprechen können, beobachtete ich ein paar Mal Erscheinungen, die ich nicht anders als durch Muskelrheuma bedingt erklären kann. Diese Kinder, welche bis dahin vollkommen gesund waren, wollten plötzlich eine untere oder obere Extremität nicht mehr gebrauchen; Druck und passive Bewegung derselben waren schmerzhaft, erregten sofort heftiges Geschrei, und bisweilen zeigten sich auch leichte Ödeme des Hand- oder Fußrückens. Die Gelenke selbst blieben dabei ganz frei, doch sprang das Leiden zuweilen von einer Muskelpartie

¹⁾ Vergl. auch den Fall von intermittirendem Caput obstipum S. 171 und eine Beschreibung von iris spaltlicher Contractur der Halsmuskeln in meinem Beitr. zur Kinderheilk., S. 24.

schnell auf die andere über, machte auch wohl freie Intervalle und trat dann plötzlich von neuem auf. Durch Ruhe im Bett und Watterwicklung der betroffenen Theile erfolgte baldige Heilung dieser Affection. Ein, wenn sie eine untere Extremität befiel, zuerst den Verlaufs einer legitimalen Coxitis erwecken konnte. Mitunter wird auch das Perineum in sehr heftiger Weise befallen. Bei zwei Mädchen im Alter von 10 und 12 Jahren, welche mit nackten Füßen auf dem kalten Fußboden gegangen waren, wurde das Perineum des Os humeri der Sitz so gewaltiger Schmerzen, dass jeder Bewegungsversuch und Druck auf den geschwellenen Knochen unerträglich war, und da auch Fieber sich hinzugesellte, die Befürchtung einer acuten Osteomyelitis nahe lag. In beiden Fällen aber brachte das Jodkali schon nach wenigen Tagen Erleichterung und bald auch Heilung zu Stande.

Nach dem Ablauf des acuten Rheumatismus, einmal des articularen, befallten die Kinder eine grosse Tendenz zu Recidiven, welche sich mehrere Jahre hintereinander wiederholen können, die schon bestehenden Klappenfehler steigern und nicht selten Recidive der Chorea im Gefolge haben. Oefters sah ich auch noch Wochen und Monate lang nach der Heilung der acuten Affection rasch Gelenkschmerzen von Zeit zu Zeit wiederkehren, welche mit einem leichten Oedem der Gelenkumgebung verbunden sein können, oder es kommt auch zu schwachen feberhaften Nachschüben. Nur einmal, bei einem 10jährigen Mädchen, bildete sich im Kniegelenk ein Hydarthrus, welcher eine längere Behandlung erforderte:

Maria K., aufgenommen am 12. Oct. 1870, zeigte die Symptome einer starken Flüssigkeitsanhäufung im linken Kniegelenk, starke Anschwellung, versteiften Oontour, taubende Patella. Vor 14 Tagen waren heftige Schmerzen im linken Knie mit Anschwellung des Kniegelenkes und von Fieber begleitet eingetreten. Einige Tage darauf auch Schmerz und Unbeweglichkeit im Hüftgelenk. Dann plötzliches Verschwinden der Schmerzen aus dem Hüftgelenk, und dafür Schmerz und Anschwellung im linken Knie, welche sich bis jetzt nicht gemindert hatten. Sonst völlige Euphorie, kein Fieber. Therapie: Anhaltendes Liegen im Bett, Eisblase auf das Knie. Vom 15. an, nachdem der Schmerz ganz aufgehört hatte, Auflösung von Jodlinctur, welche eine ungewöhnlich starke Hautreizung mit Blasenbildung hervorrief. Am 27. Nov. vollkommen geheilt entlassen. —

Viel seltener als dem acuten, begegnen wir bei Kindern dem chronischen Rheumatismus, dessen exquisite Formen man in der That nur ausnahmsweise beobachtet. Jeu permanenten Veränderungen der Gelenke und sehnigen Apparate, wie wir sie bei Erwachsenen in der Form des „nodösen“ Rheumatismus so häufig antreffen, kamen mir im Kindesalter nur sehr vereinzelt vor.

Knabe von 14 Jahren, am 30. Dec. 1864 in der Poliklinik vorgestellt. Seit 6 Jahren heftige rezidirende Schmerzen an Händen und Füßen. Rheumatismus acutus soll nicht vorausgegangen sein. An der linken Hand fast vollständige Ankylose und knieartige Anschwellung des Gelenks zwischen dem ersten und zweiten Phalangen des Daumens, des Zeige- und Mittelfingers; rechts denselben, etwas weniger entwickelten Versteifungen am Zeige-, Mittel- und Ringfinger. Anschwellung und Empfindlichkeit einiger Metacarpalnochen. Am linken Fuße ähnliche Alterationen der Gelenke des grossen und 4. Zehs. Palpitationen und Dyspnoe ohne abnorme Untersuchungsergebnisse. Weiterer Verlauf unbekannt. Ganz ähnlich war der zweite, einem 13jährige Knabe betreffende Fall, welchen ich nur einmal in meiner Sprechstunde zu sehen bekam.

Häufiger sieht man bei Kindern nach einem oder wiederholten Anfällen von acutem Gelenkrheumatismus schmerzhaft Anschwellungen und Steifigkeit verschiedener Gelenke zurückbleiben, welche Monate und Jahre den bewährtesten Mitteln Trotz bieten:

Bei einem 7jährigen Knaben, welcher im Frühjahr 1876 einen acuten Gelenkrheumatismus, namentlich der Fingergelenke, überstanden hatte, waren diese noch im October so unbeweglich, dass man eine Paraplegie angenommen hatte. Die Untersuchung ergab jedoch, dass von einer solchen nicht die Rede war; vielmehr handelte es sich um eine permanente mässige Schwellung und grosse Empfindlichkeit der Gelenke, besonders aber des Pericapsa beider Calcanei und der Plantarapponurose, welche den Knaben verhielt, die Schritte fest auf dem Boden zu setzen. Heilung durch Monate lang fortgesetzten Gebrauch von Jodkali.

Helene G., 12 Jahre alt, hatte vor Jahresfrist an einem acuten Gelenkrheumatismus gelitten und klagte seitdem anhaltend über Schmerzen in beiden Hand- und Fingergelenken. Bei der Aufnahme in die Klinik (17. März 1881) fanden wir beide Fuss- und Kniegelenke, beide Ellenbogen- und Schultergelenke, so wie das Hand- und die Fingergelenke intermetatarsal geschwollen, schmerzhaft und schwer beweglich. Fieber fehlte durchaus. Ther. Jodkali und warme Bäder. Schnelle Besserung. Pat. verlässt am 3. April das Bett und klagt nur noch über Steifigkeit der Fingergelenke beim Gehen. Anfangs Mai von neuem schmerzhaften Anschwellung der Hand- und Fingergelenke, die mit abwechselnder Besserung und Verschlimmerung, bisweilen auch von leichten Fieberbewegungen begleitet, viele Monate lang fortbestanden und trotz der consequenten Anwendung von Jodkali, Bädern und Aufbinderungen noch jetzt (März 1885) nur theilweise beseitigt sind. Lange Zeit waren die betreffenden Gelenke so gut wie ankylosirt, und erst eine beharrlich ausgeführte Massage hat seit einigen Monaten eine erhebliche Besserung der Beweglichkeit, namentlich der Handgelenke, herbeigeführt. Diese Behandlung wird noch jetzt fortgesetzt.

Bei dieser Patientin zeigte sich ausser auch eine Erscheinung, auf welche Maynet¹⁾, später Rehn²⁾ und Hirschsprung³⁾ die Aufmerk-

¹⁾ Lyon médical 1875, No. 49.

²⁾ Guchardt's Handb. d. Kinderkrankh. 1878.

³⁾ Jahrb. f. Kinderkrankh. Bd. XVI, Heft 2 u. 4.

samkeit gelenkt haben, und welche ich schon in der ersten Auflage dieser Vorlesungen (S. 683) unter der nicht völlig zutreffenden Bezeichnung „Exostose“ beschrieben habe. Der betreffende Fall, der schon aus dem Jahre 1870 stammt, ist der folgende:

Anna M., 14 Jahre alt, erschien am 31. Januar 1876 in meiner Sprechstunde, innerhalb der beiden letzten Jahre zwei Anfälle von acutem Gelenkrheumatismus. Inofficiere der Mitralklappe mit bedeutender Hypertrophie und Dilatation des Herzens. Etwa 6–8 Wachen nach den recidivirenden Anfällen entstanden jeftweise eburnöse tauberrigose Exostosen, zuerst an den Proc. styloidei beider Ulnae, dann am Rande des Kniegelenkes, Anfangs rundlich, weich und empfindlich, wurden sie allmählig fest, unempfindlich und zugespitzt. Die Zahl der Exostosen war sehr erheblich, und in der letzten Zeit hatte sich auch eine ähnliche Knochenbildung in der linken Apophyse palmaris gebildet.

Dieselben knötchenartigen Neubildungen fanden sich nur auch bei der Hebe G. (S. 728) am 10. Juli 1881 an beiden Ellenbogen oberhalb des Olecranon, ferner an beiden Handgelenken auf der Dorsalfäche nach innen vom Proc. styloid. ulnae, endlich am rechten Sternoclaviculargelenke da, wo die Apophyse des Sternomastoides auf das Manubrium sterni übergeht. Die Knötchen von der Grösse einer kleinen Erbse, waren leicht verschiebbar und ein wenig empfindlich. Unter einer Behandlung mit *Natrum salicylicum* schwanden bis zum 9. August die leichten Fieberbewegungen vollständig, und wir konnten nun constatiren, dass das Knötchen am rechten Ellenbogen vollständig verschwunden war. Allmählig wurden auch die übrigen Knötchen kleiner und flacher, und verschwanden im Verlaufe des Herbstes spurlos, sind auch bis jetzt noch nicht wieder sichtbar geworden. Noch interessanter wegen der anatomischen Untersuchung ist der folgende Fall¹⁾

Augusta W., 12jährig, aufgenommen am 4. April 1881. Untersuchung ergiebt eine Inofficiere der Mitralklappe mit Hypertrophie des rechten Ventrikels. In anatomischer Hinsicht war nichts zu ermitteln. An einzelnen Gelenken, zumeist an den Sehneninsertionen fühlte man kleine diffuse elastische Verdickungen, welche nicht empfindlich sind, so besonders an beiden Kniegelenken im Ansatz des M. quadriceps an dem oberen Rande der Patella, und an beiden Handgelenken oberhalb des Proc. styloid. ulnae. Am 19. April unter heftigen Fieber befiel sie Schmerzen in beiden Handgelenken, welche bedeutend geschwollen und schmerzhaft wurden; dabei Kopfschmerz, Schwindel, vermehrte Heraktion, Stiche in der Herzgegend, trübes Oedem des Gesichts und der Unterschenkel. Am 29. Mai, als Pat. das Bett wieder verlassen konnte, hatten sich in diffusen Verdickungen an den Kniegelenken an knorpelartigen resistenter Knötchen ausgebildet; ganz ähnliche konnten manmehr an beiden Waden erheben, am rechten Ellenbogen oberhalb des Olecranon, an beiden Spinae iliacae sup. post., endlich am rechten Schall-

¹⁾ G. Mayer, Berl. klin. Wochenschr. 1882, No. 31.

glenk außerhalb des Ansatzes der Clavicula gefühlt werden. Dieselben waren nur wenig empfindlich und etwas verschiebbar. Nach dem am 7. Juli unter den Erscheinungen allgemeiner Wassersucht erfolgten Tode, ergab die von Dr. Grauert ausgeführte Section (ausser dem Herzleiden und seinem Folgen) an dem Stellen, wo man die Knöchelchen gefühlt hatte, viele Tanssen von einem Knochengerüst und deutlich dörfer Consistenz. Sie saßen auf den Aponeurosen der Sehnen und bestanden, wie das Mikroskop zeigte, hauptsächlich aus fibrösem Gewebe mit faserknorpeligen Einsprengungen. Nicht alle Knöchelchen hatten übrigens die gleiche Structur. In des einen prävalirte das Binde-, in dem andern das knorpelige Gewebe, und das Knöchelchen an der Clavicula war sogar durch eingesprengte Kalkmasse knochenhart geworden. Die an der Patella fühlbar gewesenen Knöchelchen waren spärlich vorhanden.

Auch in einem Falle von Hirschsprung ergab die anatomische Untersuchung der Knöchelchen eine Bindegewebsbildung, und man kann daher diese als das Product eines durch den acuten Rheumatismus der Gelenke in den Ansatzstellen der Sehnen angefaßten Entzündungsprocesses ansehen. Durch eine regressive Metamorphose (Verfettung) können diese Producte, wie meine Fälle und ein anderer von Hirschsprung lehren, zur Resorption und zum Verschwinden gebracht werden, während andererseits durch Verkalkung knochenartige Bildungen entstehen können. Aber nicht bloss die Muskelsehnen und Aponeurosen können die Keimstätte dieser entzündlichen Producte werden; vielmehr scheint auch das Periost und Perichondrium diese Wucherungen produciren zu können. Der in meinem letzten Falle an der Clavicula befindliche Knoten war fest mit derselben verbunden und als eine wahre Exostase anzusehen, ebenso wie am Caputulum der rechten Ulna festhaltender harter erbsengrosser Auswuchs. In diese Kategorie gehört auch der von Ebert¹⁾ und Virchow²⁾ mitgetheilte Fall eines 10jährigen Knaben, bei welchem sich in Folge wiederholter Anfälle von acutem Gelenkrheumatismus an den Gelenkenden zahlreicher Röhrenknochen, aber auch an anderen Theilen des Skeletts zahlreiche Hyper- und Exostosen gebildet hatten. Bemerkenswerth ist, dass alle diese Dinge bisjetzt nur bei Kindern vom 3. bis zum 14. Lebensjahre beobachtet wurden. Fortgesetzte Untersuchungen müssen ergeben, ob sie auch bei Erwachsenen in Folge der Polyarthrits rheumatica auftreten können.

Von diesen „rheumatischen Fibromen und Osteomen“ hat man eine andere Art multipler Exostosen zu unterscheiden, welche nicht ganz selten bei Kindern vorkommt, und für welche sich entweder gar keine

¹⁾ Deutsche Klinik. 1862. Nr. 3.

²⁾ Die krankhaften Geschwülste. Bd. II. S. 83.

Ursache oder eine hereditäre Disposition nachweisen lässt, ähnlich wie bei den in unserer Zeit viel erwähnten Neurofibromen der Haut.

10jähriger Knabe, am 21. Nov. 1880 vorgestellt, gesund. Seit dem dritten Lebensjahre Bildung stielcher ansehnlicher, runder oder kegelförmiger Exostosen an den Epiphysen des rechten Radius, der linken Ulna, der 9. linken Rippe, an der Spina beider Schulterblätter und am inneren Condylus des rechten Humerus. Keine Hirschkall.

2jähriger Knabe, am 10. Jan. 1882 vorgestellt. Seit dem zweiten Jahre Exostosen an mehreren Rippenepiphysen, in den letzten Jahren auch an beiden Ulnae und am unteren Theil der linken Femur. Letztere konnten wegen ihrer Grösse und hakenförmigen Gestalt leicht durch die Hosen gefasst werden. Bei der Grossmutter sollen ebenfalls kleine Exostosen vorhanden gewesen sein. Auch ein 7jähriges Mädchen (vorgestellt am 7. Febr. 1874) zeigle, wie ein Vater, an verschiedenen Knochen, besonders an den Epiphysen, zahlreiche auf beiden Seiten ziemlich symmetrische Exostosen.

Am merkwürdigsten war der Fall eines Knaben, welcher, ohne dass sich eine hereditäre Anlage nachweisen liess, zahllose Exostosen fast an allen Knochen darbot, und aber völlig gesund war und nurmehr an einem kräftigen Hingling betheiligte war. Hier ging die Bildung und das Wachsthum mehrerer Exostosen wiederholt unter meinen Augen vor sich, war also mit dem Alter der Patientin völlig abgeschlossen.

Mit dieser Exostosenbildung verbindet sich meistens eine Ossification der Sehnen und Muskeln, welche so hohe Grade erreichen kann, dass ein grosser Theil des Muskul- und Sehnenapparats in eine starre Knochenmasse verwandelt, und fast jede Bewegung des Körpers unmöglich gemacht wird. Gerade zu der Zeit, als ich die Direction der Kinderklinik in der Charité übernahm, befand sich in derselben ein 12jähriges Mädchen, dessen Krankengeschichte mir leider abhanden gekommen ist, die aber eines der merkwürdigsten Beispiele dieser fast allgemeinen Muskel- und Sehnenverknocherung darbot, und bei welcher, so viel ich mich erinnere, ein Zusammenhang mit Rheumatismus nicht nachzuweisen war. In einzelnen Fällen [Skinner¹⁾] soll jede Contusion unter Fieber und Schmerz eine solche Knochenbildung in den Muskeln zu Stande gebracht haben.

In Betreff der Behandlung des Rheumatismus habe ich nichts hinzuzufügen. In den acuten Fällen bedienten wir uns, wie bei Erwachsenen und mit demselben günstigen Erfolge, entweder der Salicylsäure 0,2 bis 0,3 zweistündlich in Oblaten, oder noch häufiger des Natr. salicylicum [5/120, zweistündlich einen Kinderlöffel²⁾], in den chronischen Fällen vorzugsweise des Kali hydrojodicum.

¹⁾ Bancroft, *Medicine des enfants*, p. 303.

²⁾ Auf gewisse Veränderungen der äusseren Haut, welche gewisser in Os-

II. Die Anämie.

Die Verminderung der rothen Blutkörperchen und des Hämoglobulins, welche wir mit dem Namen „Anämie“ bezeichnen, kommt im kindlichen Alter ausserordentlich häufig, besonders im Gefolge aller mit Säftverlusten verbundener Krankheiten vor. Kinder, welche an chronischen Diarrhöen, an weitverbreiteter Tuberkulose, an Nephritis scarlatinosa leiden, sind durchweg anämisch. Aber auch solche, die in Folge mangelhafter Ernährung atrophisch werden, in überfüllten Wohnräumen oder in fruchtloser Kellerrluft leben, zeigen in ihrem Aeusseren die Züge dieser Verarmung des Blutes. Von allen diesen Fällen, in welchen die Anämie nur eine secundäre Bedeutung hat, soll hier nicht weiter die Rede sein, vielmehr nur von derjenigen Form, welche sich bei sonst gesunden Kindern entwickelt und im Allgemeinen dieselben Erscheinungen darbietet, wie die Chlorose der Pubertätsjahre. Man beobachtet diese Art der Anämie durchaus nicht selten schon bei 8—10jährigen Kindern, und fast ebenso häufig bei Knaben wie bei Mädchen. Jeder Arzt kennt diese Fälle, welche ihm von den besorgten Eltern mit der Angabe vorgestellt werden, dass den Kindern weiter nichts fehle, als die gesunde Farbe. Das „grüne“ Aussehen (ein beliebter Berliner Ausdruck) erweckt lebhafteste Bedürfnisse, und dennoch ergiebt die ärztliche Untersuchung fast aller dieser Kinder nichts, was dieselben rechtfertigen könnte. Auch stimmt die gelblich blasse Farbe der äusseren Haut nicht immer mit einer gleichen Entfärbung der sichtbaren Schleimhäute überein, welche dabei noch leichlich geröthet erscheinen können. Alle diese Kinder zeigen eine in diesem Alter ungewöhnliche Schläffheit, leichte Ermüdung, geistige Verstimmung oder erhöhte nervöse Reizbarkeit, oft auch ein Daniederliegen des Appetits, besonders auf Fleischspeisen, während die bekannte Pica der Chlorotischen hier fast niemals vorkommt. Ueber schmerzhafte Empfindungen in der Magenregion oder in den Interkostalräumen wird häufig geklagt, ohne dass sich materielle Ursachen dieser Klagen nachweisen lassen. Das anämische Verengeräusch am Halse ist häufig, aber nicht constant vorhanden, und verhält sich in jeder Beziehung wie bei Chlorotischen, d. h. es zeigt sich vorzugsweise oder ausschliesslich auf der rechten Seite des Halses, steigert sich erheblich durch Drehung desselben nach der linken Seite und durch den Druck des Stethoskops, und wird hiezuweilen auch am obersten Theil des

folgt rheumatischer Affectionen anfallen, werde ich bei der Betrachtung der Purpura zurückkommen.

rechten Sternumraumes im Verlaufe der Vena jugularis communis als ein dumpf aus der Tiefe heraufsteigendes Rauschen gehört. Eine diagnostische Bedeutung aber hat dies Geräusch für mich nur dann, wenn es auch bei völlig gerader Haltung des Kopfes hörbar ist, da die Drehung nach links auch bei gesunden Menschen durch den Muskelruck ein analoges Geräusch erzeugen kann. Abnorme Geräusche am Herzen selbst konnte ich nie wahrnehmen, sobald ich nur die Vorsicht gebräuchte, das Stethoscop lose aufzusetzen; denn jeder stärkere Druck desselben auf die Rippenknorpel kann allerdings sofort den ersten Ton rein oder geräuschartig machen, und zwar, wie mir schien, bei Kindern noch leichter, als bei gesunden Kindern.

Die Theilnahme des Nervensystems giebt sich hier sehr oft durch Anfälle von Kopfschmerzen, seltener durch Schwindel oder Flimmern vor den Augen kund, wovon schon oben bei der Schilderung der Migräne und ihrer Beziehungen zu übermässiger Geistesarbeit die Rede war (S. 298). Dass aber auf solcher Grundlage auch reinere Neurosen (Chorea, Hysterie, kataleptische Zustände) sich ausbilden können, wurde bereits wiederholt hervorgehoben.

Fast alle diese Kinder hatten, ehe sie in meine Behandlung kamen, schon viel Eisen ohne nachhaltigen Nutzen verbraucht, weil die meiste Ansicht nach häufigste Ursache des Leidens, der anhaltende Aufenthalt in der verdorbenen Atmosphäre der grossen Stadt, besonders in den überfüllten Schulzimmern, und die geistige Ueberanstrengung sich nur selten beseitigen lässt. Gegen diese Quellen der künftlichen Anämie gilt es zu kämpfen, und das jetzt in verschiedenen Städten in's Werk gesetzte Plan, auch den unbemittelten Kindern während der Schulferien einen Landaufenthalt zu verschaffen, ist wenigstens als ein Versuch, das Uebel zu lindern, im hohen Grade dankenswerth. Am meisten empfiehlt es sich da, wo die Verhältnisse es gestatten, die betreffenden Kinder gänzlich aus der Stadt zu entfernen und in ländlichen, schön gelegenen Pensionaten oder Gynnasien ausbilden zu lassen, da mit dem üblichen mehrwöchentlichen Ferientaufenthalt an der See oder im Gebirge in der Regel nur wenig erreicht wird. Macht der höhere Grad der Anämie eine Brunnen- oder Badecur nothwendig, so ergoet sich zu diesem Zweck am besten die Eisenquellen von Elster, Franzensbad (zamal bei dyspeptischer Complication), Pyrmont, Driburg, Schwalbach u. s. w., wo es aber auf die Kosten der Reise nicht ankommt, besonders Tarasp oder St. Moritz im Engadin, welche wegen ihrer hohen Gebirgslage für schwache Naturen sehr zu empfehlen sind. Ich kann Ihnen aus wiederholter eigener Erfahrung diese Curorte schon für Kinder vom 7. – 8. Jahre an empfehlen.

Die freie Lage von St. Moritz, welche den Sonnenstrahlen überall freien Zutritt gewährt, ist den Lichtbedürftigen namentlichen Kindern zuträglich, als manche „waldeshütige“ Bergregionen, welche als schattenspendende Sommerfrischen aufgesucht werden. Dagegen halte ich den von Vielen gerühmten Aufenthalt an der Seeküste immer für einen zweifelhaften Versuch. Während er in einem Theil der Fälle einen entschieden günstigen Einfluss übt, bleibt er bei vielen anderen erfolglos oder wirkt, besonders wenn man die ängstlichen Kinder mit Strenge ins Bad treibt, sogar nachtheilig, und ich ziehe deshalb immer einen hochgelegenen, der Sonne zugänglichen Gebirgsort vor. Auch die viel gebräuchten kalten Abreibungen werden von manchen Kindern ebenso wenig getragen, wie die kalten See- oder Flussbäder, und ich glaube, dass diese allgemeine verbreitete Verordnung mehr auf Tradition und dem Streben, doch irgend etwas zu thun, beruht, als auf der Beobachtung wirklicher Erfolge.

Auch für den inneren Gebrauch des Eisens in der Heimath eignen sich die natürlichen oder künstlichen Mineralwässer (Spa, Schwalbach, Pyrmont u. s. w.) mehr, als die künstlichen Eisenpräparate, weil sie nur sehr geringe Dosen des Eisens enthalten und leichter verdaulich sind. Die schwärzliche Farbe, welche der Stuhlgang oft während des Eisengebrauchs annimmt, bekundet immer, dass ein Theil des genommenen Metalls nicht resorbiert, sondern als Schwefeleisen wieder aus dem Darmkanal entfernt wird, und enthält daher eine Aufforderung, die Dosis zu vermindern. Ob Sie unter den künstlichen Präparaten *Ferrum reductum*, *lactosum*, *dialysatum* oder die *Eisentincturen* wählen, scheint mir ziemlich gleichgültig zu sein; die Hauptsache bleibt immer die kleine Dosis (0,08 bis höchstens 0,16 der festen Präparate, 8–12 gtt. der Tincturen 2–3mal täglich) und der Monate lang fortgesetzte Gebrauch. Um die Zähne vor dem Schwarzwerden zu bewahren, giebt man die genannten Mittel am besten in Pillenform, welche indess nur bei älteren Kindern anwendbar ist. In einer Reihe von Fällen, welche dem Eisen hartnäckig widerstanden, oder wo dasselbe nicht getragen wurde, habe ich vom Arsenik (als *Solut. Fowleri*, F. 11) entschieden günstige Erfolge gesehen, und rathe Ihnen deshalb, sobald nur der Zustand des Magens es gestattet, einen Versuch mit diesem Mittel zu machen.

III. Die Purpura.

Unter diesem Namen werden verschiedene ihrem eigentlichen Wesen nach unbekannte krankhafte Zustände zusammengelassen, welche die Eigenschaft mit einander gemein haben, Blutungen in der Haut, den serösen-

und Schleimhäuten, ja selbst im Parenchym der Organe hervorzubringen. Diese Blutungen erfolgen hier meistens spontan, ohne äussere Veranlassung, nicht wie bei der angeborenen hämorrhagischen Diathese, der sogenannten Bluterkrankheit, hauptsächlich nach Verletzungen der Haut oder der Schleimhäute.

Dass man gerade bei Kindern, zumal in der Armen- und Hospitalpraxis, recht sorgfältig untersuchen muss, um nicht Flohstiche, deren Resultat in der Form kleiner, oft über den ganzen Körper verbreiteter Petechien erscheinen, mit wirklichen Purpuraflecken zu verwechseln, wurde schon an einer früheren Stelle erwähnt. Insbesondere bei Infektionskrankheiten (Typhus, Scharlach) war ich öfters in Zweifel, ob die bei der Aufnahme der Kinder sichtbaren Blutflecken von Flohstichen herulieten oder der Krankheit selbst angehörten, da, wie Sie sich eräuern werden, auch wirkliche Petechien und grössere Hämorrhagien der Haut im Gefolge infectiöser Prozesse, einer Endocarditis oder septischer Vorgänge auftreten können. Deshalb versäumen Sie bei fieberhafter Purpura mit, das Herz zu untersuchen. In einem Fall von Endocarditis nach Scharlach, welcher nicht einmal deutliche Aortenräsche, sondern nur einen unreinen ersten Herzton darbot, stellte ich besonders auf Grund einer ziemlich ausgedehnten Purpura die Diagnose, welche durch die Section bestätigt wurde.

An dieser Stelle soll indess nur von denjenigen Blutungen die Rede sein, welche abhängig von einem fieberhaften Allgemeineiden oder von Endocarditis in Form einer selbstständigen Erkrankung auftreten, und wenn sie die Haut allein betreffen, als *Purpura simplex*, wenn sie aber mit Schleimhautblutungen verbunden sind, als *Purpura hämorrhagica* oder *Morbus maculosus* beschrieben werden. Leider wissen wir von dem Wesen dieser krankhaften Zustände und selbst von den anatomischen Bedingungen der vielfachen Hämorrhagien so gut wie nichts. Die alte Ansicht, dass es sich hier um eine „Entmischung“ des Blutes handele, lässt sich weder durch die chemische, noch durch die mikroskopische Untersuchung desselben beweisen. In mehreren, allerdings leichten und schnell heilenden Fällen von *Morbus maculosus*, welche ich daraufhin untersuchte (in einem Fall hatte auch Herr Dr. Litten die Güte, die Untersuchung zu wiederholen), erschienen die rothen Blutkörperchen gross, prall gefüllt und in Bezug auf ihre Farbe und Anzahl in keiner Weise verändert. Kleine Formen (Mikrocythen) waren nur hier und da sichtbar und die Zahl der weissen Körperchen nicht bedeutender, als im Normalenstande. Ebenso wenig hat sich die frühere Anschauung von einer Abnahme oder verminderten Gerinnbarkeit des Faserstoffes be-

stätigt, und es lag daher nahe, statt des normal befindlichen Blutes die festen Theile, d. h. die kleinen Gefässe verantwortlich zu machen. Da die Blutungen sowohl durch Ruptur der Gefässe, wie auch durch ein erleichtertes Auswandern der rothen Körperchen aus den Gefässwänden zu Stande kommen können, so dachte man an eine abnorme Brüchigkeit der letzteren, und in der That wurden von verschiedenen Forschern (Hayem, Straganow u. A.) mikroskopische Veränderungen der kleinen Arterien und Capillargefässe beschrieben, welche ein solches Resultat herbeizuführen wohl im Stande wären. Wenn sich nun auch das Vorkommen solcher Veränderungen keineswegs in Abrede stellen lässt, so glaube ich doch, dass diese nur in schweren, tödtlich verlaufenden Fällen in Betracht zu ziehen sind. Bedenkt man nämlich, wie plötzlich der *Morbus maculosus* oft entsteht und wie rasch er wieder verschwinden kann, so erscheint hier die Annahme einer erheblichen Strukturveränderung der Gefässwände, welche dann ebenso schnell sich wieder zurückbilden müsste, kaum statthaft, und schon daraus ergibt sich, dass es sich hier um verschiedene Zustände handeln muss, die unter dem gemeinschaftlichen Namen „*Morbus maculosus*“ zusammengefasst werden. Die schwere, selbst lethally endende Form beruht vielleicht auf jenen Veränderungen der kleinen Gefässe, während in anderen leichten, bald heilenden Fällen an eine vasomotorische Neurose gedacht werden kann, welche durch paralytische Dilatation der kleinsten Gefässe eine Stauung des Blutes, Ruptur der Gefässwände oder Auswanderung rother Körperchen zur Folge hat. Das Hinzugesellen leichter Oedeme in einer Reihe von Fällen lässt sich ebenfalls für diese Hypothese geltend machen.

Die einfache Purpura, bei welcher also Blutungen aus den Schleimhäuten fehlen, kommt hiaweilen bei schlecht genährten, in dumpfigen Kellern lebenden anämischen und rachitischen Kindern vor. Häufiger erscheint sie in Verbindung mit Leukämie und Milztumoren (S. 533). Die Blutflecken sind hier fast immer nur vereinzelt und höchstens linsengross. Am häufigsten aber und zugleich viel reichlicher beobachtet man diese Purpura bei Kindern, welche gleichzeitig über Schmerzen in den Gliedern, besonders in verschiedenen Gelenken klagen, auch wohl eine Anschwellung derselben darbieten, oder einige Tage zuvor an diesen Symptomen gelitten hatten. Besonders auf den Unterschenkeln und Füssen sieht man dann viele kleine und grössere, disternthe oder bläuliche rundliche Flecken, während die oberen Körpertheile frei bleiben oder nur spärliche Flecken zeigen. Bei einem 4jährigen Knaben sah ich die Blutflecken auch auf dem Scrotum auftreten. Dieselben bleiben beim Fingereindruck unverändert und zeigen hin und da im Centrum eine pagu-

löse oder diffusere durch eine Fibringerinnung bedingte Härte und Prominenz. Abgesehen von den erwähnten spontanen Schmerzen ist auch der Druck auf die Tibia, die Knöchel, die Sohlen, und die Bewegung der Gelenke nicht selten empfindlich, so dass dadurch das Gehen mehr oder weniger erschwert werden kann. Bisweilen gesellen sich zu den Purpura-flecken auch quaddelartige Efflorescenzen (*Erythema nodosum*), in deren Mitte ein bläuliches Blutextravasat sicht- und fühlbar ist, und nicht selten beobachtete ich ein leichtes Oedem der Fussrücken und der Knöchel, wobei der Urin niemals Eiweiss enthält. Ja, bei einem 7-jährigen Knaben, welcher die Blutflecken auch auf den Armen und im Gesicht zeigte, wurden auch die Augenlider, Wangen und Nasenflügel oedematös. Nach einigen Tagen pflegen die Flecken zu erblasen, bilden sich indess bald von neuem, sobald die Schmerzen oder Gelenkschwellungen sich wieder einstellen, oder auch ohne die letzteren, sobald die kleinen Patienten die horizontale Lage verlassen und wieder zu gehen anfangen, so dass mehrere Wochen verlaufen können, ehe diese Nachschübe, mit welchen auch die Oedeme jedesmal wieder erscheinen können, aufhören und die Heilung vollendet ist. In den meisten von mir beobachteten Fällen verlief die Affection febrilös, nur selten mit leichten unregelmässigen Temperaturerhöhungen, und mit geringer oder gar keiner Störung des Allgemeinzustandes, und endete immer mit vollständiger Heilung. Bei einem 11-jährigen Mädchen, welches abgesehen von Anorexie vollkommen gesund erschien, fiel der für das Lebensalter sehr langsame Puls von 68 Schlägen in der Minute auf, deren Aufeinanderfolge auch nicht ganz regelmässig war, während die Untersuchung des Herzens nichts Abnormes darbot. Nur einmal, bei einem 1½-jährigen Kinde, traten, nachdem ein paar Tage lang Schmerzen in den Beinen bestanden hatten, mit den Purpura-flecken gleichzeitig eisen-grosse pemphigöide Blasen mit serös-blutigem Inhalt an beiden Füssen und mit einem leichten Oedem derselben auf. Nach etwa 2 Wochen war alles verschwunden, aber 5 Monate später erfolgte ein neuer Ausbruch von Purpura an den unteren Extremitäten.

Eine Erklärung für den unweifelhaften Zusammenhang dieser Purpura mit den Schmerzen und Anschwellungen der Glieder und Gelenke giebt es bis jetzt nicht. Es ist noch sehr die Frage, ob der Name *Purpura rheumatica*, mit welchem man diese Fälle zu bezeichnen liebt, in der That gerechtfertigt ist, da wir zwar in einzelnen Fällen, keineswegs aber constant, den Einfluss der Kälte und Nässe nachweisen können. Diese aetiologische Beziehung bildet besonders in einer complicirteren Form, bei welcher sich zu den hier erwähnten Symptomen, Purpura und Ge-

lenkanschwellungen, noch eine Reihe von abdominalen Erscheinungen, nämlich Erbrechen, Darmblutung und Kolik hinzugesellte. Es kommt dann ein eigenthümliches Krankheitsbild zu Stande, welches ich im Jahre 1868 zum ersten Mal beobachtet und später in einer kleinen Abhandlung¹⁾ beschrieben habe. Der erste Fall dieser Art betraf

Einen 15jährigen kräftigen Knaben, welcher in Folge von Indigestion einen Gastroenteralcatarrh mit leichtem Icterus bekommen hatte. Einige Tage darauf Schmerzhaftigkeit in den Fingergelenken beider Hände ohne Anschwellung. Ein paar Tage später ausgedehnte Purpuraflecken auf dem Oberarmknochen, bald darauf heftige Kolik, Erbrechen und schwarze Stühle. Die Leibschmerzen waren zunächst äusserst heftig, schlafraubend; die Gegend des Colons transversum empfindlich und aufgetrieben. Mässiges Fieber (38,6 nicht überschreitend). Nach 5 Tagen Schwanden der genannten Symptome, aber schon 3 Tage später ein Recidiv mit genau denselben Erscheinungen. Recidivatum nach einer Woche. Innerhalb der nächsten Wochen noch 3 Recidive, immer mit bluthaltigen Stühlen, welche entweder schwarz oder orangefarbig, und mit mehr oder minder bedeutenden Blutklumpen vermischt erschienen. Im Ganzen fanden innerhalb 7 Wochen 5 solcher Anfälle statt. Schließlich völlige Heilung. Am besten schien Opium zu wirken.

Im März 1869 kam mir der zweite Fall vor. Ein 4jähriger Knabe litt an „dysenterischen“ Symptomen, Kolik, Tenismus, spärlichen bluthaltigen Stühlen. Gleichzeitig grosse fleckige Purpura an beiden Ellbogen und Oberarmknochen. Nach 3 Tagen beim Gebrauch von Ricinöl und Calomel Besserung, aber neue Purpuraflecken am Scrotum und Präpitiem. Einige Tage darauf von neuem Diarrhoe mit Blutstreifen und heftiger Kolik, dann Verstopfung, neue Nachschübe der Purpura. Dauer im Ganzen 3 Wochen.

Der dritte Fall (März 1873) betraf ein 12jähriges gesundes Mädchen. Seit einer Woche „rheumatische“ Schmerzen in den Gliedern, bald auch Schmerzhaftigkeit und Anschwellung der Hand- und Fussgelenke mit leichtem Fieber. Herz intact. Wenige Tage später ausgedehnte Purpura auf dem Bauch und den unteren Extremitäten. Dabei sehr heftige schlafraubende Koliken, wiederholtes Erbrechen und Diarrhoe mit reichlichem Blutgehalt. Nach 5 Tagen Schwanden aller Symptome. Dann wieder ein Recidiv. Binnen 4 Wochen erfolgten vier solcher Anfälle; schließlich völlige Heilung. Therapie indifferent.

Der vierte Fall betraf ein 11jähriges gesundes Mädchen, welches schon im Sommer 1872 an rheumatischen Schmerzen in beiden Fussgelenken und in der rechten Hüfte gelitten hatte. Im Juli 1873, also etwa ein Jahr später, wiederum Schmerzen in den Hand- und Fussgelenken, doch ohne Anschwellung, gleich darauf Purpura auf den unteren Extremitäten, mässiges Fieber, Anorexie, Erbrechen, Kolik und feste, aber stark mit Blut vermischte Stühle. Urin normal. Innerhalb 5 Wochen erfolgten drei solcher Anfälle mit 8—tägigen Intervallen. Der letzte Anfall heftiger. Ein auf den Bauch applicirter Einbrei wirkte sichtbar günstig; auch die Purpura erlosch. Plötzlich wieder Schmerzen im linken Arm und im rechten Kniegelenk, und in der darauf folgenden Nacht (vom 23.—24. Juli)

¹⁾ Ueber eine eigenthümliche Form von Purpura. Berliner klin. Wochenschr. 1874, No. 52.

sehr heftige Kolikschmerzen, grüne Erbrechen und vier starke orangefarbige, mit reichlichen Blutcoagulis vermischte Stühle. Dabei kein Fieber, reine Zunge, Eibeiheit auf das Leth, Eosinisch als Nahrung, Eosinose ausgeklügelt. Am 25. noch ein schwarzer Stuhl. Bis zum 30. ständige Euphorie, worauf noch ein Nachschub der Purpura und von einer Phase bis zum September eintrat. In diesem Monat erfolgte ein neuer ganz analoger heftiger Anfall, mit welchem aber die Krankheit schloß. Das Herz bot, abgesehen von einer Arrhythmie und einer zweiten auffallenden Verengung des Pulses (bis auf 60 Schl.), nichts Krankhaftes dar.

Einen fünften Fall hatte ich am 17. Jan. 1880 Gelegenheit zu sehen. Derselbe betraf einen 2jährigen Knaben, welcher schon beinahe 3 Wochen lang so mehrfachen, aber immer schwächer werdenden Anfällen dieser Krankheit gelitten hatte. Derselbe bestand in heftigen Kolikschmerzen mit Papöflichkeit der rechten Seite des Koles, Incontinentia, blutigen Stühlen, Purpuraflecken auf den Vorderarmen und rheumatischen Gliederschmerzen, aber ohne Anschwellung der Gelenke und ohne Fieber. Hände und Füße wurden immerhin schmerzhaft. Urea normal, Ergotin und Eosin ohne Erfolg gebracht. Alltägliche Bülung bei indifferenten Therapie.

Die Uebereinstimmung aller dieser Fälle liegt am Tage. Sondern findet sich die Purpura hier combinirt mit Kolik, Empfindlichkeit des Koles, Erbrechen, Darmlibung und, mit Ausnahme des zweiten Falles, auch mit rheumatischen Schmerzen, während die Anschwellungen der Gelenke minder constant sind. Bei einem 5jährigen Mädchen, welches am 10. Jan. 1882 in meiner Poliklinik vorgestellt wurde, bestanden seit zwei Monaten Anfälle von Purpura mit Anschwellung, Schmerzhaftigkeit und Unbeweglichkeit mehrerer Gelenke, und häufig auch mit heftigen Koliken und grosser Empfindlichkeit des Unterleibs gegen Druck, während blutige Stühle nie beobachtet wurden. Man sieht also, dass aus der Kette der betreffenden Symptome auch ein oder das andere Glied einmal fehlen kann. Charakteristisch ist aber für alle das Auftreten dieser Erscheinungen in Schüben mit einem mehrtagigen, selbst einwöchentlichen Intervall, wodurch die Dauer der Krankheit auf 3–7 Wochen verlängert wurde. Fieber war nicht constant, und hielt sich stets auf einer sehr mässigen Stufe. Dass die beschriebenen Symptome in einem inneren Zusammenhange mit einander stehen, wird wohl Niemand leugnen wollen; diesen Zusammenhang aber zu erklären, bin ich hier ebenso wenig im Stande, wie bei der gewöhnlichen Purpura rheumatica. Da meine Fälle sämtlich geheilt wurden, so stehe ich keine Sectionen zu Gebote, und ich muss es also dahingestellt sein lassen, ob es sich hier um skolische Vorgänge handelt, wie sie von Zimmermann¹⁾ in dem Falle eines Erwachsenen beschrieben wurden, nämlich um eine Verenge-

¹⁾ Arch. d. Med. 1874. Heft 2.

zung der kleinen Darmarterien durch Zellen- und Kernwucherung der Tunica adventitia und media, und eine daraus hervorgehende multiple Nekrose der Darmschleimhaut.?)

Therapeutisch schien die Application einer Eisklase auf den Unterleib, Eismilch zur Nahrung, und eine Mandel- und Oelbalsion, welcher ich bei heftigen Schmerzen Extr. Opii (0.05 : 120.0) zusetzte, am besten zu wirken. Stränge Ruhe im Bette ist hier, wie bei der gewöhnlichen Purpura rheumatica, erforderlich. In vielen Fällen der letzteren glaube ich durch Jodkali (1 : 120) gute Erfolge erzielt zu haben.

Von den bisher erörterten Formen der Purpura unterscheidet sich nun diejenige, für welche ich den Namen Purpura haemorrhagica oder Morbus maculosus reserviren möchte, durch den völligen Mangel der Schmerzen, der Gelebschwellung und der eben geschilderten intestinalen Symptome. Wir beobachten hier nur Purpura und Blutungen, welche sich in den meisten Fällen auf das Zahnfleisch und die Nase beschränken. Dass der Urin sehr oft Blut oder Etwiss enthalten soll, wie hier und da behauptet wird, davon konnte ich mich in meinen Fällen nur ausnahmsweise überzeugen. Häufig sieht man auf der Schleimhaut der Lippen und der Wangen kleine Blutextravasate, welche nicht bloss locker aufliegen, sondern in die oberflächliche Schicht infiltrirt sind, so dass nach der Abtossung ein ganz flacher Substanzverlust sichtbar werden kann. Fast bei allen von mir beobachteten Kindern begann die Krankheit plötzlich inmitten völliger Euphorie ohne alle Vorboten. Stürmisch entwickeln sich Blutflecken von dunkelrother, hier und da ins Braunrothe oder Bläuliche schimmernder Farbe, von Hirse-, Linsen-, Groschengeröse und darüber, welche sich ohne regelmäßige Succession über die ganze Fläche der Haut verbreiten, so dass diese schon nach 24–36 Stunden wie ein Leopardenfell gefleckt erscheinen kann. Hier und da finden sich auch streifenförmige oder flächenartig ausgebreitete Hämoerugien, z. B. bei einem 7jährigen Knaben ein die ganze linke Inguinalgegend einnehmendes Extravasat, welches an einer Stelle einen harten taubeneigrossen Fibrinknoten fühlen liess. Auf Druck schwinden diese Flecken niemals, doch zeigt sich mitunter um einen centralen Gerinnungsknoten ein rother Hof, dessen kasserister hyperämischer Rand beim Druck momentan erlischt. Ist eine Mundblutung vorhanden, so kann durch die zwischen den Zähnen haftenden Coagula das Kauen erschwert werden. Stärkere Berührungen des Zahnfleisches rufen ebenso

?) Vergl. nach Schödy-Buch, Deutsches Arch. f. klin. Med. 1874. II. 4 u. 5.

leicht Blutungen hervor, wie Quetschungen der Haut, ja schon das Kratzen derselben mit dem Fingernagel, schnell einen Blutfleck oder einen rothen Streif, welcher auf Druck nicht schwindet, zu erzeugen pflegen. Kleine Nadelstiche, welche zur befalls der Blutuntersuchung machten, bluteten sehr stark, und Injektionsnadeln mit der Pravaz'schen Spritze bewirkten fast immer eine ziemlich umfangreiche Blutinfiltration der Haut und des unterliegenden Bindegewebes, welche nur langsam unter allmählicher Ver-
sorgung schwindet. In einem meiner Fälle erfolgte auch wiederholt Blutungen aus einem Ekzem der Wange. Dabei war das Allgemeinbefinden meistens so ungestört, dass die Kinder aus liebsten das Bett verlassen hätten. Einen Milztumor konnten wir ebenso wenig mit Sicherheit constatiren, wie Abnormitäten des Herzens oder Blutungen im Augenhintergrunde. In der Regel erschöpfte sich die Eruption der Blutflecken mit dem ersten Schub; seltener traten noch reichliche Nachschübe ein und verlängerten den Verlauf, welcher bis zum völligen Erblaffen aller Flecken im Durchschnitt 10–14 Tage zu dauern pflegte. Fieber wurde in meinen Fällen niemals beobachtet, vielmehr blieb die Temperatur nicht selten unter dem Normalstande (36,9 bis 37,2).

Bedenkliche Zufälle traten während des ganzen Verlaufs der Krankheit nur ausnahmsweise ein, z. B. bei einem 5-jährigen Knaben zweimal eine so profuse Nasenblutung, dass die Tamponade der Nasenhöhle vorgenommen werden musste, bei einem 11-jährigen Mädchen nach der Extraction eines Zahns eine 36 Stunden dauernde Blutung aus der betreffenden Zahnlücke. Die Gefährlichkeit der Erschöpfung durch stets wiederkehrende profuse Blutungen liegt daher ziemlich fern und charakterisirt die schwere Form des *Marasmus marasmus*, welche bei weitem seltener als die oben beschriebene vorkommt und, wie ich schon bemerkte, viel-
leicht mit permanenten moleculären Veränderungen der kleinen Gefässe zusammenhängt. Die nicht plötzliche, vielmehr fast immer allmähige Entwicklung, die vielfachen Nachschübe, der chronische Verlauf, die mehr und mehr sich geltend machende Anämie unterscheiden diese Form wesentlich von der gewöhnlichen, welche einen acuten Verlauf zu nehmen pflegt; dazu kommen nun die profusen, stets sich erneuernden Blutungen aus den verschiedensten Theilen, Nase, Mund, Magen, Darmkanal, Nieren, äusserem Gehörgang, Lungen. Diese zum Glück seltenen Fälle können nach einem Monats oder Jahres-langen Verlauf entweder durch Erschöpfung unter Hinzutritt von Anasarca und Hydrops der Körperhöhlen, oder plötzlich durch Bluterguss in ein lebenswichtiges Organ, zumal ins Gehirn, tödtlich enden (S. 236). Während dieses langen Verlaufs treten bis-
weilen längere Pausen scheinbaren Wohlbefindens ein. So sah ich ein

12jähriges anämisches Mädchen drei Sommer hintereinander an Purpura, Nasenbluten, hin und wieder auch an Hämoptysis leiden, während sie im Winter gänzlich frei davon war. Bei einem 13jährigen Knaben, welcher seit zwei Jahren am Morbus maculosus litt und sich durch Blutflecken in der Gaumenschleimhaut und Uvula auszeichnete, vergingen leiserweise einige Monate, ohne dass Blutflecken und andere Hämorrhagien sich bemerkbar machten. Solche Pausen können leicht zu trügerischen Hoffnungen verleiten, welche durch das plötzliche Wiederauftreten der Purpura und der Blutungen Lügen gestraft werden. Während in der acuten Form, wie ich schon bemerkte, die Eruption gewöhnlich mit einem Schube beendet ist, sieht man in der chronischen Form wegen der stets sich wiederholenden Nachschübe Flecken von ganz verschiedener Färbung auf der Haut stehen. Frische, hell- oder dunkelrothe sind mit älteren bläulich grünen und gelben vermischt, und dazwischen sieht man an vielen Stellen blasser Pigmentflecken als letzte Spuren des resorbierten Hämatins.

Ueber die Ursachen des Morbus maculosus konnte ich in keinem meiner Fälle ins Klare kommen. Die meisten Kinder befanden sich in dem Alter zwischen 8 und 13 Jahren (nur eins derselben, welches Purpurflecken im Gesicht, Bluthrechen und schwarze Stühle darbot, war noch nicht ganz 2 Jahre alt), und erschienen sonst vollkommen gesund. Weder eine ungesunde Wohnung, noch Mangel an Nahrung oder schlechte Beschaffenheit derselben lies sich als Ursache nachweisen. Von vorausgegangenen Krankheiten kann ich nur Scharlach und Masern beschuldigen, von deren Beziehung zum Morbus maculosus bereits früher (S. 620 und 645) die Rede war.

Die Behandlung der acuten, leichteren Form kann nach meinen neueren Erfahrungen eine rein expectative sein. Von dem Glauben an die Wirksamkeit des Ergotins in dieser Krankheit¹⁾ bin ich zurückgekommen, seitdem ich in der Klinik eine Reihe von Fällen bei ruhiger Lage im Bett ohne jede Arznei in kurzer Zeit heilen, und andererseits in schweren chronischen Fällen das Ergotin, obwohl Wochenlang consequent gebraucht, völlig wirkungslos bleiben sah. Wollen Sie übrigens das Mittel versuchen, so dürfen sie es nur innerlich geben (F. 44), da die subcutanen Injectionen hier fast immer bedeutende Blutinfiltrationen, sogar mit Ausgang in Eiterung, zur Folge hatten. Der von Skaud²⁾ mitgetheilte Fall einer durch den Inductionsstrom bewirkten Heilung von Purpura haemorrhagica steht bis jetzt vereinzelt da; dieser Therapie

¹⁾ Beltr. zur Kinderheilk. N. F. S. 405.

²⁾ Lancet, 19. Juli 1879.

lag wohl derselbe Ideengang zu Grunde, welcher sich zur Anwendung des Ergotins bestimmte. In der chronischen Form sind die Eisenspräparate, besonders der Liqueur ferri sesquichlorati (F. 45) und der Aufenthalt in reiner Land- oder Bergluft, aber nur in mittleren Höhen, zu empfehlen; allenfalls ist auch eine Kaltwassercur zu versuchen, die mir wenigstens in zwei Fällen dieser Art temporär gute Dienste leistete. Gegen die einzelnen Blutungen ist, wenn sie bedenklich werden, je nach der Localität einzuschreiten, bei Epistaxis durch Tamponade, bei Magen- und Darmblutungen durch Eisentafel und Liqueur ferri u. s. w. Innerhin wird auch hier der Versuch mit dem Ergotin zu unternehmen sein.

IV. Die Skrophulose.

So charakteristisch auch das Krankheitsbild ist, welches wir mit dem Namen „Skrophulose“ bezeichnen, fehlt uns doch jede Einsicht in die Wesenheit desselben. Wenn viele Ärzte noch immer an einer „Skrophulösen“ Grundlage des Leidens festhalten, obwohl doch die Untersuchungen des Blutes bis jetzt keine Abnormitäten desselben ergaben haben, so beruht das nur auf der Beobachtung des gleichzeitigen oder successiven Erkrankens mehr Reize von Organen, welches den Schluss gestattet, dass wir es hier nicht mit einfachen Localaffectionen, sondern vielmehr mit einer die normalen Nährungsverhältnisse der verschiedenen Organe auf gleiche Weise beeinträchtigenden Krankheitsursache zu thun haben. Ob diese in einer Anomalie des Blutes oder der Gewebselemente, oder beider zugleich zu suchen ist, wissen wir nicht. Die Befunde der Koch'schen „Tuberkelbacillen“ in „skrophulösen“ Drüsen sind vorläufig noch nicht für die Pathogenese der Krankheit verwertbar. In klinischer Beziehung bedeutet die Skrophulose für mich nichts weiter, als das gleichzeitige oder successive Auftreten mehr- oder vielfacher chronischer Entzündungen in verschiedenen Geweben, mit auffallend grosser Tendenz zu Hyperplasien der benachbarten oder auch entfernterer Lymphdrüsen, welche gern mit käsiger Degeneration und Abscessbildung im Umkreise enden.

Die Ausgänge der skrophulösen Entzündung sind, so und für sich betrachtet, dieselben, wie die jeder anderen Entzündung. Man sieht hier wie dort Eiterung, Ulceration, Verhärtung u. s. w. erfolgen; nur in einzelnen Erscheinungen, wie in der Beschaffenheit des Eiters, in der Gestaltung der Geschwüre und ihrer Narben gehen sich bei der skrophulösen Entzündung gewisse Differenzen kund, die aber keineswegs charakteristisch genug sind, um auf eine wahrhaft pathognomonische Be-

festung Anspruch machen zu können. Um so mehr fand man sich bewogen, diese Bedeutung einem Krankheitsproducte zuzusprechen, welches vorzugsweise bei Skrophulösen in verschiedenen Organen gefunden und als „käsige Degeneration“ bezeichnet wird. Da, wie Sie wissen (S. 374), der Streit über die Beziehungen dieser käsigen Degeneration zur Tuberkulose noch heute nicht völlig geschlichtet ist, so werden Sie sich auch nicht darüber wundern, dass die seit vielen Jahren schwebende Frage, ob die Skrophulose und Tuberkulose als ganz verschiedene, oder nah verwandte, oder gar identische Krankheitsprocesse zu betrachten sind, auch jetzt noch nicht abgeschlossen ist. Am wenigsten befriedigend in dieser Beziehung sind die statistischen Untersuchungen ausgefallen, welche theils für (Balman), theils gegen (Louis, Philipps u. A.) einen solchen innigen Connex der beiden Krankheitsprocesse sprechen. Wer ganz frei von Vorurtheilen kranke Kinder beobachtet, der wird sich, wie ich annehmen darf, davon überzeugt haben, dass sehr viele Skrophulöse schliesslich an einer käsigen Pneumonie oder an einer allgemeinen Miliartuberkulose, zumeist an tuberkulöser Meningitis zu Grunde gehen. Diese für mich unzweifelhafte Disposition der Skrophulösen zu tuberkulösen Erkrankungen beweist aber keineswegs die Identität beider Processe, sondern beruht eben nur auf dem käsigen Zerfall, welchen die Producte der skrophulösen Entzündung in den Drüsen, den Knochen oder in anderen Theilen so häufig erleiden, und von welchem aus dann später eine mehr oder weniger allgemeine tuberkulöse Infection des Organismus erfolgen kann.

Das klinische Bild der Skrophulose ist in seiner Gesamtheit ein ziemlich charakteristisches; seine einzelnen Züge aber bieten je nach den Individuen, nach der Zahl und Art der befallenen Gewebe und Organe, und nach den Lebensverhältnissen, in welchen sich die kleinen Patienten befinden, mannigfache Verschiedenheiten dar.

Wenn auch Fälle vorkommen, wo Individuen mit deutlichen Zeichen der Skrophulose noch vollkommen blühend und wohl genährt aussehen, so gehören diese doch zu den Seltenheiten und betreffen fast immer Kinder, bei denen sich die Krankheit eben erst entwickelt oder in ihrer leichtesten Form auftritt. Früher oder später macht sich Schläffheit der Haut und der Muskeln, und häufig Entfärbung der allgemeinen Decken, geltend, wobei indess das Fett aus dem subcutanen Bindegewebe nicht zu schwinden braucht, ja sogar in grösserer Menge, als sonst gewöhnlich abgelagert werden kann. Die Blässe der Haut, insbesondere des Gesichts, der Ausdruck einer Verarmung des Blutes an rothen Körperchen, kann hier um so weniger als etwas Charakteristisches gelten, als in einer ge-

wissen Reihe von Fällen die Wangen auch schön roth gefärbt erschienen. Die älteren Aerzte nahmen hieraus Veranlassung, einen zweifachen Habitus scrophulosus unter dem Namen des *erethischen* und des *torpiden* zu unterscheiden, indem sie dem ersten dunkle Haare und Augen, einen blühenden Teint der feinen Haut, überhaupt ein angenehmes und auf geistige Regsamkeit deutendes Aeußere zuschrieben, während sich der torpide Habitus durch blonde Haare, blassblaue Augen, dicke Nase und Oberlippe, eine falte Farbe des aufgedunsenen Gesichts und einen stumpfen Ausdruck kundgeben sollte. In dieser Unterscheidung liegt unbestreitbar manches Wahre, wenn auch zahlreiche Uebergänge der einen Form in die andere stattfinden; jedenfalls ist der sogenannte torpide Habitus überwiegend häufig, am ausgeprägtesten in den Fällen, wo die durch entzündliche Infiltration verdickte und durch einen scharfen Nasenausfluss geröthete und excoriirte Oberlippe rüsselartig über der Unterlippe hervorsticht, und die entzündeten Augenlider sich krampfhaft vor den einfallenden Lichtstrahlen zusammenziehen.

In vielen Fällen erscheint als erstes Zeichen der Skrophulose eine Anschwellung der Lymphdrüsen am Halse, in den Inguinalfalten, in den Achselhöhlen. Insbesondere fällt oder sieht man unter dem Kiefer, an den Seitentheilen des Halses, im obersten Theile des Nackens Gruppen runderlicher, unter der Haut verschiebbarer Drüsen von Erbse- bis Haselnussgrösse, bisweilen zu grösseren Packeten vom Umfang eines Hühneresses und darüber vereinigt, schmerzlos oder mehr oder weniger, zumal gegen äusseren Druck, empfindlich. Man hat indess wohl zu bedenken, dass gerade die Anschwellung der Cervical-, Occipital- und Aureschdrüsen nicht selten auch ganz unabhängig von der Skrophulose auftritt, z. B. in Folge von Dentitionsreizung, von bereits bestehendem ekzematösen oder impetiginösen Ausschlägen im Gesicht, an den Ohren, auf dem behaarten Kopfe, selbst von anscheinend leichten Verletzungen, wie ich z. B. nach dem Stechen der Ohrlöcher bei kleinen Mädchen alsbald Drüsenschwellungen am Halse zu Stande kommen sah. Ich glaube nicht, dass man berechtigt ist, in solchen Fällen ohne Weiteres eine skrophulöse Basis anzunehmen, wenn nicht noch andere entscheidendere Symptome sich anschliessen sollten. In selteneren Fällen kommen auch leukämische und pseudoleukämische¹⁾ Hyperplasien der Lymphdrüsen bei Kindern vor, die man, wie jene congenitalen Anschwellungen, zuvor ausschliessen

¹⁾ Beide Arten von Drüsenerkrankungen stimmen mit den bei Erwachsenen vorkommenden durchaus überein. Klein ergriffen Fall von Pseudoleukämie mit einer enormen Zahl von Lymphomen, welcher in meiner Klinik bis zum Tode beobachtet wurde, habe ich in den Charité-Annalen Bd. VI. Jahrg. 1880 mitgetheilt.

muss, die man eine wirkliche Skrophulose Natur der Drüsentumoren annehmen darf. Die letzteren können um viele Monate, selbst Jahre lang, meistens mit anderen skrophulösen Erscheinungen verbunden bestehen bleiben, auch wohl sich allmählig wieder zurückbilden. In den meisten Fällen aber gehen sie zu wiederholten Entzündungen des umgebenden Bindegewebes, zumal am Halse, mit ausgedehnten eitrigen und schmerzhaften Infiltrationen Anlass, welche schliesslich sich eithen, fluctuiren und entweder von selbst aufbrechen oder künstlich geöffnet werden. Diese Tendenz der hyperplastischen Drüsenelemente zur „Hinfälligkeit“, zur Nekrobiose (Verkäsung) und Eiterung ist, wie Virchow mit Recht hervorhebt, ein wesentlicher Zug in dem Bilde der Skrophulose, und unterscheidet dieselbe von den leukämischen und pseudoleukämischen Lymphomen, welche bis an's Lebensende unverändert fortzuexistiren pflegen. Nach der Entleerung des Abscessreisers erfolgt nur selten schnelle Vernarbung; weit häufiger schliesst sich die Oeffnung nur oberflächlich und neue Eiter- und Jaucheansammlungen in der Tiefe erfordern eine wiederholte Incision. Oft bilden sich aus den aufgebrochenen oder künstlich geöffneten Abscessen nach mehr oder weniger unzulänglicher, von rothen infiltrirten Hautsträngen brückenartig überspannte Geschwüre mit unterminirten Rändern, in deren Grunde die erkrankten Drüsen zu Tage liegen können. Solche Ulcerationen heilen sehr schwer, oft erst nach der Exstirpation der betreffenden Drüsen, und hinterlassen unter allen Umständen strangartige, denen der Verletzungen sehr ähnliche Narben.

Nächst den Lymphdrüsen sehen wir sehr häufig die äussere Haut und das subcutane Bindegewebe ergriffen, letzteres in der Form bis wallnussgrosser, an verschiedenen Körpertheilen fühlbarer, umschriebener Infiltrationen, welche fast immer früher oder später in Suppuration übergehen und sich dann gänzlich wie die eben beschriebenen Drüsenabscesse verhalten. Diese Abscesse erfordern in der Regel eine ungewöhnlich lange Zeit zu ihrer Entwicklung, die nach häufig ohne wesentliche äussere Erscheinungen vor sich geht (sogen. kalte Abscesse). Unter andern beobachtete ich bei einem 10 Monate alten, zugleich mit Osteomyelitis am 4. linken Metacarpalknochen befallenen Kinde, neben vielen andern Abscessen auch einen sehr grossen auf der linken Patella, welcher bereits 3 Monate lang bestand, ohne dass die überliegende Haut einmal geröthet war. Um mich vor einer Verwechselung mit Hydrops bursae mucosae zu wahren, machte ich eine Probepunktion, welche guten Eiter ergab. Die Affection der äusseren Haut zeigt sich in Gestalt mannigfacher chronischer Exantheme, deren Erscheinungen mit denjenigen

der nicht skrophulösen Ausschlagsformen vollständig übereinstimmen, so dass ich auf die Schilderung der letzteren verweisen kann. Am häufigsten beobachtet man hier Ekzema impetiginosum im Gesichte, seltener an anderen Körpertheilen, und Ekthyma auf dem Rücken, den Hinterbacken und Oberschenkeln, letzteres nicht selten mit Hinterlassung mehr oder minder tief eindringender, schwer heilbarer, scharf umrandeter Ulcerationen. Auch Ekzema impetiginosum des äusseren Ohrs, des behaarten Kopfes, untermischt mit Erythemaeflecken, mit rothen Papeln auf den Wangen, zeigt sich häufig. Am seltensten beobachtet man die verschiedenen Formen des Lupus, welcher bei Kindern in der Regel mit anderen Erscheinungen der Skrophulose verbunden auftritt und meistens an der Nase, seltener an den Wangen und Lippen seinen Sitz hat. Die befallenen Theile erscheinen hart durch infiltrirtes Exsudat, mit kleineren oder grösseren roten oder lividen Knötchen besetzt, welche entweder anhaltend desquamiren (L. exfoliatus), oder zu tiefen jauchenden Geschwüren zerfallen, welche immer mehr in die Tiefe greifen, und selbst die Knötzel und Knötchen nicht verschonen, so dass nach einem meistens auf Jahre ausgedehnten Verlauf mit abwechselnder Besserung und Verschlimmerung selbst im günstigsten Falle grosse Substanzverluste mit strahligen und tiefen Narben zurückbleiben. Besonders langwierig ist der L. serpigineus, bei welchem immer ein Theil der Geschwüre vernarbt, während die Ränder sich mit neuen Knötchen infiltriren und ulceris zerfallen. Gerade diese Form ist mir ein paar Mal bei skrophulösen Kindern auf dem Handrücken und den Fingern vorgekommen, welche das Fortkriechen der Verschwärung nach einer Richtung hin zeigten, während die zuerst befallenen Stellen bereits strahlenförmig vernarbt waren.

Die verdickte Oberlippe, welche häufig durch ein schattes, aus der Nase fließendes Secret geröthet und wand erschreit, sowie die auf der Gesichtshaut haftenden gelben oder grünlich-braunen Ekzembirken, welche mit rothen Papeln, Bläschen und Pusteln vermischt sind, geben dem Antlitz einen charakteristischen Ausdruck, welcher oft noch durch eine entzündliche Schwellung und Rötzung der Augenlider, die bei jedem einfallenden Lichtstrahl fest zusammengekniffen werden, verstärkt wird. In tiefen Fällen dringt die ekzematöse Entzündung von der Ohrmaschel aus weiter nach innen und erzeugt einen serös-purulenten Ausfluss aus dem äusseren Gehörgange.

Unter den Schleimhäuten, in denen sich der skrophulöse Krankheitsprozess ebenfalls in der Form chronischer Entzündungen localisirt, sehen wir vorzugsweise häufig die Nasenschleimhaut und die Con-

conjunctiva des Auges ergriffen. Eine chronische Rhinitis mit Rötzung und Excretion der Nase, Ausfluss eines serös-purulenten Secrets, ist auch mit Anschwellung und Verdickung der äusseren Nase, deren Eingänge von gelbgrünen Borsten vertrockneten Eiters verstopft sind und das Athemholen erschweren, gehört zu den gewöhnlichen Erscheinungen; nicht minder eine Conjunctivitis mit Bildung von Phlyktänen am Hornhautrande, starkem Thränenfluss und innerer Photophobie, welche das Öffnen der Augen häufig nur in der Dämmerung gestattet und die Kinder zwingt, bei Tage das Antlitz in das Kissen zu verbergen oder mit den Händen zu bedecken. Die Meibom'schen Drüsen nehmen an der Entzündung häufig Theil und begründen dann das unter dem Namen Blepharadenitis bekannte Krankheitsbild, wobei die Augenlidränder gerötlet, angeschwollen und exoriert erscheinen und Nachts durch das Drüsensecret mit einander verklebt werden. Als Residuen dieses chronischen Entzündungsprocesses werden Chalazien und Ausfallen der Cilien mit callöser Verdickung der Augenlidränder (Tylosis) nicht selten beobachtet. Zu den häufigsten Erscheinungen gehört auch eine, meistens doppelseitige, foetide, serös-purulente Otorrhoe, welche auch da, wo kein Ekzem des äusseren Ohrs besteht, durch eine chronische Entzündung des Meatus auditorius, zumal des Ueberzuges des Trommelfells, bedingt werden kann, in anderen Fällen aber durch Caries des Felsenbeins, oder durch die Ruptur von Drüsenabscessen vor oder hinter dem Ohe in den Meatus auditorius veranlasst wird. In allen Fällen, wo diese Entzündungen einen chronischen, auf Jahre ausgedehnten Verlauf nehmen, kann schliesslich ein Uebergang derselben auf die der erkrankten Schleimhaut unmittelbar anliegenden Gebilde erfolgen. So sehen wir die Rhinitis sich nicht selten von der Schleimhaut auf das Perichondrium und die Nasenknorpel, sowie auf das Periost, die Muschel und Nasenbeine fortsetzen. Rötzung, Anschwellung und Schmerzhaftigkeit der äusseren Nase und Ausfluss eines stinkenden, blutigen, mit nekrotischen Knochenstückchen vermischten Eiters, allmälige necrotische Zerstörung der knorpeligen Scheidewand und der Nasenflügel herbeiführen, worauf selbst nach völliger Heilung mehr oder minder beträchtliche Deformitäten der Nase zurückbleiben. Ja in manchen Fällen beobachtet man einerseits eine Fortpflanzung der Krankheit auf das Siebbein und durch dieses hindurch auf die Hirnhäute mit Entwicklung einer lethalen Meningitis, andererseits eine allmälige cariose Durchbohrung des harten Gaumens von der Nasenhöhle aus, wodurch eine mehr oder minder weite Communication der letzteren mit der Mundhöhle begründet wird. In gleicher Weise kann die Entzündung des Meatus auditorius langsam auf das Trommel-

fell und nach dessen Perforation, welche durch den Öhrspiegel erkannt wird, auf die Schleimhaut der Paukenhöhle und deren knöcherne Wände, schliesslich selbst auf die Pars petrosa und die spongiöse Substanz des Processus mastoideus übergehen. Die Folgen dieser Ausbreitung sind: eitrige, blutig jauchige Otorrhoe, vermischt mit nekrotischen Knochenglucken, oder wie ich wiederholt beobachtete, sogar mit Austossung der aus ihren Verbindungen gelösten Gehörknöchelchen, zumal des Hammers; Taubheit, Anschwellung und Empfindlichkeit des Zitzenfortsatzes und des Schläfenknochen, schliesslich Rötung der überliegenden Haut, Dislocation der Auricula, deren Muschel nach vorn gerichtet wird, und Bildung fistulöser Oeffnungen, die in's Innere des cariösen Zitzenfortsatzes führen. Ja der Process kann sich noch weiter ausbreiten, einerseits das Labyrinth und den Fallopischen Kanal zerstören, mit consecutiver Paralyse des betreffenden Nerv. facialis, andererseits eine Entzündung und Thrombose des dem cariösen Felsenbein anliegenden Sinus petrosus bedingen und unter meningitischen oder pyämischen Erscheinungen zum Tode führen. Auch das Auge wird durch die skrophulöse Entzündung nicht selten gefährdet, indem ein Uebergang auf die Hornhaut (Keratitis), mitunter sogar unerwartet schnell erfolgt; unter heftigen Erscheinungen (Lichtsehen, Thränen) entsteht eine mehr oder minder ausgebreitete und intensive, in's Graugrüne spielende Trübung derselben, die oft von einem mit der Conjunctiva zusammenhängenden Gefässkranz umrandet ist. Unter ungünstigen Verhältnissen erfolgt hier leicht eine Ulceration der Cornea, welche zum Durchbruch derselben, Staphyloembildung und Atrophie des Auges führen kann. Selbst in den günstigen Fällen, wo es nicht zum Durchbruch kommt, pflegen nicht oder minder ausgebreitete, das Sehvermögen häufig beeinträchtigende Trübungen lange Zeit oder für immer zurückzubleiben.

Ob noch andere Schleimhäute, als die oben erwähnten, dem Einfluss der Skrophulose unterliegen, scheint mir zweifelhaft zu sein. Meine eigene Erfahrung spricht wenigstens nicht dafür, dass skrophulöse Kinder häufiger als andere von Bronchialkatarrhen, Bronchopneumonien, Diarrhöen befallen werden. Dagegen lässt sich nicht in Abrede stellen, dass diese Affectionen bei skrophulösen Kindern besonders hartnäckig sind, eine Tendenz zum chronischen Verlauf zeigen und vorzugsweise dadurch bedenklich werden können, dass sie noch leichter als sonst secundäre Hyperplasien der Bronchial- resp. der Mesenterialdrüsen nach sich ziehen, welche gern verkäsen und der Ausgangspunkt einer Miliartuberkulose werden. Daher kommt es, dass man in den Leichen skrophulöser Individuen Anschwellungen und käsige Degenerationen der eben

erhaltenen Drüsen, wie auch Käseerde in den Lungen und vielfache Tuberkeln überaus häufig antrifft. — Dass ein Katarrh der Vaginalschleimhaut (Flor albus) auch ein Zeichen von Skrophulose sei, wie man oft behaupten hört, kann ich nicht zugeben. Wenigstens befanden sich unter der grossen Zahl von Kindern, welche ich an Vaginitis und Vaginalkatarrhen zu behandeln hatte, verhältnissmässig nur wenige Skrophulöse, und selbst bei diesen liess sich die Affection der Genitalien oft mit grösserem Recht auf andere Ursachen (Stuprum, Onanie, Erkältung) zurückführen. Dagegen scheint mir eine Neigung skrophulöser Kinder zu Anginen unabweisbar zu sein, und in Folge ihrer häufigen Wiederkehr sehen wir gerade hier jene Hyperplastien der Tonsillen zu Stande kommen, von welchen an einer früheren Stelle (S. 438) die Rede war. Der nasale Klang der Sprache, die begleitende Schwerhörigkeit und das Offenhalten des Mundes geben diesen Fällen etwas Charakteristisches, welches den Erfahrenen sofort zur Untersuchung der Mandeln auffodert.

Neben den Lymphdrüsen, der äusseren Haut und den Schleimhäuten wird auch das Knochensystem sehr häufig von der skrophulösen Entzündung befallen, und zwar am frühesten die Phalangen der Finger und Zehen, die Metacarpal- und Metatarsalknochen in der Form der sogenannten Paedarthroakce. An einer oder der anderen Phalanx, nicht selten an mehreren zugleich, beobachtet man eine langsam sich vergrössernde, harte, anfangs unempfindliche und normal gefärbte Anschwellung von olivenförmiger Gestalt, welche viele Monate lang in diesem Zustande verharren kann, bis endlich die überkleidende Haut mit dem Knochen verwächst, sich röthet und von einer oder mehreren fistulösen Oeffnungen durchbrochen wird, aus denen ein dünnes eiteriges Secret hervorsickert. In ähnlicher Weise können die Mittelhand- und Mittelfussknochen allein, oder zugleich mit den Phalangen befallen werden. Die Entzündung hat hier ihren Sitz ursprünglich im Inneren des Knochens und im Marke selbst (Osteomyelitis), welches schliesslich mitsammt den umgehenden Knochenschichten eiterig schmilzt, während von dem an der Entzündung bald theilnehmenden Periost neue dünne Knochenlamellen auf der Binde abgesetzt, aber durch den von innen her andringenden Schmelzungs- und Resorptionsprocess ebenfalls wieder zerstört werden. Dieselben Erscheinungen können sich an den langen Röhrenknochen der oberen und unteren Extremitäten zeigen, während in anderen Fällen die Wirbel (Spondylitis) oder die Gelenke, vorzugsweise die Ellenbogen-, Hüft- und Kniegelenke befallen werden. Diese Entzündungen, auf deren Symptome ich hier nicht speziell eingehen kann, bilden insofern sehr

bedenkliche Consequenzen der Skrophulose, als sie einerseits durch ihre Ausgänge in Eiterung, durch Hektik und amyloide Degeneration vieler Organe nach jahrelangem Verlauf schliesslich lethal werden, andererseits selbst in günstigen Fällen Ankylosen und Deformitäten der Gelenke und dauernde Störungen der Bewegung hinterlassen können, während die Spodylitis entweder durch Ausbreitung auf die Rückenmarkshäute und das Mark selbst Paralysen der Rumpfglieder mit ihren Folgen, Decubitus u. s. w. herbeiführt, oder durch eine plötzliche Luxation der erkrankten Wirbel und Compression der Medulla spinalis das Leben bedroht, oder endlich durch fortwährende Eiterung, Bildung sogenannter Congestionsabscesse und Hektik zum tödtlichen Ausgange führt. Eine ausführliche Schilderung dieser Wirbelkrankheit, welche nicht selten auch ganz unabhängig von der Skrophulose bei Kindern und selbst bei Erwachsenen auftritt, und in allen Werken über Chirurgie genau beschrieben ist, werden Sie mir erlassen. Nur soviel sei bemerkt, dass sowohl die Spodylitis, wie die oben erwähnten Gelenkentzündungen von den Eltern der Kinder in der Regel auf eine traumatische Ursache, einen Fall, Stoss u. dgl. m. bezogen werden. Ohne die nachtheiligen Einflüsse dieser Traumen leugnen zu wollen, glaube ich doch, dass das Knochenbohren oft schon vorher latent bestand, und die äussere Einwirkung höchstens seinen Verlauf beschleunigte, während in anderen Fällen jeder traumatische Einfluss mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Unter allen diesen Affectionen des Knochen systems giebt die Pædarthrose und die skrophulöse Caries der Röhrenknochen immer auch die günstigste Prognose, indem hier, freilich erst nach jahrelangem Verlauf, eine vollständige Elimination der nekrotischen Knochentheile und eine Vernarbung mit trichterförmiger Einziehung der überliegenden Haut erfolgt, während die seltener vorkommende analoge Affection des Brustbeins und der Rippen durch ihren Übergang auf das Mediastinum und die Pleura (S. 368) lebensgefährlich werden kann. Schliesslich sei noch erwähnt, dass auch die Schädelsknochen, insbesondere das Schläfenbein, bisweilen von der chronischen Entzündung befallen werden, und zwar das letztere ganz unabhängig von der (S. 748) beschriebenen Otitis externa, aber mit denselben unheilvollen Ausgängen.

Dass die oben erwähnten Knochenentzündungen bei Kindern auch ohne skrophulöse Grundlage, wenigstens ohne irgend ein anderes Zeichen dieser Krankheit vorkommen, ist sicher. Dies gilt nicht bloss von der Pædarthrose, die, wie ich Ihnen früher (S. 89) mittheilte, auch syphilitischer Natur sein kann, sondern auch von anderen Formen der multiplen Osteitis. So sah ich unter anderen bei einem

kaum einjähriges, vollkommen gesundes Kinde, welches ebenso wie seine Eltern und Geschwister durchaus frei von allen skrophulösen und luëthischen Symptomen war, schnell nach einander Anschwellungen an den Epiphysen der linksseitigen Vorderarmknochen, am Metacarpus des linken Daumens, an der oberen Epiphyse des rechten Radius und auf der linken Hälfte des Stirnbeins auftreten, welche bald fluctuirt und incidirt werden mussten, wobei das Kind sich sonst vollkommen wohl befand. Ich glaube nicht, dass man berechtigt ist, solche Fälle, in denen nur das Knorpelsystem, aber weder die Drüsen, noch andere Gewebe ergriffen sind, ohne Weiteres als „skrophulöse“ zu bezeichnen. Vielmehr scheint das im Kindesalter so mächtige Knochenwachsthum, zumeist an den Epiphysen, unter gewissen uns unbekannten Verhältnissen zu übermässiger Hyperämie Anlass zu geben, welche dann mit Entzündung und Eiterung endet. —

Der Grad der Skrophulose und ihre Ausdehnung auf eine kleinere oder grössere Reihe von Organen hängen in den verschiedenen Fällen die grössten Differenzen dar. Bald besteht das ganze Leiden ausschliesslich in einer Anschwellung der Halsdrüsen, in Blepharadenitis und Kopfschlägen, bald in Otorrhoe, Rhinitis, Pædarthrocace oder anderen Combinationen. Eine lange Reihe von Jahren kann vergehen, bis mit dem Vordringen des Alters unter zweckmässiger Pflege und Behandlung die genannten Affectionen endlich heilen, während in vielen anderen Fällen, leider auch trotz der grössten Sorgfalt, welche auf die betreffenden Kinder verwandt wird, das Befallenwerden der grösseren Röhrenknochen, der Wirbel und Gelenke dem Leben Gefahr droht, oder endlich die Entwicklung allgemeiner Tuberkulose unter den Erscheinungen der Phthisis pulmonalis, der Peritonitis oder Meningitis tuberculosa den bethalen Ausgang herbeiführt. Daraus ergibt sich auch die Prognose. So lange die Krankheit nur chronische Entzündungen in den Weichtheilen (Drüsen, Schleimhäuten, Hautdecken) hervorruft, ist für das Leben nichts zu fürchten, mögen auch bis zur endlichen Heilung viele Jahre vergehen. Weit bedenklicher gestaltet sich die Prognose, sobald die Knochen und Gelenke ergriffen werden, am schlechtesten, wenn bereits Symptome unserer Tuberkelablagerung oder amyloider Degeneration der Organe auftreten. —

Von der Aetiologie der Skrophulose wissen wir fast ebenso wenig, wie von ihrem eigentlichen Wesen. Dass die Krankheit erblich sein kann, wird wohl Niemand bezweifeln, der sich die Mühe gab, in den betreffenden Familien eine sorgfältige Anamnese aufzunehmen. Freilich wird man dies Moment in einer grossen Zahl von Fällen vermissen, und man hält sich dann mit allerlei Hypothesen, wie mit dem zu haben,

oder zu jugendlichen, oder zu ungleichen Alter der Eltern, mit dyskrasischen Krankheiten derselben, wie Hydrangyrose, Syphilis u. s. w. Dass solche Eltern schwächliche Kinder zeugen werden, lässt sich freilich nicht bestreiten, und insofern schwächliche Kinder gewiss leichter skrophulös, d. h. eher von chronischen Entzündungen verschiedener Gewebe befallen werden als kräftige, mag jene Annahme einige Berechtigung in sich tragen. Ganz dasselbe gilt von der Mangelhaftigkeit der Lebensbedingungen, unter welchen das Kind aufwächst. Schlechte Ernährung, ungesunde, eingesperrte Luft in feuchten, dumpfen Räumen, die dem Lichte wenig zugänglich sind, hemmen nothwendig die normale Entwicklung des Organismus, begründen eine mangelhafte Blutbeschaffenheit und demgemäss einen Mangel an Resistenz, aus welchem schliesslich Skrophulose hervorgehen kann. Das Vorwiegen dieser Krankheit in grossen Städten und in den armen Volksschichten findet in diesen Umständen eine genügende Erklärung.

Wo einmal die Disposition zu skrophulösen Erkrankungen besteht, kann dieselbe, auch wenn sie sich bis dahin durch gar keine oder nur höchst unbedeutende Zeichen kundgab, unter dem Einfluss einer acuten Erkrankung plötzlich hervortreten. Zu diesen Erkrankungen gehören erfahrungsgemäss vorzugsweise der Keuchhusten, die Masern, die Pocken und selbst die Vaccine, nach deren Ablauf man sehr häufig Drüsenanschwellungen, Ausschläge und Schleimhautentzündungen auftreten sieht, an welchen die betreffenden Kinder früher niemals gelitten hatten. Dies ist eine unbestreitbare Thatsache, welche jedem Arzte bekannt, aber noch unerklärt ist. Viele Fälle von sogen. Syphilis vaccinalis beruhen zweifellos auf einer Verwechslung dieser nach der Impfung hervorbrechenden skrophulösen Affecte mit wirklicher Lues.

Die Hauptbedingung einer erfolgreichen Therapie bleibt die Beschaffung möglichst günstiger Lebensverhältnisse. Das Einathmen einer reinen Luft in gesunden, lichten und wohlgelüfteten Wohnungen, das Fernhalten der Kälte und Feuchtigkeits, eine nahrhafte Kost, der Genuss der frischen Land-, Berg- oder Seeluft, gymnastische Uebungen und eine sorgfältige Hautpflege durch Bäder sind hier mehr werth, als alle genährten Antiskrophulosa, und zur Heilung der milden Formen für sich allein schon ausreichend. Die Erfüllung dieser Bedingungen ist aber leider nur in der Minderzahl der Fälle möglich; in der Armen- und Hospitalpraxis stösst man hier auf eine nicht zu beseitigende Ungunst der Verhältnisse und kann sich daher über die schlechten Heilresultate unter solchen Umständen nicht wundern. Daher sind alle Bestrebungen, welche dahin zielen, den Kindern der Armen und den Skrophulösen die

Wohlthat jener „Leithäder“ zu verschaffen, mit Freude zu begrüßen, und besonders die Einrichtung von Kinderstationen an der Seeküste, mit denen uns viele andere Nationen bereits vorangegangen sind, würde sich hier in erster Reihe empfehlen. Auch in Deutschland hat man jetzt den Anfang gemacht Institute dieser Art ins Leben zu rufen (Norderney), welchen man die lehrhafteste Theilnahme zuwenden sollte.

Unter den Arzneimitteln, welche man gewöhnlich als „antiskrophulöse“ bezeichnet, steht meiner Erfahrung nach das Jod oban, welches ich am liebsten in der Verbindung mit Eisen als Symp. ferri jodati (5–12 gr. dreimal täglich), oder in Verbindung mit Jodkali (nach der Empfehlung von Lugol) verordne (F. 46). Das Mittel muss Monate lang, wenn es keine Digestionsstörungen verursacht, fortgebraucht werden, wird aber durch die Gegenwart oder den Verdacht einer bestehenden Tuberkulose der Lungen contraindicirt. Erscheinungen eines sogenannten „Jodismus“, wie sie öfters beschrieben wurden, sind mir bisher noch nicht vorgekommen, höchstens kam es zu einem starken Schnupfen oder zu Erythemen im Gesicht und an anderen Stellen der Haut. Auch die gerühmten Soolbäder verdienen sicher ihren Ruf wegen ihres mächtigen Einflusses auf den Stoffwechsel; nur verspreche man sich keine rasche Wirkung von denselben, und berathe die Eltern darauf vor, dass nur lange fortgesetzte und wiederholte Bädercuren erfolgreich sein können. Auch lasse man nicht zu anhaltend baden, sondern alle paar Tage einmal aussetzen, weil viele Kinder durch die Bäder ernstlich angegriffen werden. Die sehr geringen Mengen von Jod oder Brom, welche gewisse Soolquellen, z. B. Kremsbach, Hall und andere enthalten, kommen bei der Wirkung wohl kaum in Betracht, während die Menge des Chlornatrium und des in der Mutterlauge vorherrschenden Chlorkalcium von grösster Bedeutung ist. Ausser den beiden eben genannten Soolbädern sind Oeynhausen und Nauheim, welche sich durch einen starken Kohlensäuregehalt auszeichnen, ferner Kiesen, Sulza, Salzungen, Arnstadt, Reichenhall, Ischl, Kissingen, Pyrmont (Verbindung mit Eisenquellen), Königsdorff-Isarimb, Soben bei Aschaffenburg, Dürkheim, Rothelfelde und andere zu empfehlen. Einzig in seiner Art ist Colberg, indem es die Wirkungen eines Soolbades mit denen der Seebäder und der Seeluft vereinigt, welche letztere, wie ich schon erwähnte, als ein bedeutender Heilfactor in der Behandlung der Skrophulose zu betrachten ist. In neuester Zeit versucht auch Greifswald diesen Vorzug mit Colberg zu theilen. Ueberhaupt spielt die frische Luft bei allen diesen Curen eine Hauptrolle, und die Wirkung der künstlichen, zu Hause gebrachten Soolbäder muss schon aus diesem Grunde hinter derjenigen der natürlichen

immer weit zurückstehen. Nur wo die letzteren der Verhältnisse wegen nicht zu haben sind, muss man sich mit den künstlichen Sodbädern begnügen, zu denen man je nach dem Alter 1 bis 5 Pfund Kochsalz (Seesalz, Stassfurter Stein- oder ein anderes Badesalz) mit einem Zusatz von 1—2 Pfund Kreuzacher oder einer anderen Mutterlauge benutzt.

Dass die Spuren von Jod, die sich im *Oleum jecoris* finden, eine spezifische Wirkung ausüben, ist mehr als zweifelhaft. Das vielfach gepriesene Mittel wirkt wohl mehr als *Nitricas* und in der Weise wie fette Nahrungsmittel überhaupt, soll daher nach Einigen durch *Ol. olivarium* völlig zu ersetzen sein. Meiner Erfahrung nach steht es dem Jod erheblich nach, und möchte ich nur noch vor zu starken, die Verdauung leicht störenden Dosen desselben warnen. Zwei bis drei Kinderlöffel täglich sind vollkommen ausreichend. Die von manchen Aerzten beliebten Einreibungen des Leberthrans in die Haut halte ich wegen des widrigen Geruchs und der Unreinlichkeit für verwerflich. Ebenso wenig könnte ich von anderen gerühmten Mitteln, den Plummer'schen Pulvern, dem Aethiops, den Wallnussblättern, dem Eichelkassie u. s. w. irgend einen Erfolg beobachten. Man verliert mit der Anwendung derselben nur seine Zeit. Für die Skrophulose im Allgemeinen bleibt daher die Verbesserung der Lebensbedingungen, der Gebrauch des Jods oder des Jodeisens, und der oben erwähnten Bäder die einzige Methode, von der man sich einen wirklichen Erfolg versprechen darf.

Neben diesem im Grossen und Ganzen festzuhaltenden Heilplane können durch die einzelnen Localaffectionen, die Augenerkrankungen, die Erkrankungen der Knochen, der Gelenke, der Haut und Schleimhäute, noch eine Reihe von Indicationen Platz greifen, auf welche ich hier nicht näher eingehe, da sie grösstentheils in das Gebiet der Chirurgie und der Ophthalmiatrik hineinfallen. Nur möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass bei der Parathrokace das Auskratzen der kranken Knochen mit dem scharfen Löffel den Verlauf etwas abkürzt und daher der einfach expectativen Behandlung, welche sich viele Jahre hinzieht, vorzuziehen ist. Dennoch erwarte man von diesem Verfahren nicht allzuviel; wenigstens fehlt es in unserer Klinik nicht an Fällen, welche auch der immer wiederholten Aushöhlung Jahre lang Trotz boten. Ueber die in neuester Zeit wieder empfohlene Schmiercur mit Kaliseife, welche besonders skrophulöse Drüsenanschwellungen auffallend schnell zurückbilden soll⁷⁾, fehlen mir ausreichende eigene Erfahrungen; jedenfalls ist, wenn die Einspritzungen mit Jodtinctur erfolglos bleiben, die Behandlung mit Schmierseife

⁷⁾ Kappesser, Klingenhoffer, Krimm u. A.

(1—2 Löffel täglich in verschiedene Körpertheile eingerieben) immer zu versuchen, ehe man zur Radicalcur, d. h. zur Exstirpation der verhärteten Drüsen schreitet. —

V. Die Rachitis.

Die „englische Krankheit“, wie die Rachitis nach der Nationalität ihres ersten bedeutenden Autors Glisson genannt wird, während die noch immer populäre Bezeichnung „doppelte Glieder“ von der charakteristischen Anschwellung der Epiphyssen hergenommen ist, kommt am häufigsten bei Kindern im zweiten und dritten Lebensjahre zur Beobachtung; ich sage ausdrücklich zur Beobachtung, weil die Krankheit um diese Zeit ihre grösste Entwicklung zu erreichen pflegt, und von sehr vielen Eltern, zumal in den niederen Ständen, erst nach dem Eintritt sehr auffälliger Erscheinungen ärztliche Hülfe nachgesucht wird. Dass die ersten Symptome der Rachitis aber viel früher, ja schon in den ersten sechs Monaten des Lebens, besonders an den Schädelknochen und an den Rippen auftreten können, ist eine Thatsache, welche ich selbst sehr häufig constatirt habe. Viele Eltern werden erst dadurch aufmerksam gemacht, dass die Kinder, welche schon zu laufen angefangen, dies wieder verlieren, oder überhaupt noch nie im Stande waren zu gehen und allein auf den Füßen zu stehen. Weit seltener können die Kinder sich selbstständig oder an der Hand der Mutter bewegen, und zeigen dann einen watschelnden Gang, welchen man mit demjenigen einer Ente vergleichen kann. Bei der Untersuchung fällt sofort die im Verhältniss zum übrigen Körper bedeutende Grösse des Kopfes auf, die breite im Profil mächtig prominirende Stirn (*Frons quadrata*), die stark nach aussen geneigten Scheitelbeine. Nicht selten verläuft die *Sutura sagittalis*, bisweilen auch die *coronalis*, gleichsam in einem Thal, welches von den verdickten Scheitelbeinen hügelartig begrenzt wird. Die vordere Fontanelle, die im normalen Zustande meistens im 15. Lebensmonate vollständig ossificirt, ist bei Rachitischen mit wenigen Ausnahmen noch bis weit ins zweite und dritte Lebensjahr hinein mehr oder minder weit offen, ihre Knochenränder sind leicht eindrückbar, die Näthe, besonders die *Sutura longitudinalis*, oft aber auch die *Lambda-* und *Coronal-*, am seltensten ein Theil der Stirnath noch klaffend, mit weichen, nachgiebigen Rändern. In manchen Fällen findet man auch die beiden hinteren Fontanelles noch häufig. Diese Erscheinungen, besonders aber das bedeutende Volumen des Kopfes werden von den Laien oft als Zeichen eines Wasserkopfes betrachtet, wogegen sich sofort die gute Haltung des Kopfes und die völlige Integrität der psychischen Functionen, die oft

sogar ungewöhnlich rege sind, geltend machen lässt (S. 257). Nur in einer kleinen Zahl von Fällen beobachtete ich, dass die Kinder erst ungewöhnlich spät anfangen, sprechen zu lernen. Die Zahnentwicklung ist fast immer retardirt; solche Kinder bekommen oft erst im zweiten Jahre den ersten Zahn, und die einzelnen Gruppen brechen unregelmässig und in ungewöhnlich langen Intervallen hervor. Die Zähne werden bei Vielen bald nach ihrem Erscheinen in Folge einer mangelhaften Schmelzbedeckung gelb, streifig, schwärzlich, und beiseiten sich endlich bis auf den Kieferrand ab; mitunter fand ich nur die Zähne des Oberkiefers, und zwar schon die neu hervortretenden, auf diese Weise verfallen, während die unteren intact blieben; in anderen Fällen waren alle Zähne ebenso schön und wohl erhalten wie bei den gesündesten Kindern. Von grossem Interesse sind hier die Formveränderungen der Kiefer, auf welche Fleischmann in einer trefflichen Arbeit¹⁾ die Aufmerksamkeit gelenkt hat. Schon vor und innerhalb der ersten Dentition nimmt der Unterkiefer statt seiner normalen bogenförmigen Krümmung eine polygonale Form an, „indem von der Gegend der Eckzähne an die beiden Seiten des Kiefers eine Annäherung, eine Contraction erfahren haben, während in Folge mangelhafter Ablagerung von Kalksalzen an der vorderen Lamelle des Kiefer-Mitteltheils das Wachsthum daselbst und somit die Wölbung ausgeblieben ist“. Die Schneidezähne stehen daher in einer ziemlich geraden Linie neben einander, und von den Eckzähnen an wenden sich die Seitenthelle des Kiefers anstatt bogenförmig, beiderseits geradlinig und etwas divergirend nach rückwärts. Gleichzeitig ist der untere Kieferrand mehr nach aussen, der Alveolarrand mehr nach einwärts gestüzt, so dass die Backen- und bisweilen auch die Schneidezähne nicht vertical, sondern convergent nach innen stehen. Minder auffallend sind die von demselben Autor beschriebenen Formveränderungen des Oberkiefers, unter denen die Verlängerung der Längsachse vorzugsweise Erwähnung verdient. Noch charakteristischere Zeichen bietet aber die Untersuchung des Thorax. Die Schlüsselbeine sind häufig stark gekrümmt oder an einer Stelle spitzwinkelig geknickt; die Rippen zeigen an der Stelle, wo der knöcherne Theil mit dem knorpeligen sich verbindet, eine mehr oder weniger hervortretende, bei mageren Hautdecken deutlich sichtbare knotige Auftreibung, welche bei näherer Untersuchung meistens aus zwei durch eine Furehe geschiedenen Anschwellungen (einer am knöchernen und einer am knorpeligen Stücke) besteht. Auf diese Weise bildet sich auf jeder Seite des Thorax eine von ihnen

¹⁾ Klinik der Pädiatrik. II. Bd. Wien 1877. S. 168.

und inner nach unten und aussen verlaufende Reihe kantiger Erhabenheiten, welche man mit dem Namen des „rachitischen Rosenkranzes“ zu bezeichnen pflegt, und die besonders bei mageren Kindern sehr auffällig ist. Dazu gesellt sich häufig eine Abflachung der Seitenfläche der Brust, welche bei höheren Graden der Krankheit in eine wirkliche Concavität derselben ausartet; die zwischen dem *Angulus costarum* und den eben beschriebenen Auftreibungen der Epiphysen liegenden Theile der 2. bis 8. Rippe sind stark einwärts gegen die Thorashöhle zu gezogen, und die untersten Rippen bilden einen nach aussen umgelenkten Rand, eine Erscheinung, welche im Verein mit dem ungewöhnlich prominirenden Brustbein die Abflachung und Concavität der Seitenflächen noch auffälliger macht (*Pectus carinatum*, Hühnerbrast). Dabei kommen zuweilen Asymmetrien der beiden Brusthälften und unvollkommene Achsen-drehungen der Rippen zu Stande, deren äussere Fläche mehr nach innen gewendet ist. Die Angabe der Eltern, dass das Kind kurzathmig sei, findet man in hochgradigen Fällen immer bestätigt; die Respiration geht schneller und oberflächlicher als bei gesunden Kindern von Statten, und man bemerkt, dass die abgeflachten oder gar concaven Seitenpartien des Thorax bei jeder Inspiration noch mehr nach innen gezogen werden, während gleichzeitig durch Einziehung des Epigastriums die inspiratorische Action des Zwerchfells ungewöhnlich stark hervortritt. Bronchialkatarrhe sind sehr häufige Begleiter, wobei mehr oder minder ausgedehnte Rasselgeräusche, besonders an der Rückfläche, und eine etwas stöhnende Expiration des Kindes hörbar sind. Mit dem engen verhärteten Thorax contrastirt der auffallend gewölbte, von gaserfüllten Darmacklingen meteoristisch ausgedehnte Unterleib, dessen obere Partie durch die in Folge der Thoraxenge herabgedrückte Leber und Milz mehr als sonst gefüllt wird. Die Functionen der Digestionsorgane sind oft ganz ungestört; nur in einem Theil der Fälle giebt sich Verdauungsstörung, besonders Neigung zu Durchfällen kund. Zu den wichtigsten Erscheinungen aber gehören die an den Knochen der oberen und unteren Extremitäten wahrnehmbaren. Die Epiphysen des Radius und der Ulna, besonders des ersteren, bieten eine mehr oder minder auffallende Verdickung und Verbreiterung dar, so dass in hochgradigen Fällen, zumal bei mageren Kindern, die Hand durch eine Furche wie abgeschnitten vom Arm erscheint, während die Diaphysen der Vorderarmknochen oft eine nach der Streckseite hin convexe Krümmung oder gar eine stark hervortretende Knickung zeigen. Noch deutlicher erscheint gewöhnlich die Krümmung der Tibia, deren Knöchel-epiphyse, wie die der Fibula, ebenfalls ansehnlich verdickt ist. Die nach innen concave Curvatur ist in

der Regel im untersten Drittheil des Knochens am entschiedensten ausgeprägt, bisweilen in dem Grade, dass dadurch der Anschein eines *Pes varus* entsteht. Nicht selten beobachtet man auch Krümmungen und Knickungen der Oberarm- und Oberschenkelknochen und starke Anschwellung derjenigen Epiphysen, welche die Knie- und Ellenbogengelenke begrenzen. Selbst die Schäfelblätter und Darmbeine bieten dem aufmerksamen Untersucher in einer Reihe von Fällen mehr oder minder beträchtliche Verdickungen ihrer Ränder dar. Sehr häufig erscheint endlich eine Krümmung der Wirbelsäule, sei es nun mit Skoliose oder Kyphose, am häufigsten des Dorsaltheils mit compensirender Leodose der Portio lumbalis. Diese kyphotische Krümmung unterscheidet sich von der durch Spondylitis bedingten vorzugsweise durch den grösseren Bogen, welchen sie beschreibt, und durch Abnahme oder gänzliches Verschwinden in der Bauchlage des Kindes, zumal wenn gleichzeitig eine mässige Extension der Wirbelsäule vorgenommen wird.

Alle diese Veränderungen bieten natürlich in Bezug auf Grad und Ausdehnung grosse Verschiedenheiten dar. Auch sieht man sehr häufig einen Theil derselben gänzlich fehlen, so dass nur ein unvollständiges Bild der Rachitis zu Stande kommt. Am constantesten, fast nie fehlend, fand ich die Epiphysenschwellung an den Rippen, die auch immer zu den frühesten Symptomen der Rachitis gehört, ja schon im 3. bis 5. Lebensmonate bemerkbar sein kann. Nicht selten vermiste ich aber die Zeichen der Schädelrachitis: der Kopfumfang ist dann nicht vergrössert, die Fontanellen und Nähte sind zur richtigen Zeit geschlossen, und selbst die Zahnentwicklung kann auf normale Weise vor sich gehen. Unter anderen beobachtete ich ein 9 Monate altes Mädchen, welches trotz der Rachitis schon im 6. Monate die ersten Zähne bekommen und bei der Untersuchung bereits 6 Zähne aufzuweisen hatte. Dasselbe fand ich bei einem anderen erst 10 Monate alten Kinde, und Sie ersieht daraus, dass in einzelnen Fällen die Dentition trotz der Rachitis mit anomaler Rapidität von Station gehen kann. Zuweilen prävalirt auch die Epiphysenschwellung und die Knickung der Extremitätenknochen, während Thorax und Schädel nur wenig befallen sind. Testalem sah ich einige Kinder dieser Art schon im Alter von 1½ bis 16 Monaten ebenso gut stehen und gehen, wie gesunde Kinder. Die charakteristische Deformation des Thorax werden Sie am häufigsten und am stärksten ausgebildet immer bei sehr jungen, schlecht genährten und vielfach von Bronchialkatarrhen heimgesuchten Kindern finden, während gut genährte, kräftige Individuen dieselbe entweder gar nicht oder nur

in geringem Maasse darzubieten pflegen. Auf die Ursache aller dieser Varietäten werde ich bald zurückkommen.

Auch abgesehen von diesen localen Differenzen ist das Gesamtbild, welches die rachitischen Kinder darbieten, sehr verschieden. Während ich bei einem, allerdings kleineren Theil mit nur geringer Entwicklung der charakteristischen Knochensymptome das Allgemeinbefinden ungestört und das Aussehen blühend fand, verneth der bei weitem grössere Theil durch anämisches Colorit, Abmagerung, Welkheit der Haut und Muscularität, fühlbare Anschwellungen der Lymphdrüsen am Halse, im Nacken, in den Inguinal- und Axillargruben eine tiefere Erkrankung des Organismus. In einzelnen Fällen beobachtete ich sogar Purpura-flecken auf der wachsblassen Haut, oder scrobatische Beschaffenheit des Zahnfleisches. Die Leber ragte bisweilen mehr als bei gesunden Kindern desselben Alters unter dem Rippenbogen hervor, während ich eine palpable Anschwellung der Milz nach oben oder unten nur selten nachweisen konnte. In diesen Fällen, also ganz ausnahmsweise, fand ich einen harten Milztumor mit Leukocythose und hochgradiger Anämie; sonst liess die Milz, auch bei den zahlreichen Sectionen in der Klinik, niemals erhebliche Veränderungen wahrnehmen, und ich kann daher das Zusammentreffen grosser Milztumoren mit der Rachitis nur als ein zufälliges bezeichnen. Die Urnahrungsbereitung bot, oberflächlich untersucht, keine Abweichungen vom Normalen dar; auf die chemische Analyse, welche sehr verschiedene Resultate ergab, werde ich bald zurückkommen. Die Schweisssecretion ist in vielen Fällen vermehrt, und besonders am Kopfe finden so profuse Schweisse statt, dass das Kissen am Morgen durchnässt erscheint. Bei vielen Kindern bilden sich in Folge dieser Schweisse Sudamina und rothe sehr föhlblasige Ekzeme. Nur ein Theil der Kinder zeigte Missamigkeit und Unruhe, und schien, wenn man die ergriffenen Knochen comprimirte oder das Kind unter den Achseln in die Höhe hob, durch lebhaftes Schreien schmerzhaft empfindungen zu bekunden.

Einen acuten, von Fieber begleiteten Verlauf der Rachitis, wie er hier und da beschrieben wird, konnte ich bis jetzt nicht beobachten. Derselbe muss also, da die Zahl meiner Fälle viele Tausende beträgt, wenn er überhaupt vorkommt, zu den Ausnahmen gehören. Wo wirkliche Fieberbewegungen stattfanden, konnte ich immer eine Complication, besonders mit Bronchialkatarrhen, nachweisen. Die Rachitis selbst zeigte durchweg einen chronischen Verlauf, und ich stimme daher Friedleben und Fürst¹⁾ bei, welche das Vorkommen einer acuten

¹⁾ *Jahrb. f. Kinderheilk.* Bd. XVIII. 1882. 3. 192.

Rachitis überhaupt in Abrede stellen. Letzterer lässt höchstens ein acutes Initialstadium derselben gelten. Man hätte sich wohl, die von mir oben (S. 751) erwähnte multiple Osteitis, die in Folge eines stürmischen Knochenwachstums, besonders an den Epiphysen, auftreten und, wie wir sehen, sogar mit Eiterung verlaufen kann, ohne Weiteres als acute Rachitis anzusprechen. Manche Fälle dieser Art mögen, wie auch der oben genannte Autor hervorhebt, nach dem Schwinden der acuten Symptome in Rachitis übergehen, während dies in anderen Fällen nicht geschieht.

Die Zeitdauer der Rachitis zu bestimmen, ist in den meisten Fällen sehr schwer, ja unmöglich. Fast niemals bietet sich uns nämlich die günstige Gelegenheit, den ganzen Verlauf der Krankheit von Anfang bis zu Ende zu verfolgen, und die Angaben der Eltern, welche uns ihre rachitischen Kinder meistens erst in einem torporisirten Stadium übergeben, sind gewöhnlich so unsicher, dass wir uns nie ein Urtheil über den Zeitpunkt, wann eigentlich die Krankheit begonnen hat, bilden können. So viel steht indess fest, dass auch in den günstigsten Fällen immer viele Monate, oft aber auch einige Jahre vergehen, bevor man den Krankheitsprozess als abgelaufen betrachten kann. Die erste günstige Erscheinung ist der Versuch der Kinder, auf ihren Füßen zu stehen und sich selbstständig von der Stelle zu bewegen, d. h. die wieder gewonnene oder überhaupt zum ersten Mal erlangte Kraft und Festigkeit der Muskulatur und des Knochensystems der Wirbelsäule und der unteren Extremitäten. Gleichzeitig macht sich eine rasch fortschreitende Ossification der noch offenen Fontanelle und Nähte, sowie ein beschleunigter Zahndurchbruch bemerkbar, während das bis dahin zurückgebliebene Längenwachstum des Körpers merklich zunimmt, das Aussehen sich mehr und mehr verbessert und auch die Deformität der Wirbelsäule und des Thorax, wenn sie nicht zu sehr hohen Graden gediehen war, allmählich sich angleicht. Schliesslich bleiben als Residuen der Krankheit nur noch die Curvaturen und Infracturen der Röhrenknochen, besonders in Form der Säbel- oder X-Beine (*Genu valgum*), und die Verdickungen der Epiphysen zurück, die oft noch nach Jahren bemerkbar sind, aber durch das zunehmende Wachstum der Knochen in die Länge und Breite sich mehr und mehr ausgleichen. Oft wird auch durch die Hemmung des Kieferwachstums (S. 757) die normale Position der bleibenden Zähne ungünstig beeinflusst, und bei der zweiten Dentition ergeben sich dann mehrfache Anomalien, winkelige oder dachziegelartige Stellungen der Zähne, Hervortreten derselben in doppelter Reihe u. s. w. Nur in hochgradigen Fällen lassen sich die Residuen, selbst die Verdickung

der Schädelknochen, auch noch zur Zeit der Pubertät und darüber hinaus erkennen, und gerade in dieser Lebensperiode kann aus einem rachitischen Residuum, nämlich dem deformirten Becken, welches in der Kindheit selbst gar keine Rolle spielt, die äusserste Gefahr erwachsen. Im Allgemeinen wird durch die rachitische Knochenerkrankung der Beckeneingang und der ganze Beckenraum von vorn nach hinten vorgekl. indem das Promontorium und die obere Kreuzbeinhälfte unter gleichzeitiger lordotischer Krümmung der Lendenwirbel nach vorn gedrängt und der in Folge mechanischen Druckes höher gestellten Symphysis pubis genähert erscheint. Eine genauere Schilderung dieser Deformität und ihres Zustandekommens würde wegen ihres geringen pädiatrischen Interesses hier nicht an der Stelle sein¹⁾. Das Interesse der Beckenverbildung liegt eben nur in den beträchtlichen Geburtshindernissen, welche durch Verkürzung der Conjugata entstehen und in hochgradigen Fällen, wie aus der Geburtshilfe bekannt ist, die bedenklichsten operativen Eingriffe indiciren können. Unter diesen Verhältnissen finden wir häufig auch noch anderweitige bedeutende Deformitäten, besonders der Wirbelsäule (Kypho-Skoliose) und des Thorax, welche eine anheilbare Verkrüppelung begründen.

Während aus die Rachitis überwiegend häufig die in der Natur des Leidens begründeten Heilungsvorgänge bis zur völligen Genesung des Patienten durchläuft, sehen wir doch in einer Reihe von Fällen diesen günstigen Verlauf durch Complicationen aufgehalten oder gar in den entgegengesetzten verkehrt. Die bereits erwähnte Disposition zu Katarthen der Luftwege wird diesen Kindern vorzugsweise verderblich, indem einerseits durch die stete Wiederkehr derselben die an sich schon mangelhafte Hämatopoëse und die aus derselben resultirende Schwäche gesteigert wird, andererseits bei der durch die Thoraxverbildung bedingten Enge des Brustraums ein diffuser Katarrh, eine katarrhalische Pneumonie, welche bei gesunden Kindern glücklich vorübergegangen wäre, hier sehr leicht einen lethalen Verlauf nehmen. Die Raumbeengung der Lungen, die Schwäche der inspiratorischen Muskeln und die Schleimüberfüllung der Bronchien bringen hier oft ausgeprägte Atelektasen des Lungengewebes zu Stande, welche den tödtlichen Verlauf der Complication beschleunigen (S. 306). Ein grosser Theil Rachitischer geht auf diese Weise zu Grunde. Sehr häufig beobachtet man auch Anfälle von Spasmus glottidis und Eklampsie, zu denen, wie Sie

¹⁾ Vergl. Ritter v. Bittersheim, die Pathologie und Therapie der Rachitis. Berlin 1863, S. 181.

sich erkranken werden, diese Kinder weit mehr als gesunde disponirt sind (S. 163). Die schlimmste Complication hülfet aber die Tuberkulose, welche einen grossen Theil rachitischer, in elenden Verhältnissen lebender Kinder dahintrafft.

Ich muss bei dieser Gelegenheit auf einige für die Beurtheilung der physikalischen Untersuchungsergebnisse wichtige Momente zurückkommen, welche, wenn sie unbeachtet bleiben, zu diagnostischen Irrthümern verleiten können. Schon an einer früheren Stelle (S. 5) sprach ich von dem Einfluss, welchen Muskelcontractionen auf den Schall der unterliegenden Thoraxpartie haben können; insbesondere bei Kindern, die sich während der Untersuchung sträuben und vielfach hin und her bewegen, erscheint nicht selten auf einer Seite der Rückenfläche eine Dämpfung, welche bei ruhiger Lage mit gleichmässiger Spannung der beiderseitigen Muskelgruppen schnell wieder verschwindet. Bei Rachitischen aber, wo häufig eine skoliotische Krümmung der Wirbelsäule stattfindet, können, zumal bei sehr entwickelter Skoliose, solche Schalldämpfungen, wenn auch nur in mässigem Grade, permanent bestehen und gewinnen also unter diesen Umständen nur dann eine Bedeutung, wenn gleichzeitig auch die Auscultation an der betreffenden Stelle eine Lungenverdichtung ergiebt. Ebenso kann an der Vorderfläche des linken Thorax bei hohen Graden rachitischer Thoraxverbildung eine vollständige Herzdämpfung erscheinen, als im normalen Zustande, wobei auch der Impuls des Herzens über die gewöhnlichen Grenzen hinaus fühlbar zu sein pflegt. Erscheinungen, welche nicht sofort auf Hypertrophie des Organs zu beziehen sind, sondern einfach durch Verschiebung des Herzens und mangelhafte Ausdehnung der Lunge entstehen können. Billiet und Barthex wollen auch den Charakter des Athmengeräusches in der Rachitis dem bronchiales ähnlich gefunden haben und leiten dies von der mässigen Compression her, welche die Lunge von Seiten der einwärts gedrängten Thoraxwand erleiden soll. Auch mir ist der „unbestimmte“ Charakter des Athmens häufig aufgefallen, doch haben die genannten Autoren bei der Deutung desselben, wie ich glaube, die so häufig in der Rachitis vorkommenden Bronchialkatarrhe und Atelektasen zu wenig berücksichtigt. —

Die anatomischen Veränderungen, welche die Rachitis charakterisiren, betreffen ausschliesslich die Knochen. Derselben zeigen im Allgemeinen eine dunkle Rötze, die besonders stark an den platten Schädelknochen hervortritt; ihre scharfen Kanten und Ecken sind abgestumpft und abgerundet, die Röhrenknochen verkürzt, walzenförmig gerundet, an den Epiphysen köllig verdickt, in ihrer Länge verschiedenartig gekrümmt

und geknickt. Ihre Consistenz ist bedeutend vermindert, so dass man ohne Mühe Ein- und Durchschnitte durch das Knochengewebe machen kann. Das Periosteum ist verdickt und hyperämisch, schwer ablösbar vom Knochen, wobei nicht selten Knochenfragmente an demselben haften bleiben. Die Consistenzverminderung zeigt sich am deutlichsten an den Schädelknochen, die beim Durchsägen zugleich einen hohen Grad von Hyperämie und zumal an der vorderen Partie (Stirnbein und einem Theil der Ossa parietalia) eine beträchtliche Verdickung darbieten, woraus sich die an den Tabera frontalia und parietalia während des Lebens bemerkbaren Prominenzern erklären. Unter der verdickten Beinhaut lagern fein poröse, himmelsteinartige, spongiöse Schichten, die an den Diaphysen der Röhrenknochen nach innen zu mit compacteren Schichten abwechseln, und zwar so, dass im Innern nahe der Markhöhle die letzteren immer fester und den spongiösen Schichten der normalen Knochensubstanz immer ähnlicher werden¹⁾.

Um das rachitische Knochenleiden richtig auffassen zu können, muss man sich zunächst der Wachstumsverhältnisse des normalen Knochens erinnern²⁾, welches bekanntlich nach zwei Richtungen hin, in die Länge und in die Dicke, erstere von den knorpeligen Epiphysen, letzteres vom Periost aus erfolgt:

a) Wachsthum in die Länge. Der Hyalinknorpel der Epiphysen der Röhrenknochen geht mit zwei Schichten, einer 1–2 Mm. breiten bläulichen, und einer mattgelblichen, $\frac{1}{2}$ – $\frac{1}{2}$ Mm. breiten, in die spongiöse, von Markräumen durchzogene und mit einem sehr gefässreichen Mark gefüllte Substanz des frisch gebildeten Knochens über. In jener, der sogenannten Wucherungsschicht, findet man massenhaft entwickelte und in Längsreihen geordnete grössere Knorpelzellen, während in der zweiten Schicht die Verkalkung in der Weise stattfindet, dass sich Kalkkrumen in die Intercellulärsubstanz, welche die Knorpelzellen umgibt, ablagern und dieselbe andurchsichtig machen. In derselben Schicht geschieht dann auch die Bildung von Markräumen und wahrer Knochen- substanz, ein Process, über dessen Zustandekommen die Ansichten der Forscher noch vielfach divergiren. In der Rachitis ändert nun einerseits eine anormale Wucherung der erwähnten Knorpelschichten mit bedeutender Verbreiterung statt, andererseits geht die Verkalkung der

¹⁾ Virchow, dessen Archiv, Bd. V.

²⁾ Vergl. Bitter, a. a. O. S. 27 u. s. w. — Rehn, Gerhardt's Handbuch der Kinderkrankh. III. S. 54. 1878. — Kassowitz, die normale Ossification und die Erkrankungen des Knochen systems bei Rachitis u. hereditärer Syphilis. Wien 1879 — 82.

zweiten Schicht ganz unregelmässig und mangelhaft vor sich, und die Markraumbildung erstreckt sich von dieser aus bis in den wuchernden Knorpel hinein, wobei statt der normalen geradlinigen Begrenzung ein zackiges Ineinandergreifen der Knorpel- und spongösen Knochenschichten stattfindet. Aus diesen Vorgängen erklärt sich die Verdickung der Epiphysen und die Verkümmernng des Längenwachstums der Knochen, welches ein Zurückbleiben der Kinder im Wachsthum überhaupt bedingt und bei vielen noch im späteren Lebensalter bemerkbar ist.

b) Wachsthum in die Dicke. Im normalen Zustande hängt das sehr dicke und gefässreiche Periost durch ein netzartiges faseriges Gewebe mit kernhaltigen Zellen fest mit dem Knochen selbst zusammen, welcher dadurch wächst, dass die eben erwähnten Zellen unter Sklerosirung der Grundsubstanz in sternförmige Knochenzellen auswachsen. Zwischen den Lamellen dieser neuen Knochenbildung bleiben aber mit einander communicirende, rundliche oder längliche Räume übrig, gefüllt mit einem weichen röthlichen Mark, in welchem sich endlich aus den Markzellen neue, mit denen des Periosts und der inneren Knochentheile anastomosirende Gefässe bilden. Dieser Process dauert so lange, als der Röhrenknochen überhaupt noch in die Dicke wächst, wobei aber im Inneren durch Verflüssigung der Knochenmasse und Resorption eine mit Mark erfüllte grosse Höhle sich bildet. In der Rachitis erscheinen nun das Periost und seine zelligen Elemente bedeutend gewuchert, die neugebildeten spongösen Knochenlamellen und Balkenetze aber mangelhaft ossificirt mit fehlender oder sehr verminderter Kalkablagerung. Gleich unter dem verdickten Periost erscheinen hyperämische markraumhaltige Balkenetze, dann eine Schicht compacter Substanz, dann wieder spongöse Balkenetze u. s. w., wobei aber die normale Resorption von der Markhöhle aus fort dauert und somit die Rindenschicht immer dünner werden muss. Ganz ähnliche Verhältnisse zeigen sich an den platten Knochen des Schädels, an den Schulterblättern und Darmbeinen. Die Heilung der Krankheit erfolgt zunächst durch einen Stillstand der Knorpelwucherung, auf welchen eine rasche Verkalkung und Verknöcherung der neugebildeten Schichten folgt, welche dabei noch fester als im normalen Zustande werden (die sogenannte Eburnation oder Sklerose).

Zu diesen physikalischen Alterationen des Knochensystems gesellen sich nun auch chemische¹⁾. Alle Untersuchungen ergaben überein-

1) Friedlaender, Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. III. Wien 1860. — Baginsky, Prakt. Beitr. zur Kinderheilk. II. Tübingen. 1862. S. 80.

stimmend eine mehr oder minder beträchtliche Abnahme der Kalksalze in den rachitischen Knochen mit Verminderung des specifischen Gewichts derselben, vorzugsweise in den oberhalb des Zwerchfells gelegenen Skeletttheilen, mit relativer Zunahme des Wassergehaltes der knorpeligen Theile und der organischen Grundlage. Hand in Hand damit geht eine relative Abnahme des gesammten Körpergewichts, welches erst später im Heilungsstadium wieder erheblich zunimmt. Man kann daher die Rachitis anatomisch als einen entzündlichen Process betrachten, der an den Wachstumsstellen der Knochen, Epiphysen und Periost, vor sich geht. Ob dabei, wie Kassowitz annimmt, eine in Folge der enormen Vascularisation und Hyperämie eintretende mächtige Plasmaströmung auf die Kalkbildung hindernd und einschmelzend wirkt, muss vorläufig dahingestellt bleiben.

Aus diesen anatomischen und chemischen Alterationen erklären sich nun einige Hauptsymptome der Rachitis:

1) das gehemmte Längenwachsthum des Körpers, theils durch die Beeinträchtigung der normalen Knochenbildung von den Epiphysen her, theils durch die Nachgiebigkeit der unteren Röhrenknochen, welche den Druck des Körpers zu tragen haben:

2) die Krümmungen, Knickungen und Fracturen der Knochen, welche meistens durch Druck und andere traumatische Einwirkungen, denen die an Kalksalzen armen Knochen ausgesetzt sind, bedingt werden. Die Knickungen (Infractionen) betreffen immer die inneren festeren Schichten der Röhrenknochen, während die äusseren noch weich gebliebenen mit dem verdickten Periost nur nachgeben, so dass die Knickung etwa dem Bruche einer Weidenrute oder eines Federkiels entspricht. Obwohl dadurch auch bei einem vollständigen Bruch der inneren Schichten die Wahrnehmung einer Crepitation oder einer Verschiebung der Bruchenden sehr erschwert wird, habe ich doch in einzelnen Fällen eine Crepitation deutlich fühlen können. Schon der Druck der Körperschwere auf die unteren Extremitäten bedingt Curvatur und Knickung der letzteren, meist mit der Convexität nach aussen (Säbelbeine); während eine Compression der Rippen und Schlüsselbeine, besonders beim Aufheben der Kinder durch Umfassen des Thorax, Fracturen dieser Knochen herbeiführen kann. Jeder Fall auf den Boden, selbst das Umdrehen im Bette hat leicht ähnliche Folgen, und so findet man denn nicht selten mehr oder minder spitzwinkelige, meistens schon durch Callusbildung verheilte Infractionen der Schlüsselbeine, Rippen, Vorderarmknochen, Oberschenkel u. s. w., entweder vereinzelt oder multipel, in welchen Fälle Böhler bejammernswerther Verkrüppelung zu Stande

kommen. In einem dieser Fälle (1½-jähriger Knabe) fanden wir viele Rippen gerade an den Ansatzstellen der Knorpel fracturirt, und die Heilung durch reichlichen fliessenden Callus in der Art zu Stande gekommen, dass die Epiphysen fast auf der äusseren Fläche der Diaphysen aufsaßen. Dass auch starke Muskelcontractionen Knickungen und Fracturen herbeiführen können, wird behauptet. Unter anderen Fällen erinnere ich mich eines 7 Monate alten stark rachitischen Kindes (April 1878), welches nach sehr heftigen, einen ganzen Tag sich wiederholenden Convulsionen Fracturen beider Radii zeigte, welche die Anwendung eines Gypverbandes erheischten. Indess kann man in solchen Fällen andere traumatische Einwirkungen, besonders ein gewaltsames Anlassen, wohl nie mit Sicherheit ausschliessen.

Wahrscheinlich hat Fleischmanns Recht, wenn er auch die von ihm beschriebene Formveränderung der Rippen von den Contracturen der *Musc. mylohyoideus* und *Masseter* herleitet, die auf den kalkarmen Knochen um so stärker wirken müssen. Dagegen ist die charakteristische Deformität des Thorax nicht etwa die Folge einer vereinzelten Ursache, z. B. der vielbeschuldigten Paralyse oder Atrophie der Inspirationsmuskeln (*Serrati*, *Intercostales* u. s. w.), sondern vielmehr, wie Ritter bemerkt¹⁾, eine Folge des Zusammenwirkens einer ganzen Reihe von Momenten²⁾, unter denen der Druck der äusseren Atmosphäre, die Contractionen des Zwerchfells und die Weichheit der Thoraxknochen besonders hervorzuheben sind. Schon bei gesunden kräftigen Kindern bemerkt man, wie bei sehr kräftigen und rasch aufeinander folgenden Contractionen des Zwerchfells, z. B. beim Schluchzen, die am meisten nachgiebigen Stellen des Thoraxgerüsts, d. h. die vordersten Theile der Rippen im Beginn jeder Inspiration deutlich einwärts gezogen werden. Die grosse Nachgiebigkeit der gesamten Rippentheile beim Kinde im Verein mit der verhältnissmässig schwachen und unvollständigen Inspiration ist Schuld an dieser Erscheinung, indem in Folge der letzteren die in die Lungen einströmende Luftmenge nicht ausreicht, dem von aussen einwirkenden atmosphärischen Drucke das Gleichgewicht zu halten, und dieser daher jene nachgiebigen Theile einwärts drängt. Diese Erscheinung, welche auch bei der Hypertrophie der Mandeln sehr kleiner Kinder (S. 439) wahrgenommen wird und eine ähnliche Deformität des Thorax hervorbringen kann, muss nun bei rachitischen Kindern, wo der letztere abnorm erweitert und die inspiratorischen Muskeln oft noch schwächer als sonst agiren, um so mehr hervortreten, was mit der Zeit ein per-

¹⁾ L. c. S. 467.

massentes Einsinken der betreffenden Seitenpartie des Thorax mit entsprechender Vordrängung des Sternum und seiner Knorpelanhänge zur Folge haben muss. Auch die gürtelförmige Einschnürung, welche etwa 3 Querfinger unter der Brustwarze rings um die vordere Fläche des rachitischen Thorax läuft, und unterhalb welcher die über der Leber, dem Magen und der Milz liegenden Rippen saumartig nach aussen umgebogen und vorgefrängt erscheinen, muss theils dem nach abwärts gerichteten concentrischen Zuge der Zwerchfalleinsenkungen, theils ebenfalls dem atmosphärischen Drucke zugeschrieben werden¹⁾.

Dass die Volumenzunahme des Kopfes, zumal das Vorspringen der Stirn und der Tubera parietalia, durch pericostitische Auflagerungen bedingt, und dadurch bisweilen Verwachsungen mit Hydrocephalus hervorgerufen werden, erwähnte ich bereits. Zwar werden von verschiedenen Autoren Fälle von „Hypertrophie des Gehirns“ bei Rachitis beschrieben; mir selbst aber ist bisher ebenso wenig ein sicherer Fall dieser Art vorgekommen, als ich mich von der Häufigkeit hydrocephalischer Complicationen, wie sie z. B. von Ritter angegeben wird, überzeugen konnte. —

Die aetologischen Verhältnisse der Rachitis sind uns ebenso wenig klar, wie diejenigen der Skrophulose. Die Verbreitung der Krankheit in grossen Städten, zumal des nördlichen und mittleren Europa, ist eine enorme, und wenn Ritter unter den in Prag von ihm poliklinisch behandelten Kindern 31 pCt. Rachitische fand, so kann ich dies anscheinend colossale Verhältnisse nach den in meiner Poliklinik gemachten Erfahrungen für Berlin durchaus bestätigen. Das überwiegend häufige Vorkommen der Krankheit bei den Kindern armer Leute ergibt von vorn herein, dass ungünstige Lebensverhältnisse, unzweckmässige Ernährung, Mangel an Pflege und Reinlichkeit, Einathmen einer verdorbenen Luft u. s. w. eng, überfüllen und noch dazu oft feuchten Räumen eine wesentliche Rolle bei der Erzeugung der Rachitis spielen. Die überwiegende Mehrzahl der rachitischen Kinder sind sogenannte Pappelkinder, welche statt der Mutter- oder Ammiennähe künstliche Nahrung, insbesondere viel Mehlbrei z. dgl. m. bekommen haben und in Folge von Ueberfütterung vielfachen Dyspepsien und Diarrhöen unterworfen gewesen sind. Ebenso kann aber auch eine unzureichende Beschaffenheit der Muttermilch, meist bedingt durch die ärmlichen Verhältnisse der Säugenden, den Grund zur Rachitis legen, wie denn z. B. Friedlöh die Milch von zwei Müttern rachitischer Kinder bestehend ärmer an Proteinsub-

¹⁾ Ritter, l. c. S. 479 und Ecker, l. c. S. 66.

stauen und Kohlehydraten fand, als die normale Frauenmilch. Oft genug sieht man aber auch Kinder aus höheren Ständen, ja selbst unter den günstigsten Lebensverhältnissen bei anscheinend vorzüglicher Brustnahrung rachitisch werden. Wenn ich auch zugeben will, dass Ritter's Annahme einer erblichen Disposition, zumal von mütterlicher Seite, für manche Fälle dieser Art gerechtfertigt sein mag, so kann ich doch nach meinen Erfahrungen der Heredität im Allgemeinen nicht den Einfluss zuschreiben, welchen der genannte Autor ihr vindicirt. Auch über den Einfluss anderer Krankheiten der Eltern oder der Kinder selbst wissen wir so gut wie nichts. Wenn auch viele Rachitische von früh an mit dyspeptischen Störungen zu kämpfen hatten, so fehlt doch dies Moment, auf welches von Manchen Werth gelegt wird, bei sehr vielen Kindern, deren Anamnese ich so genau als möglich aufnahm. Ueber die Ansicht von Parrot, dass die Rachitis immer durch hereditäre Syphilis erzeugt werde, brauche ich kein Wort zu verlieren; dieselbe hat schon auf dem internationalen medicinischen Congress zu London (August 1882) ihre gehörende Abfertigung gefunden. Mir ist es unbegreiflich, dass ein so verdienstvoller Forscher wie Parrot, sich zu so unbedachten Theorien hinreissen lassen konnte, noch mehr aber, dass er Dinge, wie die von mir S. 15 erwähnte Beschaffenheit der Zunge, die so unendlich oft bei ganz gesunden Kindern vorkommt, als Zeichen der Lues betrachtet. Dann ist es freilich kein Wunder, wenn man Syphilis in allen Ecken sieht. Dagegen lässt es sich nicht leugnen, dass die Lues hereditaria nach ihrer Heilung Rachitis zur Folge haben kann, was ich einmal sogar bei einem in den allgünstigsten Verhältnissen lebenden Kinde beobachtete. Die Lues wirkt hier eben nur, wie jeder andere schwächende, die Ernährungsverhältnisse störende Einfluss, durchaus aber nicht als etwas Specificsches. Selbstverständlich dürfen die von der Lues herrührenden Schwellungen der Epiphysen und sonstige Knochenveränderungen (S. 80) nicht mit rachitischen verwechselt werden, was bei sorgfältiger Beachtung der zeitigen Verhältnisse und der begleitenden Erscheinungen leicht zu vermeiden ist.

Gibt es eine fötale Rachitis? Gewichtige Autoritäten (Virchow, Ritter u. A.) haben sich für die Existenz desselben ausgesprochen, wenn auch solche Fälle zu den grössten Seltenheiten gerechnet werden¹⁾. Ich selbst sah zwei Kinder, welche mit multiplen Verbiegungen und In-

¹⁾ Vergl. Winkler, *Arch. f. Gynäkol.* Bd. II. S. 301. und Fischer, *ibid.* Bd. VII. Heft 1. In beiden Fällen waren die mikroskopischen Veränderungen fast ganz den rachitischen entsprechend.

fractionen des Skeletts zur Welt kamen. In beiden Fällen war das Schädelgewölbe fast durchweg weich und eindrückbar, und dabei eine eigenthümliche sklerotische Härte des Oberarm- und Oberschenkelmuskels vorhanden, wie ich sie sonst nie beobachtet hatte. Der eine Fall entzog sich der weiteren Beobachtung; der andere, welcher ein 20 Tage altes Mädchen betraf, kam zur Section. Dabei fand sich eine allgemeine Craniotabes, so dass nur Knochenkern von Fünfzigpfennig- bis Zweimarkstückgrösse an den Tubera occipitalia und frontalia vorhanden waren; dazwischen nur lüftige von dünnen Knochenleisten durchzogene Schädeldecken. Die Rippen und Extremitätenknochen zeigten multiple bereits geheilte Fracturen, und nahen die für Rachitis charakteristischen Knochenveränderungen. Wenn nun auch die Frage der fötalen Rachitis noch nicht abgeschlossen erscheint, so muss man doch zugeben, dass die Krankheit sich öfters sehr frühzeitig entwickelt, und dann wohl den Namen einer congenitalen verdient, weil die Knochenaffection schon zu einer Zeit auftritt, in welcher äussere Einflüsse kaum in Rechnung gebracht werden können. Hier zeigt sich schon in den ersten Monaten des Lebens die charakteristische Epiphyseenschwellung an den Rippen und die sehr unvollkommene Ossification der Schädelknochen, während bei späterer Entwicklung, z. B. erst im Anfange des zweiten Jahres, der Kopf ganz frei bleiben kann, und nur der Thorax, die Extremitäten und die Wirbelsäule die rachitischen Erscheinungen darbieten. Später als im Beginn des zweiten Lebensjahres scheint sich die Krankheit nicht mehr zu entwickeln; vielmehr besteht sie fast in allen Fällen, welche später in Behandlung kommen, schon weit länger, kam aber den Eltern erst dann zum Bewusstsein, als die Kinder nicht zur gewöhnlichen Zeit stehen und gehen lernten.

Bei dieser Gelegenheit will ich auf die Veränderung der Schädelknochen, welche Elsässer¹⁾ unter dem Namen „Craniotabes, weicher Hinterkopf“ beschrieb, etwas näher eingehen. Die Schädelknochen, besonders das Hinterhauptbein, lassen sich hier leicht durchsagen, ja selbst durchschneiden. Die Knochensubstanz ist weich, succulent, blutreich, biegsam, an vielen Stellen rauh und porös. Ihre erdigen Bestandtheile sind vermindert. Die Auflockerung des Gewebes ist am stärksten gegen die Fontanelle und Nahe hin entwickelt, während die Ränder selbst wieder compacter erscheinen. Das Periosteum ist dick, blutreich, schwer abziehbar. Im Hinterhauptbein, aber auch in den Scheitelbeinen, besonders längs der Sutura lambdoidea, zeigen sich Eindrücke und Gruben,

¹⁾ Der weiche Hinterkopf u. s. w. Stuttgart und Tübingen 1843.

welche den Gyris des Gehirns entsprechen sollen, stark verdünnt und wie ein Kartenblatt eindrückbar sind, bisweilen aber auch nach dem gänzlichen Schwunde der betreffenden Knochensubstanz unregelmässige, ovale oder eckige, selbst haselnussgrosse Löcher darstellen, in welchen das Pericranium und die Dura mater einander berühren. Diese Erscheinungen finden sich bisweilen schon bei Kindern in den ersten Monaten des Lebens, meistens aber erst im zweiten Trimester bis gegen den 8. oder höchstens den 13. Monat. Nur in einem Fall soll das Hinterhauptstei noch bis ins dritte Jahr hinein eindrückbar gewesen sein. Elsässer, welcher diese Craniotabes als die Rachitisform des Säuglingsalters betrachtet, nimmt an, dass die rachitisch erweichten Scheitel- und Hinterhauptknochen durch den Druck der Gehirnhäutungen an den gedrückten Stellen, zumal am Occiput wegen der steilen Rückenlage, allmählig resorbiert, verdünnt und endlich durchlöchert werden. In der That findet man bei vielen Kindern im ersten Lebensjahre bei der sorgfältigen Betastung des Kopfes im Hinterhauptum nahe der Lamdaanath nachgiebige, eindrückbare, wie ein Kartenblatt knitternde Stellen. Aber in einem Theil dieser Fälle sah ich mit dem allgemainen Fortschreiten der zurückgebliebenen Ossification des Schädels auch eine Ausfüllung und Consolidirung der verdünnten Stellen erfolgen, ohne dass irgend ein anderes rachitisches Symptom sich hinzugesellte. Man kann daher, wie ich glaube, diese Craniotabes, wo sie für sich allein auftritt, nicht ohne weiteres für ein Zeichen von Rachitis betrachten, muss vielmehr Friedleben und Ritter darin bestimmen, dass sie auch ohne weitere krankhafte Veränderungen noch innerhalb der Grenzen der physiologischen Entwicklung vorkommen kann. Nach den Untersuchungen des Ersteren enthalten die hinteren Schädeltheile aller Kinder im zweiten Trimester des Lebens, besonders aber diejenigen der künstlich ernährten, etwa 8 pCt. weniger Erdsalze, als die vorderen und sind deshalb weicher, dünner und eindrückbarer. Eine anhaltende Rückenlage muss unter diesen Umständen durch den Druck, welchen das Hinterhaupt erleidet, die Knochenresorption befördern.¹⁾ Trotzdem lässt sich nicht leugnen, dass in der grossen Mehrzahl solcher Fälle allerdings anderweitige rachitische Erscheinungen am Skelet gleichzeitig bestehen oder sich später zugesellen. Ueber die von Elsässer behauptete Beziehung der „Craniotabes“ zum Spasmus glottidis habe ich mich schon oben (S. 164) ausgesprochen. —

Gestatten Sie mir nun noch einige Worte über die Pathogenese

¹⁾ Vergl. Parrét, Revue mensuelle Oct. 1879.

der Rachitis. Trotz aller Experimente und chemischen Analysen ist das Dunkel, welches dieselbe umgibt, noch keineswegs gelichtet, und die Ansichten der Autoren, welche sich mit dieser Krankheit viel beschäftigt haben, und deren Zahl mit jedem Jahre wächst, differiren so erheblich von einander, dass es bis jetzt unmöglich ist, sich ein sicheres Urtheil zu bilden. Die Untersuchung des Blutes ergab durchaus keine wesentlichen Veränderungen, denn eine geringe Abnahme der rothen, oder eine Zunahme der weissen Körperchen kann nicht als etwas charakteristisches betrachtet werden. Aber auch die Resultate der Harnanalysen zeigen so wesentliche Verschiedenheiten, dass man nicht weiss, welchem Autor man denn nun eigentlich Recht geben soll. Während frühere Untersucher eine mehr oder minder bedeutende Zunahme der Erdphosphate im rachitischen Harn gefunden haben wollten, sprechen sich fast alle neueren Autoren gegen die Vermehrung des Kalkgehaltes aus. Da einer der neuesten Autoren, Seemann¹⁾, fand sogar eine beträchtliche Verminderung des Kalks im Vergleich mit dem Harn gesunder Kinder, während Baglinsky²⁾ keinen Unterschied in der Kalkausscheidung zwischen Gesunden und Rachitischen constatiren konnte. Ist dies richtig, so ergibt sich schon daraus, dass der mangelhafte Kalkgehalt der rachitischen Knochen nicht etwa, wie man früher annahm, durch eine die Kalksalze lösende Säure (Milchsäure) bedingt sein kann, in welchem Fall die Ausfuhr des Kalks durch den Urin vermehrt sein müsste, sondern lediglich durch eine verminderte Zufuhr von Kalk. Da nun aber sowohl die Frauen-, und noch mehr die Kuhmilch ausreichende Mengen von Kalk enthalten, welche Seemann selbst in der Milch zweier Mütter, deren Kinder deutliche Spuren der Rachitis zeigten, nachwies, so kann der Grund des Kalkdefects im Knochen nicht die Folge einer mangelhaften Kalkzufuhr durch die Nahrungsmittel sein; vielmehr kann es sich hier nur um eine verminderte Aufnahme der Kalksalze von Seiten der Digestionsorgane handeln, und dafür spricht auch der Umstand, dass die Faeces dieser Kinder nach den Untersuchungen von Petersen³⁾ und Baglinsky mehr Kalk enthalten, als diejenigen gesunder Kinder von gleichem Alter.

So weit stehen wir auf einem fast sicheren Boden. Alles aber, was darüber hinausliegt, ist hypothetisch. Die Frage, weshalb die Kalksalze von den Verdauungsorganen nicht in genügender Menge auf-

¹⁾ Zur Pathogenese und Aetiologie der Rachitis. Virekow's Arch. Bd. 67. 1879.

²⁾ Ueber den Stoffwechsel in der Rachitis. Veröffentlichungen der Gesellschaft für Pathologie, Medicinische Section, Berlin 1878.

³⁾ Rehn, l. c. S. 91.

genommen und assimiliert werden, harret noch ihrer Erfolgrung; denn wenn auch die Kalksalze der Kuhmilch nur zu 25¹/₂ „ die der Frauenmilch aber zu 78¹/₂ „ verdaut werden (Uffelmann¹⁾ und die nicht verdauten Reste mit den Fettsäuren im Darm unlösliche Verbindungen eingehen, so muss man sich doch immer daran erinnern, dass auch an der Mutter- oder Ammenbrust genährte Kinder oft genug rachitisch werden. Die Theorie von Svermann und Zander²⁾, dass es sich um eine mangelhafte Bildung von Salzsäure im Magen handelt, wodurch die eingeführten Kalksalze nicht in genügender Menge zur Lösung und Resorption kommen sollen, bleibt trotz ihrer gefälligen Begründung vorläufig doch immer nur eine Hypothese, gegen welche schon eristliche Bedenken geltend gemacht worden sind.³⁾ Ob überhaupt die mangelhafte Kalkzufuhr zu den Knochen für sich allein hinreicht, die für die Rachitis charakteristischen Verhältnisse der Knochel und Knochen hervorzurufen, was Reiff und Seemann behaupten, ob zu dieser verminderten Kalkzufuhr noch eine relativ zu grosse Bildung von Milchsäure oder anderen organischen Säuren kommen muss, oder ob die Knochensäfte erst durch einen constitutionellen, auf die osteogenen Gewebe wirkenden Reiz hervorgerufen werden, wie Wegner⁴⁾ nach seinen Versuchen annimmt, ist noch eine offene Frage. Für eine in neuerer Zeit ausgesprochene Ansicht, dass die Rachitis eine Malariainfektion sei⁵⁾, kann ich in meinen Beobachtungen nicht die geringste Stütze finden.

Unter diesen Umständen sind wir außer Stande, der Behandlung eine wahrhaft wissenschaftliche Grundlage zu geben, und müssen zufrieden sein, dass wir mit den durch Empirie bewährten Mitteln hier fast immer auskommen. Dass man sowohl für die Prophylaxe, wie für die eigentliche Therapie eine zweckmässige Diät und andere hygienische Massregeln als besonders wichtig betrachtet, ist selbstverständlich, und man kann nur bedauern, dass sich diese nur in den verhältnissmässig selteneren Fällen ausführen lassen, wo die Krankheit sich bei Kindern wohlhabender Leute zeigt. In der unendlich grösseren Zahl der Fälle scheitern die hygienischen Anordnungen an der Ungunst der Verhältnisse. Eine nahrhafte, leicht verdauliche Kost (Milch, Bouillon, Eigelb, Weizen, später Fleisch), der Genuss der frischen Land- oder Seeluft, der Aufenthalt in trockenen sonnigen Räumen und eine sorgfältige Hautcultiv-

1) Archiv f. klin. Med. 1881. S. 472.

2) Virchow's Archiv. Bd. 83. S. 577.

3) Baginsky, *ibid.* Bd. 87.

4) *ibid.* Bd. 88.

5) Oppenheimer, *Archiv f. klin. Med.* XXX. Bd. 1 u. 2.

durch lauwarme Bäder, alle diese nicht nur prophylaktisch, sondern auch für die Cur der schon entwickelten Krankheit bedeutungsvollen Momente bleiben oft nur fromme Wünsche. Ganz widersinnig scheint mir das Verbot der Milch, welches sich auf einigen unzuverlässigen Versuchen über den schädlichen Einfluss der Milchsäure gründet und uns eins für den Säugling vorzugsweise geeigneten Nahrungsmittels berauben würde. Trotz der Ungunst der äusseren Verhältnisse kommt aber doch in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle die Heilung der Rachitis zu Stande, wenn nicht etwa Tuberkulose oder eine andere Complication dazwischen tritt oder die allgemeine Cachexie einen zu hohen Grad erreicht hat. Ich beginne die Cur in der Regel mit den leichteren Eisenpräparaten, zumal der *Tinctura ferri chlorati*, zu 8–10 gtt. 3 Mal täglich; sollte dieselbe, was ich bisweilen beobachtete, Diarrhoe erzeugen, so ersetze ich sie durch das *Ferrum lacticum* oder *reductum* (0,03–0,05 2mal täglich). Selbstverständlich müssen die Verdauungsorgane, um das Eisen zu vertragen, sich im guten Zustande befinden. Sollte daher Anorexie, Zungenbelag, Verstopfung oder Diarrhoe vorhanden sein, so müssen zuvor Salzsäure, dann leichte Anara, besonders die *Tinctura rhei aquosa* oder *vinosa* (10–12 gtt. 3mal täglich) gegeben werden, welche letzteren man auch mit dem Eisengebrauch combiniren kann. Einen um den andern Tag lasse man das Kind ein lauwarmes Bad mit einem Zusatz von Salz (S. 754) oder Malzabkochung oder von einem Aufguss aromatischer Kräuter (Kamillen, Kalmus etwa eine Handvoll) nehmen, und sowohl im Bade, wie auch sonst mehrmals täglich die unteren Extremitäten mit Flanell reiben und kneten, um die schlaffe Muskulatur anzuregen. Gegen die profusen Schweiße am Hinterhaupt mache man fleissig kalte Waschungen desselben, und wo erweichte Stellen im *Os occipitis* vorhanden sind, suche man nach Elsässer's Vorschlag durch die Lagerung des Kopfes in ein mit einem Loche versehenes Kissen die betreffende Partie möglichst gegen Druck zu schützen. Um aber die Krümmungen der Wirbelsäule und die Infractioren der unteren Extremitäten möglichst zu verhüten, lasse man kleine rachitische Kinder nicht ohne Stütze aufrecht sitzen, sondern meistens auf einer harten Matratze liegen, und in einem mit derselben versehenen Kinderwagen spazieren fahren, und nur mit grosser Vorsicht Steh- und Gehversuche machen.

In einer sehr grossen Zahl von Fällen kam ich mit dieser Behandlung binnen wenigen Monaten zum Ziel; nicht selten sah ich sogar schon nach einigen Wochen die Kinder Versuche machen, sich auf ihre Füsse zu stellen und Bewegungen vorzunehmen. In einer andern Reihe von Fällen hingegen, wo die Cur bei dieser Behandlung keine Fort-

schritte machte, konnte ich mich von der vielfach zerräuterten Wirkung des Leberthraus in der That überzeugen. Ich gebe denselben aber immer nur in der kühleren und kalten Jahreszeit, vorzugsweise bei mageren Kindern, und niemals mehr als zwei Kinderlöffel täglich, entweder für sich allein, oder auch in Verbindung mit den Eisenpräparaten. Von der Anwendung der Kalksalze, welche auch dem über die Pathogenese Gesagten (S. 774) von vorn herein Misstrauen erwecken muss, habe ich nie einen Erfolg gesehen und dasselbe daher längst aufgegeben.

Die rachitischen Deformitäten der Glieder, welche durch die Curvaturas und Infractioren der Knochen bedingt werden, verändern in den leichteren Graden keine besondere Behandlung, da sie sich nach erfolgter Heilung mit der Zunahme des Wachstums und der Körperfülle mehr und mehr ausgleichen und dem Auge entziehen. Ueberhaupt möchte aber, trotz mancher gegenheiligen Behauptung, keine orthopädische Behandlung und kein Schienenverband im Stande sein, wirkliche, bereits consolidirte Krümmungen und die daraus entspringenden Deformitäten zu beseitigen; nur im frischen Zustande, wo der Knochen noch weich und biegsam ist, lässt sich von diesem Verfahren etwas erwarten. Wohl aber müssen solche Verbände und besonders Stützflecken, die mit passenden Apparaten versehen sind, oft da in Anwendung kommen, wo in Folge einer stärkeren Krümmung des unteren Theils der Tibia die Kinder, wie beim Pes varus, mit dem äusseren oder inneren Fussende auftreten. Ebenso wenig kann die Orthopädie und Gymnastik entlehrt werden, wo es sich um rachitische Krümmungen der Wirbelsäule handelt. Um die rachitische Deformität des Thorax zu vermindern oder ganz zu beseitigen, ist in neuester Zeit die von Hauke angegebene „pneumatische Wanne“ empfohlen worden, in deren luftverdrängtem Baume die Kinder täglich einige Zeit belassen werden sollen. Ich selbst habe dies Verfahren noch nicht in Gebrauch gezogen, doch fordern einzelne Erfolge zur Nachahmung auf¹⁾.

Die Therapie der consolidirten Krümmungen der Extremitäten, des Genu valgum u. s. w., fällt in das Gebiet der Chirurgie, welche in neuester Zeit gerade hier durch die neuesten Eingriffe, Wiederbrechen der geheilten Krümmungen und Gypverband, Osteotomie u. s. w. grosse Erfolge aufzuweisen hat.

¹⁾ Kaulich, Prager med. Wochenschr. No. 2. 1880.

Zehnter Abschnitt.

Die Krankheiten der Haut.

Fast alle Krankheiten, welche die Haut der Erwachsenen betreffen, kommen auch im Kindesalter vor. Da sie aber sowohl in anatomischer, wie in klinischer Beziehung, mit denen des späteren Lebensalters fast durchweg übereinstimmen, so werde ich mich hier ausschliesslich auf die Betrachtung derjenigen Affectionen beschränken, welche bei Kindern überwiegend häufig beobachtet werden oder sich durch gewisse Eigenthümlichkeiten auszeichnen. Zunächst aber kann ich nicht umhin, eine Frage zu berühren, welche von jeher die Aerzte wegen ihrer eminent praktischen Bedeutung beschäftigt und die widersprechendsten Beantwortungen gefunden hat. Ich meine die Metastasen der Hautkrankheiten. Unter diesem Namen verstanden die älteren Aerzte das rasche Verschwinden einer Hautaffection und die darauf folgende Entwicklung einer inneren oder äusseren Krankheit, welche man von dem Zurückweichen des „Krankheitsstoffes“ von der Hautoberfläche nach innen abhängig machte und dadurch heilen wollte, dass man die versiegt Absonderung auf der Haut wieder hervorzurufen suchte. Die neuere Zeit will von diesen Metastasen nichts mehr wissen; insbesondere spricht sich Hebra mit Entschiedenheit gegen dieselben aus und fürchtet demgemäss von der Unterdrückung der Hautleiden durchaus keine Nachtheile für den Gesamtorganismus. In der That ist in diesem Gebiete früher vieles falsch gedeutet worden; man übersah z. B., dass nicht selten die Sache sich gerade umgekehrt verhält, dass nämlich die Hautkrankheit verschwindet, weil eine innere Krankheit sich ausbildet. So trocken chronische Kopfschläge nicht selten ein, wenn eine Meningitis sich entwickelt, ebenso wie dabei die Nasenschleimhaut trocken wird, eine Otorrhoe versiegt und Drüsenanschwellungen sich schnell zurückbilden können. Dies alles sind unbestreitbare Thatsachen. Andererseits ergab die Beobachtung, dass von eitrigen Kopfschlägen aus die eintödtliche Reizung sich durch eine Phlebitis oder Thrombose der kleinen Haut- und Knochenvenen bis in's Innere des Schädels fortsetzen und hier zu gefährlichen Erscheinungen Anlass geben kann. Trotz alledem halte ich die Frage der Metastasen noch keineswegs für entschieden. Zunächst glaube ich, dass Hospitalbeobachtungen hier lange nicht den Werth beanspruchen können, welcher ihnen sonst zukommt, weil die kleinen Patienten nach der Heilung ihrer Ausschläge aus den Kliniken sofort entlassen zu werden pflegen und das

späteres Schicksal der Meisten dem Arzte völlig unbekannt bleibt. Ich halte daher die Privatpraxis für die Lösung dieser Frage für bes. weitem geeigneter, und seitdem ich ein paar Fälle vortheilhaft beobachtet habe, in welchen auf die künstliche Suppression eines chronischen Kopfschlags fast unmittelbar eine intensive exsudative Pleuritis, Bronchitis oder Diarrhoe folgte, und mit dem spontanen Wiederauftreten des Ausschlags sofort eine auffallende Besserung eintrat¹⁾, bin ich zu der absoluten Negirung der Metastasen etwas vorsichtiger geworden. Dazu kamen später noch zwei, ganz junge Kinder betreffende Fälle, in welchen 8 bis 10 Tage nach der raschen Heilung eines Ekzema capitis et faciei Convulsionen mit letalem Ausgange eintraten. Ich weiss sehr wohl, dass diese vereinzeltten Beobachtungen keineswegs entscheidend sind, dass sie vielmehr nur das Resultat eines Zufalls sein können; trotzdem machten sie auf mich einen tiefen Eindruck und regten das längs verschwundene Bedenken wieder an, ob nicht durch das plötzliche Versiegen einer längere Zeit bestehenden, ausgedehnten eiterigen oder serös purulenten Abscedung tödtlich Hyperämien mit ihren Folgen in andern Theilen entstehen können. Diese Möglichkeit glaube ich bei der Behandlung solcher Exantheme nicht aus den Augen verlieren zu dürfen und werde bei der Therapie des Ekzema darauf zurückkommen.

I. Erythem und Interigo.

Unter den Hautkrankheiten, welche das Kindesalter, besonders die ersten Lebensjahre heimsuchen, ist das Erythem eine der häufigsten. Dasselbe charakterisirt sich durch eine kleinere oder grössere Zahl aus den verschiedensten Hautstellen, auch im Gesicht zum Vorschein kommende rother Flecken von verschiedener Grösse und Form; die kleineren, linsen- bis erbsengrossen, von rundlicher Gestalt, werden von Manchen als Rosula, die grösseren, unregelmässig geformten und über grössere Flächen ausgedehnten speciell als Erythem bezeichnet. Zuweilen geht die Hyperämie mit einer geringen Exsudation einher, wodurch die rothe Hautstelle, sei es in ihrer Totalität oder an einzelnen Stellen, oder an den Rändern infiltrirt und etwas erhaben erscheint. So entstanden viele Varietäten unter dem Namen des Erythema nodosum, papulosum, marginatum, annulare, welche mit den bei Erwachsenen vorkommenden Formen völlig übereinstimmen, daher auch bisweilen in Verbindung mit kleinen Blutextravasaten oder mit urticariaartigen Quaddeln auftreten (E. urticatum). Der Ausbruch des Exanthems erfolgt mitunter, aber

¹⁾ Berl. klin. Wochenschr. 1864. No. 5.

keineswegs immer, mit fieberhaften Erscheinungen (allgemeinem Unwohlsein, Anorexie, Pulsbeschleunigung und erhöhter Temperatur), welche indess mit der vollendeten Eruption in der Regel ihr Ende erreichen. Der Ausschlag besteht dann bei völligem Wohlbefinden noch mehrere Tage fort, worauf er allmählig erbläßt und endlich spurlos oder mit geringer Desquamation verschwindet. Diese bisweilen stark juckenden und daher zum Kratzen reizenden Ausschläge kommen besonders in den Frühjahrsmonaten vom März bis Mai häufig bei Kindern vor. Ueber die Ursachen konnte ich fast nie ins Klare kommen; nur ein paar Mal, z. B. bei einem 10 Monate alten, seit zwei Wochen entwöhnten Kinde trat ein mit starkem Jucken einhergehendes Erythema papulatum und tomentosum im Gefolge eines durch Diätfehler entstandenen Brechdurchfalls auf. Der Ausschlag kann, wenn er fieberhaft auftritt, mit Masern, und wenn er als mehr diffuses Erythem auftritt, auch mit Scharlach verwechselt werden. Das mässige Fieber, der Mangel der charakteristischen Angina und der rasche Verlauf ohne darauf folgende lamellöse Desquamation sind indess ausreichend, denselben vom Scharlach zu unterscheiden; dennoch erinnere man sich, dass bisweilen Fälle von sehr leichter Scarlatina (S. 593) vorkommen, in welchen die Diagnose keineswegs leicht ist und erst nach dem Eintritt der Abschuppung mit Sicherheit gestellt werden kann. Mancher Fall von wiederholtem Auftreten der Masern oder des Scharlach bei einem und demselben Kinde mag in einer Verwechselung mit Erythem begründet sein. Contagiosität ist den Roseola- und Erythemformen nicht eigen; wohl aber sind sie einer gewissen epidemischen Verbreitung fähig. Eine Behandlung dieser Formen ist fast niemals nöthig; nur bei fieberhaften Prodrumen halte man die Kinder im Bett und gebe ihnen ein leichtes Purgans. Da ernstere Symptome irgend einer Art in den von mir beobachteten Ausschlägen dieser Form nie vorhanden waren, bedurfte es auch keiner weiteren Therapie.

Abgesehen von den hierher gehörigen Ausschlägen, welche als Begleiter allgemeiner fieberhafter Krankheiten, des Rheumatismus, des Typhus, der Pyämie, der Diphterie sowohl bei Kindern wie bei Erwachsenen vorkommen, sehen wir nicht selten in der Umgebung wunder oder geschwüriger Hautstellen Erytheme auftreten, z. B. um die Vaccinopusteln herum, wobei der ganze Arm sich röthen und anschwellen kann, oder wie ich öfters beobachtete, in der Umgebung ekzematöser und impetiginöser Hautpartien, Erytheme, welche sich von dem unter gleichen Umständen auftretenden Erysipelas durch ihre mehr fleckige Form, durch den Mangel der Tendenz zum Weiterwandern und des Fiebers unterscheiden. Einfache Fomentationen mit Bleiwasser reichen

fist immer zur Beseitigung dieser Erytheme aus, die eben nur als reine Hautentzündungen, nicht als infectiöse Erkrankungen wie das Erysipelas zu betrachten sind.

Diesen Zuständen reihen sich nun diejenigen entzündlichen Affectionen der Haut an, welche durch directe Reizung derselben (Druck, chemische Reize) zu Stande kommen und unter dem Namen Intertrigo beschrieben werden. Bei sehr vielen Kindern im Säuglingsalter, welche nicht gehörig gepflegt werden, sehen wir am Anus, an den Genitalien, der inneren Schenkelfläche, in Folge des Contactes mit Urin und Excrementen mehr oder minder ausgebreitete, heller oder dunkler geröthete Erytheme auftreten, oft auch an den Fersen und an der hinteren Fläche der Ober- und Unterschenkel, welche sich bei der Rückenlage stets mit den durchnässeten Windeln in Contact befinden, oder auch an Stellen, wo Hautfalten sich gegenseitig berühren, wie in den Inguinalgegend, am Halse und am oberen Theil der Brust, unter den Achseln, im Nacken, hinter den Ohren. Bei manchen Kindern, auch bei gut gepflegten, besteht eine entschiedene Tendenz zu dieser Intertrigo, welche sich dann, und zwar um so eher wenn die gehörige Reinlichkeit verabsäumt wird, über grosse Strecken der Haut, z. B. über die ganze untere Körperhälfte, mitunter auch über den Rücken, den Bauch, ja über den ganzen Körper verbreitet. Dabei sieht man bisweilen kleine Ekzembäschen oder dunkelrothe Papeln hier und da auf der gerötheten Haut aufschliessen, und die letztere oft eine feuchte, glänzende und klebrige Beschaffenheit annehmen, indem das Erythem sich zu einer Dermatitis steigert, und die Epidermis durch seröse Exsudation erweicht und macerirt wird, so dass ein grosser Theil des Körpers dunkelroth glänzend, wie geschunden aussehen kann. Dasselbe geschieht auch nicht selten bei der auf die oben genannten Hautfalten beschränkten Intertrigo, und es können hier nach Abstossung der Epidermis gelblichgrau, unregelmässige, mehr oder weniger tief dringende Ulcerationen inmitten der gerötheten Haut zu Stande kommen, die beim Sitz um den Anus und die Genitalien zur irrigen Annahme von Syphilis führen können. Denselben Irrthum ist der Unverfahrene in solchen Fällen ausgesetzt, wo die um den Anus und auf den Nates entwickelte Intertrigo mit grösseren Papeln vermischt auftritt, deren abgestumpfte, ihrer Epidermis beraubte Spitzen wie rötliche oder gelbrothliche Exanationen erscheinen, und in der That eine gewisse Aehnlichkeit mit exulcerirten breiten Kondylomen darbieten können. In einzelnen Fällen sah ich die Hautentzündung tiefer eindringen, und besonders am Halse eine Phlegmone und Abscessbildung zur Folge haben. Alle diese Intertrigoformen kommen zwar auch bei den Kindern

waldhabender Familien bisweilen vor, ungleich häufiger aber bei den atrophischen verfallenen Kindern der Armen. Mangel der Reinlichkeit, Aufenthalt in überfüllten duncfen Räumen, unzureichende oder unzweckmässige Nahrung, Kälte u. s. w. vereinigen sich hier, um einen Zustand zu schaffen, welchen man sehr passend mit dem Namen der *Cachexia pauperum* bezeichnet. Bei solchen Kindern sehen wir die Intertrigoformen am häufigsten sich über einen grossen Theil des Körpers verbreiten. Durch ein unter die Epidermis gesetztes seröses Exsudat kann die letztere abgehoben werden, und bildet dann nur noch Fetzen und Lappen auf der rothen, feucht glänzenden Cutis, ähnlich wie bei umfangreichen Verbrennungen, während in anderen Fällen die rothe, aber trockene Haut mit massenhaft abgestossenen graugelblichen Lamellen, welche aus Epidermis und Sebum bestehen, überall bedeckt erscheint. Diese Fälle können, ebenso wie ausgebreitete Verbrennungen, durch Complicationen mit Pneumonie oder Durchfall einen tödtlichen Ausgang nehmen.

Die Behandlung der Intertrigo erfordert vor allem die grösste Reinlichkeit, häufigen Wechsel der Wäsche, Abwaschungen der Genitalien und der Umgebungen des Anus nach jeder Urin- und Kothentleerung, sehr häufiges Bepudern der gerötheten Partien mit einem Puder von gleichen Theilen Zinc. oxydat. alb. und Amylum, und Entfernung der sich berührenden gerötheten Hautfalten von einander durch dazwischen gelegte, mit einem Unguent. Zinci oder saturnini. bestrichene Charpie oder Leinwand. Ich benutze zu diesen Salben statt der gewöhnlichen Fette, welche leicht ranzig werden und dann noch mehr reizen, immer Vaseline, welche auch ohne Zusatz eingerieselt werden kann. Warme Bäder wirken leicht zu reizend; man lasse daher höchstens mit 26° und einen Zusatz von Kleie, Leim oder Bolus alba (50–100.0) baden. Bei den sehr ausgedehnten Formen von Intertrigo leisteten mir Bäder mit Sublimat (1.0), auch wo keine Lues zu Grunde lag, bisweilen gute Dienste, während bei hartnäckiger, auf den Anus und die Genitalien beschränkter Intertrigo tägliche Bepinselungen mit einer Lösung von Argent. nitricum (1:50) oder Sublimat (0.03:100)¹⁾ guten Erfolg hatten.

II. Lichen-Strophulus und Prurigo.

A. Lichen-Strophulus. Diese im Kindesalter ungemein häufig vorkommende Hautaffection charakterisirt sich durch zahlreiche an den verschiedensten Hautstellen, im Gesicht, auf dem Rücken, den Extremitäten

¹⁾ Wolffheider, Berl. klin. Wochenschr. 1878. No. 13.

bläs- aufschliessende discrete, oder auf einer rothen, zuweilen infiltrirten Basis gruppenförmig beisammenstehende, hell- oder dunkelrothe, zum Theil von einem Haar durchbohrte Knötchen, bald von so geringer Grösse, dass sie durch das Gefühl besser als durch das Auge wahrgenommen werden, bald umfangreicher, selbst den Durchmesser einer halben Erbsen und darüber erreichend. Meistens, aber nicht immer, findet dabei lebhaftes Jucken statt, wobei die Papeln von den Kindern blutig gekratzt werden. Ist der Ausschlag nur spärlich, so wird das Allgemeinbefinden nicht wesentlich gestört, während bei reichlicher oder gar über den grössten Theil des Körpers ausgebreiteter Eruption durch das Jucken Schlaflosigkeit und grosse Unruhe entstehen können. Ein Theil der Papeln schwindet unter allmählicher Erlassung durch Resorption; andere zeigen auf ihrer Spitze ein unscheinbares Bläschen oder ein Eiterpünktchen, welches eintrocknet und schliesslich dünne Schüppchen auf den sich verkleinernden Papeln zurücklässt. Nachschübe kommen häufig vor, und der Ausschlag kann dann mit abwechselnder Besserung und Verschlimmerung mehrere Wochen und sogar Monate fortbestehen, bis endlich Heilung eintritt.

In der Periode der ersten Dentition werden diese papulösen Ausschläge am häufigsten beobachtet und daher von Vielen als Folgen der Zahnreizung, d. h. einer von den Zahnnerven aus reflectorisch angeregten Angioneurose betrachtet. Die Bezeichnung „Strophilus“ gilt namentlich für diese Formen. Unter den örtlichen Reizen, welche diese Hautaffection veranlassen können, habe ich den Einfluss der Sonnenstrahlen auf der Hitze hervor, welche neben einem Bläschenausschlag (Ekzema solare) nicht selten auch eine Fülle äusserst kleiner rother Papeln im Nacken, auf dem Rücken, der Brust und im Gesicht hervorrufen. In sehr vielen Fällen bleibt aber die Ursache dieser Ausschläge durchaus unbekannt; eine Beziehung zu krankhaften Zuständen innerer Organe lässt sich nicht nachweisen, und mit der unerrwiesenen Annahme einer dyskrasischen Grundlage kommt man nicht weiter. Der Umstand, dass man diese Eruptionen bei armen Kindern im Allgemeinen häufiger, als in den bemittelten Ständen beobachtet, spricht dafür, dass auch hier die ungünstigen hygienischen Verhältnisse, zumal eine mangelhafte Hautkultur, nicht ohne Einfluss sind.

Die Behandlung des Lichen-Strophilus beschränkt sich bei heftigem Jucken auf lauwarme Bäder mit einem Zusatz von Kleie oder Seife. Auch zweimal täglich wiederholte Waschungen mit einer (1 bis 2 pCt.) Carbolsäurelösung sind als reizmildernd zu empfehlen. Innere Mittel haben, so weit meine Erfahrung reicht, keinen Einfluss auf das

Hautleiden, und ihre Anwendung ist um so nutzloser, als das letztere in den meisten Fällen nach einer gewissen Zeit von selbst schwindet. Bei weitem ungünstiger in Bezug auf die Heilung verhält sich

B. die Prurigo, deren von Hebra treffend entworfenes Bild ich sehr häufig schon bei Kindern in den ersten Lebensjahren zu beobachten Gelegenheit hatte. Damit stimmt auch die Ansicht des eben genannten Autors überein, dass weitaus die meisten Fälle von Prurigo sich bis auf das Kindesalter zurückführen lassen. Die Erscheinungen weichen von den bei Erwachsenen beobachteten in keiner Weise ab; auch bei Kindern finden wir die theils blassen, theils mit einem durch Aufkratzen entstandenen dunklen Blutpunkte bedeckten Prurigopapeln vorzugsweise auf den Streckseiten der Extremitäten, während die Beugeseiten frei oder nur wenig befallen sind, gleichzeitig aber auch auf dem Bauche, dem Rücken, der Brust. Das anhaltende heftige Jucken reizt die Kinder zum Kratzen, und diesem mechanischen Insulte müssen wir die weiteren Hautveränderungen zuschreiben, welche sich allmählig im Verlaufe der Prurigo entwickeln, die ekzematösen Ausschläge, die Rauhheit und Verlickung der Haut, Veränderungen, welche das ursprünglich einfach papulöse Bild wesentlich modificiren können. Auch die von Hebra hervorgehobene ungewöhnlich starke Schwellung der Lymphdrüsen in der Inguinalgegend und über den Adductoren der Oberschenkel vermisse ich bei Kindern fast niemals. Das Allgemeinbefinden ist dabei ungestört, nur kann die Störung der nächtlichen Ruhe schliesslich das gute Aussehen der Kinder beeinträchtigen, und zwar um so mehr, als die Prurigo immer ein sehr chronisches Uebel darstellt, Jahre lang mit geringen Unterbrechungen fort dauert und der Heilung fast immer hartnäckig widerstrebt.

Bei einigen an Prurigo leidenden Kindern beobachtete ich gleichzeitig oder als Vorläufer dieses Hautleidens einen Ausbruch kleiner Pomphigushlasen, welche einmal in ziemlich bedeutender Menge der Prurigo vorausgingen, in den anderen Fällen nur sehr spärlich von Zeit zu Zeit zwischen den Papeln aufschossen. Auch bei einem alten Manne, welchen ich im Sommer zu einem acuten Pomphigus von enormer Ausbreitung und schwächestlicher Dauer behandelt hatte, sah ich während des Herbstes und des darauf folgenden Winters stark juckende Prurigopapeln, an denen er früher nie gelitten hatte, an den verschiedensten Körperstellen hervorstechen.

Die Aetiologie war in allen Fällen dunkel. Weder eine erbliche Anlage, noch eine tuberkulöse Basis, auf welche Hebra Werth legt, liess sich mit Sicherheit nachweisen. Nur in einem Falle, welcher ein

10-jähriges Mädchen betraf, erfolgte der Tod durch Phthisis pulmonalis. In der Behandlung hatte ich ebenso wenig Glück, wie Andere, denn nur in einem einzigen Falle, welcher einen 8-jährigen Knaben betraf, erreichten wir eine mehrjährige Heilung, während die ebenfalls an Prurigo leidende Schwester immer wieder mit Recidiven in die Klinik kam. Tägliche Abreibungen des Körpers mit Sapo viridis im lauen Bade, später die in derselben Weise zur Anwendung kommende Vieminsche Lösung von Kalkschwefel (P. 47), schienen in diesem Falle heilsam gewesen zu sein, während dieselben Mittel in den anderen Fällen ebenso wenig leisteten, wie der innere Gebrauch der Solut. arsen. Fowleri¹⁾.

Schliesslich mache ich Sie noch darauf aufmerksam, dass eine etwas veraltete Scabies bei oberflächlicher Untersuchung, wenn man nicht sofort deutliche Milbenangänge entdeckt, leicht mit Prurigo verwechselt werden kann. An diese Möglichkeit haben Sie immer zu denken, und zwar nicht bloss in der Armenpraxis. Wiederholt beobachtete ich Scabies bei Kindern aus guten Familien, und zwar schon im ersten Lebensjahre und unter Umständen, welche jede Möglichkeit einer Infection ausschliessen schienen, wo daher die Demonstration eines Acarus nicht geringen Schrecken erregte.

III. Ekzema und Impetigo.

Unter allen Hautaffectionen des Kindesalters nehmen in Bezug auf Häufigkeit die vesiculösen und pustulösen Formen die erste Stelle ein. Durch sitorige Unrandung des Vesikelinhalts geht das Ekzem in Impetigo über, dessen Pusteln zugleich grösser werden und nach dem Zerplatzen durch Vertrocknung dickere honiggelbe Borsten zu bilden pflegen. Sehr häufig sieht man Bläschen, Pusteln und deren Residuen mit einander vermischt auf einer und derselben Hautstelle (Ekzema impetiginosum).

Schon während des Säuglingsalters, ja nicht selten bereits wenige Wochen nach der Geburt, tritt der Ausschlag, vorzugsweise im Gesicht, sehr häufig auf, und ist hier unter dem Namen „Milchschorf, Crusta lactea“ auch den Laien wohlbekannt. In der exquisiten Form desselben sieht man Stirn, Wangen, Nase, Oberlippe und Kinn mit einer mehr oder minder zusammenhängenden, oder durch Intervalle einer rötlichen excoriirten Haut hier und da unterbrochenen Borken von grünlich oder

¹⁾ Ueber die von O. Simon empfohlene Einspritzungen von Pilocarpin deken mir keine eigenen Erfahrungen zu Gebot.

schwarzbrauner Farbe, wie mit einer Maske, bedeckt, aus welcher die Augen des Kindes klar hervorschauen. An einzelnen Stellen ist die Berke heruntergekratzt und das aus der exsiccirten Haut ausseickernde Blut zu dunkeln Schorfen geronnen. Bei genauerer Untersuchung entdeckt man bisweilen auch im Umkreise der Berke oder auf den von derselben frei gelassenen Hautstellen kleine, auf rother Fläche einzeln oder gruppenförmig beisammenstehende Bläschen und kleine Pasteln, deren vertrocknetes Secret die Berke bildete. Abgesehen von dem lästigen Jucken befinden sich die meisten dieser Kinder vollkommen wohl und haben sogar ein blühendes wohlgenährtes Aussehen; doch pflügen sie benachbarte Lymphdrüsen unter dem Kieferwinkel und dem Kinn durch Vermittelung der Lymphgefäße leicht anzuschwellen. Die Dauer des Ausschlags ist sehr verschieden. In der Regel besteht er mit abwechselnder Besserung und Verschlimmerung mindestens 4—6 Wochen, oft auch Monate oder selbst Jahre lang zur größten Beunruhigung der besorgten Eltern fort. Während des Bestehens einer acuten Krankheit, z. B. einer Pneumonie, oder stärkeren Säfteverluste, zumal profuser Diarrhoe, sieht man den Ausschlag nicht selten abtrocknen, aber nach der Heilung jener intercurrenten Krankheiten von neuem zum Vorschein kommen. Die Heilung erfolgt endlich durch ein Erlöschen der ekzematösen Eruption und des von der wanden Oberfläche abgesonderten serösen Secrets, worauf die überliegenden Berken vertrocknen, abfallen und eine rothe Haut ohne Spur von Narben hinterlassen.

In einer Reihe von Fällen esser Art verbreitet sich das Ekzem des Gesichts über die behaarte Kopfhaut, das äussere Ohr, in das innere der Ohrmuschel und in den Eingang der Nase, erstreckt sich auch wohl bis auf das untere Augenlid und giebt dann leicht zu einer Entzündung der Conjunctiva palpebralis Anlass.

Die Ursachen der Crusta lactea sind dunkel. Die Annahme einer „skrophalösen“ Constitution ist meistens ganz willkürlich, doch steht fest, dass die Affection in manchen Familien erblich ist, so dass fast alle Kinder derselben, sogar durch Generationen hindurch, während des Säuglingsalters an Ekzema faciei leiden. Auch der Ernährung, zumal der zu fetten Milch einer dem zarten Alter des Kindes nicht mehr angemessenen Amme wird das Hautleiden zugeschrieben, wofür aber der Beweis, d. h. die Heilung durch Ammenwechsel, nur ausnahmsweise beibringen ist.

Auch jenseits des Säuglingsalters kommt das Ekzem häufig vor, pflügt aber dann das äussere Ohr, die Ohrmuschel, die Gegend hinter den Ohren und besonders die behaarte Kopfhaut stärker als das Gesicht zu

befallen. Das Ekzema capitis bildet oft ausgedehnte, zusammenhängende, die ganze Kopfhaut bedeckende, grünlichbraune oder graugrüne, die Haare verfallende, ziemlich fruchte Borken, aus deren Spalten das unter denselben angehäuften parient-seröse, oft sehr fidele Secret hervorsiehet. Sehr häufig wimmeln diese Borken von Läusen. In anderen Fällen ist die Affection beschränkter, und die Kopfhaut ist nur stellenweise mit den geschulterten Borken bedeckt¹⁾, welche entweder eine nussartige, oder eine ganz unregelmässige Form und eine trockene körnelartige Consistenz zeigen. Man sieht dann häufig abgelebte, durch das Wachstum der Haare emporgehobene Klümpchen in den Haaren hängen, wie Perlen, die an einem Faden aufgereiht sind (Tinea granulata). Entfernt man die Borken durch Pomment auf schonende Weise, so erscheint die Kopfhaut roth, wund und mit Secret bedeckt. Bläschen und Pusteln bilden auch hier die Urforn, welche im Umkreise der Borken und besonders dann sichtbar wird, wenn die Krankheit, was oft geschieht, auf bereits geheilten Hautstellen von neuem ausbricht. Durch das heftige Jucken werden die Kinder zum Kratzen gezwungen, welches die entzündliche Irritation unterhält. Im knochenartigen Drüsen hinter den Ohren, am Hinterkopf, unter den Kiefern, am Hals schwollen an, und das unter den Borken stagnirende, sich zersetzende Secret verhieltet in vielen Fällen einen widerlichen Geruch. Nicht selten griff auch die Hautentzündung von der Oberfläche aus mehr in die Tiefe. In mehreren Fällen sah ich inmitten der ekzematösen Partien dicke Infiltrationen der Haut, welche schliesslich in Abscess übergingen, entstanden; ja ein paar Mal löstete sich eine umfangreiche Eiteransammlung unter dem Pericranium des Scheitelbeins, nach deren Eröffnung die Sonde bis auf den Knochen drang, und an dessen Randern der bekannte Knochenzug, wie beim Cephaloematom gefühlt wurde (S. 32). In anderen Fällen

¹⁾ Man verwechselte damit nicht die unter dem Namen „Greis“ bekannte schuppige Decke, die sich häufig auf der Kopfhaut kleiner Kinder, besonders in der Gegend der grossen Fontanelle, als ein mehr oder weniger dickes, gelbliches oder bräunliches Ueberzug findet. Dasselbe ist das endliche Product einer verminderten Thätigkeit der Talgdrüsen (Sebarrhoea), vermischt mit abgestossenen Epidermiszellen. Dieser Ueberzug bleibt oft Monate lang liegen, bildet sich wieder von neuem, nachdem er schon entfernt worden war, löst sich zuletzt nicht wieder. Als ein einfaches Mittel empfehlen sich Einreibungen mit frischer Butter oder Kigell, und darauf tüchtige Waschungen mit Seifenwasser. Uebrigens kann durch den heftigen Reiz, welchen die immer sehr sich schäufelnden Schuppen und Epidermiszellen auf die Kopfhaut ausüben, schliesslich auch ein Ekzema capitis erzeugt werden, dessen serös-eitrige Absonderung und Borken mit den Producten der Sebarrhoe sich vermischen.

entwickelte sich von dem Ekzema capitis aus ein Erysipelas, welches über Nacken und Gesicht wanderte und von starkem Fieber begleitet war. (S. 44).

Die Dauer des Ekzema capitis ist meistens eine sehr lange. Nicht selten zieht es sich mit mehr oder minder langen Unterbrechungen Jahre lang, selbst bis zur Pubertätsperiode hin, zumal bei armen, der gehörigen Reinlichkeit entbehrenden Kindern. Die Haare werden dabei gewöhnlich krankhaft verändert, glanzlos, dünn, fallen aus, wachsen aber nach der Heilung der Krankheit wieder. Sobald diese erfolgt, hört die Secretion der wunden Flächen auf, die trocknen werdenden Borken lösen sich ab, und auf der gerötheten Haut bilden sich noch längere Zeit hindurch kleine gelbliche, trockne Schüppchen.

Das Auftreten des Ekzems auf der Impetigo am Rumpf und an den Extremitäten beobachtet man nicht selten bei denselben Kindern, welche an Ekzema faciei und capitis leiden. Doch können Gesicht und Kopf auch völlig verschont bleiben, besonders bei älteren Kindern im Alter der zweiten Zahnung, welche dann dasselbe Bild wie Erwachsene darbieten. Zuweilen bestand der Ausschlag schon von frühester Kindheit an, z. B. bei einem 6jährigen Mädchen, welches seit ihrem 7. Lebensmonate ununterbrochen an einem über den grösssten Theil des Körpers vertheilten Ekzem litt. Vorzugsweise befallen fand ich in diesen chronischen Fällen die Beugseiten der Ellenbogen- und Kniegelenke, die inneren Flächen der Oberschenkel und die Wadengegend. —

Der Verlauf der geschäfterten Ausschläge, an welchen Theilen sie auch ihren Sitz haben mögen, ist zwar in der Regel ein chronischer, auf viele Monate und Jahre ausgedehnter; doch kommen auch acute Eruptionen dieser Art, die nur wenige Wochen dauern, bei sonst gesunden Kindern nicht selten vor. Ich beobachtete dieselben wiederholt am Oberarm und in der entsprechenden Achselhöhle, aber auch an den unteren Extremitäten und im Gesicht, besonders am Kinn, ohne andere krankhafte Erscheinungen, zumal ohne Fieber. Bei einem 14jährigen Knaben (vorgestellt am 9. Jani 1879) erfolgte seit 10 Jahren regelmässig in jedem Frühling ein Ekzemausbruch auf beiden Wangen und Ohren, welcher etwa 4—5 Wochen bestand und dann vollständig verschwand. Bei einem 11jährigen gesunden Mädchen (7. Febr. 1881) war es seit einem Jahr schon 6- bis 7mal zum Ausbruch eines acuten Ekzems gekommen, welches nach vorausgegangenen brennenden Schmerzen immer an derselben Stelle, nämlich in der rechten Schläfengegend hervorbrach, sich bisweilen bis zum Unterkiefer ausdehnte, und 3 bis 4 Tage zu dauern pflegte, ohne dass die Untersuchung eine locale Ursache auf-

zufinden im Stande war. Mitunter kam es im Verlaufe eines chronischen Ekzema faciei plötzlich zu einem neuen acuten Ausbruch auf der schon lange bestehenden wunden Hautpartie und in ihrer Umgebung, wobei die Augenlider und das ganze Gesicht stark anschwellen, und die neu im Gesicht hervorstechenden Bläschen zu grossen Pusteln anwachsen, welche theilweise, wie die Variolapusteln, eine centrale Delle zeigten und mit einander coalescirten. Ich meldete Sie gerade auf diese Fälle besonders aufmerksam machen, weil ich Irrthümern in der Auffassung des Exanthems wiederholt begegnete. Besonders in einem dieser Fälle, welcher in der Privatpraxis vorkam, war mit voller Bestimmtheit die Diagnose „Variola“ gestellt worden, obwohl doch die völlige Integrität aller übrigen Körpertheile (nur an den beiden Handgelenken waren noch ein paar ähnliche Pusteln erschienen), der gänzliche Mangel des Fiebers und die allgemeine Euphorie von vorn herein dagegen sprachen. In der That zeigte der weitere Verlauf, dass von Variola gar nicht die Rede sein konnte. Diese acuten Steigerungen chronischer Ekzeme wurden gewöhnlich durch heftiges, Blutungen erzeugendes Kratzen der Kinder hervorgerufen.

Ich will bei den Blutungen, welche aus dem Ekzema faciei erfolgen können, noch etwas länger verweilen, weil dieselben nicht immer durch traumatische Eingriffe bedingt und daher gunstiger Natur sind, sondern weil ich in drei Fällen, welche sämmtlich Kinder im Alter von 3 bis 4 Monaten betrafen, diese Hämorrhagien erschöpfend werden und mit dem Tode enden sah. Hier schien es sich in der That um eine wirkliche hämorrhagische Diathese zu handeln, welche sich indess nur bei einem dieser Kinder durch gleichzeitige geringe Blutungen aus dem Magen und Darmkanal kund gab, während in den beiden anderen Fällen keine anderweitige Blutung stattfand. Vielmehr schien das eine Kind vollkommen gesund zu sein, während das andere an Rachitis und Spasmus glottidis litt, und ein sehr elendes, anämisches Aussehen darbot. In allen diesen Fällen riesselte das Blut fast ankaltend, ohne dass gekratzt wurde, aus den ekzematösen Flächen und Rissen, und gerann zu weichen schwarzen Borken, welche durch das nachfliessende Blut bald wieder abgespült wurden. Alle Styptica, auch das Ergotin, blieben fruchtlos, und die Kinder gingen nach einigen Wochen an zunehmender Schwäche unter Collapsercheinungen zu Grunde. Nach diesen Erfahrungen machte ich die spontanen Blutungen aus einem Ekzema faciei, welche sich ohne deutliche Ursache (Kratzen) wiederholen, immer als ein nicht unbedenkliches Symptom betrachteten. —

Von der Ätiologie des Ekzems im Allgemeinen wissen wir sehr

wenig. Nur in verhältnissmässig seltenen Fällen können wir die Ursache mit Sicherheit angeben. Zu diesen gehört besonders das acute Ekzema solare (sulare, aestivum), welches die Schweisse der Backtaschen (S. 769) begleitet, vorzugsweise aber in der Sommerhitze bei sehr vielen Kindern, schon bei Säuglingen, auf dem Rücken, der Brust, dem Halse, besonders aber auf der Stirn und den Schläfen, in Form dicht gedrängter äusserst kleiner, auf gerötheter Fläche sitzender Bläschen und Knötchen zum Vorschein kommt. Mitunter kommen auch grössere Papeln und selbst Pusteln dazwischen vor, und bei einem 3jährigen Mädchen beobachtete ich gleichzeitig ein starkes Erythem und Oedem der linken Augenlider und Stirnkälte. In anderen Fällen sind traumatische Einflüsse aetiologisch bedeutsam:

Kind von 2 Monaten, vorgestellt am 15. Nov. 1879. In Folge der Extraction mit der Zange war eine Quetschung und Erosion der Stirn erfolgt, gegen welche laue Pomade angewendet wurde. Zwei Wochen später bildete sich auf und neben den committenten Stellen ein Ekzem bis zum Scheitel hinauf mit starkem Oedem der Augenlider. Bei mehreren kleinen Kindern gab das Stechen der Ohrschläger Anlass zur Entwicklung eines Ekzems, welches entweder auf das äussere Ohr beschränkt blieb oder sich über den Nacken und Rücken ausbreitete. Auf ähnliche Weise können bekanntlich auch andere Ausschläge, namentlich Psoriasis, zu Stande kommen. So sah ich bei einem 5jährigen, zuvor ganz gesunden Mädchen fast unmittelbar nach der Verrichtung einer umfangreichen Brandwunde auf dem Hinter von dieser Stelle aus eine Psoriasis sich entwickeln, welche sich später über den ganzen Körper ausbreitete.

Sehr häufig werden Sie die Vaccination als Ursache des Ekzems beschuldigen hören. Unmittelbar oder bald nach derselben soll nach Aussage der Mutter der Ausschlag im Gesicht oder an anderen Körpertheilen zum Vorschein gekommen sein. Wenn ich auch glaube, dass viele Fälle dieser Art nur auf Zufälligkeiten beruhen, so will ich doch die Möglichkeit eines Connexes um so weniger in Abrede stellen, als andere acute Exantheme, besonders die Masern, aber auch Scharlach, Varicellen und Pocken öfters Ekzem und Impetigo im Gefolge hatten. Unsicher ist auch die immer noch vielfach geltend gemachte Beziehung zur Irritation, worüber ich nach schon früher (S. 189) ausgesprochen habe, und die häufige Annahme einer skrophulösen Basis entbehrt in vielen Fällen der Begründung. Nur da, wo andere skrophulöse Symptome vorhanden sind, ist sie gerechtfertigt. Die begleitenden secundären Anschwellungen der benachbarten Drüsen sind für sich allein nicht ausreichend.

Dass das Ekzema impetiginosum contagiosum werden könne, wird in unserer Zeit behauptet, und von Hebra u. A. ist auch ein Padergipz

beschrieben worden, welcher die Abstöckung vermitteln soll. Mir selbst kamen einige Fälle bei Geschwistern vor, unter denen besonders der eines kleinen Kindes bemerkenswerth ist, welches sein Gesicht- und Kopfkraus nach einigen Worten auf die ältere Schwester übertrug, welche das Kind trug und dabei den Kopf desselben stets an ihre Wange lehnte.

Bei dem Drängen der meisten Mütter, den zumal das Gesicht verstellenden Ausschlag so schnell als möglich zu heilen, haben Sie sich immer die Frage vorzulegen, ob eine solche radicale Behandlung auch wohl statthaft sei. Was mich betrifft, so habe ich es mir mit Rücksicht auf die (S. 776) erwähnten Erfahrungen schon seit Jahren zur Pflicht gemacht, chronische Ekzeme, welche schon viele Monate oder gar Jahre, zumal im Gesicht und auf dem Kopfe bestehen, nicht mit einem Mal, sondern allmählig zu beseitigen, indem ich einen Theil der erkrankten Haut nach dem andern local behandle, ein Verfahren, zu welchem man in vielen Fällen auch durch die grosse Ausdehnung der Affection gezwungen wird. Zunächst reibere man die Rörken durch Einschiebungen mit Vaseline, frischem Öl oder Fomentationen von lauem Wasser, auf den Kopf am besten durch letztere, welche mit einer Kappe von Wachstafel oder Guttaperchapapier bedeckt werden. Nach der Abkürzung der Rörken wird die nunmehr blossgelegte rötliche und nussende Haut mit Seifenwasser (*Sapo viridis*) täglich einmal gewaschen, und dann je einmal frisch mit dem Unguent. Hebraeum verbanden, welches 12 Stunden darauf liegen bleibt. Nur bei sehr starker Entzündung lasse ich zunächst Fomentationen mit Bleiwasser machen. Das Schwereste dabei ist, den Salbtenverband bei kleinen Kindern auf dem Gesicht zu befestigen und das Kratzen zu verhüten. Ersteres erreicht man am besten durch die Application einer auf der inneren Fläche mit der Salbe beschriebenen Leinwandmaske, letzteres durch Umwicklung der Hände und Finger mit Watte und Leinen. Statt der Hebraeischen Bleisalbe benutze ich wie auch mit Vortheil Salben von *Acidum salicylicum* (F. 48), *Tannin* (F. 49), *Borsäure* (F. 50), oder *Zink*, selbste und nur bei local beschränkten Ekzemen eine Salbe von *Hydrargyr. princip. alb.* oder *rubr.* (0,5:15,0 Vaseline). *Thierssalben* von Anfang an anzuwenden, ist nicht rathsam, weil sie leicht zu reizend wirken und die Entzündung steigern; dagegen sind sie nach vorübergehender Behandlung mit den zuvor erwähnten Salben, um die Heilung zu consolidiren, sehr zu empfehlen. Wir benutzten meistens das *Ol. cadinum*, welches als Liment (1 Th. auf 8 bis 2 Th. Olivenöl) täglich nach vorausgegangener Abseifung auf die kranken Hautstellen aufgetragen wurde. Bei der Application der Thiersalben

auf ausgedehnte Flächen haben Sie indess immer an die Möglichkeit einer reinenden Wirkung auf die Nieren (S. 366) zu denken und daher den Urin sorgfältig zu untersuchen, dessen schwärzliche Färbung oder gar Eiweissgehalt die Unterbrechung der Cur sofort erfordert.

Die Dauer dieser Behandlung ist selbstverständlich eine sehr verschiedene. Während manche Ekzeme, und selbst sehr lange bestehende, schon nach wenigen Wochen heilen, erfordern andere eine Monate lang fortgesetzte Cur bis zur Heilung, und selbst dann sehen wir häufig ohne erkennbare Ursache Rezidive des Hautleidens eintreten. In diesen sehr hartnäckigen Fällen bewies mir bisweilen der Arsenik in Form der Solut. Fowleri (F. 11) entschieden gute Dienste, zunächst, wie es schien, durch Linderung des Juckens und Kratzens. Selbst kleine Kinder von 2–3 Jahren vertrugen das Mittel in kleinen Dosen (3–5 gr. der Mischung 3mal täglich bei vollem Magen gegeben) vortreflich. Bei skrophulöser Diathese sah ich auch guten Erfolg von der Anwendung des Syrup. fern. iodati, oder der (F. 46) empfohlenen Mischung von Jod mit Jodkali. Dagegen kann ich in das Lob der vielgerühmten Seebäder nicht einstimmen, weil sie nicht selten die Ausschläge durch starke Hautreizung verschlimmerten. Weit eher möchte ich laue (26° R.) Seifen- oder Schwefellöser empfehlen, welche letztere Sie durch einen Zusatz von 50–100.0 Kali sulphurat. pr. baht. zum Bade bereiten können.

IV. Ekthyma.

Häufig beobachtet man bei Kindern, entweder mit Ekzem combinirt oder auch für sich allein, grosse eitergefüllte, mit einem rothen Saum umgebene, einzeln oder gruppenweise beisammen stehende Pasteln. Dieselben sitzen mit Vorliebe auf den Nates, den Ober- und Unterschenkeln, können die Grösse einer Erbsen erreichen, und vertrocknen zu einem schwarzbraunen Skorf, nach dessen Abstossung ein rother Fleck ohne Narbe zurückbleibt. Das Ekthyma findet sich oft bei skrophulösen, aber auch bei ganz gesunden Kindern, welche unreinlich gehalten werden, scheint auch nicht selten durch den Biss von Ungeziefer (besonders Kleiderläusen) zu Stande zu kommen, so dass man in allen Fällen auf diese Ursache sein Augenmerk richten sollte.

Das Ekthyma tritt aber häufig auch als Ausdruck einer Cachexie bei elenden, schlecht genährten, durch Noth oder Krankheit (besonders allgemeine Tuberkulose, Maseri, Scharlach) erschöpften Kindern auf, und bekommt dann oft eine schlimmere Befestigung. In der Regel bildet hier die sogenannte Cachexia pauperum die Grundlage, welche jedig-

lich durch die ständigen Lebensverhältnisse erzeugt wird, und sich durch hochgradige Anämie, Abmagerung, Schwäche und Tendenz zu chronischen Entzündungen verschiedener Gewebe kundgibt. Auch die Haut nimmt hier nicht selten in der Form des Ekthyma oder der Rupia cachectica Theil, die sich auch beide mit einander combiniren können. Der Unterschied beider Formen liegt überhaupt mehr in der Grösse der Epidermis-erhebungen, als in ihrem Contentum, da auch die schalligen Rupialblasen, welche den Umfang eines halben Markstücks und darüber erreichen können, und besonders am Rumpf, auf dem Rücken aufschliessen, mit einem trüben, eiterartigen, demjenigen der Ekthymapusteln sehr ähnlichen Inhalt gefüllt sein können. Unter diesen Umständen bilden sich aus den erwähnten Pusteln und Blasen leicht tieffringende Ulcerationen, welche ich besonders am Scrotum und in dessen Umgebung, aber auch auf dem Rücken als mehr oder weniger zahlreiche, erbsen- bis grossengrosse, runde, scharfgegrändete, wie mit einem Lochreiss herausgestossene Substanzverluste beobachtete. Mit der Besserung des Allgemeinbefindens können diese Geschwüre allmählig unter Zurücklassung entsprechender Narben heilen, während sie im entgegengesetzten Falle sich mehr und mehr vergrössern, vertiefen und vervielfachen. Am schlimmsten aber ist der unter denselben Verhältnissen bisweilen vorkommende Uebergang des Ekthyma und der Rupia in Brand. Beide Vorgänge glaube ich Ihnen am besten durch die Mittheilung der folgenden klinischen Fälle veranschaulichen zu können:

Johann B., $1\frac{1}{2}$ Jahre alt, aufgenommen am 11. März 1879, sehr atrophisch und anämisch, zeigt eine Menge von Hautgeschwüren, die nach Aussage der Eltern aus „Eiterpusteln“ hervorgegangen sind. Sitz derselben ist fast aus die Umgebung der Genitalien, Scrotum, Mast pectus, Inguinalgegend und Oberschenkel; vereinzelt auch die Nates. Linsen- bis grossengrosse Geschwüre stellen scharf abgerundete bis in den Papillarkörper der Cutis dringende Beule dar, mit gelblich grauen Grunde und etwas untermixtem Rändern. Mehrere derselben sind zu grösseren Substanzverlusten confluir. In den nächsten Tagen auch ähnliche Ulcera hinter dem rechten Ohr, welche confluire und das äussere Ohr durch einen tief dringenden ulcerösen Spalt fast vom Schädel ablösen. Tod im Collaps am 21. März. Section: Bronchopneumonia duplex, künige Degeneration der Bronchiadrinen, chronischer Darmcatarrh.

Clara P., 2¹/₂ jährig, aufgenommen am 2. April 1879, ziemlich wohlgenährt. Am rechten Bein mehrere runde Hautleiste, wovon drei von der Grösse eines Markstücks, mit gelblich speckigen Grunde und rothem scharf abgegrenzten Rand. Derselben stellen aus Eiterbläschen mit eitrigeisern Saum vor 14 Tagen entstanden sein (Ekthyma); ähnliche frische Pusteln sind noch hier und da am Körper zu sehen. Gleichzeitige starke Erythra, doppelreihige Otiorrhoe, Ekzema auricular, Drüsenentzündungen. Vom 5. an neue Parotidrupturen auf dem linken Bein, dem Rücken und der Nates, welche platzen und schnell in Ulceration übergehen. Die

letzteren fließen von 16. an besonders auf dem Rücken theilweise zusammen und bilden grosse Hautbläsere, welche einen schwammförmigen schiefigen Belag zeigen und einen entschiedenen fruchtigen Geruch haben. Allmählig werden der ganze Rücken, die Bauchhaut, zum Theil auch die Extremitäten von diesem gangränösen, tief einschneidenden Ueberschleim befallen. Fast überall sieht man kleine und grosse schwarze, theils runde, theils durch Confluenz entstandene hochligende, rauh umrandete Ektete. Fortschreitende Abmagerung mit Entkräftung, vorzügliches Fieber, welches am 26. und 27. Abends 40,8 erreicht, Husten und Diarrhoe. Entfernung des Thorax wegen des vorgeschrittenen Hautleidens nicht möglich. Tod am 5. Mai. Section: Neben dem multiplen Hautbrande fand sich chronische Ström's Pleuritis, doppelseitige Bronchopneumonie, ungeschriebener Lungenbrand im linken Unterlappen, Tuberkelose der rechten Lunge, des Bauchfells, der inneren Genitalien (Salpingitis, Perisalpingitis et Perioophoritis tuberculosa).

In diesem Falle gab die weit verbreitete Tuberkulose zu der Cachexie Anlass, in deren Gefolge das Ecthyma carboeticum und der aus diesem sich entwickelnde multiple Hautbrand sich bildete. Die bei der Section gefundene Lungengangrän ist ohne Zweifel als embolische (S. 388) aufzufassen. Ich bemerke nur noch, dass trotz der sorgfältigsten Behandlung mit Ruberantien, örtlicher Anwendung des Chlorzinks, des Tanninbleis, des Kampherweins, Carbolöls und vielständigen Sitzens im warmen aromatischen Bade nicht der geringste Erfolg erzielt wurde. Die Behandlung des gewöhnlichen, nicht cachectischen Ecthyma stimmt mit derjenigen des Ekzems im Allgemeinen überein; nur vergesse man dabei nie auf Ungewöhnliches zu fahnden und, wo man es findet, dagegen einzuschreiten, besonders die getragenen Kleidungsstücke einer gründlichen Reinigung zu unterwerfen.

V. Abscesse des subcutanen Gewebes.

Die Tendenz zu Abscedirungen des Bindegewebes ist besonders in den ersten Jahren des Kindesalters eine sehr ausgesprochene. Ich spreche hier nicht von den isolirten, auf eine einzelne Stelle beschränkten Pilegmonen, welche entweder durch traumatische Einwirkungen, oder durch den Reiz benachbarter Hautentzündungen (Ekzema impetiginosum), oder von Hyperplasien der Lymphdrüsen her besonders unter dem Kieferwinkel zu Stande kommen; sondern von den multiplen Abscessen, welche sich an vielen Stellen des Körpers gleichzeitig oder successiv ohne erkennbare Ursache entwickeln und deshalb als der Ausdruck einer „Diathese“ betrachtet werden müssen. Worauf diese Diathese beruht, wissen wir nicht. Nur soviel steht fest, dass die in Rede stehenden Infiltrationen und Abscesse, wenn sie auch bei gesunden Kindern bis und da vorkommen, doch mit grösser Vorliebe solche betreffen, welche hochgradig atrophisch oder tuberkulös sind. Je jünger die Kinder,

um so häufiger trifft man die Abscess. Schon in den ersten Monaten des Lebens sieht man multiple, an den verschiedensten Stellen des Körpers sich bildende Infiltrationen von Erbsen- bis zu Wallnuss- und Hühnereigröße, welche binnen wenigen Tagen roth werden, flurturen, aufbrechen und nach ihrer Heilung bläulich pigmentirte Narben hinterlassen. Die immer sich wiederholenden Eiterungen tragen zur Steigerung der schon bestehenden Atrophie und Schwäche erheblich bei, gehen auch bisweilen in eitrige Ulcerationen über, welche, wie ich mehrfach beobachtete, die Muskeln blosslegen und ausgebreitete Nekrosen der Haut und des Bindegewebes zur Folge haben können.

Eine andere Art von Abscessen findet sich häufig bei skrophalösen Kindern oder solchen, die an Affectionen des Knorpelsystems leiden. In der Umgebung der Fussknöchel, auf dem Fuss- und Handrücken, über den Rippen, auf dem Kopf u. s. w. findet man häufig kleine oder grössere von normal gefärbter Haut bedeckte Abscess. welche viele Wochen bestehen können, bevor sie sich röhren, und nach deren Öffnung die eingeführte Sonde auf einen cartilagen Knoschen dringt. Ein paar Mal beobachtete ich colossale Abscess auf dem Kopf, wobei der Eiter zwischen dem Knochen und Pericranium sich angesammelt und schliesslich das letztere und die äussere Haut durchbrochen hatte. In diesen Fällen konnte man ganz ähnlich wie beim Cephalhaematom (S. 372) einen wallartigen Knochenring fühlen, welcher den Abscess umgrenzte und auch hier durch periostale Auflagerung an der Grenze des Abscesses, da wo Knochen und Pericranium sich berühren, zu Stande gekommen war. Man darf indess mit einem solchen Knochenring nicht die bei kleinen Kindern oft leistenartig vorspringenden Schädelknötchen verwechseln, wie es mir selbst in einem Falle von starrer Abscessbildung am Hinterhaupt mit der Sutura lambdoidea ergangen ist. Häufig ist auch die Gegend hinter dem Ohr der Sitz umfangreicher Abscess, welche die Ohrmuschel vom Kopf abdrängen, so dass dieselbe gerade nach vorn gerichtet ist. Wird die Eröffnung des Abscesses verschoben, so bricht derselbe gern in den Mastoideus nach, externus durch, und nachdem eine tiefe Incision gemacht ist, ergiebt oft die bis auf den Knochen dringende Sonde, dass man es mit einer Caries des Felsenbeins oder des Process. mastoideus zu thun hat.

Mit besonderer Sorgfalt müssen Sie aber alle Abscess untersuchen, welche an irgend einer Stelle des Rückens, auf den Nates, in den Inguinalgegenden und an der Innenseite der Oberschenkel sich bilden, weil denselben sehr häufig als Senkungsabscess, welche von einer Wirbelcaries ausgehen, hinfanden werden.

Receptformeln.

Die Nummern der Formeln (F. 1 u. s. w.) entsprechen den gleichen im Text vorkommenden Bezeichnungen.

F. 1. Hydnargyr. oxydal. nig. 0,01
Sacch. alb. 0,5
M. f. c. d. tal. dos. 10
2mal tägl. 1 Pulver.

F. 2. Calomel 0,005—0,01
Sacch. alb. 0,5
M. f. c. d. tal. dos. 10.
2mal tägl. 1 Pulver.

F. 3. Acid. hydrochloric. 0,5—1,0
Aq. dest. 100,0
Gm. arab. 1,0
Syrup. alb. 20,0
Tinctur. Oculor. ad. 2—4.
MDS. 2stündl. 1 Kinderl.

F. 4. Creosoti gutt. 2—4
Aq. dest. 35,0
Syrup. alb. 25,0
MDS. 2stündl. 1 Theel.

F. 5. Peponi 1,0
Acid. hydrochlor. 0,5
Aq. dest. 120,0
Sacch. alb. 10,0
MDS. 4mal tägl. 1 Kinderl.

F. 6. Pulv. rad. hyome. 1,0—2,0
Tartar. emet. 0,05—0,10
Aq. dest. 30,0
Oxydul. acidi. 15,0
MDS. Alle 30 Min. 1 Kinderl.
bis zur Wirkung.

Pulv. rad. hyome. 0,5—1,0
Tartar. emet. 0,01
M. f. c. d. tal. dos. 5
S. Alle 30 Min. 1 Pulver bis
zur Wirkung.

F. 7. Calomel 0,00—0,05
Sacch. alb. 0,5
M. f. c. d. tal. dos. No. X.
S. 2stündl. 1 Pulver.

Infus. Senae compo.
Syrup. spissus corv. ad 25,0
MDS. 2stündl. 1 Kinderl.

F. 8. Kali bromat. 3,0
Aq. dest. 100,0
Syrup. simpl. 20,0
MDS. 2stündl. 1 Kinderl.

F. 9. Hydrat. chlorali 1,0—2,0
Aq. dest. 100,0
Syrup. cort. zar. 20,0
MDS. 2stündl. 1 Kinderl.

Hydrat. chlorali 0,5—0,5
Aq. dest. 50,0
MS. Zwei Kliptr.

F. 10. Morphiacet. x. murat. 0,01—0,05
Aq. dest. 35,0
Syrup. alb. 15,0
MDS. 2—4mal tägl. 1 Theel.

- F. 11. Salzi. amon. Powl. 2,0
Aq. dest. 8,0
MDS. 3mal 45gt. 10—15 gtt.
- F. 12. Ferrilantli s. refozli 0,03—0,05
Sacch. alb. 0,5
MDS. 2—3mal tigh. 1 Pulver.
Tinct. veri chlorali 10,0
DS. 3mal tigh. 8—12 gtt.
Tinct. veri chlorali s. pomati 7,5
Tinct. rhu. rhu. 2,5
MDS. 3mal 12—20 gtt.
- F. 13. Kali hydrojodici 1,0—2,0
Aq. dest. 100,0
Aq. menth. pipor. 20,0
MDS. 3—4mal tigh. 1 Kinderl.
- F. 14. Camphora trita 0,05—0,2
Sacch. alb. 0,5
M. f. s. d. tal. dos. No. 10
Zatundl. 1 Pulver.
Camphora 0,6
Spir. Vini
Aq. dest. aa 5,0
MS. Klay Fraval'sche Sympat
voll in Injectionen.
- F. 15. Ammon. mariat. 1,0—2,0
Aq. dest. 100,0
Tark. met. 0,05
Syrup. lignit. 20,0
MDS. 2stundl. 1 Kinderl.
- F. 16. Infus. rad. ipocac. 0,2—0,5 100,0
Salt. sulfurici 2,0
Aq. laurcer. 1,5
Syrup. alb. 20,0
MDS. 2stundl. 1 Kinderl.
- F. 17. Calomel 0,01—0,03
Pulv. rad. ipocac. 0,01
Sacch. alb. 0,5
M. f. s. d. tal. dos. 10
Zatundl. 1 Pulver.
- F. 18. Tartar. stibici. 0,05—0,1
Aq. dest. 100,0
Syrup. simpl. 20,0
MDS. 2stundl. 1 Kinderl.

- F. 19. Vini stibici
Oxydul. solut. aa 10,0
MDS. Abt. 10 Min. 1 Kinderl.
bis zur Wirkung.
- F. 20. Decoct. rad. Scirpae s. Polygalae
amarae (5,0) 100,0
Liquor. ammon. satiat. 1,5
Syrup. alb. 20,0
MDS. 2stundl. 1 Kinderl.
- F. 21. Camphora trita 0,05—0,05
Acid. benzoic. 0,05
Sacch. alb. 0,5
MDS. d. tal. dos. 10 in chart.
vital. 5
Zatundl. 1 Pulver.
- F. 22. Infus. bi. digital. 0,5—0,5 100,0
Salt. citr. s. Kali citr. s. Kali
sulfat. 2,0—3,0
Syrup. simpl. 20,0
MDS. 2stundl. 1 Kinderl.
- F. 23. Decoct. cort. Chinae reg. (5,0 bis
10,0) 100,0
Syrup. cort. aar. 20,0
MDS. 2stundl. 1 Kinderl.
- F. 24. Extr. Chinae rigida par. 2,0—3,0
Aq. fer. sulfur. 100,0
Syr. fer. arsenic. 20,0
MDS. 4mal tigh. 1 Kinderl.
- F. 25. Calomel 0,015
Pulv. bi. digital. 0,01
Sacch. alb. 0,5
MDS. d. tal. dos. 10
Zatundl. 1 Pulver.
- F. 26. Kali chlorat. 2,0
Aq. dest. 100,0
Syrup. simpl. 20,0
MDS. 2stundl. 1 Kinderl.
- F. 27. Decoct. cort. Chinae regiae (5,0
bis 10,0) 100,0
Kali chlorat. 2,0 s. Aq. vitian 0,5
Syrup. simpl. 20,0
MDS. 2stundl. 1 Kinderl.

- F. 28. Electuar, e Sana 25,0
Aq. dest. 100,0
Ash. tartar. 1,2
Sacch. alb. 10,0
MDS. 2-3mal tagl. 1 Kinderl.
- F. 29. Inf. rad. specar. (0,2) 100,0
Mucil. Gum. arab.
Syrup. simpl. aa 10,0
Tinct. thebaic. gutt. 2-4 s. Est.
Opil 0,02-0,05
MDS. 2-3mal tagl. 1 Kinderl.
- F. 30. Magister. Emerici 0,1-0,2
Pulv. gumm. 0,5
M. f. s. d. tal. dos. 10
2-3mal tagl. 1 Pulver.
- F. 31. Dec. rad. Oculenta (5,0-8,0) 100,0
Syrup. alb. 20,0
Tinct. thebaic. gutt. 4
MDS. 2-3mal tagl. 1 Kinderl.
- F. 32. Dec. cort. Cassiarilae (5,0-8,0) 100,0
Syrup. alb. 20,0
Tinct. thebaic. gutt. 4
MDS. 2-3mal tagl. 1 Kinderl.
- F. 33. Acidi tannici
Tinct. nuc. specar. aa 1,0
Aq. dest. 100,0
Syrup. alb. 20,0
MDS. 2-3mal tagl. 1 Kinderl.
- F. 34. Argem. nitrici 0,05-0,1
Aq. dest. 100,0
Mucil. Gum. arab. 20,0
M. ad vitr. nigr. S.
2-3mal tagl. 1 Kinderl.
- F. 35. Pimeli acetici 0,05
Pulv. gumm. 0,5
M. f. s. d. tal. dos. 10
3mal tagl. 1 Pulver.
- F. 36. Ol. ricini 20,0
Gum. arab. 1,0
L. l. a. Essenzia r.
Aq. dest. 75,0
Syr. simpl. 15,0
MDS. 2-3mal tagl. 1 Kinderl.
- F. 37. Extr. nuc. vomica spirit. 0,05
Aq. dest. 30,0
Syrup. alb. 15,0
MDS. 3mal tagl. 1 Theel.
- F. 38. Extr. stral. cornuti aq. 1,0
Glycerini
Aq. dest. aa. 5,0
MS. Eine Pravarsche Syringe
voll zu injiciren.
- F. 39. Infus. rad. rhei (5,0-8,0) 100,0
Kali tartar. 5,0
Syrup. simpl. 20,0
MDS. 2-3mal tagl. 1 Kinderl.
- F. 40. Chinin. sulphur. s. normal.
Pulv. celatini aa 0,05
Sacch. alb. 0,5
M. f. s. d. tal. dos. 10
2-3mal tagl. 1 Pulver.
- F. 41. Kali acet. 2,0-3,0
s. Liqueur. Kali acet. (5,0-8,0)
Aq. dest. 100,0
Syrup. simpl. 20,0
MDS. 2-3mal tagl. 1 Kinderl.
- F. 42. Decori. cort. Chinaz (5,0-8,0) 100,0
Kali acetici 3,0
Syrup. cort. marst. 20,0
MDS. 2-3mal tagl. 1 Kinderl.
- F. 43. Acidi tannici 10,0
Sacch. alb. 0,5
M. f. s. d. tal. dos. 10
2-3mal tagl. 1 Pulver.
- F. 44. Extr. social. cornuti. aq. 1,0
Aq. dest. 100,0
Syrup. simpl. 20,0
MDS. 2-3mal tagl. 1 Kinderl.
- F. 45. Liqueur ferri ses. phlerati 1,0
Aq. dest. 100,0
Syrup. simpl. 20,0
MDS. 4mal tagl. 1 Kinderl.

P. 46. Joli puri 0.03—0.05
 Calc. Apyrogalis 1.0
 Aq. destilat. 100.0
 Syrup. simpl. 20.0
 MDS. 3—4 mal täglich 1 Kilo-
 derdosis.

P. 47. Sulphur. citris. 80.0
 Calc. citras 40.0
 Coque c. Ag. terrib. 800.0
 Al. rosae 500.0
 Cola et filtra.
 S. Zum Einreiben.

P. 48. Acidi ascyrl. 2.5—5.0
 Spir. vini
 Glycerin. puri q. s. ad solut.
 Vanillin 50.0
 M. Unguent. S. Zum Verband.

P. 49. Acidi tartari 2.0
 Vanillin 30.0
 M. f. Ungt. S. Zum Verband.

P. 50. Acidi tartari 2.5—5.0
 Vanillin 50.0
 M. f. Ungt. S. Zum Verband.

Register.

A.

- Achras bei Lux 354.
 Achromie des Auges 45, 744, 792;
 — der Mund 428, 432; — bei Schar-
 lack 596.
 Adenitis scarlatina 686.
 Adhärenz der Schamlippen 573; — der
 Vorhaut 573.
 Adhärenz 17, 342, 575.
 Alger progressiva 16.
 Amannia 294, 353.
 Amblyopia bei Typhus 704.
 Anämie 735.
 Angina 155, 435; — crepans 433; —
 follicularis 434, 657; — Ludwig 597;
 — parotidea 449.
 Anus 346.
 Aphakie 155, 236; — bei Typhus 694.
 Aphonia erythematosa 88.
 Aphthen des Oesophagus 57.
 Apoplexia 234.
 Ascariden 485, 492.
 Ascaris lumbricoides 494.
 Asthma 338; — bronchiale 340; — dys-
 pnoicum 449.
 Atelactase der Lungen 396, 332.
 Athrope s. Atrophia.
 Atrophia ani 478.
 Atrophia 43; — circuli 252; — men-
 strua 349.
 Auscultation 5, 10.

B.

- Bambusa 568.
 Bandwürmer, Tausend 496.
 Bacteriæ Balanoposthæ 76.
 Bilelithia 21.
 Blasenstein 573.
 Blutbrechen 52; — hysterisches 564.
 Blutungen bei Ekzema 287.
 Blüte s. Crisp.
 Blutharshall 433.
 Bronchialsupp 321; — Drüsen, Tuber-
 kulose des 380; — Katarrh 325.
 Bronchiectasie 361.
 Bronchitis 325; — catarrhalis 328.

- Bruchhypertrophie 65, 325, 330, 398, 711;
 — verhillen 627.
 Bruchschleimhaut 479.
 Bruchström, Entzündung der 37.

C.

- Cagal obliquus 37.
 Canes des Felsenbeins 215, 251, 271; —
 der Rippen 349; — des Schenke 251.
 Cephalæmia 31.
 Cerebrale Lähmung, atrophische 252.
 Chloroform gegen Gonorrhoe 148.
 Cholera 118, 455.
 Chorea 177, 419; — electra 190; —
 magna 199.
 Chorioides, Tuberkulose des 285.
 Colica fatalis 115.
 Colla 470.
 Contractura asi 477.
 Contractures, Hämiplegische 168; — syphi-
 litische 98.
 Corrhoeen 20, 145, 195.
 Craniotomie 164, 770.
 Creep 316; — bei Euphemia 468; —
 bei Masern 696; — bei Scharlack 608.
 Crusta lactea 783.
 Cynose 406.

D.

- Daktylitis erythematosa 91.
 Darmblutung 59, 480, 709, 728; — ein-
 schüßig 479; — geschwür 325, 464;
 katarrh 117, 463; — erythema 82, 526;
 Dentition 128, 151, 268, 428.
 Diarrhoe absterilis 115; — catarrhalis
 112, 461, 692; — verhillen 428; —
 verhillen 618.
 Diphtherie 347, 355, 465, 477, 483; —
 Collaps bei der 667, 676; — des Darms
 468; — der Genitalien 669; — Ema-
 tieme bei der 666; — maligne 640;
 — Paratons bei der 678, 690; —
 scarlatina 645; — septica 648.
 Dondalgeschwür 61.
 Doctus Botalli 496.
 Dysenterie 470; — chronische 472.

Dyspepsia 87, 102, 118; — gastrica 113, 151, 447; — intestinalis 113.
Dysuria 372.

E.

Eklampsie 145, 168.
Ekthyma 743, 790; — carboaceum 791.
Ekzema 45, 347, 783; — acutum 786;
— impetiginosum 785; — sebum 788.
Embolia 238.
Encephalitis interstitialis 50.
Encephalose 34.
Endometritis 412, 725; — ovariorum 602, 412; — scarlatinea 417, 600.
Eosinie 155, 402, 409.
Eosinophilus 519.
Eosinose 69.
Eosinose 576.
Erythema 151, 165.
Ektrosien der Säuglinge 112; — ovariorum 455.
Erkältung 11; — akute 73.
Erysipelas 44; — neonatorum 39.
Erythema 777.
Erythema, skrophulöses 747.
Exanthea, multiple 780.

F.

Facies 37.
Facies remansens 721.
Fathia 422.
Fathia 347.
Fathia, rheumatische 726.
Fathia, typische 697.
Fathia avi 477.
Fathia alba 229, 629.
Fathia 37.
Fathia ovata 406.

G.

Gährungsstypus 115, 456.
Gährungsstypus, Gährungsstypus 24.
Gastritis bei Mucin 544; — der Hohl 615, 731.
Gastritis 118.
Gastritis 57; — gastrica 58; — kalische 14.
Gastritis, Abnorm des 554; — Atrophie des 252; — Geschwülste des 719; — Genua des 255, 31; — Hyperämie des 264; — Schmelz des 256; — Taktik des 223.
Gastritis bei Scharlach 187, 418, 600; — bei Syphilis 34; — bei Purpura 728.
Gastritis 9, 18.
Gastritis 335.
Gastritis 785.

H.

Hämat. strigatissima 745.
Hämato des Stomatostomus 26.
Hämophylus 280.
Hämorrhagien des Gehirns 224.
Hämorrhagische Hämato 268, 687.
Hämorrhoiden 485.
Hämorrhoiden 478.
Hämorrhoiden 572.
Hämorrhoiden nach Typhus 716.
Hämorrhoiden 154, 61.
Hämorrhoiden 238.
Hämorrhoiden 422.
Hämorrhoiden 187; — angustata 405.
Hämorrhoiden, welche a. Craniophylus.
Hämorrhoiden 11.
Hämorrhoiden, typische der 65.
Hämorrhoiden 727.
Hämorrhoiden 709, 458.
Hämorrhoiden 275, 264; — der 247, 260.
Hämorrhoiden 571.
Hämorrhoiden 600; — typische 715.
Hämorrhoiden, typische 202.
Hämorrhoiden des Harns 427, 431; — der Mucosa 722; — der Tactik 428.
Hämorrhoiden 492, 450.

I.

Icterus 329; — neonatorum 39.
Icterus a. Typhus.
Icterus 478.
Icterus 165.
Icterus 178.
Icterus 600.
Icterus 156, 721.
Icterus 777.
Icterus 479.

K.

Karnia 312.
Karnia, skrophulöse 748.
Karnia 225, 223, 281, 629.
Karnia, typische der 757.
Karnia 719.
Karnia 76.
Karnia 410.
Karnia, typische 768; — typische 89, 35; — skrophulöse 750.
Karnia 210.
Karnia 85, 160.
Karnia 11.
Karnia 238.
Karnia 11.
Karnia 127; — typische 618; — neonatorum 607; — typische 84.
Karnia a. Typhus 700.

Kryptorchie 579.
Kubisch 74.

L.

Lackkrämpfe 176.
Lähmungen 197; — cerebrals 234, 252;
— diphterische 678, 690; — periph-
erische 213; — spinale 219; — trache-
len 760; — syphilitische 55.
Laparotomie 184.
Laryngitis 311; — tuberculosa 315.
Laryngostomie 312.
Lebenswälsche 31.
Leber, Absoner der 527; — Angioden-
terung 524; — Cirrhose 522; — Ekt-
omose 523; — Fettsucht 527;
— Sarkom 523; — Syphilis 96, 524.
Leukämie 583, 745.
Licht'sche Suppe 76.
Lichen-Straphalar 780.
Lithias 179; — vesicalis 489, 573.
Lues s. Syphilis.
Lungen, Absoner der 524, 556; — At-
lectase 546, 552; — Brand 588, 644,
713; — Eitelfüllung 525, 545; —
Schwamm 541; — Tuberkulose 574.
Lungenarterie, Stenose der 469.
Lupus 747.
Lymphdrüsen, skrophalose 745.

M.

Magen, Erweiterung des 453; — Geschwür
im.
Malacia 722.
Maser s. Morbilli.
Mastitis 37.
Masthose, Polyp der 455; — Vordrill des
458.
Melaena menstruaria 59.
Meningitis tuberculosa 642; — scrophalosa
604; — simplex 588; — tuberculosa
572.
Mercuriole 34.
Mesenterium, Frühstige 581.
Mesenterialdrüsen, Tuberkulose der 549.
Metastasen der Hautkrankheiten 779.
Migräne 298.
Milch 72; — epidemische 15.
Milchstreifen der Neugeborenen 38.
Miliarietuberkulose, acute 585.
Miliarius 551; — typhöser 704.
Morbilli 588, 492, 629; — haemorrhagici
625; — spec. 646.
Morbus maculosus 746.
Mortalität 2.
Mumps 440.
Mundbrand s. Stoma.

Mundhöhle 2, 14.
Myocarditis 421.
Myositis 37, 98.

N.

Nase, Entzündung der 501, vngl. Rhyn.
Nephritis 50, 540; — arthritische 566;
— chronica 469, 559; — diphterica
563, 662, 675; — haemorrhagica 541,
545; — mercurialis 564, 644; — scar-
latinosa 542; — syphilitica 568; —
nach Eitelfüllung 565; — nach Inter-
mittens 564; — nach Paronitis 564;
— ohne Albuminurie 553, 569.
Nessel'ss Haut 76.
Neuralgie 238.
Nekkrampf 173.
Nerv, Entzündung des 549; — Sarkom
567.
Noma 436, 644.
Nyctagmus 174.

O.

Olecranon sibi 473.
Odem 42, 569; — der Neugeborenen 48;
— periodisches 571.
Oedema glottidis 515, 547.
Oesophagus, Stenose des 413.
Ovaris 176, 207.
Osteomyelitis, skrophalose 750.
Ovaris, multiple 751.
Ovaris 294, 609; — scrophalosa 598.
Ovariole, skrophalose 745.
Oxyuris vermicularis 492.

P.

Pachymeningitis 538, 565.
Pachytrichose 750.
Paralyse s. Lähmungen; — hysterische
197, 206; — des N. facialis 213, 728,
599; — des Plexus brachialis 217.
Paronitis 440, 711.
Pars acutissima 211, 459.
Pentagmus acutissimus 52; — syphiliticus
56, 86; — bei Psoriasis 782; — bei
Scharlach 636; — bei Masern 644.
Pericarditis 3.
Pericarditis 361, 415, 419, 725.
Pericarditis alveolaris 141.
Peritonitis acuta 503, 552; — chronica
504; — tuberculosa 511.
Perityphilitis 561.
Pharyngitis 435.
Phimose 575.
Pleuritis 153, 262; — jointis 379; —
tuberculosa 583.

Urethra, Atresia der 572; — Polyp der 581.
Urin 16.

V.

Vaccination 85, 188.
Vaginalblutung 581.
Vasculen 648.
Verbrenn. 571.
Verhärtung des Zellgewebes 46.
Vulva, Atresia der 583; — Hymen der 582; — Hymenitis der 615; — Entzündung der 581; — Geschwüre der 582, 584; — Carcin. der 583.


W.

Wechseljahre u. Entzündungen
Windpocken u. Variolen
Wundwunden 416.

Z.

Zäken 825.
Zahnfleisch, Scarsinosen des 141.
Zange 14; — Aspiration der 128, 161.
Zungenblutungen, Geschwüre der 255.

22869



Accession no. 22869

Author Henoch:
Vorlesungen über
Kinderkrankheiten.

Call no. RJ44
883H

